This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.


IBL. RADCL
133



Die

Säugthiere

in

Abbildungen nach der Natur

mit Beschreibungen

von

Dr. Johann Christian Daniel von Schreber,

Präsidenten der Kaiserl. Königl. Akademie der Naturforscher, Königl. Preuß. geheimem Hofrathe und ordentlichem ersten Lehrer der Naturgeschichte und Arzneikunde auf der Friedrich-Alexanders-Universität, mehrerer gelehrten Gesellschaft Mitgliede ꝛc. ꝛc.

Fortgesetzt

von

Dr. Johann Andreas Wagner,

ordentlichem Mitgliede der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Professor der Zoologie und Palaeontologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ꝛc. ꝛc.

Supplementband.

Fünfte Abtheilung:

Die Affen, Zahnlücker, Beutelthiere, Hufthiere, Insektenfresser und Handflügler.

Leipzig

Verlag von T. O. Weigel.

1855.

BODLEIAN
D
16JAN1953
LIBRARY

Die

Säugthiere

in

Abbildungen nach der Natur und mit Beschreibungen.

Eine Zusammenstellung der neuesten Entdeckungen

auf dem

Gebiete der Säugthierkunde

bearbeitet

von

Dr. Johann Andreas Wagner,

ordentlichem Mitgliede der K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ꝛc. ꝛc.

Leipzig

Verlag von L. O. Weigel.

1855.

Schnellpressendruck von C. H. Kunstmann in Erlangen.

Vorrede.

Nachdem das Verlagsrecht und die sämmtlichen Vorräthe des Schreber'schen Säugthierwerkes von den früheren Besitzern auf Herrn T. O. Weigel übergegangen waren, habe ich mich auf dessen Aufforderung entschlossen, den bisher erschienenen vier Abtheilungen des Supplementbandes eine fünfte nachfolgen zu lassen. Die ersten vier Abtheilungen desselben waren in den Jahren 1839 bis 1844 ausgegeben worden, und der seitdem verflossene Zeitraum war lange genug, um theils durch Entdeckung zahlreicher neuer Species, theils durch genauere Bekanntschaft mit früher unvollständig oder selbst fehlerhaft gekannten Arten ein ansehnliches Material zu erhalten, das zur Vervollständigung und theilweisen Berichtigung meiner älteren Arbeiten dienen konnte.

Der vorliegende Band befaßt sich mit den Ordnungen der Affen, Zahnlücker, Beutelthiere, Hufthiere, Insectenfresser und Handflügler. In denjenigen Abtheilungen, in welchen nur einzelne Entdeckungen nachzutragen waren, habe ich dieselben, unter Verweisung auf meine frühere Bearbeitung, einfach nach der systematischen Reihenfolge aufgeführt; in denjenigen Familien und Ordnungen aber, wo dieselben zahlreich sich ergaben, und zugleich in der systematischen Stellung und Charakteristik der älteren Arten häufige Aenderungen nothwendig machten, hätte eine ähnliche Eintragung eine solche Zerstückelung in der Darstellung veranlaßt, daß eine geordnete Uebersicht über diese Gruppen höchst erschwert worden

wäre. Um diesen Uebelstand zu vermeiden, habe ich es vorgezogen bei den Ordnungen der Affen, Beutelthiere, Insektenfresser und Handflügler, so wie bei den Familien der Hirschthiere und Antilopen, sämmtliche Arten in systematischer Ordnung aufzuführen, um immer am gehörigen Orte die Einschaltungen und Berichtigungen eintragen zu können, wodurch die Einheit und Uebersichtlichkeit der Darstellung vollständig gewahrt wurde.

Wie es sich von selbst versteht, wurden die hinreichend bekannten Arten nur ganz kurz behandelt, dagegen die neuen oder die zu berichtigenden in genauere Betrachtung gezogen. Um indeß diese neue Ergänzung meiner früheren Arbeit nicht allzusehr auszudehnen, habe ich mich so viel als möglich der Kürze befleißigt und hauptsächlich diejenigen Merkmale hervorgehoben, welche mir zur Unterscheidung verwandter Species am meisten geeignet erschienen. Wer weitere Belehrung über diese oder jene Art sucht, kann dieselbe in der von mir mit großer Sorgfalt aufgeführten Literatur finden.

Auf die specifische Vereinigung nahe verwandter, mir aber nicht ausreichend bekannter Formen bin ich diesmal schwieriger eingegangen als früherhin. Erstlich hat mich die Erfahrung belehrt, daß bei genauerer Bekanntwerdung mit denselben, insbesondere auch mit ihren Verbreitungsverhältnissen, nicht selten solche sich wirklich als besondere Arten erwiesen haben. Dann aber auch trübt die Trennung, selbst wenn sie sich späterhin als unbegründet herausstellen sollte, die Anschauung weniger als eine voreilige Vereinigung, die bei weiteren Untersuchungen als unhaltbar sich ergiebt. In letzterem Falle wird die Beschreibung leicht zu einer Vermengung heterogener Merkmale und ist dadurch zum großen Theile unbrauchbar und irreleitend; im Falle der Trennung werden aber auch die Beschreibungen auseinander gehalten, und bleiben naturgetreu und brauchbar, mögen nun solche Formen im Laufe der Zeiten sich als bloße Varietäten einer Species oder als wirklich gesonderte Arten ausweisen. Von einer sichern Feststellung sämmtlicher Arten sind wir dermalen noch immer weit entfernt.

Da der Druck dieser Abtheilung über zwei Jahre andauerte, so konnte es nicht fehlen, daß die in diesem Zeitraume erschienene oder mir doch erst zugänglich gewordene neueste Literatur abermals Nachträge nothwendig machte, von denen ich wenigstens die wichtigsten in einem besonderen Anhange am Schlusse aufzunehmen für räthlich hielt. Beim Gebrauche dieses Bandes ist daher auf das Inhaltsverzeichniß besondere Rücksicht zu nehmen, da in demselben die Nachträge bei den betreffenden Arten mit citirt sind. So angelegentlich ich mich auch bestrebt habe, die neuere Literatur in möglichst vollständiger Weise zu benützen, so mag mir doch hie und da Einiges entgangen seyn oder ist mir wenigstens zur Benützung noch nicht zugekommen. Die Jahresberichte, welche ich über die Leistungen im Gebiete der Säugthierkunde im Archiv für Naturgeschichte seit dem Jahre 1841 erscheinen lasse, werden dazu dienen solche Auslassungen nachträglich zur Vorlage zu bringen.

Indem der vorliegende Band dazu bestimmt ist, eine möglichst vollständige Zusammenstellung dessen zu geben, was seit dem Abschlusse meiner früheren Arbeiten die neuere Zeit auf dem Gebiete der Säugthierkunde, zunächst der in dieser Abtheilung abgehandelten Ordnungen, geleistet hat, so macht er nicht blos eine Fortsetzung des Schreber'schen Werkes aus, sondern bildet zugleich ein selbstständiges, für sich bestehendes Werk, welches deßhalb auch unter dem eigenen Titel: „die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur und mit Beschreibungen, eine Zusammenstellung der neuesten Entdeckungen auf dem Gebiete der Säugthierkunde," besonders ausgegeben wird.

Für die Abbildungen ist dießmal, statt des Kupferstiches, die für bildliche Darstellung von Säugthieren weit geeignetere Lithographie gewählt und die Colorirung, da sie unter meiner unmittelbaren Aufsicht erfolgte, mit größter Sorgfalt ausgeführt worden. Einen besondern Werth werden diese Tafeln dadurch erlangen, daß ich bei den Beutelthieren und Handflüglern die günstige Gelegenheit hatte, die von Joh. Natterer in Brasilien nach frischen Exemplaren mit meisterhafter Vollendung an-

gefertigten Abbildungen benützen zu können. In der Regel sind die beigegebenen Tafeln gleich bei den Diagnosen der Arten citirt; da jedoch zuletzt der Text früher als die Tafeln vollendet wurde, so konnte die erwähnte Anführung nicht mehr stattfinden, und es wird deshalb auf das Inhaltsverzeichniß verwiesen, in welchem die Abbildungen gleich bei den einschlägigen Arten angegeben sind.

Zwei und zwanzig Jahre sind nunmehr verflossen, seitdem ich mit der Fortsetzung von Schreber's Naturgeschichte der Säugthiere den Anfang gemacht und dieselbe, wenn auch mit Unterbrechungen — die letzte betrug sieben Jahre — bis jetzt fortgeführt habe. Ich muß es als eine besondere Gnade Gottes rühmen, daß er mir in diesem, für ein Menschenleben immerhin verhältnißmäßig langen Zeitraume hiezu Kraft und Ausdauer geschenkt hat.

München, den 28. September 1855.

A. Wagner.

Inhaltsverzeichniß

mit Angabe der Abbildungen.

I. SIMIAE.

Seite

I. Fam. S. catarrhinae 5

I. SIMIA 5

a) Troglodytes

1. S. Troglodytes 5, 783
2. S. Gorilla 8, 784

b) Pithecus

3. S. Satyrus tab. 1 . . . 11, 785

II. HYLOBATES 14

1. H. syndactylus 15
2. H. Lar 15
3. H. variegatus 16
4. H. leuciscus 17
5. H. concolor 17
6. H. funereus 18
7. H. Hulok 20
8. H, leucogenys 20

III. SEMNOPITHECUS . . . 21

1. S. melalophos 21
2. S. rubicundus 22
3. S. chrysomelas 22
4. S. sumatranus 23
5. S. Maurus 23

Seite

6. S. pruinosus 24
7. S. frontatus 24
8. S. comatus 24
9. S. siamensis 25
10. S. leucoprymnus 25
11. S. cucullatus 26
12. S. jubatus 26
13. S. albigena 27
14. S. obscurus tab. 2 27
15. S. Phayrei 28
16. S. albocinereus 29
17. S. pileatus 30
18. S. hypoleucus 31
19. S. Entellus 32
20. S. Anchises 32
21. S. schistaceus 33
22. S. Priamus 33
* S. albipes 34
23. S. Thersites 34
24. S. nemaeus 35
25. S. nasicus 35

IV. COLOBUS 35

1. C. Guereza 36, 789
2. C. polycomos 36
3. C. Satanas 36

Seite

4. C. ferrugineus 37
5. verus (C. olivaceus) 37

V. CERCOPITHECUS 37

a) Miopithecus

1. C. Talapoin 38

b) Cercopithecus

2. C. cynosurus 38
3. C. pygerythrus 39
4. C. Lalandii 39
5. C. griseoviridis 39
6. C. sabaeus 40
7. C. rufo-viridis 40
8. C. flavidus 41
9. C. Werneri 42
10. C. ruber 42
11. C. pyrrhonotus 42
12. C. ochraceus 43
13. C. Pogonias 43
14. C. Burnettii 43
15. C. Samango (C. labiatus) . . . 44
16. C. albigularis (C. monoides) tab. 3. 45, 790
17. C. erythrarchus 46
18. C. Mona 47
19. C. Campbelli tab. 4. . . . 47, 790
20. C. Diana 48
* C. palatinus 47, 790
21. C. leucampyx 48, 790
* C. Pluto 48, 791
22. C. erythrotus 49
23. C. cephus 49
24. C. nictitans 50
25. C. Petaurista 50
26. C. melanogenys 50
27. C. Ludio 51

c) Cercocebus

28. C. fuliginosus 51
29. C. collaris 52
30. C. Aethiops 52
31. C. lunulatus 791

VI. INUUS 52

a) Macacus

1. I. cynomolgus 52
* palpebrosus 54

Seite

2. I. pileatus 55
3. I. sinicus 56

b) Rhesus

4. I. erythraeus 56
5. I. Pelops 56
* assamensis 57
6. I. nemestrinus 57

c) Inuus

7. I. arctoideus 57
8. I. speciosus tab. 5 58
9. I. ecaudatus 59
10. I. fusco-ater 59
* ocreatus 59

VII. CYNOCEPHALUS . . . 60

a) Cynopithecus

1. C. niger 61
2. C. nigrescens tab. 6 61

b) Theropithecus

3. C. Silenus 62
4. C. Gelada 62

c) Cynocephalus

5. C. Hamadryas 62
* C. Toth 62
6. C. Babuin 63
* C. Anubis 63
7. C. Sphinx 64
* C. Choras 64
** C. rubescens 792
8. C. ursinus 65
9. C. Mormon 65
10. C. leucophaeus 65

II. Fam. S. platyrrhinae 65

†) GYMNURAE.

VIII. MYCETES 66

1. M. fuscus 67
2. M. ursinus 67
* M. seniculus & chrysurus . . 68
3. M. Caraya 68
4. M. rufimanus 69
5. M. flavicaudatus 70

Seite

6. M. palliatus 71
7. M. stramineus 71

IX. LAGOTHRIX 73
1. L. olivacea 73
2. L. infumata 73

X. ATELES 74

a) Ateles

1. A. pentadactylus 74
2. A. Paniscus 75
3. A. ater 76
4. A. marginatus 77
5. A. Belzebuth 77
* A. variegatus 78
** A. melanochir 78
6. A. hybridus 79

b) Eriodes

7. A. hypoxanthus 79
8. A. arachnoides 80
9. A. frontatus 82

††) CEBIDAE.

XI. CEBUS 82
1. C. Azarae 83
2. C. Fatuellus 84
* elegans, ** vellerosus . . . 86
*** barbatus, **** libidinosus . 87
3. C. Capucinus 87
4. C. olivaceus tab. 8 87
5. C. hypoleucos 88
6. C. nigrivittatus 88
7. C. gracilis 90
* albifrons 93
** flavus, *** chrysopus . . . 94
8. C. versicolor 95
9. C. xanthosternus 95
10. C. macrocephalus 96
* unicolor 96
** castaneus 97

†††) ANETURAE.

XII. PITHECIA 97

a) Pithecia

1. P. leucocephala 97
* albinasa 101

Seite

2. P. hirsuta 101
3. P. Satanas 102

b) Brachyurus

4. P. melanocephala 102
5. P. Ouakary 103
6. P. calva 104
7. P. rubicanda 104

XIII. NYCTIPITHECUS 105
1. N. felinus 106
2. N. trivirgatus 106
3. N. Oseryi 107
4. N. vociferans 108

XIV. CALLITHRIX 109
1. C. personata 110
2. C. nigrifrons 110
3. C. Gigot 112
4. C. melanochir 113
5. C. Moloch 113
6. C. cuprea 114
7. C. cinerascens 115
* donacophila 116
8. C. caligata 117
9. C. brunnea 118
10. C. torquata 119
11. C. amicta 119

XV. CHRYSOTHRIX 120
1. Chr. sciurea tab. 9 120
2. Chr. entomophaga tab. 10 . . . 121
3. Chr. nigrivittata tab. 11 . . . 122

††††) HAPALIDAE.

XVI. HAPALE 124

a) Jacchus

1. H. Jacchus 124
* albicollis 124
2. H. penicillata 124
* leucocephala 124
3. H. aurita 125
4. H. chrysoleucus 125
5. H. pygmaea 126
6. H. melanura tab. 13 127

Seite

7. H. argentata 128
8. H. rufiventer 129

b) Midas

9. H. Mystax 129
10. H. labiata 130
11. H. pileata 130
12. H. fuscicollis 131
* flavifrons 131
13. H. nigricollis 132
14. H. Devilli 133
15. H. Weddellii 134
16. H. Illigeri 134
17. H. nigrifrons 135
18. H. Ursula 135
19. H. Midas 135
20. H. bicolor tab. 12 135
21. H. Geoffroyi 137
22. H. Oedipus 138
23. H. Rosalia 138
24. H. leonina 138
25. H. chrysopyga 138
26. H. chrysomelas 139

III. Fam. Prosimii 139

†) BRACHYTARSI.

XVII. LICHANOTUS 140
1. L. brevicaudatus 140

XVIII. HABROCEBUS . . . 140
1. H. lanatus 140
2. H. Diadema 141

XIX. LEMUR 141
1. L. Catta 142
2. L. Macaco 142
3. L. ruber 142
4. L. rubriventer 142
5. L. flaviventer 143
6. L. collaris 143
* albimanus 143
7. L. brunneus 143
8. L. rufus 144
9. L. albifrons 144

Seite

10. L. Mongoz 144
* nigrifrons 144
11. L. anjuanensis 145
12. L. rufifrons 145
13. L. coronatus 146
14. L. chrysampyx 146

XX. GALEOCEBUS 147
1. G. murinus 147

XXI. CHIROGALEUS 147
1. Ch. cinereus 148
* olivaceus 149
2. Ch. Milii 149
3. Ch. furcifer 149
4. Ch. typicus 150
5. Ch. Smithii 150

XXII. STENOPS 150
1. St. gracilis 151
2. St. tardigradus 151
3. St. javanicus 152

XXIII. PERODICTICUS . . . 152
1. P. Potto 153, 792

††) MACROTARSI.

XXIV. MICROCEBUS 153
1. M. murinus 154
2. M. myoxinus 154

XXV. OTOLICNUS 156
1. O. crassicaudatus . . . 156, 792
2. O. Galago 158
* conspicillatus 159
3. O. Alleni 159, 793
* Garnetti 157
4. O. Peli 793
? O. Demidoffii 160
? 5. O. minor 159

XXVI. TARSIUS 160
1. T. Spectrum 160

Seite

II. EDENTATA.

I. BRADYPUS 168, 794
II. DASYPUS 173
1. D. gigas 174
2. D. gymnurus 174
3. D. minutus 176
4. D. tricinctus 176
5. D. conurus 178
6. D. novemcinctus 178
7. D. hybridus 179
III. ORYCTEROPUS . . . 179, 795
IV. MANIS 179
1. M. tricuspis 180, 796
2. M. tridentata 181
3. M. Guyi 183
4. M. javanica 185
5. M. leucura 185
6. M. laticaudata 186
7. M. Temminckii 187
?8. M. leptura 186

III. MARSUPIALIA.

I. Fam. Dasyurina 192
I. THYLACINUS 192
1. Th. cynocephalus tab. 14 . . 193
II. DASYURUS 193
a) Sarcophilus.
1. D. ursinus tab. 15 193
b) Dasyurus.
2. D. viverrinus 194
* D. Maugei 194
3. D. Geoffroyi 194
4. D. hallucatus 195
5. D. macrurus 196
III. PHASCOLOGALE 196
a) Phascologale.
1. Ph. penicillata 198
2. Ph. calura 198

Seite
b) Antechinus.
3. Ph. melas 198
4. Ph. Swainsonii 199
5. Ph. apicalis 199
6. Ph. unicolor 796
7. Ph. flavipes 200
8. Ph. leucogaster 201
9. Ph. minima 202
10. Ph. maculata 202
11. Ph. minutissima 203
12. Ph. albipes 203
* leucopus 204
13. Ph. ferrugineifrons 796
14. Ph. murina 204
15. Ph. fuliginosa 205
c) Podabrus.
16. Ph. macrura 205
17. Ph. crassicaudata 206
d) sedis incertae.
18. Ph. Virginiae 207
IV. MYRMECOBIUS 207
1. M. fasciatus tab. 16 209
II. Fam. Syndactylina 209
V. PERAMELES 209
a) Macrotis.
1. P. lagotis 210
b) Perameles.
2. P. macrura 211
3. P. obesula 211
4. P. nasuta 213
5. P. doreyanus 214
6. P. Gunnii 214
7. P. fasciata 215
8. P. myosuros 215
VI. CHOEROPUS 217
1. Ch. castanotis tab. 17. . . . 218
III. Fam. Pedimana 219
VII. DIDELPHYS 219
1. D. virginiana 219
2. D. poecilotis 219
3. D. leucotis 223

Seite

4. D. Azarae 223
5. D. californica 223
6. D. breviceps 224
7. D. cancrivora 225
8. D. Quica tab. 18. 225
9. D. myosuros 225
10. D. Opossum 226
11. D. Philander tab. 19 . . . 226
12. D. dichrura 230
13. D. ornata 231
* Derbyana 232
14. D. lanigera 233
15. D. ochropus 236
16. D. affinis 237
17. D. cinerea 239
18. D. dorsigera 239
19. D. noctivaga 239
20. D. impavida 240
21. D. murina 241
22. D. macrotarsus tab. 20 . . 242
23. D. microtarsus tab. 21. . . 243
24. D. Musculus 245
25. D. pusilla 245
* incana 246
26. D. elegans 246
27. D. velutina 248
28. D. unistriata 249
29. D. tristriata 250
30. D. brachyura 251
31. D. glirina 253
32. D. domestica 255
33. D. tricolor 256

VIII. CHIRONECTES 256
1. Ch. variegatus 260

IV. Fam. Edentula 262

IX. TARSIPES 262
1. T. rostratus 265

V. Fam. Scandentia 268

X. PHALANGISTA 268

a) Ceonyx.

1. Ph. ursina 268
2. Ph. chrysorrhos 268

Seite

3. Ph. maculata 269
* macrura 269
4. Ph. cavifrons 269

b) Trichurus.

5. Ph. vulpina 269
6. Ph. felina 270
7. Ph. hypoleucus tab. 22 . . 273
* xanthopus 273
8. Ph. canina 274

c) Pseudochirus.

9. Ph. Cookii 274
10. Ph. canescens 275
11. Ph. nudicaudata 276

d) Dromicia.

12. Ph. gliriformis 276
13. Ph. concinna 277
14. Ph. Neillii 277

XI. PETAURUS 278

a) Petaurista.

1. P. taguanoides 278

b) Belideus.

2. P. flaviventer 278
3. P. sciureus 279
4. P. breviceps 279
5. P. Ariel 279

c) Acrobates.

6. P. pygmaeus 280

XII. PHASCOLARCTOS 280

1. Ph. fuscus 281

XIII. DENDROLAGUS 283

1. D. ursinus tab. 23 286
2. D. inustus 287, 797

VI. Fam. Macropoda 288

XIV. HYPSIPRYMNUS 289

a) Bettongia.

1. H. rufescens 290
2. H. Cuniculus 291
3. H. Gaimardi tab. 24 292
4. H. Grayi 293
5. H. penicillatus 294

Seite

* H. Ogilbyi 294
6. H. campestris 296
b) Potorous.
7. H. murinus 297
* H. Gilbertii 298
8. H. platyops 299
c) Dorcopsis.
9. H. Brunii 300
XV. HALMATURUS 300
a) Macropus.
1. H. giganteus 302
b) Onychogalea.
2. H. unguifer 303
3. H. frenatus 303
4. H. lunatus 304
c) Lagorchestes.
5. H. leporoides 305
6. H. conspicillatus 306
7. H. Leichardti 798
8. H. hirsutus 307
9. H. fasciatus 307
d) Halmaturus.
10. H. antilopinus 309
11. H. robustus 310
12. H. laniger 311
13. H. agilis 312
14. H. isabellinus 313
15. H. Parryi 314
16. H. manicatus 314
17. H. Greyi 316
18. H. Bennetti 317
* ruficollis 318
19. H. nemoralis 319
20. H. Thetidis 320
21. H. Dama 321
22. H. dorsalis 322
23. H. Derbyanus 323
24. H. Parma 324
25. H. Billardieri 325
26. H. brachyurus 326
e) Petrogale.
27. H. penicillatus 327
* albigularis 327

Seite

28. H. xanthopus 799
29. H. lateralis 328
30. H. brachyotis 330
31. H. inornatus 331
32. H. concinnus 331
VII. Fam. Glirina 332
XVI. PHASCOLOMYS 332
1. Ph. fossor 333
2. Ph. latifrons 333

IV. RUMINANTIA.

I. Fam. Cervina 339
I. MOSCHUS 338
a) Moschus.
1. M. moschiferus 339
2. M. chrysogaster 339
* lemdogaster 341
b) Tragulus.
3. M. Stanleyanus 342
4. M. Napu 342
5. M. Kanchil 343
c) Meminna.
6. M. Meminna 343
d) Hyomoschus.
7. M. aquaticus tab. 26 343
II. CERVUS 346
a) Alce.
1. C. Alces 350
b) Rangifer.
2. C. Tarandus 351
c) Dactyloceros.
3. C. Dama 352
d) Elaphus.
†) Panolia.
4. C. frontalis 352
††) Cervus.
5. C. Elaphus 354
6. C. strongyloceros 355
7. C. Wallichii 355

	Seite
8. C. Sika	356
†††) Rusa.	
9. C. Duvaucelii	356
10. C. Aristotelis tab. 27	357
11. C. equinus	359
12. C. Kuhlii	361
13. C. marianus	362
14. C. Hippelaphus	362
* moluccensis, timoriensis, Peronii	363
††††) Axis.	
15. C. Pseudaxis	364
16. C. Axis	366
17. C. porcinus	366
* oryzeus	399
†††††) Blastoceras.	
18. C. paludosus	367
19. C. campestris	368
††††††) Macrotis.	
20. C. macrotis	368
21. C. Richardsonii	369
†††††††) Reduncina.	
22. C. virginianus	372
* similis	372
** leucurus	373
23. C. nemoralis	374
24. C. mexicanus	375
25. C. gymnotis	376
* savannarum, punctulatus	377
e) Capreolus.	
26. C. Capreolus	378
* pygargus	378
f) Furcifer.	
27. C. antisiensis	380
* chilensis	382
g) Subulo.	
28. C. rufus	384
29. C. rufinus	385
30. C. simplicicornis	386
* C. Tschudii	387
h) Cervulus.	
31. C. Muntjac	388
32. C. styloceros	388
33. C. Reevesii	389
i) sedis incertae.	
34. C. Pudu tab. 26	390
III. CAMELOPARDALIS	393
1. C. Giraffa	393
II. Fam. Cavicornia	394
IV. ANTILOPE	394
1) A. naaune	402
a) Colus.	
1. A. Saiga	402
b) Pantholops.	
2. A. Hodgsonii	402
2) A. gazellinae.	
c) Antilopa.	
3. A. Dorcas	403
4. A. arabica	403
5. A. laevipes	404
6. A. subgutturosa	404
7. A. Dama	404
* hamata	405
8. A. Mhorr	405
9. A. Soemmerringii	405
10. A. Bennettii	405
11. A. Hazenna	406
12. A. Euchore	407
13. A. leptoceros	407
14. A. gutturosa	408
15. A. picticaudata	408
16. A. melampus	409
17. A. cervicapra	409
d) Tetracerus.	
18. A. quadricornis	410
* labipes	410
e) Calotragus.	
19. A. Tragulus	410
20. A. melanotis	411
21. A. scoparia	411
22. A. hastata	411

Seite

23. A. montana 412
24. A. Oreotragus 412
25. A. saltatrixoides 412

f) Nanotragus.

26. A. Hemprichiana 415
27. A. moschata 415
28. A. spinigera 416

g) Cephalolophus.

29. A. mergens 418
* grimmia 418, 425
30. A. ocularis 418
31. A. Campbelliae 419
32. A. altifrons 420
33. A. coronata 421
34. A. Madoqua 422
35. A. sylvicultrix 422
36. A. Pluto 422
37. A. Ogilbyi 423
38. A. dorsalis 424
39. A. rufilatus 425
* pallidus 426
40. A. natalensis 426
41. A. Maxwelli tab. 30 427
42. A. melanorheus 428
43. A. pygmaea 429
44. A. punctulata 429
45. A. Whitfieldii 429
? * A. quadriscopa 430

h) Redunca.

46. A. Capreolus 430
47. A. Kleotragus 431
* isabellina 431
48. A. redunca 431
49. Bohor 432
50. Kob tab. 29 432
51. leucotis 406, 800
52. A. Lechè 434
53. A. ellipsiprymna 434
54. A. Defassa 435
* unctuosa 435
3) A. orycinae 435

i) Hippotragus.

55. A. equina 435
* leucophaea 436

Seite

56. A. nigra 436
57. A. Oryx 436
58. A. Beisa 436
59. A. ensicornis 437
* leucoryx 437
60. A. Addax 437
4) A. strepsicerinae . . 438

k) Taurotragus.

61. A. Oreas 439
62. A. Derbiana tab. 28 439
63. A. depressicornis 439

l) Tragelaphus.

64. A. strepsiceros 440
65. A. euryceros 441
66. A. Angasii tab. 31 441
67. A. scripta 443
68. A. Decula 443
69. A. sylvatica 443
5) A. alcinae 443

m) Bubalis.

70. A. Bubalis 444
71. A. Caama 444
72. A. Lichtensteinii 445
73. A. lunata 446
74. A. senegalensis 447
75. A. pygarga 447
76. A. albifrons 448

n) Catoblepas.

77. A. Gnu 448
78. A. Gorgon 448

o) Portax.

79. A. picta 449, 800
6) A. budorcinae 451

p) Budorcas.

80. A. taxicolor tab. 32 452
7) A. caprinae 458

q) Capricornis.

81. A. Thar 459
82. A. sumatrensis 459
83. A. crispa 459
84. A. Goral 460

Seite

r) Haplocerus.

85. A. lanigera 460

s) Rupicapra.

86. A. Rupicapra 460

* pyrenaica 460

8) A. furciferes 461

t) Dicranocerus.

87. A. furcifer 461

V. AEGOCEROS 462

1. Aeg. Skyn 463
2. Aeg. hispanicus 464
3. Aeg. Falconeri 466
4. Aeg. Capra 466
5. Aeg. hylocrius 467
6. Aeg. Iharal 468
7. Aeg. Argali 468
8. Aeg. montanus 468
9. Aeg. Nahur 468
10. Aeg. orientalis 469
11. Aeg. Vignei 469
12. Aeg. Arkar 469

VI. BOS 470

1. B. moschatus 471
2. B. brachyceros 471
3. B. Bison 472
4. B. americanus 472
5. B. grunniens 472
6. B. Taurus 472

* B. Banteng 473, 800

7. B. frontalis 477

III. Fam. Tylopoda 478

VII. CAMELUS 478

VIII. AUCHENIA 479

V. SOLIDUNGULA.

I. EQUUS 484

1. E. Asinus u. Hemionus . . . 484

Seite

2. E. Onager tab. 38 484
3. Hybridi 488

VI. PACHYDERMATA.

I. HIPPOPOTAMUS 494

1. H. amphibius 495
2. H. liberiensis 497

II. SUS 501

1. S. Scrofa 501
2. S. leucomystax 501
3. S. larvatus 501
4. S. penicillatus (S. pictus) 502, 800
5. S. cristatus 503
6. S. barbatus 504
7. S. verrucosus 504
8. S. celebensis 505
9. S. vittatus 506
10. S. timoriensis 507

III. PORCULA 507

1. P. salviana 507

IV. PORCUS 509

1. P. Babyrussa 509

V. PHACOCHOERUS . . . 510

1. Ph. Aeliani 511
2. Ph. Aethiopicus 512

VI. DICOTYLES 512

VII. TAPIRUS 512

VIII. HYRAX 513

1. H. sylvestris 513

* H. dorsalis 514

IX. RHINOCEROS 515

1. Rh. indicus 515, 801
2. Rh. cucullatus 516
3. Rh. javanus 516
4. Rh. sumatranus 517
5. Rh. Keitloa 518

X. ELEPHAS 518

1. E. sumatranus 519

Seite

VII. INSECTIVORA.

I. Fam. Dermoptera 522
I. GALEOPITHECUS 522
1. G. volans 523
2. G. philippinensis 524
? 3. G. macrurus 524
II. Fam. Scandentia 524
II. CLADOBATES 525
a) Tupaja.
1. Cl. Tana 525
2. Cl. ferrugineus tab. 34 . . . 526
3. Cl. Ellioti 526
4. Cl. javanicus 527
5. Cl. Belangeri 527
b) Dendrogale.
6. Cl. murinus 528
III. PTILOCERCUS 528
1. Pt. Lowii tab. 35 529
IV. HYLOMYS 529
1. H. Suillus tab. 36 530
III. Fam. Soricina 530
V. RHYNCHOCYON 531
1. Rh. Cirnei 532
VI. GYMNURA 533
1. G. Rafflesii 534
VII. MACROSCELIDES . . . 534
a) Rhinomys.
1. M. typicus 535
2. M. rupestris 535
3. M. Intufi 536
4. M. fuscus 536
5. M. Edwardii 537
6. M. brachyrhynchus 537
7. M. melanotis 538
8. M. Rozeti tab. 37 538
b) Petrodromus.
9. M. tetradactylus 538

Seite

VIII. SOREX 539
a) Crossopus.
1. S. fodiens 541
2. S. palustris 542
3. S. platycephalus 543
b) Soriculus.
4. S. nigrescens (S. sikimensis) 545, 566, 806
c) Sorex.
5. S. alpinus 543
* Antinorii 545, 802
6. S. vulgaris 544
* rusticus 544
7. S. pygmaeus 545
* pumilus 546
8. S. Richardsonii 546
9. S. Forsteri 546
10. S. longirostris 547
* platyrrhinus 547
11. S. personatus 548
12. S. Lesueurii 548
13. S. Dekayi 548
14. S. brevicaudus 549
15. S. parvus 549
16. S. Harlani 550
17. S. carolinensis 550
d) Feroculus.
18. S. macropus 806
e) Paradoxodon.
19. S. melanodon 805
f) Crocidura.
†) dentes intermedii 4.
20. S. coerulescens 551, 803
21. S. myosuros 552, 803
22. S. serpentarius 553, 803
23. S. crassicaudus 554
24. S. soccatus 803
25. S. heterodon 804
26. S. ferrugineus 804
27. S. montanus 804
28. S. etruscus 555
29. S. micronyx 804
30. S. Perrotteti 555, 804
31. S. nudipes 805

Seite

32. S. atratus 805
33. S. gracilis 555
34. S. madagascariensis 556

††) dentes intermedii 3.

35. S. Hedenborgi 556
36. S. sericeus 557
37. S. fulvaster 557
38. S. flavescens 557, 807
39. S. capensis 558
40. S. hirtus 558
41. S. sacralis 559
42. S. canescens 559
43. S. annellatus 560
44. S. araneus 560
* Güldenstaedtii . . . 561, 802
45. S. leucodon 561, 802
46. S. Dsi-Nezumi 561
47. S. umbrinus 562
48. S. cinnamomeus 562
49. S. infumatus 562
50. S. cyaneus 563

†††) dent. interm. 2. Diplomesodon.

51. S. pulchellus 563

g) Myosorex.

52. S. varius 564
53. S. caffer 565, 807

*) sedis incertae.

54. S. hymalayicus 563
55. S. Newera Ellia 564
56. S. poënais 564
57. S. mariquensis 564
58. S. viarius 565
59. S. tenuis 565

**) species dubiae.

60. S. niger 566
61. S. caudatus 566
62. S. nemorivagus 553, 803
63. S. fimbripes 542
64. S. cinereus 550
65. S. Cooperi 550

IX. SOLENODON 566
1. S. paradoxus 567

Seite

X. MYOGALE 567
1. moschata 568
2. pyrenaica 568

IV. Fam. Talpina 569

XI. UROTRICHUS 569
1. U. talpoides tab. 38 570

XII. SCALOPS 571, 807
1. Sc. aquaticus 572
* Pennantii 809
2. Sc. latimanus 573
3. Sc. argentatus 573
4. Sc. Breweri 573
5. Sc. Townsendii 574
* taeniatus 809
6. Sc. aeneus 574

XIII. RHINASTER 574
1. Rh. cristatus 575
* macrura 576

XIV. TALPA 576
1. T. europaea 577
2. T. coeca 577
3. T. Wogura 578
4. T. micrura 578
5. T. leucura 578
? T. reposta 808

XV. CHRYSOCHLORIS . . . 579
1. Ch. inaurata 579
2. Ch. obtusirostris 580
3. Ch. rutilans tab. 40 580
* hottentotta 581
** holosericea 581
4. Ch. albirostris tab. 39 . . . 581
5. Ch. damarensis 582
6. Ch. villosa 582

V. Fam. Aculeata 582

XVI. CENTETES 582
1. C. ecaudatus tab. 41 583
* semispinosus 583
2. C. armatus 584

Seite

XVII. ERICULUS 584
1. E. spinosus 584
* nigrescens 585
XVIII. ECHINOGALE . . . 585
1. E. Telfairi 585
XIX. ERINACEUS 586
1. E. europaeus 586
2. E. concolor 586
3. E. frontalis 587
4. E. albiventris 587
5. E. Pruneri 587
6. E. auritus 588
7. E. brachydactylus 588
* platyotis 588
8. E. Libycus 589
* aegyptius 589
** algirus 589
†) sedis incertae.
9. E. hypomelas 589
10. E. collaris 590
11. E. Grayi 590
* spatangus 590
12. E. micropus = nudiventris . . 591

VIII. CHIROPTERA.

I. Fam. Frugivora 594
I. PTEROPUS 594
a) Pteropus.
†) Pteropus.
1. Pt. edulis 594
2. Pt. Pluto 595
3. Pt. jubatus 595
4. Pt. Edwardsii 595
5. Pt. funereus 596
6. Pt. argentatus 596
7. Pt. phaiops 596
8. Pt. poliocephalus 597
9. Pt. conspicillatus 597
10. Pt. chrysoproctus 597
11. Pt. Macklotti 597
12. Pt. dasymallus 598
13. Pt. pselaphon 598
14. Pt. moluccensis 598
15. Pt. Alecto 599
16. Pt. leucopterus 599
17. Pt. hypomelanus 599
18. Pt. pallidus 600
19. Pt. Kerandrenius 600
20. Pt. tonganus 600
21. Pt. vanicorensis 601
22. Pt. Dussumieri 601
23. Pt. vociferus 601
24. Pt. samoënsis 601
25. Pt. griseus 602
26. Pt. personatus 602
27. Pt. vulgaris 602
28. Pt. rubricollis 602
††) Cynonycteris.
29. Pt. stramineus 603
30. Pt. Geoffroyi 603
31. Pt. Leschenaultii 604
32. Pt. amplexicaudatus 604
33. Pt. Leachii 604
34. Pt. Hottentottus 604
b) Pachysoma.
†) Epomophorus.
35. Pt. crypturus 605
36. Pt. Wahlbergii 606
* macrocephalus 606
37. Pt. gambianus 607
38. Pt. Whitei 607
39. Pt. labiatus 608
40. Pt. schoënsis 608
? Pt. Haldemanni 609
††) Pachysoma.
41. Pt. marginatus 609
42. Pt. brachyotis 610
43. Pt. melanocephalus 610
c) Megaera.
44. Pt. ecaudatus 611
II. MACROGLOSSUS 611
1. M. minimus 611

Seite

III. HARPYIA 611
1. H. Cephalotes 612
IV. HYPODERMA 612
1. H. Peronii 612
II. Fam. Istiophora 613
§) DESMODINA.
V. DESMODUS 613
1. D. rufus 614
* D'Orbignyi 614
VI. DIPHYLLA 615
1. D. ecaudata 615
§§) PHYLLOSTOMATA.
VII. BRACHYHYLLUM . . . 616
1. B. cavernarum 616
VIII. GLOSSOPHAGA . . . 616
a) Glossophaga.
1. G. amplexicaudata 617
2. G. nigra 618
3. G. megalotis 618
4. G. soricina 618
5. G. caudifer 619
6. G. Redmanni 619
b) Choeronycteris.
7. G. ecaudata 620
8. G. villosa 620
9. G. peruana 620
10. G. mexicana 621
IX. PHYLLOSTOMA 621
a) patag. interfem. longum truncatum.
1. Ph. macrophyllum 622
2. Ph. longifolium tab. 44. . . . 622
3. Ph. cirrhosum 623
4. Ph. crenulatum 623
5. Ph. elongatum 623
6. Ph. hastatum tab. 42. . . . 624
* fuliginosum 624
7. Ph. Sylvicola 624
8. Ph. bidens 625
9. Ph. amblyotis 625
10. Ph. bicolor 626
11. Ph. discolor tab. 42. 626
12. Ph. brevicaudum tab. 46. . . 626
* Grayi 627
13. Ph. scrobiculatum 627
14. Ph. innominatum 628
15. Ph. Spectrum 628
16. Ph. Centurio 629
17. Ph. brachyotum 629
18. Ph. verrucatum 629
19. Ph. superciliatum 629
20. Ph. calcaratum 630
21. Ph. infundibuliforme 630
22. Ph. Lilium 631
b) patag. interfem. breve excisum.
23. Ph. perspicillatum et obscurum tab. 42. . . . . 631, 809
* jamaicense 632
** falcatum 632
24. Ph. bilabiatum tab. 45. . . . 632
25. Ph. lineatum tab. 42. . . . 633
26. Ph. personatum 633
27. Ph. pusillum tab. 43. 634
c) cauda et patag. interfem. nulla.
28. Ph. erythromos 634
29. Ph. chilense 635
30. Ph. chrysocomos 635
31. Ph. oporaphilum 635
32. Ph. fumarium 636
33. Ph. excisum 636
34. Ph. albescens 637
35. Ph. rotundatum 637
d) species incertae.
36. Ph. fimbriatum, fuliginosum . 627
37. Stenoderma rufum 631
X. CENTURIO 637
1. C. senex 638
2. C. flavigularis 639, 809
§§§) MEGADERMATA.
XI. MACROTUS 639
1. M. Waterhousii 640

Seite

XII. MEGADERMA 640
1. M. Lyra 641
2. M. Spectrum 641
3. M. philippinense 642
4. M. Trifolium 642
5. M. Frons 643
XIII. RHINOPOMA 643
1. Rh. microphyllum 644
2. Rh. Hardwickii 644
XIV. NYCTERIS 645
1. N. thebaica 645
* albiventer et Geoffroyi . . . 645
2. N. discolor 646
* capensis 646
3. N. affinis 646
4. N. fuliginosa 646
5. N. villosa 647
6. N. hispida 648
7. N. javanica 648
XV. NYCTOPHILUS 649
1. N. Geoffroyi 649

§§§§) RHINOLOPHINA.

XVI. RHINOLOPHUS 649
a) Phyllorrhina.
1. Rh. gigas 650
2. Rh. vittatus 653
3. Rh. cyclops 654
4. Rh. fuliginosus 654
5. Rh. gracilis 655
6. Rh. caffer 655
7. Rh tridens 656
8. Rh. nobilis 656
* armiger 657
9. Rh. Diadema 657
10. Rh. insignis 657
11. Rh. speoris 658
12. Rh. dukhunensis 658
13. Rh. galeritus 659
14. Rh. griseus 659
15. Rh. larvatus 660
16. Rh. bicolor 660

Seite

17. Rh. murinus 660
* ater & fulvus 661
18. Rh. cervinus 661
19. Rh. pygmaeus 662
20. Rh. tricuspidatus 662
b) Rhinolophus.
21. Rh. luctus 662
22. Rh. trifoliatus 663
23. Rh. aurantius 664
24. Rh. tragatus 664
* mitratus 665
? Rh. Pearsonii 665
25. Rh. euryotis 665
26. Rh. philippinensis 666
27. Rh. ferrum equinum 666
28. Rh. clivosus 667
29. Rh. Euryale 667
30. Rh. lobatus 668
31. Rh. capensis 668
32. Rh. fumigatus 669
33. Rh. Alcyone 669
34. Rh. Nippon 669
35. Rh. affinis 670
36. Rh. Rouxii 671
37. Rh. megaphyllus 671
38. Rh. Landeri 672
39. Rh. Hippocrepis 672
40. Rh. minor 673
? Rh. subadius & lepidus . . . 674
41. Rh. pusillus 673
42. Rh. cornutus 673
43. Rh. macrotis 674
XVII. COELOPS 674
1. C. Frithii 675
III. Fam. Gymnorhina 675

§) BRACHYURA.

XVIII. MORMOPS 676
1. M. Blainvillei 676
XIX. CHILONYCTERIS . . . 677
a) Chilonycteris.
1. Ch quadridens 678
* Mac Leayii 678

Seite

2. Ch. fuliginosa 679
3. Ch. cinnamomea 679
4. Ch. rubiginosa tab. 47 . . . 679
5. Ch. gymnotus tab. 48 . . . 680
6. Ch. personata 680

b) Phyllodia.

7. Ch. Parnellii 680

XX. NOCTILIO 681

1. N. unicolor 681
2. N. dorsatus tab. 51 681
* affinis 681
** albiventer 683
3. N. ruber 683

XXI. TAPHOZOUS 684

a) africani.

1. T. nudiventris 684
2. T. perforatus 684
3. T. senegalensis 685
* mauritianus 685
4. T. leucopterus 685
5. T. Peli 686

b) asiatici.

6. T. saccolaimus 686
7. T. philippinensis 687
8. T. melanopogon 687
9. T. longimanus 688
* fulvidus & Cantori 689
10. T. bicolor 690

c) australienses.

11. T. australis 690

XXII. EMBALLONURA . . . 691

a) Proboscidea.

1. E. afra 692
2. E. monticola 693
3. E. saxatilis 693
4. E. canina tab. 50 694
5. E. calcarata 694

b) Urocryptus.

6. E. bilineata tab. 51 694
* insignis 695
7. E. lineata 695

Seite

c) Mystacina.

8. E. tuberculata 695

d) Mosia.

9. E. brevirostris 696
10. E. macrotis 697
11. E. nigrescens 697
12. E. leptura 697
13. E. Alecto 698
14. E. semicaudata 698

XXIII. DICLIDURUS 699

1. D. albus 699

§§) MACRURA.

XXIV. PTERONOTUS . . . 700

1. Pt. Davyi 700

XXV. CHIROMELES 700

1. Ch. caudatus 700
2. Ch. torquatus 701

XXVI. DYSOPES 701

a) Nyctinomus.

†) europheo-africani.

1. D. Cestonii 701
2. D. Midas 702
3. D. Geoffroyi 703
4. D. limbatus 703
5. D. brachypterus 704
6. D. pumilus 704

††) asiatici.

7. D. plicatus 704
8. D. dilatatus 705
9. D. tenuis 705

†††) americani.

10. D. auritus tab. 49 706
* coecus 706
11. D. macrotis 706
? 12. D. aurispinosus 707
13. D. Naso tab. 49. 707
14. D. laticaudatus 707
15. D. gracilis 708

b) Molossus.

†) africani.

16. D. natalensis 708

Seite

††) americani.

17. D. perotis tab. 49. 708
18. D. ursinus 709
19. D. longimanus 709
* leucopleura 709
20. D. glaucinus tab. 49. . . . 710
21. D. abrasus 710
22. D. holosericeus tab. 51 . . . 711
23. D. albus tab. 51 711
24. D. nasutus 711
25. D. olivaceo-fuscus 712
* amplexicaudus 712
26. D. velox tab. 49. 712
27. D. tropidorhynchus 713
28. D. fumarius 713
29. D. myosuros 713
30. D. crassicaudatus 714

c) species incertae.

31. D. fuliginosus, norfolcensis, cynocephalus, anonymus etc. . 714

§§§) VESPERTILIONINA.

XXVII. PLECOTUS. 715

1. Pl. auritus. 716
* brevimanus et Peronii . . . 716
2. Pl. homochrous 716
3. Pl. timoriensis 717
4. Pl. velatus tab. 51 717

XXVIII. SYNOTUS 718

1. S. Barbastellus 718
2. S. leucomelas 719
3. S. macrotis 719
4. S. Maugei 719
* Lecontii 720
5. S. Townsendii 720

XXIX. VESPERTILIO . . . 721

1. Europaei.

a) Vespertilio.

1. V. murinus 722
2. V. Bechsteinii 723
3. V. Nattereri 723
? V. Brandtii 723
4. V. ciliatus 724
5. V. mystacinus 725
6. V. Daubentonii 726
7. V. dasycnemus 726
* V. Capaccinii 727

b) Vesperugo.

8. V. Noctula 728
* macuanus 728, 749
9. V. Leisleri 728
10. V. Kuhlii 729
* Alcythoe & marginatus . . 729
11. V. Nathusii 729

Seite

12. V. Ursula 730
13. V. Pipistrellus 730
14. V. Maurus 731

c) Vesperus

15. V. serotinus 732
* turcomanus 732
16. V. discolor 733
17. V. Nilssonii 733
18. V. Savii 734
19. V. Bonapartii 734
20. V. Leucippe 734
21. V. Aristippe 734

d) Miniopterus.

22. V. Schreibersii 735

2. Asiatici.

a) Vespertilio.

23. V. adversus 735
24. V. papillosus 736
25. V. Hardwickii 736
26. V. pictus 736
V. formosus 736
27. V. tralatitius 737
28. V. Horsfieldii 737
29. V. macrodactylus 737
V. malayanus 738

b) Vesperugo.

30. V. Molossus 738
31. V. circumdatus 738
32. V. imbricatus 738
33. V. Abramus 739
34. V. Akokomuli 739
35. V. macrotis 739
36. V. tenuis 740
37. V. Hasseltii 740
38. V. Harpyia 740
39. V. Suillus 741

c) Vesperus.

40. V. macellus 741
41. V. pachypus 741
42. V. irretitus 741
* V. Blythi 742
* coomandelicus 742

d) dentes haud cogniti.

43. V. oreias 742
44. V. macrotarsus 742
45. V. pellucidus 742
46. V. lasiurus 743
47. V. tristis 743
48. V. Eschscholtzii 743
49. V. Meyeni 744
50. V. rufo-pictus 744
51. V. brachypterus 744
V. labiatus, Leachii, parvipes, pallidiventris 743, 744

***

Seite

3. Africani.

a) Vespertilio.

52. V. tricolor 745
53. V. epichrysus 745

b) Vesperugo.

54. V. Rüppellii 745
55. V. platycephalus 745
56. V. subtilis 746
57. V. nanus 746

c) Vesperus.

58. V. isabellinus 746
59. V. megalurus 747
60. V. minutus 747
V. Smithii 747

d) Miniopterus.

61. V. scotinus 747

e) sedis incertae.

62. V. lanosus 748
63. V. Hesperida 748
64. V. poënsis 749

4. Americani.

a) Vespertilio.

65. V. Carolii 749
66. V. Gryphus 749
67. V. Salarii 749
68. V. georginianus 750
69. V. subflavus 750
70. V. crassus 750
71. V. subulatus 750
72. V. lepidus 751
73. V. splendidus 751
74. V. Arsinoe 751
75. V. Isidori 752
76. V. nubilus tab. 51 752
* hypothrix 753
77. V. parvulus 753
78. V. chiloensis 753

b) Vesperugo.

79. V. carolinensis 753
80. V. erythrodactylus 754
81. V. noctivagans 754
82. V. leucogaster 754
83. V. cinnamomeus 755
84. V. nigricans 755

c) Vesperus.

85. V. phaiops 756
86. V. ursinus 756
87. V. Creeks 756
88. V. pulverulentus 756
89. V. ferrugineus 757
90. V. Hilarii 757
* derasus 757
91. V. Dutertreus 757
92. V. furinalis 758
93. V. arctoideus 758
* nitens tab. 51 810

Seite

* polythrix 758
94. V. innoxius 759

d) dentes haud cogniti.

95. V. lanceolatus 759
96. V. lacteus 759
97. V. aenobarbus 760
98. V. monticola 760
99. V. virginianus 760
100. V. Leibii 760
101. V. californicus 760
102. V. cubensis 761
103. V. barbatus 761
104. V. nasutus 761
105. V. villosissimus 761
106. V. levis 761

5. Australienses.

107. V. Morio 762
108. V. Gouldii 762
109. V. australis 762
110. V. pumilus 763
111. V. picatus 763

6. Species dubiae.

V. cyanopterus, arquatus, brasiliensis, Natalus stramineus, Romicia calcarata, Kerivoula grisea etc . . 763

XXX. NYCTICEIUS 763

a) asiatici.

1. N. Heathii 764
2. N. Temminckii 764
* Belangeri, noctulinus . . . 765
* luteus 765
3. N. Tickelli 766
4. N. ornatus 767
5. N. Pearsonii 767

b) africani.

6. N. nigrita 768
7. N. borbonicus 768
8. N. leucogaster 768
9. N. Dinganii 769, 810
10. N. planirostris 769
11. N. viridis 770

c) americani.

12. N. pruinosus 770
13. N. lasiurus 771
14. N. bonariensis 772
* varius tab. 51 772
15. N. noveboracensis 773
16. N. macrotis 774

XXXI. THYROPTERA . . . 774

1. Th. tricolor 778
2. Th. discifera 780

XXXII. FURIA 781

1. F. horrens 782

Zusätze und Berichtigungen . . . 783

I. Ordnung.

Affen. SIMIAE s. PRIMATES.

Es sind nunmehr dreizehn Jahre verflossen, daß meine Bearbeitung der Ordnung der Affen im ersten Supplementbande des Schreber'schen Werkes durch den Druck veröffentlicht worden ist. Innerhalb dieses Zeitraumes hat sich die Kenntniß dieser Ordnung, sowohl nach ihrer anatomischen Begründung als nach dem Umfange ihrer Arten, in einer so raschen und umfassenden Weise entwickelt, daß jetzt bereits sehr zahlreiche Nachträge zu meiner frühern Bearbeitung beizubringen sind. Die Anzahl der Arten hat sich seitdem um zwei Drittel des früheren Betrages vermehrt; ein Resultat, das allerdings nicht blos durch die Entdeckung vorher ganz unbekannter Species herbeigeführt worden ist, sondern auch noch durch den Umstand, daß bei genauerer Bekanntwerdung mit den schon früher publicirten Arten es sich herausgestellt hat, daß mehrere Formen, die man als Varietäten erklärte, sich als selbstständige Species oder doch wenigstens als geographisch geschiedene und constante Typen erwiesen, denen man mindestens die Arten-Selbstständigkeit so lange zuerkennen muß, bis nicht das Gegentheil evident dargethan ist.

Daraus ergiebt sich mir aber bei der Wiederaufnahme meiner Fortsetzung des Schreber'schen Werkes in Bezug auf die Ordnung der Affen die eigenthümliche Schwierigkeit, daß ich meiner Aufgabe nicht vollständig genügen könnte, wenn ich mich blos auf die Beschreibung der seitdem neu entdeckten Arten der Vierhänder beschränken wollte. Auch ein nicht unerheblicher Theil der von mir früher publicirten Arten bedarf,

zumal seitdem durch Aufsuchung derselben in ihren Heimathsstätten ihre Lebensgeschichte und insbesondere auch ihre geographischen Verbreitungsverhältnisse genauer bekannt geworden sind, vielfacher Berichtigungen, die nicht minder wichtig als die Zufügung der Beschreibung neuer Arten sind. Ich habe es daher für zweckmäßig und dankenswerth erachtet die Ordnung der Affen in Monographien zu behandeln und zwar in der Weise, daß diejenigen der älteren Arten, bei welchen nichts zu erwähnen ist, einfach mit ihren Namen, Diagnosen und der neu zugekommenen Literatur aufgeführt werden, bei denjenigen, die einer Berichtigung bedürfen, dieselbe zugefügt wird und endlich in systematischer Reihenfolge die neuen Arten mit ausführlichen Beschreibungen an ihrer rechten Stelle eingeschaltet werden.

Um eine anschauliche Uebersicht von dem Fortschritte unserer Kenntnisse von den Arten der Affen zu gewähren, lege ich nachstehende Tabelle vor. In der ersten Rubrik ist bei jeder Gattung die Zahl ihrer Arten angegeben und zwar nach Grundlage meiner Bearbeitung in der ersten Abtheilung des Schreber'schen Supplementbandes vom Jahre 1840. Die zweite Rubrik enthält gleichfalls die Angabe der jeder Gattung zuständigen Summe der Arten, aber auf Grund der vorliegenden neuen Bearbeitung; sie zeigt also, um wieviel sich binnen eines Zeitraumes von 13 Jahren bei jeder Gattung die Zahl der Arten nach meinen dermaligen Feststellungen derselben gemehrt hat. Da indeß ein nicht unansehnlicher Theil des jetzigen Mehrbetrages der Arten nicht aus der Auffindung neuer Formen, sondern nur aus der Trennung von ältern und bereits systematisch benannten Arten, die mit Unrecht von mir und Andern vereinigt waren, hervorgegangen ist, so habe ich eine dritte Rubrik beigefügt, in welcher bei jeder Gattung die Zahl der seit 1840 durch neue Entdeckungen ihr zugefügten, vordem völlig unbekannten, also ganz neuen Arten angegeben ist.

Namen der Gattungen.	Zahl der Arten.		Seit 1840 neu-entdeckte Arten.
	im Jahr 1840	im Jahr 1852	
Simia	2	3	1
Hylobates	7	8	2
Semnopithecus	14	25	8
Colobus	7	5	—
Cercopithecus	16	32	11
Inuus *)	11	10	2
Cynocephalus	7	10	1
Mycetes	2	7	1
Lagothrix	2	2	—
Ateles	8	9	1
Cebus	2	10	3
Pithecia	6	7	2
Nyctipithecus	1	3	1
Callithrix	6	11	2
Chrysothrix	1	3	1
Hapale	15	26	7
Lichanotus	1	1	—
Habrocebus	2	2	—
Lemur	8	14	4
Galeocebus	—	1	1
Chirogaleus	1	5	3
Stenops	2	3	—
Microcebus	1	2	1
Perodicticus	1	1	—
Otolicnus	4	6	1
Tarsius	1	1	—
Summe	128	210	53

Aus dieſer Tabelle iſt erſichtlich, daß ſich die Summe der mir jetzt bekannten Affenarten, die ich im Jahr 1840 zu 128 annahm, auf 210 geſteigert hat, alſo ein Zuwachs von 82 Arten, von denen 53 neuentdeckt, die andern 29 aber durch Reſtitution älterer Arten hinzugekommen ſind. Nur ſehr wenige Gattungen ſind es, deren Artenbetrag ſich nicht gemehrt

*) Bemerkung. Von Inuus habe ich jetzt 2 der früheren Arten zu Cynocephalus geſtellt.

hat; Colobus iſt die einzige, wo ſich derſelbe durch nothwendige Reduktion von Nominalarten gemindert hat. Bei Inuus iſt wie erwähnt dieſe Minderung durch Ueberweiſung zweier Arten an Cynocephalus veranlaßt worden.

Zur Erlangung einer genaueren Kenntniß als man ſie zur Zeit meiner erſten Bearbeitung der Affen hatte, haben vor Allem die wichtigen Entdeckungsreiſen, deren Reſultate ſeitdem publicirt wurden, beigetragen. Unter dieſen ſind hier zu nennen die umfaſſenden Unterſuchungen von Salomon Müller und Schlegel[1]) über die Affen des den Holländern angehörigen Theiles des indiſchen Archipels, die von Blyth[2]) über die Vierhänder des indiſchen Feſtlandes, die von Peters[3]) über die von Moſſambique, die von J. v. Tſchudi[4]) über die Affen von Peru und die von Natterer und mir[5]) über die braſiliſchen Arten dieſer Ordnung. Auch durch Caſtelnau's[6]) Expedition ſowie durch mehrere andere Reiſende ſind werthvolle einzelne Beyträge gewonnen worden.

Mit ſyſtematiſchen Bearbeitungen der ganzen Ordnung ſind bald nach dem Abſchluß meiner eigenen hervorgetreten Martin[7]) und Leſſon[8]); das gut angelegte Werk des erſteren iſt leider bald ins Stocken gerathen, nachdem es noch nicht ganz die erſte Familie, die altweltlichen Affen, beendigt hatte; von den Arbeiten des letztgenannten kann nicht geſagt werden, daß ſie zur Förderung der Kenntniſſe von den Vierhändern beigetragen hätten und bemerkenswerth ſind ſie lediglich wegen der ſchauderhaften Bildung neuer Namen. Von vorzüglichem Werthe dagegen iſt der von Iſ. Geoffroy[9]) herausgegebene Katalog der im pariſer Muſeum aufgeſtellten Affen, der außer der Charakteriſtik mehrerer neuen Arten beſonders

---

1) Verhandelingen over de Natuurlijke Geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen. Zoologie 1839 — 1844. 2) Journal of the Asiatic Society of Bengal; in verſchiedenen Bänden. 3) Reiſe nach Moſſambique. Säugthiere. Berlin 1852. 4) Unterſuchungen über die Fauna Peruana. I. Therologie. St. Gallen 1844. 5) Abh. der K. Akadem. d. Wiſſenſch. in München. II. Klaſſe V. (von 1847 — 49). 6) Expedition dans les parties centrales de l'Amérique du sud. Paris I — V. 1850. 7) Natural History of Quadrupeds and other Mammiferous Animals. London 1840. 8) Species des Mammifères bimanes et quadrumanes, suivi d'un mémoire sur les Orycteropes. Paris 1840. 9) Catalogue méth. de la collection des mammifères etc. du Muséum d'histoire naturelle de Paris. I. Introduction et Catalogue des Primates. Paris 1851.

dadurch einen großen Werth hat, daß er zahlreiche Bemerkungen über diejenigen Exemplare, auf welche ein großer Theil der älteren Affen-Species begründet iſt, beibringt. Von den wichtigen Monographien, die derſelbe Verfaſſer über einzelne Gattungen bearbeitet hat, wird noch beſonders bei dieſen ſelbſt die Rede ſeyn. Ueber die Halbaffen hat van der Hoeven[1]) eine vortreffliche Monographie publicirt. Die anatomiſchen Verhältniſſe nebſt der ſyſtematiſchen Eintheilung der ganzen Ordnung hat Vrolik[2]) in klarer und gründlicher Weiſe in einer Abhandlung zuſammen gefaßt. Von der geographiſchen Verbreitung der Affen und der übrigen Säugthiere habe ich in einer beſondern Abhandlung eine ausführliche Darſtellung gegeben[3]).

A. SIMIAE. Aechte Affen.

Dentes primores $\frac{4}{4}$ contigui, laniarii ceteris longiores, mammae 2, uterus simplex.

I. Familie.

Simiae catarrhinae. Altweltliche Affen.

Septum narium angustum, meatus auditorius osseus tubuliformis, compressus, margine denticulatus.

I. SIMIA. Orangaffe.

Brachia elongata, sacculi buccales nulli, nates tectae, cauda nulla.

In Aſien auf Borneo und Sumatra, in Afrika auf die weſtlichen tropiſchen Gegenden beſchränkt. In ihrer Lebensweiſe kommen die 3 Arten mit einander überein.

†) cranium resiliens, brachia paululum sub genu elongata. — Troglodytes.

1. S. Troglodytes Blum., der Schimpanſe; nigra, auriculis majoribus.

S. Troglodytes Bl. s. Troglodytes niger Geoffr. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 31, 301. — Martin mammif. anim. p. 365. — Temm. monogr. de mammal. II. p. 116. — Blainv. ostéogr. Primat. tab. 5 (Schädel). — Vrolik rech. d'anatom. comp. sur le Chimpansé. Amsterd. 1842. — Erbl Tafeln z. vgl.

---

1) Tijdschrift vor Natuurl. Geschiedenis. XI (1844) p. 1 u. f. 2) Todd's Cyclopedia of Anatomy and Physiology part. XXXI p. 194 Artikel: Quadrumana. 3) Abh. d. K. Akadem. d. Wiſſenſch. in München IV (1844) in 3 Abtheilungen.

Anatom. des Schädels tab. 4. fig. 4. — MACARTNEY, transact. of the R. Irish Academ. XIX. 2 (1843, Gehirn). — THOMAS S. SAVAGE and JEFFRIES WYMAN, Boston journ. of nat. hist. IV. 3 (1843) p. 362, 4. (1844) p. 377. — OWEN ann. of nat. hist. XVII p. 476 (anatom. Bemerkungen); transact. of the zool. soc. III part. 6 p. 381. tab. 58 — 60 (Schädel). — Is. GEOFFR. catal. des Primat. p. 4.

Die bedeutenden Arbeiten, welche 1840 über den Schimpanſe erſchienen und im Vorſtehenden aufgezählt ſind, haben uns jetzt zu einer genauen Kenntniß deſſelben verholfen; wir wollen hier das Wichtigſte daraus zu unſerer frühern Beſchreibung nachtragen.

Das Gehirn des Schimpanſes hat, wie Macartney erklärt, nach ſeiner äußern Form eine ſo große Aehnlichkeit mit dem menſchlichen Gehirn, daß, die Differenz in der Größe ausgenommen, das eine mit dem andern verwechſelt werden könnte. Die Windungen ſind eben ſo beſtimmt markirt und die Verhältniſſe des kleinen zum großen Hirn genau wie beim Menſchen. Die corpora candicantia fand Macartney ſehr unbeſtimmt, die Pyramiden und Oliven nicht ſehr entwickelt, die Aeſte des Lebensbaumes vielleicht nicht ſo ſtark, aber eben ſo zahlreich als beim Menſchen. Dem corpus fimbriatum fehlt der gezackte Rand, die Zirbeldrüſe iſt groß, das vordere Paar der Vierhügel iſt das kleinere. — Nach Vrolik's Unterſuchungen iſt wie bei allen andern Affen der Strecker des Zeigfingers kein getrennter Muskel, daher auch der Schimpanſe den Akt des Zeigens und Deutens nicht ausführen kann; ein Mangel, der, wie genannter Beobachter mit Recht beifügt, ohne Zweifel in Bezug ſteht zu der geringern Ausbildung der intellektuellen Anlagen und zu der Unmöglichkeit ſich abſtrakte Ideen zu bilden. Der Sack des Kehlkopfs iſt bald einfach, bald doppelt und ſcheint nur eine Verlängerung der Ventrikeln des Larynx zu ſeyn.

Von beſonderem Werthe ſind die Angaben des Miſſionars Savage, der am Kap Palmas in Oberguinea ſtationirt war, über die Lebensweiſe der Schimpanſes, da ſie auf authentiſchen Beobachtungen und Berichten beruhen. Nachſtehendes enthält das Wichtigſte aus denſelben.

Dieſe Thiere ſind auf Guinea beſchränkt; erwachſen erreichen ſie faſt eine Länge von 5 Fuß. Die Alten können ihre Hand nicht nach Art der

menschlichen ausstrecken, indem die Finger durch lange Verwendung zum Greifen gekrümmt und zusammengezogen sind. Diese Contraktionen sind von der Art, daß die Thiere beim vierfüßigen Gange auf den Knöcheln anstatt auf den Handsohlen ruhen, weshalb an jenen Theilen die Haut sehr verdickt ist. In der Ruhe nehmen die Schimpansés gewöhnlich eine sitzende Stellung an. Mitunter trifft man sie wohl auch stehend und gehend an, wenn sie aber so entdeckt werden, werfen sie sich gleich auf alle Viere und entfliehen. Ihre Organisation ist von der Art, daß sie nicht aufrecht stehen, sondern vorwärts sich neigen; daher legen sie auch beim Stehen die Hände auf den Hinterkopf oder die Lenden, um das Gleichgewicht, wie es scheint, nicht zu verlieren. Ihre natürliche Stellung ist auf allen Vieren, wobei der Körper vorn auf den Knöcheln ruht. Sie sind vortreffliche Kletterer, schwingen sich von Ast zu Ast auf eine große Entfernung hin und springen mit erstaunlicher Geschicklichkeit.

Die Nahrung der Schimpansés besteht im Freien in Früchten, doch werden sie in der Gefangenschaft leicht an das Fleisch gewöhnt. Ihre Wohnstätten erbauen sie sich auf Bäumen, doch gleichen selbige mehr Nestern als Hütten, wie sie irriger Weise von einigen Naturforschern genannt wurden. Gewöhnlich bauen sie nicht hoch über dem Boden und legen ihr Nest aus Aesten und Zweigen an, die niedergebogen oder auch theils abgebrochen und angeflochten werden. Bisweilen sieht man es auch gegen das Ende eines starken belaubten Astes in einer Höhe von 20—30 Fuß über dem Grunde; in einem Fall entdeckte es Savage sogar noch höher. Ihr Aufenthalt ist kein ständiger, sondern wird zur Aufsuchung der Nahrung und der Ruhe nach Umständen gewechselt. Selten werden mehr als ein oder zwei Nester auf einem Baume oder in der Nachbarschaft gesehen; ein Einzigesmal wurden fünf gefunden. Sie leben nicht in Dörfern, wie die älteren Erzählungen fabelten, und werden mehr paarweise als in Horden gesehen, doch sollen sie sich bisweilen in größerer Anzahl zum Spielen versammeln.

Die Schimpansés scheinen niemals der angreifende Theil zu seyn und ihre Vertheidigung beschränkt sich auf Beißen. Sie sind unreinlich und in der Gefangenschaft verzehren sie ihre eigenen Exkremente. Nach

der allgemeinen Sage der Eingebornen ſollen dieſe Affen einſt Mitglieder ihres eignen Menſchenſtammes geweſen, aber wegen ihrer ſchlechten Aufführung von aller menſchlichen Geſellſchaft ausgeſchloſſen worden ſeyn, wo ſie dann durch Verharren in ihren ſchlimmen Gewohnheiten endlich in ihren gegenwärtigen Zuſtand verſanken. Trotz dieſer Verwandtſchaft werden ſie gleichwohl von den Negern gegeſſen. Die Schimpanſes zeigen einen merkwürdigen Grad von Intelligenz und die Mütter eine große Liebe zu ihren Jungen.

2. S. Gorilla Savage, der Gorilla; praecedenti similis at major, nares posteriores multo altiores quam latiores.

Troglodytes Gorilla. Savage and Wyman, Boston journ. of nat. hist. V. (1847) p. 4. mit 4 Abbild. des Schädels. — Owen transact. of the zool. soc. 100. III. (1848) p. 381 tab. 61 — 63. (Schädel); literary gazette Novbr. 1851. — Wyman, Sillim. americ. journ. IX. p. 34. — Is. Geoffr. compt. rend. XXXIV (1852) p. 81; ann. des sc. nat. 3° sér. Zool. XVI. p. 154 tab. 7 (Thier und Kopf).

Die merkwürdigſte Entdeckung, welche in der ganzen Ordnung der Affen gemacht wurde, iſt die von einer zweiten Art von Schimpanſe. Die Ehre der Auffindung und Erkennung derſelben gebührt dem ſchon vorhin genannten proteſtantiſchen Miſſionar Savage, der mit ihr am Gabon-Fluße in Niederguinea bekannt wurde, wo ſie den Namen Enge-ena führt. Als ſyſtematiſche Benennung wählte er die von Tr. Gorilla, mit Bezug auf die Gorillas oder wilden Menſchen, von welchen der berühmte karthagiſche Seefahrer Hanno in ſeiner Reiſe ſpricht und unter denen wohl eine Art von Schimpanſe verſtanden ſeyn dürfte.

Der Stamm, von welchem Savage ſeine Nachrichten einzog, iſt der Mpongwe, der beide Ufer des Gabon von ſeiner Mündung bis 50 oder 60 Meilen landeinwärts bewohnt. Obſchon dieſer Fluß des Handels wegen nicht ſelten von Europäern und Nordamerikanern beſucht wird, ſo blieb dieſen doch bisher das Vorkommen des Gorilla unbekannt, was davon herrührt, daß ſein Wohnort erſt in einiger Entfernung von der Küſte beginnt, und ſeine Lebensweiſe und Wildheit der Art iſt, daß er nicht oft bemerkbar wird, auch die Einwohner vor ihm gewaltige Furcht haben. Sein Wohnbezirk iſt im Innern von Nieder-Guinea, während der des eigentlichen Schimpanſe näher an der Küſte liegt.

Seine Höhe beträgt fünf Fuß, über die Schultern ist er unverhältnißmäßig breit, und er ist dicht mit schwarzen Haaren bekleidet, die im Alter grau werden. Das Gesicht ist sehr breit und lang, die Nase platt, die Schnautze breit und hervorspringend, die Unterlippe sehr beweglich und großer Verlängerung fähig, Gesicht und Ohren nackt und von dunkelbrauner, in's Schwarze ziehender Farbe; besonders auffallend ist ein hoher Haarkamm längs der Mitte des Scheitels, welcher hinten an einen queren, von einem Ohr zum andern verlaufenden Kamm anstößt. Das Thier kann seine Kopfhaut nach Belieben vor und rückwärts bewegen, und im Zorne soll es dieselbe mit dem Haarkamme ganz vorwärts schieben, wodurch es ein äußerst wildes Ansehen erlangt; Brust und Schultern sollen doppelt so stark als beim Schimpanse seyn, und die Arme reichen etwas unter das Knie. Weder Schwanz noch Gesäßschwielen sind vorhanden.

Die Gorillas leben in Gesellschaften, sind aber nicht so zahlreich als die Schimpanses; die Weibchen übertreffen an Anzahl das andere Geschlecht. Nach den übereinstimmenden Erzählungen der Eingebornen wird in einem Trupp nur ein einziges altes Männchen gesehen; wenn die jungen Männchen heranwachsen, entsteht ein Wettkampf um die Herrschaft und das stärkste vertreibt oder tödtet die andern, und wird so das Haupt der Gesellschaft. Ihre Wohnungen, wenn man sie so nennen darf, sind ähnlich denen der Schimpanses und bestehen lediglich aus einigen Reisern und Blattzweigen, die von den Baumästen getragen werden; sie werden bloß bei Nacht benützt, und haben keine Bedachung, weßhalb die Eingebornen den Gorilla einen Thoren nennen, der sich in einem Lande, wo es so viel regnet, ein Haus ohne Dach baue. Die Enge-ena's sind überaus wild und fliehen den Menschen nicht, sondern greifen ihn an und sind daher von den Eingebornen sehr gefürchtet, die niemals, außer zur Vertheidigung, mit ihnen anzubinden wagen. Die wenigen, die gefangen wurden, wurden von Elexhantenjägern und auch einheimischen Händlern, die in den Wäldern unvermuthet auf sie stießen, getödtet. Die Erlegung eines Enge-ena wird als Zeichen großer Geschicklichkeit und Muthes angesehen, und gewährt dem Sieger ausgezeichnete Ehre. Ein Sklave, der das erwachsene Männchen und Weibchen,

deren Knochengerüste theilweise Savage erhielt, erlegte, erlangte deßhalb seine Freiheit. Ihre hauptsächlichste Nahrung besteht in Amomums, Zuckerrohr, den Früchten der Elais guineensis, Carica papaya, Musa sapientum und andern Gewächsen. Von den Eingebornen werden sie fast allgemein als degenerirte menschliche Wesen, als „wilde Waldmenschen" angesehen. Gleichwohl werden sie allenthalben gegessen, und ihr Fleisch, nebst dem der Schimpanses und anderer Affen, nimmt einen Hauptplatz in ihrem Küchenzettel ein.

Nach den Vergleichungen, welche Wyman und Owen zwischen den Schädeln des Gorilla und des Schimpanse angestellt haben, ergeben sich folgende Unterscheidungsmerkmale als die wichtigsten. 1) Der Gorilla ist ansehnlich größer. 2) Die vordern Nasenlöcher sind bei ihm fast quadratisch oder wenn sie sich der dreiseitigen Form annähern, so ist ihre Spitze abwärts gekehrt; bei dem Schimpanse dagegen sind sie dreiseitig mit aufwärts gekehrter Spitze. 3) An den hintern Nasenlöchern ist der senkrechte Durchmesser fast zweimal so groß als der quere; während bei dem Schimpanse der quere den senkrechten übertrifft. 4) Am hintern Rande des knöchernen Gaumens findet sich beim Gorilla ein Ausschnitt in der Mittellinie, während beim Schimpanse ein solcher fehlt. 5) Die Entfernung zwischen der Nasenöffnung und dem Alveolarrande der Schneidezähne ist beim Gorilla geringer als bei letzterer Art. — Sowohl Wyman als Owen haben ihren Abhandlungen Abbildungen von den Schädeln beider Arten beigefügt, unter denen die des Letzteren wahre Meisterstücke der Kunst sind.

Das pariser Museum hat neuerdings 2 Individuen des Gorilla vom Gabon-Flusse erhalten, wovon das eine, ein junges Thier, zugleich mit einem jungen Schimpanse lebend eingeschifft wurde, aber auf der Fahrt umkam und deßhalb in Spiritus aufbewahrt wurde, das andere vom Dr. Franquet geschenkte Exemplar ist ein erwachsenes und ebenfalls in Brantwein conservirtes altes Männchen. Letzteres hat die Höhe eines Mannes von mittlerer Statur; da aber beim Gorilla die hinteren Gliedmassen verhältnißmäßig sehr kurz sind, so ist der Körper viel länger und zugleich von einem viel beträchtlicheren Durchmesser als der des Menschen. Die Maaße von diesen Individuen sind in Meters ausgedrückt:

Höhe	1,67
Umfang am Halſe . . .	0,75
Umfang an der Bruſt. . .	1,35
Spannweite	2,18

Der Gorilla iſt demnach der gröſte aller Affen. Eine ausführliche Beſchreibung deſſelben will Dr. Franquet liefern; einſtweilen hat Is. Geoffroy eine Abbildung vom ganzen Thiere und deſſen Kopf in zwey Anſichten mitgetheilt.

b) cranium elevatum, brachia malleolos attingentia. — Pithecus.

3. S. Satyrus Linn, der Orang-Utan; rufescens, auriculis parvis. Tab. 1.

Simia (Pithecus) Satyrus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 55 u. 301; Münchn. gel. Anzeig. IX (1839) S. 409. — Blainv. ostéogr. Primat. tab. 1 (Skelet vom pariſer Pongo). — Owen, transact. of the zool. soc. II. 3 (1839) p. 165. tab. 30 — 34 (Oſteologie); ann. des sc. nat. 1839 p. 122. — Dumortier bullet. de l'acad. de Bruxell. V (1838) p. 756. — Erbl Tafeln z. vergl. Anatom. des Schädels tab. 4 fig. 1 — 3, tab. 5 fig. 1 (Schädel). — Martin mammif. anim. p. 388. — Temm. monogr. de mammal. II p. 119 u. 364. tab. 41 (altes ♂), 42 (altes ♀), 43 (Köpfe), 44 (Junge), 45 (Schädel), 46 (ganzes Skelet). — S. Müller u. Schleg. verhandel. Zool. (1839) S. 1. tab. 1 (altes ♂); Sandifort ebenda S. 29 tab. 2 — 7 bis (Anatomie). — S. Müller in Wiegm. Archiv f. Naturgeſch. 1845. 1 S. 72. — Somm', bullet. de l'acad. de Bruxell. I. p. 315 (Anatomiſches). — Burmeiſt. Zeitung f. Zoolog. S. 3. — R. Leuckart ebend. S. 58. — Mayer in Wiegm. Archiv 1849 S. 352 (Schädel). — Schlegel, Diergaarde te Amsterd. p. 1. tab. I. (junges ♀). — Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 278.

Orang-roux. Temm. monogr. de mammal. II. p. 136. — Pithecus bicolor. Is. Geoffr. compt. rend. XV. p. 720; archiv. d. mus. II (1841) p. 526; catal. des Primat. p. 6.

Mias Pappan, M. Kassar, M. Rambi. Brooke ann. of. nat. hist. IX. p. 54.

Simia Morio Owen. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 49.

Vergebens hat man ſich bisher nach dieſer Art auf dem Continent umgeſehen und alle ältern deſſfallſigen Angaben haben ſich als irrig erwieſen, ſie iſt auf die beiden großen Inſeln Borneo und Sumatra beſchränkt und darnach kann man 2 Varietäten unterſcheiden: S. Satyrus borneensis und S. Satyrus sumatranus, deren ſpecifiſche Verſchiedenheit bis jetzt durchaus nicht erwieſen iſt. Eben ſo wenig ſind ausreichende Belege aufgebracht worden, um die Annahme von 2 oder 3 verſchiednen

Arten auf Borneo zu rechtfertigen; die deßfallsigen Angaben von Brooke beruhen nicht auf umfassenden eignen Beobachtungen. Auch Owen's S. Morio, auf Ansicht eines Schädels begründet, hat für ihre specifische Selbstständigkeit keine weitere Bestätigung erlangen können und scheint von ihrem Begründer jetzt selbst aufgegeben zu seyn. Am wenigsten kann wohl eine solche Temminck's Orang roux, dem Is. Geoffroy den Namen Pithecus bicolor beilegte, ansprechen, da mit demselben nur ein junges Thier bezeichnet ist, Färbung und Schädelform aber beim Orang-Utan nach Alter, Geschlecht und Individualität einen großen Kreis von Abänderungen darbieten. Bis jetzt kann man mit S. Müller und Schlegel nur eine einzige Art von Orang-Utan anerkennen.

Die genauesten Nachrichten über diese Art hat uns Salomon Müller nach seinen eignen, auf Borneo angestellten Beobachtungen und nach sichern Erkundigungen mitgetheilt, wovon Nachstehendes das Wesentliche ist.

Das gröste Thier, das er auf Borneo erhielt, hatte eine Höhe von 4 Fuß. Die Färbung der Haare variirt vom hell Rostrothen und gelblich Rothen bis zum Schwarzbraunen. Das Männchen unterscheidet sich vom Weibchen durch ansehnlichere Größe, längere Behaarung, insbesondere durch einen starken Bart am Kinn, vor Allem aber durch den halbmondförmigen schwieligen Auswuchs an den Wangen.

Wie der Orang-Utan seiner ganzen äußern und innern Beschaffenheit nach ein höchst merkwürdiges Geschöpf ist, ist er es auch durch manchen Zug in seinen Sitten. Träge und wenig behende, dabei furchtsam von Art und die Einsamkeit liebend, trifft man ihn entweder nur einzeln oder in kleinen Gesellschaften an; in letzterem Falle sind es gewöhnlich jüngere Thiere und Weibchen. Während des Tages klettert er, Nahrung suchend, bedächtlich in den Kronen der Bäume umher; so bald er aber Gefahr ahnet, oder gar durch Verfolgung sich bedroht sieht, sucht er in den höchsten Gipfeln Schutz, wo er sich entweder hinter einem dicken Ast oder zwischen dem dunklen Laubwerk versteckt, oder endlich bei Ermangelung dieses Rettungsmittels in der Höhe von Baum zu Baum weiter flüchtet. Doch selbst bei dieser Gelegenheit sind seine Bewegungen keineswegs ungestüm rasch und eilig, sondern sie werden vielmehr durch ei-

ne gewiſſe zögernde Ueberlegung und geſchliffene Umſicht geleitet. Verwundet durch einen Schuß oder mit einem vergifteten Pfeil, fängt der Orang-Utan ſogleich an alle Zweige, in ſeiner Nähe abzureißen und von der Höhe herabzuſchleudern, vermuthlich in der Abſicht, um dadurch ſeinen Gegner Furcht einzujagen und ihn von fernerer Verfolgung abzuhalten. Unter dieſem verwüſtlichen Zorn, und Wuth verrathenden Treiben ſtößt er auch von Zeit zu Zeit ein tief brummendes, beinahe pantherähnliches Gebrülle aus. Da manche Stämme der halb wilden Eingebornen von Borneo, unter andern jener der Bejadju's, welcher das ausgedehnte Stromgebiet des ſogenannten großen Dajak-Fluſſes oder Sungie Kahayan mit deſſen Nebenflüſſen bewohnt, große Liebhaber vom Fleiſche des Orang-Utans ſind, wird ihm häufig nachgeſtellt. Das Thier iſt meiſt ſehr fett, und alte Männchen ſollen bisweilen ſo ſchwer ſeyn, daß drei bis viek Menſchen an einem zu tragen haben. Die Nacht hindurch verweilt der Orang-Utan am liebſten in den weniger dem Winde und Regen unmittelbar ausgeſetzten Niederungen des Urwaldes in einer Höhe von 12 bis 20 oder 30 Fuß über dem Boden. Hier wählt er ſich irgend einen großen Farnkraut- oder Orchideenbuſch, der als Paraſit auf einem dicken Stamme wuchert, als Ruheſtelle; oder auch, er ſchlägt ſein Nachtlager auf dem Gipfel eines einzeln ſtehenden kleinen Baumes auf. Zu dieſem Zwecke biegt er die dünnen Zweige kreuzweiſe zuſammen, und legt alsdann, um ſein Lager weicher zu machen, noch eine Anzahl loſer Blätter von Orchideen, Farnkräutern, Pandanus fascicularis, Nipa fruticans und dergleichen darüber hin. Schon hierdurch alſo, daß ſich der Orang-Utan eine Art Bett bereitet, zeichnet er ſich von allen ſeinen Familiengenoſſen, mit Ausnahme des Schimpanſes, augenfällig aus; und dadurch, daß er nicht, wie alle übrigen Affen, ſitzend ſchläft, ſondern ſich meiſt auf dem Rücken oder eine der Seiten niederlegt, charakteriſirt er ſich noch greller. Bei unfreundlichem, kühlem Wetter bedeckt er des Nachts gewöhnlich auch ſeinen Körper mit ähnlichen Blättern und zumal legt er ſich ſolche gern auf den Kopf.

Unter den Sinnen ſcheint das Gehör am vollkommenſten bei ihm ausgebildet zu ſeyn und der Nutzen, den er für ſeine Sicherheit daraus zieht, iſt nicht gering. Geſicht und Geruch ſtehen ohne Zweifel erſterem

an Schärfe nach. Der Tastsinn scheint bei ihm seine höchste Entwicklung und Feinheit in den Lippen, vornehmlich in der großen fleischigen Unterlippe, zu erreichen, was dem Thiere manchen Vortheil gewährt.

Die Nahrung des Orang-Utans besteht in allerlei wilden Früchten, Fruchtknospen, Blüthen und jungen Blättern. Am meisten liebt er die Feigen, namentlich die Ficus infectoria. Ein altes Männchen hatte mehrere 1 — 2 Fuß lange Streifen Baumrinde, nebst einer Anzahl silberweißer Samen von Sandoricum indicum im Magen.

Bis jetzt ist der Orang-Utan, nach zuverlässigen Quellen, blos auf Borneo und Sumatra beobachtet worden. Auf Borneo bewohnt er ausschließlich die großen sumpfigen Wälder der Niederungen; in den Gebirgen sieht man ihn nie. An der Süd- und Westseite dieser großen Insel ist er im Ganzen gar nicht selten, obgleich er sich nirgends zahlreich vorfindet; in sehr bevölkerten Strichen, wie unter andern in der Umgegend von Banjermasing und von da landeinwärts längs des Flusses Duton, ist er gegenwärtig ganz verschwunden. Nicht vergebens sucht man ihn dagegen einige Tagreisen westlich von da längs der Ufer der Flüsse Kahayan, Sampit, Mandawej, Kotaringin u. s. w., während er an der Westküste im Innern von Pontianak und vielen andern Orten vorkommt. Auf Sumatra scheinen hauptsächlich die ebenen Waldstriche im nordöstlichen Theil dieser Insel (in den Reichen Siak und Atjien) seine eigentliche Heimath zu bilden. Die Eingebornen jener Gegend kennen ihn ziemlich allgemein unter dem Namen Mawej. Bei den Dajaken vom Bejadju-Stamme, auf Borneo, heißt er Kahieo, und bei denen, welche die höhern Theile des Flusses Duson bewohnen, Ke-u. Den Namen Orang-Utan (Orang = Mensch, Utan = Wald) führt er allein bei der malaischen und überhaupt mohamedanischen Bevölkerung.

II. HYLOBATES. Gibbon.

Brachia terram attingentia, sacculi buccales nulli, nates callosae, cauda nulla, caput parvum.

Die Kenntniß der hieher gehörigen Arten, die sämmtlich das tropische Asien bewohnen, ist in den letztern Jahren hauptsächlich durch Sa-

lomon Müller [1]) und Is. Geoffroy [2]) gefördert worden; ersterem verdanken wir auch umfassende Angaben über ihre Lebensweise.

1. H. syndactylus Raffl., der Siamang; aterrimus, gula nuda, indice et digito medio pedariorum coadunatis.

Hylobates syndactylus. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 69. — S. Müller in v. d. Hoev. Tijdschr. 1835. II. p. 324. tab. 5. (Kopf eines ♀); Wiegm. Arch. f. Naturgesch. 1845. I. S. 79. — Sandifort in Verhandel. tab. 2. fig. 3 — 5 (Gehirn), tab. 7. fig. 1 — 3 (Luftsack). — Martin mammif. anim. p. 420. — Siamanga syndactyla. Gray catal. of. Brit. Mus. p. 1. — Horsf. catal. of. the East-Ind. mus. p. 1.

Bewohnt lediglich Sumatra, erreicht eine Höhe vom Scheitel bis zum After von 1′ 8½″, Vorderglieder 2′ 5½″, Hinterglieder 1′ 10½″. Die Verwachsung der genannten Zehen kommt bei beiden Geschlechtern vor, die Behaarung der Vorderarme ist aufwärts gerichtet, bei allen andern Gibbons abwärts; einzig unter diesen hat er einen großen Kehlsack.

2. H. Lar Linn. Gm., der weißhändige Gibbon; colore valde variabilis, manibus albidis.

Hylobates Lar. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 71. — Martin mammif. anim. p. 433. — S. Müll. in Verhandel. Zoogdier. p. 48; Wiegm. Arch. f. Naturgesch. 1845. S. 88. Anmerk. — Cantor, Journ. of the Asiat. soc. XV. p. 172. — Blyth ebendas. IX. p. 839; XVI. p. 730. — Hylobates albimanus Vig. Horsf.; Is. Geoffr. compt. rend. XV. p. 716.

β) albido- lutescens, indice et digito medio pedariorum membrana conjunctis.

Hylobates entelloides. Is. Geoffr. compt. rend. XV. p. 717; Jacquem. voy. dans l'Inde p. 13; archiv. du mus. II. p. 532. tab. 1. — S. Müller in Wiegm. Arch. f. Naturgesch. 1845. S. 88. Anmerk.

S. Müller machte zuerst bemerklich, daß bei dieser, das hinterindische Festland bewohnenden Art die Farbe sehr wechselnd ist: aus dem Weißlichgelben bis ins dunkel Schwarzbraune. Dasselbe bestätigt Cantor: „die Farbe wechselt vom Schwärzlichbraun bis zu lichtbraun, gelblich oder schmutzig weiß, bisweilen einförmig, bisweilen gefleckt". Eben so äußert sich Blyth und fügt bei, daß in Tenasserim die lichten Abänderungen vorherrschen. — Is. Geoffroy unterschied einen H. entelloides aus Malakka von H. Lar durch licht falbe Färbung, breitere weiße

1) Archiv für Naturgesch. XI. (1845) S. 77. 2) Compt. rend. XV. (1842) p. 716.

Stirnbinde, die mehr allmählig in die Scheitelfärbung übergeht und durch Verbindung des zweiten und dritten Fingers an der Hinterhand vermittelst einer Spannhaut. Allein die Färbung kann, wie schon Müller bemerkt, diesen H. entelloides vom H. Lar nicht specifisch unterscheiden und was das Vorkommen einen Spannhaut anbelangt, so sagt Cantor vom H. Lar: „die zweite und dritte Zehe von beiden oder nur einem Fuß sind bei einigen Individuen, gleichviel welchen Geschlechtes oder Farbentones, nach der ganzen Länge der ersten Phalanx durch eine breite Haut mit einander verbunden; bei einigen nur theilweise und bei andern nicht.“ Der H. entelloides, von dem die hiesige Sammlung ebenfalls ein Exemplar besitzt, gehört daher nur zu den lichten Farbenänderungen des H. Lar.

3. H. variegatus Geoffr., der Ungko; colore valde variabilis, manibus nigris, fascia supraciliari albida.

S. Müller in Wiegm. Arch. f. Naturgesch. 1845. S. 86; v. d. Hoev. tijdschr. 1835. II. p. 326. tab. 6. (Kopf); verhandel. p. 47. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 3.

α) niger, prymna rufo- aut flavido- fusca.

Hylobates Rafflesii Geoffr. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 73. — Is. Geoffr. compt. rend. XV. p. 716; catal. des Primat. p. 8. — H. agilis Fr. Cuv. var. Ungka etam. Cantor Journ. of. the Asiat. soc. XV. p. 173. — Martin mammif. anim. p. 425.

β) fuscescens, dorso inferiore flavescente.

H. variegatus. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 74. — H. agilis Fr. Cuv. Is. Geoffr. compt. rend. XV. p. 716; catal. p. 7. — E. Fry ann. of nat. hist. XVII. p. 484 (Skelet).

γ) fascia supraciliari albida nulla.

H. concolor (partim). Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 80.

Auf Sumatra und der malayischen Halbinsel; auf letzterer entdeckte ihn Cantor, doch nur in der dunkeln Abänderung. Meine früher ausgesprochene Vermuthung, daß H. Rafflesii und agilis bei weiteren Untersuchungen als eine Art ausmachend sich darstellen würden, ist durch S. Müller's Beobachtungen zur Gewißheit geworden. Letzterer characterisirt den Ungko von Sumatra folgendermassen. Unter beiläufig 40 Individuen fand sich nur ein einziges halbausgewachsenes Weibchen von sehr heller weißgelber Färbung; die meisten andern waren bräunlichgelb,

gelbbraun und rußschwarz, und zeigten mannigfache Schattirungen und Uebergänge; 2 oder 3 waren jedoch tief schwarz, mit Ausnahme derjenigen Theile, welche stets helle gefärbt sind. Beide Geschlechter haben nämlich immer einen weißlichen Streif über den Augen und die Männchen weiße Backenbärte, die sich als Kranz um das dunkle Gesicht ziehen. Bei den schwarzen Individuen ist die Kreuzgegend rothbraun oder schmutzig gelblichbraun. Bei den hellfarbigen ist die Unterseite etwas dunkler als die übrigen Theile, gewöhnlich ins Braune ziehend, welche Farbe auch den Händen eigen ist; das Kreuz ist bei ihnen meist blaßgelb oder weißlichgelb. Gesicht und innere Handfläche sind stets rußschwarz. — Cantor bemerkt von den Exemplaren der malayischen Halbinsel, daß die ersten Phalangen der zweiten und dritten Zehe bei einigen Individuen theilweise oder ganz durch eine Haut vereinigt sind und daß auch manchmal die vierte Zehe theilweise mit der dritten verbunden ist. — Noch habe ich zu erwähnen, daß S. Müller bei Besichtigung der hiesigen Sammlung das von mir in Schreb. Suppl. S. 80 zum H. concolor gezählte Individuum, das angeblich von Borneo kommen sollte, für ein Weibchen des H. variegatus aus Sumatra erklärte, obwohl ihm die weiße Stirnbinde ganz fehlt.

4. H. leuciscus Schreb., der Oa; lanuginosus, brunneo- cinereus, sincipite nigro.

Hylobates leuciscus. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 78. — Martin mammif. anim. p. 436. — S. Müller in Wiegm. Arch. f. Naturgesch. 1845. S. 83. — Schleg. Diergard. S. 151. mit Abbild. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 7.

Man weiß jetzt, daß dieser Gibbon blos auf Java beschränkt ist. Seine Höhe vom After bis zum Scheitel beträgt 1′ 5 — 6″. In der Jugend ist er fast einfarbig hellgrau, erwachsen auf dem Rücken und Gliedmassen bald hellgrau, bisweilen ins Gelblichgraue übergehend, bald dunkler bräunlichgrau, wobei Vorderkopf und Brust braunschwarz sind. Um das Gesicht zieht sich ein Kranz weißlicher Haare.

5. H. concolor Harl., der Kalawet; e fusco et brunneo-flavido variegatus.

Hylobates concolor. Harlan, journ. of the Acad. of Philadelph. v. (1826) p. 229. — Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 79 (theilweise). — Is. Geoffr. voy. de Jacquem. Zool. I. p. 8. — S. Müller, Verhandel. I. p. 48; Wiegm. Arch. f. Na-

turgesch. 1845. S. 85. — Schlegel essai sur la physionomie des serpens, p. 237 u. 241. — Martin mammif. anim. p. 443. — Tfmm. coup d'oeil sur les possess. neerland. III. p. 403. — H. Mülleri. Martin l. c. p. 444. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 7.

Ueber diesen auf Borneo beschränkten Gibbon sind auch jetzt noch nicht alle Bedenken beseitigt. Schlegel sieht ihn nur für den borneoschen Repräsentanten des H. leuciscus an und S. Müller hebt ebenfalls die nahe Verwandtschaft mit letzterem hervor, von dem er ihn dadurch unterscheidet, daß 1) bei H. concolor die Behaarung nicht so dick wollig und rauh, sondern mehr seidenartig ist; 2) daß bei ihm eine ins Gelbliche ziehende Farbenmischung vorherrscht, beim Da dagegen der Grundton mehr hellgrau ist; 3) daß die Färbung größeren Abänderungen als beim Da unterliegt. Bei einigen Männchen aus den südöstlichen Theilen Borneos fand Müller Kopf, Unterleib und Innenseite der Gliedmassen dunkel schwarzbraun, den Rücken und die Außenseite der Gliedmassen gelblichbraun. Bei andern, Männchen wie Weibchen, von Pontianak ist Kopf, Rücken und Außenseite der Gliedmassen bräunlich; Kreuz, Brust und Bauch blaßgelb. Alle haben vor der Stirne einen gelblichweißen Querstreif, ohne daß die Gesichtseinfassung diese Färbung annimmt. Daß Müller das von mir früher hieher gezählte Individuum, obwohl ihm die weiße Stirnbinde fehlt, zu H. variegatus rechnet, ist schon bei diesem angeführt worden. — Is. Geoffroy ist der Meinung, daß Müllers Kalawet specifisch verschieden seyn dürfte vom ächten H. concolor Harl., der einfärbig schwarz ist und will ihn mit Martin als H. Mülleri bezeichnet wissen. Von 2 Exemplaren, die ihm vom holländischen Museum als H. concolor zugeschickt wurden, gesteht er, daß er das eine von H. agilis nicht habe unterscheiden können. Der Harlan'sche H. concolor ist übrigens so unbestimmt beschrieben, daß diese Art nicht auf ihn, sondern auf die Beschreibung von Müller zu begründen ist.

6. H. funereus Is. Geoffr.; der schwarzbäuchige Gibbon; supra cinereus, infra niger.

Hylobates funereus. Is. Geoffr. compt. rend. XXXI (1850) p. 874; catal. des Primat. p. 7; archiv. d. mus. V. p. 532. tab. 26.

Nach einem lebenden Exemplare von der Insel Solo hat Is. Geof-

froy dieſe Art vor Kurzem aufgeſtellt und in ausführlicher Beſchreibung und ſchöner Abbildung erläutert. Die Farbe der Oberſeite iſt grau, was je nach dem Lichteinfall rein aſchgrau oder etwas ins Bräunliche ziehend erſcheint; der Unterrücken und die Lenden ſind lichter. Die Außenſeite der Gliedmaſſen, die Hinterhände mit Ausnahme der Finger, der Hinterkopf und eine ſchmale Binde an der Stirne und den Geſichtsſeiten ſind ebenfalls aſchgrau. Dagegen iſt das Uebrige des Vorderkopfs, der Unterleib und der größte Theil der Innenſeite der Gliedmaſſen ſchwarz, was mehr oder weniger ins Bräunliche fällt. Die Oberſeite der Vorderhände und die hintern Finger ſind ebenſo gefärbt, doch merklich mit Grau gemiſcht. Geſicht, Handſohlen und Geſäßſchwielen ſind ſchwarz; die Augen braun. Die Länge in aufgerichteter Stellung, aber nach ſeiner Gewohnheit mit gebogenen Knieen, iſt ungefähr 65 Centimeter; die Entfernung von der Schnautze bis zum After beträgt ohngefähr einen halben Meter.

Is. Geoffroy unterſcheidet ſeinen H. funereus von dem gleichfalls grau gefärbten H. leuciscus dadurch, daß dieſer nicht nur oben, ſondern auch unten und auf den Gliedmaſſen, innen ſowohl als außen, aſchgrau iſt, und daß nur der Kopf in ſeiner obern und vordern Parthie dunkler iſt, jedoch nicht bräunlich ſchwarz wie beim H. funereus, ſondern dunkelgrau mit etwas Braun unterlaufen. Wenn auch grau bei beiden Arten die Hauptfarbe iſt, ſo iſt ſie doch bei H. funereus etwas dunkler und zieht etwas mehr ins Braune. — Von H. Muelleri s. concolor unterſcheidet Is. Geoffroy ſeine neue Art, daß bei jenem die untern und innern Theile zwar ebenfalls ſchwärzlich ſind, aber die obern ſind braun und nicht grau. Noch hebt er hervor, daß die Stimme des H. funereus von der des H. leuciscus verſchieden iſt.

Obwohl Is. Geoffroy ſeinen H. funereus für eine vollſtändig verſchiedne Art anſieht, geſteht er doch zu, daß ſie ein Mittelglied zwiſchen dem H. leuciscus und H. Muelleri bildet. Meines Bedünkens iſt die Verſchiedenheit von beiden nicht ſo ſchlagend, als Geoffroy meint, nachgewieſen, indem er dabei überſehen hat, daß auch der H. leuciscus erhebliche Farbenabänderungen darbietet und man überdieß nicht weiß, ob nicht ſolche ebenfalls beim H. funereus vorkommen dürften. Einſtweilen

betrachten wir ihn als den Repräſentanten des H. leuciscus auf der Inſel Solo.

7. H. Hulok Harl., der Hulok; totus ater, fascia supraciliari albida; ♀ pallidior.

Hylobates Hulok (Hoolock). Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 76. — Horsf. proceed. of the zool. soc. VII. p. 148. — Martin mammif. anim. p. 438. — Blyth, Journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 729.; ann. of nat. hist. XV. p. 449. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 9. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 2. — Hylobates choromandus. Ogilby, Lond. and Edinb. philosoph. magaz. 1838. XII. p. 531. — Martin mammif. anim. p. 442.

Die Bedenken, die ich früher gegen die Selbſtſtändigkeit dieſer Art äußerte, ſind nunmehr gehoben. Sie findet ſich nach den Angaben von Blyth in Arrakan, Sylhet und Aſſam als Stellvertreter des H. Lar, nach de Viſmes auch im Innern von Bengalen (Mewat). Die genaueſte Beſchreibung iſt folgende von Blyth. „Unter der beträchtlichen Anzahl Individuen, die ich von dieſer Art geſehen habe, ſind die Männchen, faſt ohne Ausnahme, tief ſchwarz geweſen, mit mehr oder minder entwickelter weißer Stirnbinde, ſowohl hinſichtlich der Ausdehnung als der Reinheit des Weißen; gewöhnlich, aber nicht immer, iſt dieſe Binde in der Mitte getheilt, ſelten iſt ſie von dunkelgrauer Farbe, was nicht ſehr mit dem Schwarzen contraſtirt. Die Weibchen ſcheinen niemals tief ſchwarz zu ſeyn, ſondern variiren vom Bräunlichſchwarzen bis zum Weißlichbraunen, im letzteren Falle jedoch ohne die falbe Färbung, die bei lichten Exemplaren des H. Lar bemerklich iſt. Im Allgemeinen ſind ſie blaſſer auf dem Scheitel, dem Rücken und der Außenſeite der Gliedmaſſen, dunkler an der Stirne und viel dunkler an Wangen und Kinn. Sie ſind von allen Zwiſchentönen zwiſchen den erwähnten Extremen und ſcheinen in der Färbung während des Lebens nicht zu ändern. Ogilby's H. choromandus iſt auf einen Hulok von einer zwiſchenliegenden Färbung begründet."

8. H. leucogenys Ogilb., der geſchopfte Gibbon; „niger, pilis ad latera faciei et ad gulam albis; pilis verticis longis et semi-erectis."

Hylobates leucogenys. Ogilb. ann. of nat. hist. VI. (1841) p. 303. — Blyth ann. of nat. hist. IX. p. 61. — Martin mammif. anim. p. 445.

Nach einem jungen weiblichen Thiere von Ogilby charakteriſirt als einförmig tief ſchwarz, mit Ausnahme der Kehle und Wangen, welche mit

langen weißen Haaren, die eine breite Binde von einem Ohr zum andern bilden, beſetzt ſind. Ueber den Augen findet ſich kein weißer Streif wie beim Hulok. Die Haare des Kopfes ſind im Allgemeinen rückwärts gerichtet; die des Scheitels ſehr lang und geben dem Kopf eine pyramidale Figur. Heimath unbekannt. — Blyth bemerkt, daß er die Abbildung des H. leucogenys dem Lieut. Beagin gezeigt habe, der darin ein Thier erkannt hätte, das ihm häufig in den malabariſchen Ghats vorgekommen ſey, gewöhnlich in Truppen von 8 bis 10, worunter braune Individuen. — Dieſe Angaben ſind zur Feſtſtellung der Art nicht ausreichend.

III. SEMNOPITHECUS. Schlankaffe.

Artus elongati graciles, pollex anterior brevissimus, sacculi buccales nulli, nates callosae, cauda longissima, stomachus divisus.

Bewohner von Südaſien. Der letzte Backenzahn des Unterkiefers hat 5 Höcker, wovon jedoch der S. comatus, S. leucoprymnus und vielleicht noch eine und die andere Art eine Ausnahme macht, indem bei ihnen dieſem Zahne der fünfte Höcker fehlt. Die 14 Arten, welche ich früher annahm, ſind jetzt auf 25 geſteigert worden. Das Hauptverdienſt um die genauere Kenntniß derſelben haben ſich in neuerer Zeit Salomon Müller und Schlegel durch ihre Monographie der Schlankaffen des holländiſch-indiſchen Archipels [1]) und Blyth [2]) durch ſeine Schilderung dieſer Thiere von dem indiſchen Feſtlande erworben.

†) **diversicolores, pili verticis a fronte retrorsum versi, depressi aut cristam formantes.**

1. S. melalophos Raffl., der Simpei; supra splendide rufofulvus, subtus dilute ochraceus, crista capitis nigricante.

Semnopithecus melalophos. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 85. — S. Muell. u. Schleg. verhandel. I. p. 60, 66. tab. 12 bis fig. 2 (Kopf). — Martin mammif. anim. p. 470. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 16.

β) **pallidior, crista mystacibusque albidis.**

Semnopithecus flavimanus. Is. Geoffr. archiv. du mus. II. p. 543. —

1) Verhandelingen over de natuurl. geschied. der Nederlandsche overzeesche bezittingen. Zool. I. 1839—1844. 2) Journal of the Asiat. Society of Bengal., in verſchiedenen Artikeln.

S. Muell. a. a. O. p. 60, 67. — Martin l. c. p. 471. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 11.

Lediglich auf Sumatra. Gleich mir betrachten auch S. Müller und Schlegel den S. flavimanus als eine Farbenabänderung von S. melalophus, welche an der Weſtküſte den letzteren vertritt. — Die Jungen des Simpei ſind den Alten gleichfarbig [1]).

2. S. rubicundus Muell., der Kalaſie; unicolor fusco-rufus, occipite cristato, pilis sincipitis radiatis.

Semnopithecus rubicundus. S. Müll. in v. d. Hoev. tijdschr. V. (1838), p. 137; verhandel. I. 61, 69. tab. 9, tab. 11. fig. 1 (jung). — Wagn. Schreb. Säugth. Suppl. I. S. 303. — Martin mammif. anim. p. 473.

Auf Borneo; von der Größe des vorigen. Der Unterleib iſt etwas lichter als die dunkel rothbraune Oberſeite, die Hände ſind gewöhnlich dunkler. Die Jungen ſind anfänglich blaß rothbraun, auf der Unterſeite gelblichweiß. Von C. melalophos iſt er verſchieden ſowohl durch die Färbung als durch die ſtrahlenartige Ausbreitung der Haare des Vorderkopfs, die ähnlich wie bei Cercopithecus radiatus und sinicus beſchaffen iſt.

3. S. chrysomelas Muell., der ſchmalſchopfige Schlankaffe; niger, antibrachiorum latere interno, ventre infimo, caudae basi inferiori nec non artuum posteriorum stria interiori ochraceis; capite cristato. — Juniores sordide flavidi.

Semnopithecus chrysomelas. S. Muell. v. d. Hoev. tijdschr. V. p. 138; verhandel. I. p. 61, 71 tab. 10, tab. 11 fig. 2 (jung), 3 (Schädel). — Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 303.

Semnopithecus auratus Geoffr. Martin mammif. anim. p. 474.

Bewohnt die ſüdlichen Theile von Borneo, namentlich um Pontianak. Die ſchwarze Färbung ſcheint bei beiden Geſchlechtern erſt im Alter ein-

---

1) Hier iſt noch zu erwähnen einer von Gray neuerdings (in den ann. of. nat. hist. X. p. 256) aufgeſtellten Art, die er S. nobilis benennt und alſo charakteriſirt: „lichtroth, ohne Schulterſtreif. Dieſe Species unterſcheidet ſich von S. melalophos, daß ſie dunkler iſt und keinen ſchwarzen Kamm hat; von S. flavimanus, daß ſie faſt einfärbig roth (auburn) iſt und nicht gelb, mit ſchwärzlichem Rücken, und daß ſie keinen ſchwarzen Strich über die Schultern oder an den Wangen hat.“ Aus Indien. — Mit ſolcher Charakteriſtik ſehe ich mich außer Stande über die richtige Stellung des S. nobilis ins Klare zu kommen.

zutreten; die jungen Thiere sind schmutzig gelblich. S. auratus ist nach Schlegel ein hellfarbiges Weibchen. Längs der Mitte des Scheitels verläuft ein schmaler Schopf, der sich bis zum Gesicht erstreckt; die Wangenhaare sind wenig verlängert.

4. S. sumatranus Muell., der weißschenklige Schlankaffe; praecedenti simillimus, at ventre toto usque ad latera, artuum latere interiore et stria usque ad pectus producta albis diversus.

Semnopithecus sumatranus. S. Muell. u. Schleg. verhandel. I. p. 61, 73 tab. 10. — Semnopithecus femoralis. Martin, magaz. 1838. p. 436.; mammif. anim. p. 480. — Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 480. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 15. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 10.

Auf Sumatra als Repräsentant des S. chrysomelas, dem er in allen Stücken ähnlich ist, mit der Ausnahme, daß die Oberseite lichter, der ganze Unterbauch bis zu den Seiten, die Innenseite der Gliedmassen und ein bis zur Brust sich verlängernder Streif weiß ist. Die Jungen sind licht gelblich oder röthlich braun, und wie bei S. chrysomelas scheinen die Weibchen das schwarze Kleid später als die Männchen anzulegen. In ihrer hellen Färbung sind sie mitunter nicht von denen der letztgenannten Art zu unterscheiden; ein Beweis mehr, daß dieser S. sumatranus nur als lokale Varietät des S. chrysomelas anzusehen ist. — Martins' S. femoralis ist ohne Zweifel mit S. sumatranus identisch, zumal da er gleich diesem von Sumatra herstammt. Vielleicht daß auch die Simia Maura von Raffles hieher gehört.

5. S. Maurus Desm., der Lutong; totus ater, mystacibus longissimis; — juniores fulvidi.

Semnopithecus Maurus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 91, tab. 24. — S. Muell. u. Schleg. verhandel. I. p. 61, 76 tab. 12 bis fig. 3 (Kopf) — Martin mammif. anim. p. 478. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 14. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 9. — S. Pyrrhus Horsf. Wagn. Schreb. S. 94, 305. — Horsf. l. c. p. 10.

Auf Java, wo er einer der gemeinsten Affen ist. Durch die von S. Müller und Andern an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen sind uns jetzt die mit dem Alter vor sich gehenden Farbenveränderungen vollständig bekannt geworden. Alt ist er einfarbig schwarz; bei der Ge-

burt goldgelb, nur am Unterrücken, der Oberseite des Schwanzes und der Schwanzquaste mit schwärzlichen Haarspitzen. Nach einigen Wochen fängt die schwarze Farbe an den übrigen Haarspitzen sich zu verbreiten an, und nach 2½ bis 3 Monaten sind bereits Hände, Obertheil des Kopfes und Schwanzquaste ganz schwarz; noch ein Monat später stellt sich das Thier fast ganz im Kleid der Alten dar und nur die langen Wangenhaare bleiben noch eine Zeitlang gelb, bis auch sie schwarz werden. Auch hier scheint es, daß die Weibchen länger die falbe Färbung behalten als die Männchen, wenigstens bildet Horsfield ein solches lichtes Weibchen mit seinem Jungen als S. Pyrrhus ab.

6. S. pruinosus Desm.; der Tjingko; nigrescens, pilis apice albidis, mystacibus longissimis; — juniores fulvidi.

Semnopithecus pruinosus. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 92. — S. cristatus Raffl., S. Muell. u. Schleg. verhandel. I. p. 61, 77 tab. 12 fig. 1 (jung). — Cantor Journ. of the Asiat. soc. XV. — Martin mammif. anim. p. 476. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 13.

Auf Borneo, Sumatra und Banka als Ersatz des S. maurus, von dem er eigentlich nur eine Lokal-Varietät bildet; nach Cantor findet er sich auch auf der malayischen Halbinsel. In allen Stücken, auch in dem Farbenwechsel, mit diesem übereinstimmend, unterscheidet er sich nur durch einen grauen Farbenton, der auf der Unterseite meist ins Weißliche übergeht. Einige Exemplare von Borneo sind ganz schwarz und kaum von S. maurus zu unterscheiden.

7. S. frontatus Muell., der Sampulan; fuliginosus, fronte macula calva lacteo-alba.

Semnopithecus frontatus. S. Muell., v. d. Hoev. tijdschr. V. p. 134; verhandel. I. p. 62, 78 tab. 8. — Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 302. — Martin mammif. anim. p. 475.

Auf Borneo. Unterscheidet sich von allen andern Arten schon durch den kahlen milchweißen Fleck auf der Stirne.

8. S. comatus Desm.; der Surile; e nigrescente cinereus; gastraeo, artuum caudaeque latere interno albidis; occipitis pilis longis cristam formantibus.

Semnopithecus comatus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 87. tab. 24 A. — Martin mammif. anim. p. 468. — Presbytis mitrata. Eschscholtz in Kotzeb. Reise. III. Anhang S. 196. — Semnopithecus mitratus. S. Muell. u. Schleg. verhandel. I. p. 60, 65 tab. 12 fig. 2 (jung), tab. 12bis fig. 1 (Kopf).

Auf Java beschränkt. Die Simia fascicularis Raffl. halten S. Müller und Schlegel für identisch mit Macacus aureus.

9. S. siamensis Muell., der siamische Surili; praecedenti simillimus, at manibus nigricantibus, crista pallidiore, cauda fere tota nigra diversus.

Semnopithecus siamensis. S. Muell. u. Schleg. verhandel. I. p. 60. — Is. Geoffr. cat. des Primat. p. 16. — Semnopithecus nigrimanus. Is. Geoffr. archiv. du mus. II. p. 546. — Wagn. in Wiegm. Archiv 1843. 2. S. 148.

In Siam durch Diard entdeckt und dort der Repräsentant des S. comatus. Nach den Verhandel. kommt er in allen wesentlichen Stücken mit diesem überein, außer in folgenden Punkten. Die Hände sind, statt grau, dunkel braunschwarz, die ganze Ober- und Außenseite ist graubraun, statt grauschwarz, der Schopf graubraun und vorn viel heller als bei S. comatus, alle Untertheile sind minder rein und mehr ins Gelbliche ziehend, der Schwanz ist fast ganz einfarbig schwarzbraun. — Is. Geoffroy, der von Diard ebenfalls 2 Exemplare dieser Art erhielt, bezeichnete sie als S. nigrimanus.

10. S. leucoprymnus Otto, der weißsteißige Affe; nigrescens, occipite brunneo-rufescente; prymna, mystacibus magnis caudaque albidis.

Semnopithecus leucoprymnus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 96. — S. Muell. u. Schleg. verhandel. I. p. 59. — Cercopithecus (Semnopithecus, Presbytis) cephalopterus. Zimmerm. geograph. Gesch. II. S. 185. — Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 734, 1271. — Martin mammif. anim. p. 483. — C. latibarbatus. Geoffr. ann. du mus. XIX p. 94. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 12.

Ist auf Ceylon beschränkt und bis in die neueste Zeit oft mit den verwandten festländischen Arten verwechselt worden. Seine Färbung ist mehr oder minder dunkel, aber der große Backenbart, das Kreuz und der Schwanz sind immer mehr oder weniger weiß. Blyth beschreibt 4 Exemplare in folgender Weise. Zwei Weibchen sind schwarz, etwas grau-

lich gesprenkelt, der Kopf röthlichbraun, an den Seiten etwas schwärzlich; Kreuz, Schwanz, Außenseite der Schenkel, Backenbart, Kinn- und Lippenhaare sind weißlich. Ein anderes Weibchen ist einförmig dunkelbraun, der Kopf viel blasser und mehr röthlich, der Backenbart weißlich; Kreuz, Außenseite der Schenkel und Schwanz verhältnißmäßig, aber schwach heller und weißlich. Ein Männchen ist ähnlich gezeichnet, aber von viel hellerer und röthlichbrauner Farbe, an Händen und Füßen dunkler; Kreuz und Schwanz gelblichweiß, Backenbart weiß. — Is. Geoffroy will nach einem jungen Exemplare den S. latibarbatus von S. leucoprymnus dadurch unterscheiden, daß bei jenem der Schwanz minder lang, aber am Ende flockig und der Pelz insbesondere in der hintern Region mehr einförmig ist.

11. S. cucullatus Is. Geoffr., der Kapuzen-Schlankaffe; fuscus, capite fulvido-brunneo, cauda artubusque nigris.

Semnopithecus cucullatus. Is. Geoffr. archiv. d. mus. II. p. 541.; catal. des Primat. p. 14. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 98. — S. Muell. u. Schleg. verhandel. I. p. 59. — Semnopithecus Johnii. Martin mammif. anim. p. 487. — Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 734, 1272. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 8.

Von den Nilgherris und den Ghats in Vorderindien als Stellvertreter des S. leucoprymnus. Nach Is. Geoffroy ist die Farbe braun, Gliedmassen und Schwanz sind schwarz, die niedergelegten und von der Stirne an rückwärts gerichteten Kopfhaare bräunlichfalb. Blyth bemerkt, daß S. Johnii in seiner Färbung mit den schwarzen Abänderungen des S. cephalopterus sehr nahe verwandt sei, daß aber der erstere eine weit ansehnlichere Größe erreiche, der Schwanz immer schwarz und der Backenbart dunkelbraun zu seyn scheine, auch bei lebenden Thieren der Gesichtsausdruck sehr verschieden wäre.

12. S. jubatus Wagn., der gemähnte Schlankaffe; aterrimus, capite pilis longis brunnescentibus, ad humeros usque dependentibus vestito.

Semnopithecus jubatus. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 305. — Semnopithecus Johnii. Is. Geoffr. archiv. du mus. II. p. 542 Anmerk.

Aus den südlichen Theilen Vorderindiens durch Baron v. Hügel in 2 Exemplaren mitgebracht. Aus einer Bemerkung von Is. Geoffroy

ist ersichtlich, daß vollkommen mit diesem S. jubatus gleichgefärbte Exemplare im brittischen Museum als S. Johnii aufgestellt sind. Ob übrigens diese wirklich mit John's „Affen aus Tellicherie" (Simia Johnii Fisch.) identisch sind, ist nach der Beschreibung, die letzterer von den Kopfhaaren gibt, sehr zweifelhaft. Vom S. cucullatus, so wie er durch Is. Geoffroy charakterisirt ist, ist der S. jubatus allerdings bedeutend verschieden; es fragt sich aber, ob bei weiteren Untersuchungen jener nicht als der jüngere Zustand des letzteren sich herausstellen möchte, was auch aus Martin's Schilderung von verschiednen, unter dem Namen S. Johnii von ihm bezeichneten Exemplaren hervorzugehen scheint.

13. **S. albigena** Gray, der grauwangige Schlankaffe; **totus niger; genis, gutture collique lateribus canis; vertice cristato.**

Presbytis albigena. Gray proceed. with illustrat. 1850. p. 77 tab. 16.

Alles, was wir von dieser neuen Art wissen, beruht auf folgender Beschreibung von Gray. „Schwarz, Kehle, Halsseiten und Vordertheil der Brust graulich; Gesicht schwarz, fast kahl, mit einzelnen kurzen steifen schwarzen Haaren an den Lippen, über jedem Auge ein Büschel langer steifer Haare; Wangen mit kurzen anliegenden grauen Haaren besetzt. Haare des Körpers einförmig schwarz bis am Grunde, lang und locker, zu beiden Seiten Fransen und auf dem Scheitel und Nacken einen zusammengedrückten Kamm bildend. Hände und Füße kurz, Vorderarme klein, hintere groß und breit. — Heimath Westafrika? — Diese Art ist sehr ähnlich Pr. obscurus, aber sie ist schwärzer und hat keinen lichten Fleck im Nacken; die Haare des Körpers sind viel länger, weicher und bilden einen Kamm im Nacken, der dem P. obscurus ganz fehlt. Sie ist mehr ähnlich dem P. melalophos, unterscheidet sich aber durch die schwarze Färbung und kann kaum eine schwarze Abänderung dieser Art seyn."

14. **S. obscurus** Reid, der weißschnautzige Schlankaffe; **fuliginosus, subtus pallidior, manibus nigris, pilis occipitis subelongatis dilute canescentibus, labiis albopilosis; cauda cinerea; — juniores fulvidi. — Tab. 2.**

Semnopithecus obscurus. Reid proceed. of the zool. soc. for 1837. p. 14. — Martin mammif. anim. p. 486. — Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 99. Anmerkg 3. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 174. — Blyth ebenda,

XVI. p. 734. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 12. — Semnopithecus leucomystax Temm. Muell. u. Schleg. verhandel. I. p. 59. — Semnopithecus halonifer. Cantor proceed. of the Linn. soc. for April 1845; ann. of nat. hist. XVII. p. 335. — S. albocinereus. Eydoux voy. de la Bonite. 1838.

Gemein auf der malayiſchen Halbinſel, Prinz von Wales Inſeln und andern benachbarten Inſeln. Körper 2′ 1″, Schwanz 2′ 2″ engliſch. Eine viel verkannte und verwechſelte Art, die uns aber jetzt durch Cantor und Blyth nach Beobachtung vieler lebenden und friſch erlegten Thiere genau bekannt geworden iſt. Mit ihren Beſchreibungen ſtimmt ein Exemplar in der hieſigen Sammlung vollkommen überein. Die Haut iſt milchweiß; der Pelz weich, ſeidenartig, glänzend graulich rußigbraun, unten und an der Innenſeite der Beine, wo die Haare ſpärlicher ſtehen und deshalb auch die weiße Haut durchſcheint, lichter. Geſicht, Ohren, die vier Hände und die Geſäßſchwielen ſind ſchwarz; die Augenlieder milchweiß, was einen breiten Ring um jedes Auge bildet; Kinn und Lippen ſind weiß behaart, der Schwanz iſt licht aſchgrau, die Wangenhaare ſind lang, rückwärts gerichtet und dunkelbraun. Die Kopfhaare ſind rückwärts geneigt, ohne einen ausſtrahlenden Haarwirbel zu bilden; vorn ſind ſie dunkel, am Hinterkopf verlängert und hier licht bräunlichgrau, viel heller als die übrige Behaarung. — Die Jungen ſind anfänglich ganz lichtfalb, ſpäter mit ſchwarzer Beimiſchung, bis endlich das ausgefärbte Kleid zum Vorſchein kommt. — Unſer Exemplar beſtätigt Blyth's Angabe, daß die Haare des Hinterhauptes immer verlängert und gleich dem Schwanz viel lichter als der übrige Körper ſind. Es ſteht dieſe Art durch ihre Färbung in Verwandtſchaft mit S. leucoprymnus wie mit S. pruinosus, obgleich von beiden hinlänglich verſchieden. Eydoux hat ſie irriger Weiſe für den Cercopithecus albo-cinereus angeſehen.

15. S. Phayrei Blyth, der grauſchwarze Schlankaffe; cinereo-niger, subtus albidus, vertice cristato, pilis sincipitis haud elongatis, cauda plus minus albida.

Presbytis Phayrei. Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 733 tab. 26 fig. 3; XIII p. 466 und ann. of nat. hist. XV. p. 452 (als S. obscurus).

β. crista nulla, cauda corpore parum pallidiore.

Presbytis Barbei. Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 734.

Gemein in Arrakan, als Mittelglied zwiſchen S. albocinereus und S. obscurus, mit welch letzterem ihn auch früher Blyth confundirte. Nach der Beſchreibung des letztgenannten iſt der Scheitel ohne ausſtrahlende Haarwirbel, wie ſie bei S. albocinereus ſich finden, aber mit viel längerem Haarkamm; die Haare des Hinterhauptes ſind nicht verlängert und anliegend, die Wangenhaare dunkel, ſehr lang, von vorn die Ohren verdeckend (bei S. albocinereus ganz frei laſſend). Der Pelz iſt aſchfarbig ſchwarz, am dunkelſten an Kopf und Beinen, am Rücken zum Theil ſilberfarbig. Die Unterſeite iſt weiß, was ſich kaum auf die Innenſeite der Gliedmaſſen erſtreckt und viel weniger an den Seiten ausdehnt; Hüften und Schenkel ſind mit dem Rücken gleichfarbig. Der Schwanz ganz oder nur in ſeiner vordern Hälfte weißlich. Das Geſicht iſt bleiſchwarz; Mund und Lippen ſind licht fleiſchfarbig und mit weißen Haaren beſetzt; die innere Hälfte jedes Augenkreiſes iſt von einem blaſſeren und mehr gelblichen Tone. Die Jungen ſind den Alten gleichfarbig. — Der P. Barbei aus Tenaſſerim hat weder den Kamm des S. Phayrei, noch die verlängerten und merklich lichteren Hinterhauptshaare des S. obscurus; die Unterſeite und die blaſſen Flecken des Geſichts gleichen letzterem; die Außenſeite der Arme iſt ſilberig; der Schwanz nur wenig blaſſer als der Leib. Die Größe iſt beträchtlich geringer als die des S. obscurus, übertrifft aber vielleicht etwas die des S. Phayrei. — Mir ſcheint die ſpecifiſche Verſchiedenheit dieſer beiderlei Affen vom S. obscurus noch nicht genügend dargethan.

16. S. albocinereus Desm., der Kaka; cinereo-fuscus, gastraeo, artuum latere interno nec non femorum latere externo posteriore albis; canda nigrescente; vertice vorticibus duobus instructo.

Semnopithecus (Presbytis) albocinerus. Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 174. — Blyth ebenda XVI. p. 733.

Bewohnt die malayiſche Halbinſel. Was der Cercopithecus albocinereus Desm. eigentlich iſt, läßt ſich nicht mehr beſtimmen, da nach Is. Geoffroy kein Exemplar im pariſer Muſeum exiſtirt und der in der Bonite beſchriebene der S. obscurus iſt. Hier nehmen wir ihn, wie ihn Cantor und Blyth übereinſtimmend charakteriſiren. Die Haare

des Scheitels sind durch zwei, seitlich nahe neben einander gestellte Haarwirbel geordnet; die Haare des Hinterhaupts sind etwas verlängert und aufwärts gerichtet, und endigen an dem vertikalen Kamm, welchen sie hervorbringen helfen. Die Farbe ist oben mehr oder minder dunkel graubraun, die vier Hände sind schwarz, die Unterseite, die Innenseite der Gliedmassen, wie auch ein großer Theil der Außenseite der Hüften und Schenkel sind weiß. Der Scheitel ist schwärzlich mit Beimischung von Weiß an den beiden Haarwirbeln; die aufgerichteten Hinterhauptshaare sind gleichfarbig mit dem Rücken oder etwas blasser. Der Schwanz ist schwärzlich, ausgenommen an der Wurzel. Die Augenlieder scheinen den einzig weißen Theil des Gesichts zu bilden, indem die Lippenhaut dunkel ist. — Die Jungen gleichen den Alten, nur haben sie eine lichtgraue Binde an jeder Seite, welche die dunkle Farbe der Oberseite von der weißen der Unterseite scharf scheidet.

17. S. pileatus Blyth, der Mützen-Schlankaffe; cinereus, mystacibus, gastraeo artubusque partim ferrugineis; pilis verticis dependentibus.

Semnopithecus pileatus. Blyth journ. of the Asiat. soc. XII p. 174, XIII p. 467, XVI p. 735 tab. 26. fig. 2; ann. of. nat. hist. XV. p. 452. — Horsf. catal. of the East. Ind. mus. p. 7.

Nach Blyth ist diese Art gemein in den Bergen von Chittagong und Tipperah. Die Haare des Scheitels sind nicht in der Art wie bei S. obscurus verlängert und ohne Spur eines Kammes, wohl aber ragen sie etwas über die des Hinterkopfes, Vorderkopfes und der Schläfe vor, so daß sie über diese herabhängen, wodurch der Anschein einer kleinen flachen, dem Scheitel aufsitzenden Kappe entsteht. Die Männchen sind auf Kopf und Rücken aschgrau, mit Rostfarben überlaufen; die Wangenhaare, die Unterseite und mehr oder weniger die Außenseite der Beine sind tief rostfarben; die Finger sind schwärzlich; der Schwanz ist anfangs dem Rücken gleichfarbig, wird aber gegen das Ende schwarz. Die Weibchen haben nur einen schwachen Anflug von Rostfarbe, und Rücken und Gliedmassen sind mehr rein grau[1]).

[1]) Zur ersten Abtheilung scheint auch der S. argentatus Blyth zu gehören, der indeß nur nach einem halbwüchsigen, von Horsfield (catal p. 7) charakterisirten Exemplar bekannt ist.

††) stramineï, pili sincipitis a vortice centrali radiatim excurrentes. — Entellus Auct.

18. S. hypoleucos Blyth, der dunkelfarbige Lungur; cano-fuscus, capite gastraeoque pallide flavidis, antibrachiis manibusque nigris, cauda nigra apice dorso concolori.

Semnopithecus hypoleucos. Blyth journ. of the Asiat. soc. X. p. 839, XII. p. 170, XV. p. 454, XVI. p. 733. tab. 26. fig. 1. — Semnopithecus Pussumieri. Is. Geoffr. archiv. d. mus. II. p. 538. tab. 2; catal. des Primat. p. 13, 14. — Semnopithecus Johnii var. Martin mammif. anim. p. 489.

Gemein auf Malabar und Travancore. Dieſe Art iſt gleichzeitig von Blyth und Iſ. Geoffroy aufgeſtellt worden. Erſterer giebt von einem Männchen folgende Beſchreibung. Auf der Stirne findet ſich ein ähnlicher ausſtrahlender Haarwirbel wie bei S. Entellus. Der Rücken nebſt der Außenſeite der Oberarme und Oberſchenkel iſt dunkler als bei S. Entellus, was an den Seiten lichter wird und in das Weißliche der Unterſeite des Leibes und der Innenſeite der Oberarme und Oberſchenkel übergeht. Geſicht, Augenbrauen, ganzer Schwanz und der Reſt der Gliedmaſſen ſind tief ſchwarz, was auf der Innenſeite der Vorderarme und der Vorderſeite der Schenkel mit weißlich gemiſcht iſt. Scheitel, Hinterhaupt und Wangenhaare (die zwar ſehr reichlich, aber nicht beſonders lang ſind) ſind bräunlich weiß. Die Länge dieſes Männchens, das Blyth für erwachſen anſieht, beträgt vom Scheitel bis zum After 21″, der Schwanz 32″.

Das von Iſ. Geoffroy beſchriebene Exemplar iſt ein erwachſenes Weibchen. Die Art der Kopfbehaarung giebt er ganz ſo an wie Blyth. Die Oberſeite iſt graulichbraun, was auf den Gliedmaſſen dunkler wird; Vorderarme und die vier Hände ſind ſchwarz. Die Unterſeite, die Außenſeite der Arme und der ganze Kopf iſt falb, was letzterem den Anſchein

---

Körper 1′ 3½″ lang. Oberſeite graulichbraun, dunkler an den Vordergliedern; Mitte des Rückens und Oberſchenkels heller, bei gewiſſer Beleuchtung mit ſilberigem Schimmer. Unterſeite und ein Fleck zwiſchen Aug und Ohr gelblichweiß; Schwanz lichter als der Rücken. Auf dem Scheitel ein ſenkrechter Kamm.

einer Kapuze giebt, die lichter als der übrige Pelz ist. Das Gesicht ist schwarz. Der Schwanz ist in den ersten zwei Dritteln schwarz, dann geht er ins Braune und zuletzt ins Graulichbraune gleich dem Rücken über. Länge 22″ 4‴, Schwanz 31″.

Sowohl Is. Geoffroy als Blyth machen bemerklich, daß Martin mit Unrecht diesen Affen für eine Abänderung des S. cucullatus ansehe, von dem er sich schon durch den Haarwirbel auf dem Vorderkopf wesentlich unterscheide. Er gehört zur Gruppe des Entellus, ist aber dunkelfarbiger und kleiner als dieser. Die lichtere Färbung des Schwanzendes bei dem von Is. Geoffroy beschriebenen Weibchen ist nach Blyth kein Grund dasselbe als besondere Art zu betrachten.

19. S. Entellus Linn., der Hanuman; sordide stramineus, fulvido-indutus, manibus nigris; pilis undulatis.

Semnopithecus Entellus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 99 (theilw.) tab. XXIII. B. — Bennett gard. and menag. p. 81. mit fig. — Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 732; ann. of nat. hist. XV. p. 454, XX. p. 313. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 4.

Man hat die Simia Entellus Linn. in neuerer Zeit in mehrere Arten getrennt, von denen einige annehmbar erscheinen, andere erst noch einer festeren Begründung bedürftig sind. Die hier angeführte Art ist gemein in Bengalen bis nach Centralindien und Cuttack, auch in Assam. Die Haare sind bei ihr wollig und der Scheitel ohne Kamm oder Schopf. Die vier Hände sind beständig schwarz; der Pelz ist blaß und schmutzig strohfarben, auf dem Rücken und den Gliedmassen mehr oder weniger mit einer blassen Milchschokolad-Farbe überlaufen. Nach Blyth's Versicherung zeigt dieser Entellus keine Farbenabänderungen. Dieß ist der heilige Affe der Hindus, von ihnen Hanuman (Hanumaun) genannt.

20. S. Anchises Ell., der dekkanſche Lungur; obscurius coloratus, manibus albidis nigro-adspersis; pilis longissimis, inprimis digitorum posteriorum.

Semnopithecus Anchises. Elliot journ. of the Asiat. soc. XIII p. 470. — Blyth ebenda XVI. p. 733; ann. of nat. hist. XV. p. 455.

Dieß iſt die gemeine Art von Lungurs auf dem erhöhten Tafelland von Dekkan. Sie gleicht den dunkelſten Individuen des S. Entellus, aber die Vorderhände ſind weiß und ſchwarz geſprenkelt, die Hinterhände weißlich, mit Schwarz an der Wurzel der Zehen und ihren endſtändigen Phalangen. Die Haare ſind gerade und weit länger als bei S. Entellus, an den Seiten 4 bis 7″ lang, an den Hinterhänden beträchtlich über die Fingerſpitzen hervorragend.

21. S. schistaceus Hodgs, der nepaliſche Lungur; schistaceo-canus, capite gastraeoque pallide stramineis, manibus paululum obscurioribus aut dorso concoloribus; pilis longis subundulatis.

Semnopithecus nepalensis v. schistaceus. Hodgson, journ. of the Asiat. soc. X. p. 907; ann. of nat. hist. VIII. p. 314. — Blyth ann. of nat. hist. XX. p. 313. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 6. — Presbytis Entellus. Gray catal. of spec. present. by Hodgs. p. 1.

Bewohnt die Tarai-Waldungen und die niedern Berge, ſelten auch Kachar. Körper 30″, Schwanz ohne Haare 36″ engliſch. Wird von Hodgſon alſo charakteriſirt: oben dunkel ſchieferfarbig, unten und am ganzen Kopfe blaßgelb, nur Hände und Füße etwas dunkler oder mit dem Oberleib gleichfarbig. Haare von einerlei Sorte, weder harſch noch weich, mehr oder weniger gewellt, 3 bis 5½″ lang am Leibe. Gray machte bemerklich, daß unter den von Hodgſon eingeſchickten Fellen auch blaſſere und faſt weiße waren. Dieß macht die Selbſtſtändigkeit dieſer Art bedenklich. Wahrſcheinlich iſt dieß dieſelbe Species, welche Capt. Hutton (ann. of nat. hist. XV. p. 456) als Mussoorie Lungoor bezeichnet und ſie im Himalaya in einer Meereshöhe von 11000′ bei ſtarkem Froſt, ja ſelbſt bei Schneefall antraf, ohne daß ſie von der Kälte litt.

22. S. Priamus Ell., der koromandeliſche Hanuman; pallide fulvidus, manibus albidis, vertice cristato; pilis rectis.

Semnopithecus Priamus. Elliot journ. of the Asiat. soc. XIII. p. 470. — Blyth ebenda XVI. p. 732; ann. of nat. hist. XV. p. 455. — Horsf. catal. of the East. Ind. mus. p. 6.

Gemein an der Küſte Koromandel und Malabar. Die blaſſe Milchſchokolade-Färbung breitet ſich über den ganzen Rücken und die Außen-

ſeite der Gliedmaſſen aus und zwar in einem viel größeren Umfang als je bei S. Entellus; die 4 Hände ſind mit weißen Haaren beſetzt. Die Haare ſind gerad und nicht wellig wie bei letzterem; beſonders eigenthümlich iſt ein aufgedrückter ſchmaler Haarkamm auf dem Kopf, ähnlich dem von S. cristatus. Scheint eine gut begrenzte Art zu bilden.

* **S. albipes. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 14; arch. du mus. V. p. 536.**

Aus Manilla wurde dem pariſer Muſeum ein Schlankaffe überbracht, in dem Iſ. Geoffroy eine neue, aber dem S. Entellus ſehr nahe verwandte Art erkennen wollte. Er iſt von der Größe des letzteren, hat deſſen ſchwärzliches Geſicht, die langen ſchwarzen Augenwimpern und die ſo charakteriſtiſche Phyſiognomie. Die Farbe der Außenſeite iſt bräunlich grau, etwas dunkler als bei S. Entellus und der Kopf gelb überlaufen; die untern Theile ſind weißlich; die Vorderhände ſind ſchmutzig falbgrau, die Hinterhände ſchmutzig weiß, der Schwanz ſchmutzig grau oder bräunlich. — Geoffroy unterſcheidet dieſen Affen von S. Entellus ſowohl durch ſeine lichten, dem Körper gleichfarbigen Hände, als auch durch die Anordnung der Kopfhaare: während nämlich bei S. Entellus alle hinter dem Haarwirbel ſtehenden Haare gegen das Hinterhaupt fallen, ſind es bei S. albipes blos die dem Divergenzpunkt zunächſt liegenden, indem die Haare am Hinterhaupt eine Art Kamm wie bei S. melalophos und mitratus, wenn auch in minder makirtem Grade bilden. — Hierdurch iſt allerdings die ſpecifiſche Trennung von S. Entellus begründet; allein Geoffroy hat dabei die neuerdings von Blyth und Elliot aufgeſtellten Arten dieſer Gruppe überſehen, unter welchen mir die Beſchreibung von S. Priamus in allen Stücken auf dieſen S. albipes zu paſſen ſcheint.

23. S. Thersites Ell., der ceylonſche Hanuman; sordide canus, capite manibusque anterioribus fuscis, mystacibus longis albis.

Presbytis Thersites. Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 1217; ann. of nat. hist. sec. ser. I. p. 454.

Dieſer Repräſentant des S. Entellus iſt auf Ceylon und zwar auf die niedere nördliche Hälfte der Inſel beſchränkt. Wie ihn Blyth uns ſchildert, iſt er kleiner als S. Entellus; auf der Oberſeite einförmig trüb

grau, ohne falbe Beimiſchung, auf dem Scheitel und den Vordergliedern dunkler, an den Händen ins dunkel Schieferbraune übergehend. Auf dem Scheitel findet ſich weder ein Kamm, noch eine Art Querleiſte von Haaren (wie beim lebenden S. Entellus). Der Backenbart iſt mehr entwickelt als bei allen andern Hanuman, und weiß, was ſehr von dem Kopfe und Leibe, die dunkler als bei S. Priamus ſind, abſticht.

†††) statura robustior.

24. S nemaeus Linn., der Duf; cineraceus, torque humerali, femoribus digitibusque nigris; mystacibus, antibrachiis caudaque albis; torque gutturali tibiisque ferrugineis.

Semnopithecus nemaeus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 101. tab. XXIV. — S. Müll. u. Schleg. verhandel. I. p. 62. — Martin mammif. anim. p. 459.

Allein aus Cochinchina bekannt.

25. S. nasicus Schreb., der Kahau; supra rufus, naso longissime producto.

Semnopitheeus nasicus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 102. tab. X. B; l. c. — S. Müll. u. Schleg. verhandel. I. p. 62, 80 tab. 12 fig. 3 (jung). — S. larvatus. Martin mammif. anim. p. 452.

β) juvenis; pallidior, naso recurvo.

Nasalis recurvus Vig. et Horsf.

Auf Borneo. Körper faſt 30″, Schwanz 27″.

IV. COLOBUS. Stummelaffe.

Manus anteriores pollice nullo instructae.

Da die Stummelaffen ſich lediglich durch den Mangel des Daumens an den Vorderhänden von den Schlankaffen unterſcheiden, in allen andern Stücken des äußern wie des innern Baues mit denſelben übereinſtimmen, ſo iſt in zoologiſcher Beziehung, ſtreng genommen, ihre Trennung von den letzteren nicht zu rechtfertigen. Da ſie indeß eine von den Schlankaffen geographiſch geſchiedene Gruppe bilden und als deren Stellvertreter in Afrika anzuſehen ſind, ſo mag es gleichwohl geſtattet ſeyn, ſie in eine beſondere

Gattung zuſammen zu faſſen. Sowohl Iſ. Geoffroy[1]) als H. S. Pel[2]) haben dieſelbe monographiſch behandelt; erſterer legt ihr 9 Arten bei, die letzterer mit Recht auf 4, höchſtens 5 reducirt. Die letztere Monographie iſt um ſo ſchätzbarer, als ihr Verf. die meiſten Arten in ihrem eignen Vaterlande zu beobachten Gelegenheit hatte.

1. C. Guereza Rüpp., der Guereza; ater, fascia circa faciem, gutture, prymnae laterumque pilis longissimis caudaque apicem versus albis.

Colobus Guereza. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 106. — Thomson ann. of. nat. hist. X. p. 203. — Tarragon rev. zool. 1847 p. 177. — Is Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. IV. p. 117.

Abyſſinien, in den Provinzen Gobjam, der Kulla und beſonders Damot. Körper 2′ 4″, Schwanz mit Quaſte 2′ 6½″.

2. C. polycomos Schreb., der weißſchwänzige Stummelaffe; longissime pilosus, ater, mystacibus caudaque albis.

Colobus polycomos. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 108, 307 tab. X. D. — Is. Geoffr. dict. univ. IV. p. 117. — Martin mammif. anim. p. 493. — C. ursinus Ogilb. Wagn. a. a. O. S. 108. — Owen ann. of nat. hist. IX. p. 503. — Is. Geoffr. a. a. O. — Fraser Zoolog. typic. tab. 1. — Pel bijdrag. tot de Dierkund. II. p. 7. — Semnopithecus vellerosus Is. Geoffr. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 97. — (Colobus vellerosus) Is. Geoffr. dict. univ. IV. p. 116. — Semnopithecus bicolor. Wesmael l'instit. III. p. 245. — Colobus leucomeros Ogilb. Wagn. a. a. O. S. 109, 307.

Häufig an der Goldküſte. Aufrecht ſtehend an 3′ hoch. Von den 5 Nominalſpecies, die aus dieſer Art gebildet wurden, habe ich zuerſt die Identität von C. polycomus und C. ursinus nachgewieſen und ebenfalls von Semnop. vellerosus und bicolor wenigſtens ſo viel erkannt, daß ſie eine und dieſelbe Art conſtituiren. Van Beneden zeigte hierauf, daß dieſer S. vellerosus mit Colobus leucomeros identiſch ſey und Pel erklärte ſie endlich alle als zu einer Species gehörig.

3. C. Satanas Wat., der ſchwarze Stummelaffe; totus ater.

---

1) D'Orbigny, dict. univ. d'hist. nat. IV. (1844) p. 116. 2) Bijdragen tot de Dierkunde. Amsterd. II. (1851) p. 7.

Colobus Satanas. Waterh. Loud. magaz. 1838 p. 335; ann. of nat. hist. II. p. 468. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 109, 307. — Is. Geoffr. a. a. O. S. 117. — Martin mammif. anim. p. 497.

Auf Fernando Po im guineiſchen Meerbuſen. Körper 31″, Schwanz 36″ engliſch. Pel meint, daß bei weiteren Unterſuchungen dieſer Affe ſich nur als eine Farbenabänderung des C. polycomos ergeben dürfte.

4. C. ferrugineus Shaw., der roſtfarbige Stummelaffe; schistaceo-nigricans, subtus flavo-albidus; mystacibus, artubus caudaque ferrugineis.

Colobus ferrugineus. Wagn. Schreb. I. S. 110, 308. — (C. ferruginosus) Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. IV. p. 118. — Pel bijdrag. tot de Dierk. II. p. 7. — Colobus fuliginosus. Ogilb. proceed. III. p. 97. — Wagn. Schreb. a. a. O. S. 109. — Colobus rufo-niger Ogilb. Martin mammif. anim. p. 500. — Colobus Temminckii. Kuhl Beitr. z. Zool. S. 7. — Colobus Pennantii. Waterh. Loud. magaz. 1838 p. 335; ann. of. nat. hist. II. p. 468. — Wagn. Schreb. a. a. O. S. 111, 309. — Martin mammif. anim. p. 501.

Gambia, Sierra Leone, Goldküſte, Fernando Po (hier C. Pennantii). Körper 2′ 5″, Schwanz 2′ 8″ engliſch. Bietet verſchiedene Farbenabänderungen dar, unter denen C. Pennantii die bemerkenswertheſte darſtellt.

5. C. verus Bened., der braune Stummelaffe; ferrugineo-fuscus, subtus albido-canus, artuum partibus inferioribus extus caudaque fusco-canis.

Colobus verus. Van Beneden bullet. de Bruxell. V. p. 347 mit Abbild. — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. IV. p. 118. — Martin mammif. anim. p. 503. — Pel bijdrag. tot de Dierk. II. p. 8. mit Abbild. — C. olivaceus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 309.

Auf der Goldküſte. Körper 1′ 4″, Schwanz ohne Quaſte 1′ 5½″, Quaſte 1″. Nach Pel iſt die ganze Oberſeite nebſt Wangen mit rothbraunen, ſchwarz zugeſpitzten Haaren beſetzt, die Unter- und Innenſeite iſt weißgrau; Vorderarme und Unterſchenkel außen, ſo wie Hände und Schwanz ſind braungrau, die Schwanzquaſte iſt dunkler gefärbt.

V. CERCOPITHECUS. Meerkatze.

Artus mediocres, pollex anterior elongatus, sacculi buccales, nates callosae,

cauda longissima, stomachus simplex, dentium molarium inferiorum postremus 4-cuspidatus, rarissime 3- aut 5-cuspidatus.

Eine werthvolle Monographie dieſer Affen iſt von Is. Geoffroy[1]) geliefert worden. In meiner frühern Bearbeitung derſelben hatte ich nur 16 Arten angenommen, jetzt ſind ihrer doppelt ſo viel, nämlich 32 aufgezählt, von denen einige freilich noch nicht ganz ſicher geſtellt ſind. Sie ſind ſämmtlich Afrika angehörig.

1. Subgen. Miopithecus Is. Geoffr.; dentium molarium inferiorum postremus 3-cuspidatus.

1. C. Talapoin Schreb., der Talapoin; olivaceo-viridis, subtus albus, facie pallide carnea, naso nigro.

Cercopithecus Talapoin. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 118. — Blainv. ostéograph. Quadrum. tab. 3. (Skelet). — Martin mamm. anim. p. 534. — Miopithecus Talapoin. Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III. p. 308; archiv. d. mus. II. p. 549; catal. des Primat. p. 18. — M. capillatus. Is. Geoffr. dict. p. 309; archiv. p. 551. — C. melarhinus. Schinz ſyſtem. Verz. I. S. 47.

Geoffroy glaubte eine 2te Art als M. capillatus unterſcheiden zu können, erkannte aber bald hernach, daß dieß nicht zuläſſig ſey. Welchem Theile von Afrika dieſe Meerkatze angehört, iſt noch nicht bekannt geworden.

2. Subgen. Cercopithecus; dentium molarium inferiorum postremus 4-cuspidatus.

†) vellere olivaceo, mystacibus albis.

2. C. cynosurus Scop., der Malbrul; flavido-virescens, subtus albus, artubus externe caudaque canis, mento albo, circulo oculorum livido-carneo, regione anali rubra, scroto cyaneo.

Cercopithecus cynosurus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 116. — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. III. p. 306; catal. des Primat. p. 22. — Martin mammif. anim. p. 515.

An der Weſtküſte von Afrika. Das weiße Kinn unterſcheidet ihn von C. Lalandii und pygerythrus. Das Geſicht iſt nicht ganz ſchwarz wie

1) D'Orbigny, dict. univ. d'hist. nat. III. (1843) p. 296.

bei den andern grünen Affen, ſondern der Augenkreis iſt fleiſchfarbig, was an jüngern Individuen ſich weiter ausbreitet; ein ſolches ſcheint mir der C. Tephrops zu ſeyn (Schreb. Supplem. I. S. 119).

3. C. pygerythrus Fr. Cuv., die rothſteißige Meerkatze; flavido-virescens, subtus albus, artubus externe canis; facie, mento, manibus caudaeque apice nigris, regione anali saturate rufa.

Cercopithecus pygerythrus. Fr. Cuv. mammif. p. 63. tab. 21. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 116 (theilw.). — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III. p. 305.; catal. des Primat. p. 21. — Peters Reiſe nach Moſſamb. I. S. 4.

Dieſe Art, die bisher nach dem einzigen Exemplar im pariſer Muſeum unbekannter Heimath charakteriſirt war, iſt neuerdings von Peters in Moſſambique aufgefunden worden. Sie wurde von Fr. Cuvier mit der folgenden zu einer Art gebracht, von Is. Geoffroy aber davon getrennt und von ihr lediglich unterſchieden durch die nicht graue, ſondern gelbgrüne Färbung der Oberſeite.

4. C. Lalandii Is. Geoffr., die olivengraue Meerkatze; praecedenti simillimus, at vellere cano, pallide olivaceo tincto diversus.

Cercopithecus Lalandii. Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III. p. 305; archiv. du mus. II. p. 561; catal. des Primat. p. 21. — Du Petit-Thouars voy. sur la fregatte Venus, atl. Zool. tab. 1.

Häufig an der afrikaniſchen Südſpitze. Die Hauptfarbe der Oberſeite fällt mehr ins Graue, was nur ſchwach mit einem blaſſen Olivengelb überlaufen iſt. Meine Beſchreibung von C. pygerythrus in Schreb. Supplem., ſowie die von Martin (S. 521.) gehört hieher.

5. C. griseo-viridis Desm., die graugrüne Meerkatze; cano-viridis, subtus albidus, capite pyramidali; mento nec non regione anali albidis, facie nigra, scroto viridi.

Cercopithecus griseo-viridis. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 114. — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III. p. 306. — Martin mammif. anim. p. 518. — C. griseus. Fr. Cuv. mammif. p. 61. tab. 20. — C. sabaeus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 22.

In Kordofan, Sennaar und Abyſſinien einheimiſch. Sie hat die Größe der vorigen Art und unterſcheidet ſich von N. 4 und 3 durch die

weiße Färbung des Kinns und der Aftergegend, von C. cynosurus durch letzteres Merkmal, so wie durch ganz schwarzes Gesicht, grünes Scrotum und den pyramidalen Kopf. Wahrscheinlich ist diese Art die ächte Simia sabaea Linn., daher Is. Geoffroy jetzt ihr auch diesen Namen beigelegt hat.

6. C. sabaeus Fr. Cuv., die grüne Meerkatze; viridi-olivaceus, subtus albidus, capite pyramidali; mystacibus, regione anali caudaeque apice plus minus flavidis, facie nigra, scroto olivaceo-albo.

Cercopithecus sabaeus. Fr. Cuv. mamm. p. 58. tab. 19; fol. I. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 113. — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III. p. 306; rev. zool. 1851. p. 22. — Martin mammif. anim. p. 519. — C. chrysurus. Blyth ann. of. nat. hist. XV. p. 461. — C. callithrichus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 23.

Wie die vorige Art den östlichen Theilen Nordafrikas angehört, so diese den westlichen: Senegambien und den Inseln des grünen Vorgebirges. Da Is. Geoffroy in der vorhergehenden Art die ächte Simia sabaea Linn. erkennen will, so hat er dieser den neuen Namen C. callithrichus beigelegt.

7. C. rufo-viridis Is. Geoffr., die rothgrüne Meerkatze; e rufescente viridis, subtus albus, humeris femoribusque viridi-canis, facie mentoque canis.

Cercopithecus rufo-viridis. Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III. p. 307; archiv. du mus. II. p. 564. tab. 4; catal. des Primat. p. 23.

Nach einem weiblichen Exemplar unbekannter Heimath, das eine Zeitlang in der pariser Menagerie lebte, hat Is. Geoffroy diese Art aufgestellt. Die Oberseite ist olivengrün, was auf dem Rücken mehr als auf dem Kopf mit Roth gewässert ist. Die Seiten sind gegen die Schultergegend hin röthlichgrün; die Wollhaare sind in dieser Region auf einem Theil ihrer Erstreckung röthlichfalb gewässert und die Stichelhaare schwarz und grün geringelt. Weiter hinterwärts gegen die Mitte der Seiten sind die Wollhaare fast ganz hell röthlichfalb, fast wie Nankin, und diese Farbe zeigt sich durch die hier wenig zahlreichen und schwarz und grün geringelten Stichelhaare hindurch. Noch mehr hinterwärts sind

die Seiten faſt rein röthlichfalb, indem die außerordentlich ſpärlichen Stichelhaare die röthlichfalben, nur an der Wurzel weißen Wollhaare nicht mehr verdecken. Schultern und Oberſchenkel ſind graulichgrün, die Außenſeite der Vorderarme und Schienbeine grau mit grünlicher Sprenkelung, die vier Hände fallen ins Grauliche. Die Unterſeite des Leibs und die Innenſeite der Gliedmaſſen iſt weiß. Der Schwanz iſt oben ſprenkelig grau, unten weißlich, ſeine Spitze oben ſchwarz. Zwiſchen dem Schwanz und den Geſäßſchwielen finden ſich einige rothe Haare. Das Geſicht iſt ſchwarz mit weißer Stirnbinde, das Kinn iſt ſchwarz. An den Seiten ſtehen lange weiße Wangenhaare wie bei C. griseo-viridis.

Von den beiden nahe verwandten Arten: C. griseo-viridis und C. pygerythrus unterſcheidet Is. Geoffroy dieſen Affen durch die rothe Färbung der Seiten, deren Wollhaare bei ihm nicht weiß, ſondern roth ſind. Weitere Erfahrungen müſſen über die Selbſtſtändigkeit dieſer Art entſcheiden.

8. C. flavidus Pet., die ockerhändige Meerkatze; ochraceus, nigro-punctulatus, subtus albidus, manibus ochraceis.

Cercopithecus flavidus. Peters Reiſe nach Moſſamb. I. S. 3. tab. I. B.

Dieſe Art iſt von Peters in Moſſambique entdeckt und nach einem jüngeren männlichen Exemplare beſchrieben worden. Die Länge des Körpers beträgt 0,310 M., des Schwanzes 0,340 M. Die ganze Oberſeite iſt ockergelb mit eingeſprengten ſchwarzen Punkten ohne ölgrünliche Beimiſchung; an den Leibesſeiten und an der Außenſeite der Gliedmaſſen wird die Farbe blaſſer und mehr mit Grau verſetzt. Die Unterſeite und die Innenſeite der Gliedmaſſen iſt ſchmutzig weiß; die kurze Behaarung der vier Hände blaß ockergelb. Die einzelnen Haare der Oberſeite ſind am Grunde weiß, dann gelbbraun und ſchwarz geringelt mit ſchwarzer Spitze. Naſe und Geſicht ſind ſchwarz, der mittellange Backenbart iſt weiß mit einigen gelb geringelten und ſchwarz zugeſpitzten Haaren. Der Schwanz iſt auf der Oberſeite anfangs ockergelb und ſchwarz gemiſcht, bis er im letzten Drittel ganz ſchwarz wird; ſeine Unterſeite iſt bis zur Spitze gelblichweiß und nur an der Wurzel mit einem Fleck roſtrother Haare verſehen.

9. C. Werneri Is. Geoffr., die falbe Meerkatze; rutilo-fulvus, subtus albus, cauda apice aureo-fulva.

Cercopithecus Werneri. Is. Geoffr. compt. rend. XXI. p. 874; rev. zool. 1851. p. 22; catal. des Primat. p. 23; archiv. d. mus. V. p. 539 tab. 27.

Nach zwei Männchen unbekannter Heimath hat Is. Geoffroy diese neue Art folgendermaſſen charakteriſirt. Sie iſt ſehr nahe verwandt mit C. callithrichus und griseo-viridis, aber alle Parthien, welche bei dem erſteren graugrün und bei dem anderen olivengrün ſind, ſind hier rothfalb und ſchwarz geſcheckt, indem die Haare mit dieſen beiden Farben in großen Binden gefärbt ſind. Die Verſchiedenheit der Färbung iſt zweifach: Erſetzung des Grünen in den hellern Binden durch Rothfalb und viel größere Ausdehnung der ſchwarzen Binden. Die einzelnen Haare der Oberſeite ſind am Grunde grau, dann ſchwärzlich und hernach lebhaft falb, etwas ins Olivenfarbige ſpielend, zuletzt mit ſchwarzer Spitze. Die untern und innern Theile ſind weiß, die langen Wangenhaare hellgelblich. Die Außenſeite der Gliedmaſſen, mit Ausnahme der Schultern und Schenkel, iſt grau mit etwas Olivenfarbig und ſehr geſprenkelt; eben ſo die Hände. Das Geſicht iſt ſchwarz und der Schwanz an ſeiner Spitze und einem Theil der Unterſeite goldigfalb wie bei C. callithrichus, dem dieſer Affe ganz in der Vertheilung der Farbe und in ſeinen Formen gleicht [1]).

††) vellere rufo, mystacibus albis.

10. C. ruber Linn. Gm., der Patas; naso nigro-piloso.

Cercopithecus ruber. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 130 var. α tab. XVI, XVI. B. — Martin mammif. anim. p. 509. — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III p. 307; catal. des Primat. p. 24.

Bewohnt die Weſtküſte von Afrika, insbeſondere Senegambien, und wird an 2 Fuß lang.

11. C. pyrrhonotus Ehr., der Nisnas; naso albo-piloso.

Cercopithecus pyrrhonotus. Is. Geoffr. dict. univ. III p. 307; catal.

1) Zur Abtheilung der grünen Affen gehört auch noch Ogilby's C. Tantalus (proceed. IX. p. 33), der jedoch zur ſichern Beſtimmung nicht ausreichend charakteriſirt iſt.

des Primat. p. 24. — Fr. Cuv. mammif. fol. IV. — C. ruber var. β. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 310.

Der Stellvertreter des Patas in Darfur, Sennaar und Kordofan, von dem er sich durch die weiße Behaarung der Nase unterscheidet. Is. Geoffroy hebt auch noch als Differenz hervor, daß während bei C. ruber die Schulter und Außenseite der Arme graulich ist, bei C. pyrrhonotus dagegen diese Theile gleich dem Oberkörper roth sind. Dieses letztere Merkmal ist jedoch nicht durchgreifend.

12. C. ochraceus Pet., die ockerfarbige Meerkatze; supra undique ruso-ochraceus, subtus pallidior, facie nigra.

Cercopithecus ochraceus. Peters Reise nach Mossamb. I S. 2 tab. I A.

Diese durch Peters in Mossambique entdeckte Art schließt sich durch ihre Größe und Gestalt den rothen Meerkatzen des tropischen Nordafrikas an, ist aber von beiden wohl unterschieden. Die ganze Oberseite des Kopfs, Rückens, Schwanzes und der Gliedmassen, so wie die etwas blassern Haare des Backenbarts sind rostroth ockergelb, bei jüngeren Thieren mehr rostbraun; die Unterseite des Leibes, des Schwanzes und der Gliedmassen ist verwaschen ockergelb. Die einzelnen Haare der Oberseite sind rothgelb mit schwarzer Spitze, andere einfach falbgelb; wie letztere sind auch die Haare der vier Hände. Die Haut der Nase und des Gesichts ist schwarz und nur von kurzen ebenso gefärbten Haaren bekleidet; die Ohren, Gesäßschwielen und die Handsohlen sind schwarz. — Diese Affen finden sich nicht selten in den Gebüschen der Ebenen von Querimba, gewöhnlich truppweise.

†††) diversicolores, mystacibus annulatis, fascia supraciliari nulla.

13. C. Pogonias Benn., die bärtige Meerkatze; nigrescens, albopunctulatus; gastraeo, artubus interne caudaque subtus flavis; tergo caudaque superne nigris; barba longa flavido-alba, faciem cingente.

Cercopithecus Pogonias. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 122.

Zur Kenntniß dieser ausgezeichneten, auf der Insel Fernando Po entdeckten Art sind seitdem keine weiteren Beiträge erschienen.

14. C. Burnettii Gray, die gelbstirnige Meerkatze; cano-niger, flavido-punctulatus, subtus cano-albus, fronte mystacibusque flavidis.

Cercopithecus Burnettii. GRAY ann. of nat. hist. X. (1842) p. 256.

Gray giebt von dieser auf Fernando Po entdeckten Art folgende Charakteristik. „Graulichschwarz, Kopf, Nacken und Oberseite des Rückens gelb punktirt; Kehle, Wangen, Unterleib, Innenseite der Vorderbeine und Schenkel graulich weiß; Gesicht schwarz; Wangenhaare und Stirne gelb mit einem kleinen schwarzen Büschel über jedem Auge; Pelz sehr dick; Haare lang, ziemlich starr, am Grunde blaß, dann graulichschwarz; die des Kopfs, Nackens und der Oberseite des Rückens und der Schwanzwurzel mit 2 oder 3 breiten gelblichbraunen, fast endständigen Binden. Länge des Leibs und des Kopfes 19", Schwanzende beschädigt."

15. C. Samango WAHL., der Samango; cinereus, flavido-variegatus, subtus pallescens, capite nigro pallide punctato, brachiis totis nigris, labiis albo-pilosis.

Cercopithecus Samango. WAHLENB. öfvers. af K. Vetensk. Akadem. förhandl. 1844 p. 160; Arch. stand. Beitr. I S. 179. — Peters Reise nach Mossamb. I. S. 4.

Wahlenberg hat diese Art in Truppen im Kaffernlande einwärts von Port Natal entdeckt und nicht lange hernach hat sie Peters in Inhambane aufgefunden. Der Körper mißt 0, 59 M., der Schwanz 0, 77 M. Die Oberseite ist grau und gelblich gesprenkelt, die Unterseite blaß. Der Oberkopf ist schwarz und hell punktirt, das Gesicht ist schwärzlich, die Wangenhaare sind dem Körper gleichfarbig; die Oberlippe und die Unterlippe mit dem Kinn, sowie die Ohren innen am Rande sind weißlich behaart; vor den Wangen findet sich ein schwarzer Fleck. Die Vorderbeine sind schwarz und nur an der Vorderseite des Oberarms gesprenkelt; die Hinterbeine sind außen dunkel grau und weißlich gesprenkelt; alle vier Hände sind schwarz. Der Schwanz ist von der Wurzel bis zur Mitte weißlich, oben mit einer braunen Linie; hernach wird er allmählig schwarz. — Das Weibchen ist nur wenig kleiner, sonst dem Männchen ähnlich; die Jungen sind von der Farbe der Alten.

15. a. C. labiatus Is. GEOFFR.

Is. GEOFFR. dict. univ. d'hist. nat. III (1843) p. 302; archiv. du mus. II p. 555; catal. des Primat. p. 20.

Unter dem Namen C. labiatus stellte Is. Geofsfroy eine neue Art auf, deren Heimath er nicht näher kannte und bezeichnete ihre wesentlichen Merkmale in folgender Weise: „Pelz lang und reichlich. Oberseite dunkelgrau, mit blaß Olivengelb stark gesprenkelt; ein schwarzer Fleck im Gesicht über dem Mundwinkel, der übrige Mundkreis weiß, die vier Hände und die Außenseite der Vorderbeine schwarz; die Außenseite der Hinterbeine bräunlichgrau, die Innenseite der einen wie der andern grau; Schwanz unten schmutzig falb auf eine ziemliche Erstreckung, und längs derselben oben falb und schwarz gesprenkelt, der Rest schwarz." — Später erlangte Is. Geoffroy von Port Natal ein zweites Exemplar, ein Weibchen, das dem ersten ganz ähnlich war, nur daß die falbe Parthie des Schwanzes reiner und heller war. — Man ersieht aus dieser Beschreibung die vollkommene Identität des C. labiatus mit C. Samango.

16. C. albigularis Syk., die weißkehlige Meerkatze; fulvo et nigro-irroratus, subtus canus; mento guttureque albis, artubus caudaque plus minus nigris. — Tab. 3.

Semnopithecus albogularis. Sykes proceed. of the comm. I (1830-31) p. 105. — C. albogularis. Sykes l. c. II p. 18. — Martin mamm. anim. p. 512. — Wagn. Schreb. Suppl. I S. 129 Anmerk. — Fraser Zool. typic. tab. 2. — C. monoides. Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III p. 303; archiv. du mus. II p. 558 tab. 3; catal. des Primat. p. 19.

Indem ich früherhin die Beschreibung von Sykes aufnahm, machte ich gleich auf die nahe Verwandtschaft dieses Affen mit C. Mona aufmerksam, ohne jedoch bei der Unvollständigkeit der Vorlage eine sichere Entscheidung geben zu können. Seitdem sind weitere Beiträge erschienen, welche nunmehr eine solche zulassen. Zunächst ist der durch Sykes als C. albigularis aufgestellte Affe von Fraser in einer schönen Abbildung vorgeführt und dadurch genauer bekannt geworden; die mangelhafte Beschreibung des Ersteren hat er freilich nicht ergänzt, aber doch wenigstens die muthmaßliche Heimath, die früher unbekannt war, nämlich die Insel Zanzibar angegeben. Zugleich hat er Is. Geoffroy's C. monoides für identisch mit diesem C. albigularis erklärt.

Von seinem C. monoides gab Is. Geoffroy folgende Characteristik: „Oberseite des Kopfs und Nackens olivengrün und schwarz gesprenkelt,

Obertheile roth gesprenkelt und etwas grün gewässert; Schultern, ein großer Theil der Gliedmassen und des Schwanzes schwarz; Bauch und Untertheil der Brust graulich, Vordertheil der Brust und Kehle weiß." Von C. Mona durch die Färbung der Unterseite und den Mangel der weißen Flecke neben der Schwanzwurzel verschieden. — Is. Geoffroy wollte diesen Affen von C. albigularis unterschieden wissen; allein nicht blos die Angabe Fraser's, sondern auch ein Exemplar unserer Sammlung weist aus, daß beiderlei Thiere identisch sind. An unserem Exemplare mißt der Körper 1' 6", der Schwanz 2'; Fraser giebt beide Dimensionen zu 1' 9½" und 2' 6½" engl. an.

17. C. erythrarchus Pet., der Koro; olivaceo et nigro-irroratus; subtus albidus; mento guttureque albis, artubus externe nigro-canis; regione anali rufa.

Cercopithecus erythrarchus. Peters Reise nach Mossamb. I S. 1 tab. I.

Eine Entdeckung von Peters, der diesen Affen nicht selten in den Ebenen von Inhambane, weniger häufig bei Quellimane auffand. Die Länge des Körpers beträgt 0,480 M., des Schwanzes 0,640 M. Die Oberseite ist graugrünlich oder bräunlichgrün und schwarz geringelt; auf dem Kopf und dem Vorderrücken ist die Farbe dunkler, am Backenbart und den Leibesseiten lichter, und der Unterrücken nimmt eine mehr bräunliche Färbung an. Nach den Seiten und der Außenseite der Gliedmassen geht die grünliche Rückenfarbe ins Graue über, indem die einzelnen Haare weiß und schwarz oder grau geringelt sind. Die Außenseite der Vorderarme und Hände ist schwarz mit eingesprengten graugeringelten Haaren; die Unterschenkel sind außen dunkelgrau. Kinn und Vorderhals sind weiß, Brust und Bauch schmutzigweiß, die ganze Innenseite der Gliedmassen ist grau. Das Gesicht ist schwarz, die Ohren, Lippen und das Kinn sind mit weißen Haaren besetzt. Die Aftergegend, das erste Sechstel des Schwanzes und die Enden der langen Haare an der Hinterseite der Oberschenkel bis zur Kniekehle herab sind rostroth. Der übrige Theil des Schwanzes ist schwarz mit eingesprengten lichteren Haaren.

Diese Art ist sehr nahe verwandt mit dem C. albigularis, unterscheidet sich aber durch die blassere Färbung, indem das schöne Rostfalb am

Rücken des letzteren hier durch Graugrün oder Bräunlichgrün erſetzt wird und das Schwarz an den Gliedmaſſen weniger Intenſität und Ausbreitung erlangt, insbeſondere aber durch die rothe Färbung der Aftergegend, denn wenn auch bei C. albigularis der roſtfalbe Ton an der Schwanzwurzel vorherrſcht, ſo ſind dagegen die Haare an der Hinterſeite der Schenkel nicht roſtroth, ſondern ſchwarz und weiß geringelt.

††††) fascia supraciliari alba, cauda obscura.

18. C. Mona Schreb., die Mona; macula utrinque ad caudae basin alba.

Cercopithecus Mona. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 128 tab. XV*, XV.B. — Martin mammif. anim. p. 526. — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III p. 304; catal. des Primat. p. 20.

Bewohnt Senegambien und Guinea.

19. C. Campbelli Wat., die geſcheitelte Meerkatze; flavido et nigro irroratus, tergo femoribusque extus staturate cinereis, brachiis externe nigris, gastraeo artubusque intus albis; vellere dorsali longitudinaliter diviso. — Tab. 4.

Cercopithecus Campbelli. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 312. — Martin mamm. anim. p. 544. — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III p. 303. — Fraser Zool. typ. tab. 3.

Fraſer hat neulich eine ſchöne Abbildung dieſes auf Sierra Leone vorkommenden Affen geliefert. Er hat viel Aehnlichkeit mit der Mona, auch gleich dieſer eine weißliche Stirnbinde, aber es fehlen ihm die weißen Flecke neben der Schwanzwurzel, und die Scheitelung der Rückenhaare iſt ihm ganz eigenthümlich.

20. C. palatinus Wagn., der Palatinaffe; fusco-niger, capite, lateribus, femoribus tibiisque saturate griseis; fascia frontali, barba acuminata, gutture, gastraeo toto femoribusque intus albis.

Cercopithecus Rolovay. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 123 (theilw.) — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III p. 304; archiv. d. mus. II p. 538.

Nach Is. Geoffroy's Vorgang trenne ich nunmehr dieſe Art von der folgenden, kann ihr aber den Namen Roloway nicht belaſſen, da damit der ceyloniſche S. Entellus bezeichnet wird. Der C. palatinus, wie ihn Allamand beſchreibt und der von Guinea herſtammt, muß

selten seyn, da ihn nicht einmal das pariser Museum besitzt. Durch seinen fast schwarzen Rücken und die weiße Färbung der ganzen Unterseite unterscheidet er sich von C. Diana.

21. C. Diana Linn., der Dianenaffe; niger, albo-punctulatus, dorso medio ruso-castaneo; lunula frontali, genis, barba acuminata, gutture, pectore necnon brachiorum latere interno pure albis; ventre nigricante; femoribus intus fulvidis, cauda artubusque nigris.

Cercopithecus Diana. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 123 (größtentheils). — Martin mamm. anim. p. 523 (theilw.). — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. III p. 304; arch. d. mus. II p. 558; catal. des Primat. p. 20. — Simia Diana. Schreb. tab. XIV. — Audeb. sing. IV. 2 fig. 6.

Als Heimath ist Guinea, Congo und Fernando Po angegeben. Das von Bennett beschriebene Exemplar gehört hierher, obgleich er den Hinterbauch nur als gelblichweiß bezeichnet.

22. C. leucampyx Fisch., der Diademaffe; olivaceo-canus, nigro-punctulatus; lunula frontali mentoque albis; pectore ventreque nigris; barba mentali nulla.

Cercopithecus leucampyx. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 124. — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III p. 304; archiv. d. mus. II p. 557; catal. d. Primat. p. 20. — Martin mammif. anim. p. 529. — C. diadematus. Is. Geoffr. voy. de Bélang. p. 51. — C. Diana. Fr. Cuv. mammif. p. 47 tab. 14.

Bewohnt ebenfalls die Westküste von Afrika. Zur Unterscheidung ist zu bemerken, daß bei C. palatinus die ganze Unterseite weiß ist, bei C. Diana blos Kehle und Brust, aber nicht der Bauch, bei C. leucampyx lediglich das Kinn.

23. C. Pluto Gray, die Mantel-Meerkatze; niger, supra albido-punctulatus; taenia frontali alba, mento imberbi nigro.

Cercopithecus Pluto. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. III p. 305; proceed. with illustrat. 1848 p. 56 tab. 3.

J. E. Gray hat die Art nach einem lebenden Exemplare aus Angola aufgestellt und folgende Merkmale von ihr angegeben. „Specifischer Charakter schwarz; die Haare der breiten Stirnbinde weiß geringelt; der ansehnlich abgerundete Backenbart, der Rücken, Obertheil des Vordertheils der Seiten und die Schwanzwurzel grünlichweiß geringelt; die hintere Schwanzhälfte

ſchwarz; Geſicht und Lippen ſchwarz mit einzelnen kurzen weißen Haaren. Dieſe Art iſt auf den erſten Blick leicht erkennbar durch die tief ſchwarze Farbe der Oberſeite des Kopfes und der Gliedmaſſen und die breite weiße Stirnbinde, den großen mantelartigen Fleck von fein und weiß geſprenkelten Haaren am Rücken und der anſehnlichen Größe des ſchwarz und weiß geringelten Backenbartes. Der Kinnbart fehlt wie bei C. leucampyx, mit welchem dieſe neue Art ſonſt einige Aehnlichkeit hat, ſie unterſcheidet ſich aber von ihm durch die viel dunklere Färbung, und daß die Lippen gleich dem Geſicht ſchwarz und blos mit ſehr kurzen weißlichen Haaren beſetzt ſind. Aus der Abbildung iſt ferner erſichtlich, daß die Unterſeite ſchwarz gefärbt iſt.

†††††) naso rufescente, aut coeruleo, cauda rufa.

24. C. erythrotis Wat., die rothohrige Meerkatze; niger, flavo-irroratus, subtus canescens; genis albis; auriculis intus regioneque anali rufis; cauda splendide rufa, naso rufescente.

Cercopithecus erythrotis. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 311. — Martin mamm. anim. p. 535. — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III. p. 302. — Fraser Zoolog. typic. tab. 4.

Waterhouſe hatte bei Beſchreibung dieſes von Fernando Po ſtammenden Affen nur ein Fell vor ſich, dem Geſicht und Füße fehlten. Nach einem zweiten vollſtändigen Exemplare iſt Fraſer's Abbildung verfertigt, woraus man erſieht, daß das Geſicht bräunlich falb und die Füße ſchwarz ſind. Im Uebrigen iſt die Beſchreibung von Waterhouſe vollkommen genau. Dieſer Affe iſt zwar dem C. Cephus nahe verwandt, unterſcheidet ſich aber von ihm ſchon durch die rothe Färbung des Ohrenbeſatzes, des Schwanzes und der Aftergegend.

25. C. Cephus Linn., die blaunaſige Meerkatze; nigro et flavo-punctulatus, subtus canescens, mystacibus pilisque auriculi internis flavescentibus; cauda pone basin ferruginea, naso coeruleo.

Cercopithecus Cephus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 127 tab. XIX. — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III p. 302; catal. des Primat. p. 19. — Martin mammif. anim. p. 532.

Ebenfalls dem tropiſchen Weſtafrika angehörig.

††††††) naso albo.

26. C. nictitans Linn., die Wink-Meerkatze; totus nigricans, flavido-punctulatus, naso albo.

Cercopithecus nictitans. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 121. — Is. Geoffr. dict. univ. d'hist. nat. III p. 301. — Martin mammif. anim. p. 536.

Guinea. Durch die Weiße wie durch die Vorragung der Naſe ausgezeichnet [1]).

27. C. Petaurista Schreb., die weißnaſige Meerkatze; fulvido-olivaceus, nigro-punctulatus, gastraeo mystacibusque albis, naso apice albo.

Cercopithecus Petaurista. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 119 u. 310. tab. XIX. B. u. C. — Is. Groffr. dict. univ. d'hist nat. III p. 301; catal. des Primat. p. 19. — Martin mammif. anim. p. 539. — Simia Ascanius Auct.

Guinea. Ein ganz altes Thier iſt von mir beſchrieben worden.

28. C. melanogenys Gray., die ſchwarzfleckige Meerkatze; obscure olivaceus, flavido-punctulatus, subtus albidus; facie, mystacibus, manibus, artubus extus caudaeque apice nigris; macula nasi cordata nec non macula temporali parva utrinque albis.

Cercopithecus melanogenys. Gray ann. of nat. hist. XVI p. 212; sec. ser. V. p. 54; proceed. with illustrat. 1849. tab 9.

Dieſer Affe iſt von Gray nach einem halbwüchſigen Exemplare folgendermaſſen charakteriſirt worden: „dunkel olivenfarbig, fein gelb geſprenkelt; Geſicht, Wangen, Stirne, Bruſt und Hände ſchwarz; ein großer herzförmiger Fleck auf der Naſe und ein kleiner an jeder Seite weiß. Kehle, Unterſeite des Leibs und Innenſeite der Beine weißlich; Vordertheil der Schultern, Außenſeite der Beine und Schwanzende ſchwärzlich; Ohren, Rückenmitte und Oberſeite des Schwanzes roth.“ — Gray unterſcheidet dieſen Affen von C. nictitans durch ſeinen gelb geſprenkelten Pelz und die Herzform des Naſenflecks; von C. Petaurista durch eben dieſes Merkmal, ſowie durch die ſchwarze Färbung der Wangenhaare, die graue der Außenſeite der Beine und die rothe Färbung des Mittelrückens.

1) Der Nachweis, daß der von Waterhouſe nach einem verſtümmelten Felle charakteriſirte C. Martini (Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 311) von C. nictitans wirklich ſpecifiſch abweicht, iſt bisher noch nicht beigebracht worden.

und Schwanzes. Bei der Veränderlichkeit der Färbung muß man zur sichern Annahme dieser Art die Kenntniß alter Thiere abwarten. Als ihre Heimath wird Westafrika vermuthet.

29. C. Ludio Gray., die schwarzschläfige Meerkatze; nigricans, flavido-punctulatus, gastraeo brachiisque intus albis; facie, genis, temporibus artubusque anterioribus nigris; macula nasi oblonga alba.

Cercopithecus Ludio. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. V p. 54; proceed. with illustrat. 1849 tab. 9.

J. E. Gray hat diese Art auf ein fast vollständig erwachsenes Exemplar, das ebenfalls aus Westafrika abstammen soll, begründet. Er bezeichnet es als „schwärzlich, fein gelb gesprenkelt; Gesicht, Schläfe, Oberkopf, Schultern nnd Vorderglieder schwarz; Außenseite der Hinterbeine und Schwanzende schwärzlich; auf der Nase ein großer länglicher weißer Fleck; Kehle, Obertheil der Innenseite der Arme und Unterseite des Leibs weißlich; Steiß und Unterseite der Schwanzwurzel dunkel röthlich braun." Gray unterscheidet diese Art von den beiden andern gelb gesprenkelten: dem C. Petaurista und C. melanogenys, durch die Größe und die aufrechte längliche Form des Nasenflecks und insbesondere durch gänzlichen Mangel von Weiß an Wangen und Schläfen; sie ist auch sonst durch die vorherrschend schwarze Färbung des Pelzes und die rothen Haare des Steißes ausgezeichnet.

3. Subgen. Cercocebus Geoffr.; dentium molarium inferiorum postremus 5-cuspidatus.

Diese Gruppe repräsentirt in Afrika die asiatischen langschwänzigen Makakos, denen sie sich auch im Zahnbaue, in der verlängerten Schnauze und den obern Augenhöhlen-Wülsten annähert, während sie im Uebrigen die Formen der Meerkatzen zeigt. Den zwei von mir früher angegebenen Arten ist seitdem eine dritte beigefügt worden, die sämmtlich auf Westafrika beschränkt scheinen.

30. C. fuliginosus Geoffr., die räucherige Meerkatze; fuliginosus, subtus canescens, palpebris superioribus nivels.

Cercopithecus fuliginosus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 123: tab. XX. — Cercocebus fuliginosus. Geoffr. catal. des Primat. p. 25.

Von Is. Geoffroy wird die Simia Atys Audeb. als Albino dieſer Art angeſehen.

31. C. collaris Gray., die weißhalſige Meerkatze; fuliginosus, subtus canescens, palpebris superioribus niveis, taenia collari alba, capillo ferrugineo.

Cercopithecus Aethiops. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 126. — Cercocebus collaris. Gray list of Brit. mus. I p. 7. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 24.

Eine wohlbekannte Art.

32. C. Aethiops Linn., die weißſcheitelige Meerkatze; capillo ferrugineo, postice albo.

Cercocebus Aethiops. Gray list. of Brit. mus. I p. 7. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 25.

Sowohl Gray als Is. Geoffroy unterſcheiden dieſen Affen von dem vorigen, weil ſeine Scheitelplatte nicht einfarbig, ſondern hinten weiß iſt.

VI. INUUS Makako.

Corpus robustum, rostrum prominens, cauda longa, brevis aut nulla, dentium molarium inferiorum postremus quinquecuspidatus.

Eine Mittelgattung zwiſchen Cercopithecus und Cynocephalus, von erſterer (mit Ausnahme von Cercocebus) hauptſächlich durch den Beſitz einer fünften Höckers am letzten Backenzahn des Unterkiefers verſchieden; übrigens iſt auch der Bau robuſter, die Schnauze vorſpringender und die Wülſte am knöchernen Schädel oberhalb der Augenhöhlen ſind ungleich aufgetriebener als bei den Meerkatzen. Mit Ausnahme einer Art ſind alle Makakos Südaſien angehörig und dadurch auch geographiſch von jenen abgeſchieden.

1. Subgen. Macacus; cauda corpore parum breviore aut longiore.

1. I. cynomolgus Linn., der gemeine Makako; fusco-olivaceus, subtus albidus, facie livido-carnea, cauda manibusque nigricantibus.

Inuus (Macacus) cynomolgus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 135. tab. XIII, XXII. — S. Mueller verhandel. I. p. 48. — Cantor journ. of the Asiat.

soc. XV p. 176. — Cuming proceed. VIII p. 33. — Erdl, Tafeln z. vergl. Anatom. tab. 5. fig. 5 (Schädel). — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 27. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 17.

β) facie brunneo-nigra.

Macacus carbonarius. Fr. Cuv. mammif. p. 84 tab. 28. — Blyth, journ. of the Asiat. soc. XVI p. 732.

γ) supra fulvus, nigro-punctulatus.

Macacus aureus. Is. Geoffr. archiv. d. mus. II p. 566; catal. des Primat. p. 27. — Wagn. Schreb. a. a. O. S. 138. — P. Gervais, Bonite zool. I. p. 6. tab. 2.

Seine Heimath ist der indische Archipel: Java, Sumatra, Banka, Borneo, Celebes, Timor (nach S. Müller); ferner die malayische Halbinsel und Tenasserim (nach Cantor), selbst der Makako der Philippinen wird von Einigen ihm noch zugezählt. Diese weite Ausdehnung seines Wohngebietes steht in merkwürdiger Verbindung mit der Verbreitung der malayischen Menschenrasse. Der Körper ist 1′ 8″, der Schwanz fast ebenso lang. S. Müller berichtete nach seinen Beobachtungen, daß auf Sumatra diese Affen immer ein dunkleres schwärzliches Gesicht und glatten Scheitel haben, gewöhnlich auch auf dem Rücken mehr gelbroth gefärbt sind. Auf Borneo ist auch das Gesicht meist schwärzlich und der Scheitel glatt, der Rücken gelblich graubraun, bisweilen auch dunkel braungrau. Auf Java ist er lichter gefärbt und immer hat er auf dem Kopf einen kleinen Schopf (Simia Aygula Linn.). Uebrigens finden sich solche Uebergänge, daß deshalb es unmöglich wird, specifische Ausscheidungen vorzunehmen, daher erklärt S. Müller den M. aureus und carbonarius, beide von Sumatra, für bloße Varietäten, wie ich es schon früher ausgesprochen hatte; den in der Bonite aufgeführten M. aureus will übrigens selbst Is. Geoffroy nicht als solchen gelten lassen, sondern für einen ächten M. cynomolgus. — Als einen gemeinen Affen in Arrakan führt übrigens Blyth einen M. carbonarius auf, den er für ganz verschieden von M. cynomolgus erklärt; den Nachweis hat er aber nicht beigebracht. — Die Simia fascicularis Raffl. (Wagn. Schreb. a. a. O. S. 89) von Sumatra erklären S. Müller und Schlegel für einerlei mit Macacus aureus.

1. a. I. palpebrosus Is. Geoffr., der manilliſche Makako; olivaceo-fuscus, subtus albidus, palpebris maculaque utrinque supraorbitali albis; facie obscura, cauda corpore longiore.

Macacus palpebrosus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 93; archiv. d. mus. V. p. 543.

β) totus albus, facie rosea.

Macacus philippinensis. Is. Geoffr. archiv. du mus. II p. 568 tab. 5; catal. des Primat. p. 29.

Nach vier lebenden, aus Manilla gebrachten Exemplaren hat neuerdings Is. Geoffroy dieſe Art aufgeſtellt mit folgenden Merkmalen: „Es iſt dies eine Art mit ſehr langem Schwanze, der länger als beim gemeinen Makako iſt, mit längerer und feinerer Schnauze als bei letzterem. Der Pelz iſt braun, auf der Oberſeite des Körpers und der Außenſeite der Gliedmaſſen etwas olivenfarbig, auf den untern und innern Theilen weißlich, auf dem Kopfe röthlich. Die Augenlieder ſind weiß, eben ſo jederſeits ein darüber ſtehender Fleck, was ſowohl mit der dunkeln Färbung des Zwiſchenraumes dieſer Flecken als mit der des Geſichts contraſtirt. Dieſe letzteren Merkmale geben der Phyſiognomie des M. palpebrosus einen ganz eigenthümlichen Charakter. Dieſer Makako ſteht in mehreren Beziehungen dem gemeinen Makako nahe, entfernt ſich aber durch andere von demſelben in einer ſehr markirten Weiſe." — Es iſt klar, daß zur Zeit dieſe Merkmale nicht ausreichend ſind, um mit Sicherheit dieſen Affen ſpecifiſch von I. cynomolgus zu trennen.

Früher ſchon hatte Is. Geoffroy in einem andern, ebenfalls aus Manilla lebend überbrachten Makako, obwohl er ein Albino war, eine vom gemeinen Makako unterſchiedene neue Art, der er den Namen Macacus philippinensis gab, zu erkennen geglaubt. Bei dieſem Individuum ſind alle Haare weiß, etwas mit Gelb überlaufen; alle nackten Theile ſind zart roſafarben. Die Iris iſt ſehr wenig gefärbt und die Augen erſcheinen je nach dem Lichteinfall bläulich oder blaßroth. Dieſen Albino will Is. Geoffroy von M. aureus durch die Art der Kopfbehaarung und von M. cynomolgus durch größere Schwanzlänge unterſcheiden. Während nämlich bei letzterem der Schwanz kaum die Körperlänge erreicht, iſt er bei dem Albino um ein Decimeter länger. Is. Geoffroy iſt

demnach der Meinung, daß dieser Albino eine neue Art anzeige, deren eigentliche Färbung erst noch zu ermitteln wäre. Nach einer ihm von Gervais mitgetheilten Notiz hätte ein in London lebender Makako von Manilla einen dunkler olivenfarbig gefärbten Pelz und ein schwärzeres Gesicht als der gemeine Makako.

Man sollte nun wohl vermuthen, daß Is. Geoffroy in seinem M. palpebrosus die Stammart dieses Albinos anerkennen würde, allein dieß ist nicht der Fall, denn er erklärt von jenem, daß seine Kopfbildung und geringere Größe ihn von dem letztgenannten Albino specifisch zu trennen scheinen. Unserer Meinung nach wird letztere Verschiedenheit wohl nur vom Altersstande bedingt seyn, so daß wir vor der Hand uns berechtigt halten, diesen M. philippinensis dem M. palpebrosus zuzuweisen. Wir haben hiezu um so mehr Grund, als wir durch Cuming wissen, daß die Makakos der Philippinen mancherlei Farbenabänderungen darbieten, wie er denn unter gewöhnlich gefärbten auch ein schwarz und weiß, so wie ein hell kastanienfarbig und weißgeschecktes Individuum antraf. Cuming betrachtet übrigens alle diese Affen als dem J. cynomolgus angehörig, mit dem sie jedenfalls in der nächsten Verwandtschaft stehen und vielleicht nur als eine Lokalrasse desselben anzusehen sind.

2. I. pileatus Shaw, der falbe Hutaffe; fulvido-fuscus, subtus albidus; capillitio radiato.

Simia pileata. Shaw, gen. zool. I. 1. p. 53. — Macacus pileatus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 27. — Cercocеb. sinicus. Geoffr. ann. XIX. p. 99. — Mac. (Inuus) sinicus. Fr. Cuv. mammif. fol. III. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 139. — Templeton ann. of nat. hist. XIV. p. 361. — Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 1272. — Guenon couronnée. Buff. suppl. VII. p. 71 tab. 16.

Es ist jetzt dargethan, daß diese Art nicht auf dem Festland, sondern nur auf Ceylon wohnt. Bei erwachsenen Männchen ist Kopf und Rücken gelblichbraun, das Gesicht licht lohfarbig, die Unterlippe schwarz gesäumt, die Iris röthlichbraun, die Unter- und Innenseite blaß, die Hände rußfarbig; der Schwanz mausfarbig, an der Spitze lichtbraun oder grau. Beim Weibchen sind Schenkel und Arme röther, die Innenseite der Oberarme und breite Flecken auf Brust und Bauch indigoblau, das

Band über der Stirne gewöhnlich nicht dunkel, sondern orangegelb. — Die Verwirrung in der Synonymik dieser und der folgenden Art ist durch Is. Geoffroy gelöst worden.

3. I. sinicus Linn., der grüne Hutaffe; sordide viridi-fuscus, subtus albidus; capillitio radiato.

Simia sinica. Linn. Gm. I. p. 34. — Mac. sinicus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 26. — Cercoceb. radiatus. Geoffr. ann. XIX. p. 98. — Mac. (Inuus) radiatus. Fr. Cuv. mammif. p. 86 tab. 29; fol. I. (Toque). — Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 140. — Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 732. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 18. — Bonnet-chinois. Buff. XIV. tab. 30.

Gemein auf der vorderindischen Halbinsel. Vielfach verwechselt mit I. pileatus, aber dieser ist lebhaft rothbraun, bis ins Goldfalbe ziehend, J. sinicus dagegen ist schmutzig grünlichbraun.

2. Subgen. Rhesus; cauda corpore dimidio breviore, rostrum mediocriter productum.

4. I. erythraeus Schreb., der Bangur; olivaceo- aut fusco-canus, infra albidus, manibus carneis; cauda femora subaequante.

Inuus erythraeus. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 142 tab. VIII. C. — Macacus Rhesus. F. Royle, illustr. Himal. mount. part. XI. p. LVI. — Blyth ann. of nat. hist. XV. p. 459. — Gray catal. Hodgs. p. 2. — Horsf. catal. of the East-Ind. mus. p. 20. — Pithex oinops. Hodgs. journ. of Beng. IX. p. 1212; ann. of nat. hist. VIII. p. 315 mit Abbildung des Kopfes.

Gehört dem nördlichen Indien an: Bengalen, Nepal, Simla, Assam?; steigt im Sommer im Himalaya bis zu 9 und 10,000′ auf und kehrt beim Beginn der kalten Jahreszeit nach den Ebenen zurück. Die Färbung ist veränderlich; bei einem lebenden Weibchen, das hier im Sommer 1843 in einer wandernden Menagerie zu sehen war, war auch der ganze Hinterbauch brennend roth.

5. I. Pelops Hodgs., der graue Bangur; praecedenti similis, at vellere largiore canescente, facie obscura.

Pithex Pelops. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. IX. p. 1213; ann. of nat. hist. VIII. p. 315. — Gray, catal. Hodgs. p. 2.

Hodgson, der diesen Affen in Nepal aufgefunden, bezeichnet ihn in nachstehender Weise: „Struktur und Ansehen dem vorigen ähnlich.

Farben mehr ſchmutzig oder purpurn, ſchieferfarbig, zum Theil roſtig überlaufen; Hinterbacken hinten, mit Ausnahme der Schwielen, bekleidet; Geſicht nackt und dunkel, flacher als bei letzterem. Länge 20″, Schwanz ohne Haare 9½″. Pelz voller und wallender als bei P. oinops. — Gray bezeichnet die beiden Felle, die er von Hodgſon erhalten, als graubraun, Pelz ſehr locker, ziemlich lockig, Kopf, Hinterſeite der Oberſchenkel und Unterſeite weiß. — Ob wirklich ſpecifiſch von J. erythraeus verſchieden?

5. a. J. assamensis Mc. Cl., der aſſamſche Makako; coeruleo-canus, subtus pallidior, humeris fuscis, facie natibusque carneis; cauda partem tertiam longitudinis totius superante.

Macacus assamensis. Mc. Clelland proceed. VII. p. 148. — Horsf. cat. of the East-Ind. mus. p. 21.

Nach der kurzen Charakteriſtik, die Mc. Clelland von dieſem Affen giebt, bewohnt er Aſſam, iſt 2½′ lang, blaugrau (in der lateiniſchen Diagnoſe fälſchlich fulvo-cinereus überſetzt), mit dunkel Bräunlich an den Schultern, unten lichtgrau, der Scheitel mit einigen ſchwarzen Haaren, das Geſicht fleiſchfarben, der Schwanz ganz behaart. Verhältniſſe kräftig. Gray ſtellt ihn fragweiſe mit J. Pelops zuſammen und Horsfield erklärt ihn geradezu für identiſch mit dieſem, aber für verſchieden von J. erythraeus, mit dem er übrigens nahe verwandt ſey.

6. J. nemestrinus Linn., der Schweinsaffe; olivaceo-fuscus, subtus flavido-griseus; capite, dorso medio caudaque supra nigris; cauda tenui femoribus breviore.

Innus (Macacus) nemestrinus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 143 tab. IX, IX*. — S. Mueller verhandel. I. p. 14. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. pag. 176. — Macacus libidinosus Is. Geoffr. Schreb. tab. X. B.

Bewohnt Sumatra, Borneo und die malayiſche Halbinſel, aber nicht Java.

3. Subgen. Innus; cauda brevissima aut nulla.

7. J. arctoideus Is. Geoffr., der Bären-Makako; fuscus, fulvo-punctulatus, cauda brevissima.

Macacus (Innus) arctoides. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 146. —

Is. Geoffr. archiv. d. mus. II. p. 573; catal. des Primat. p. 31. — Blainv. ostéogr. Primat. 1. p. 44 tab. 7 (Schädel).

Blyth vermuthet, daß dieser Affe außer in Cochinchina auch vielleicht noch in Afrika vorkommen könnte. Aus Blainville's Abbildung ist ersichtlich, daß der Schädel ganz nach dem Typus von J. cynomolgus und ecaudatus geformt ist. Vom J. speciosus ist diese Art durch ihre langen, mehrmals braun und falb geringelten Haare sehr verschieden.

8. J. speciosus Fr. Cuv., der japanische Makako; flavido-brunneus, subtus pallide canus, facie laete rufa, cauda brevissima floccosa. — Tab. 5.

Inuus (Macacus) speciosus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 146. — Temm. faun. japon. mamm. p. 9. tab. 1. 2. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 31. — Papio melanotus. Ogilb. proceed. VII. p. 31.

Meine frühere mangelhafte Beschreibung von dieser Art kann ich jetzt vollständig ergänzen, nicht blos nach der genauen Schilderung, die nunmehr Temminck von ihr geliefert hat, sondern auch nach einem erwachsenen Exemplare, das seitdem der hiesigen Sammlung zugekommen ist. Es ist dieß eine durch mehrere Merkmale sehr ausgezeichnete Art. Der Pelz ist sehr reichlich, lang und ungemein fein; der kurze Schwanz ist dicht und flockig behaart. Die Hauptfarbe ist ziemlich licht und einförmig oliven-gelblichbraun, was auf der Außenseite der Gliedmassen und Hände am dunkelsten ist und auf der Unterseite des Leibes und der Innenseite der Gliedmassen ins licht Bräunlichgraue übergeht. Die Haare der Oberseite, zumal am Vordertheil, haben einige schwärzliche, wenig merkliche Ringe. Die Wangenhaare sind von gleicher Färbung mit der Oberseite; der Schwanz ist gleichfarbig mit dem Hinterrücken, an der Spitze dunkler, auf der Unterseite lichter. Das Gesicht ist karmesinroth, was besonders lebhaft zur Brunstzeit hervortritt. Die nackten Theile des Gesäßes und die männlichen Geschlechtstheile sind auch mehr oder weniger roth. Der Schädel ist von der typischen Form der Makaken. An unserem Exemplare mißt der Körper 1′ 9″, der Schwanz 2½″; diese Maaße stimmen mit denen von Temminck, der die ganze Länge zu 2′ angiebt, wovon der Schwanz 3″ wegnimmt. — Nach des Letzteren Bemerkung ist bei den 11 bis 12″ langen Jungen das Gesicht fahl, der Schwanz

spärlich behaart und der Pelz schmutzig isabellfarben. In der Menagerie des Kaisers von Japan sah v. Siebold einen Albino von dieser Art, dessen rein weißer Pelz sonderbar mit dem rothen Gesichte und Gesäße contrastirte.

Es lebt dieser Affe auf den japanischen Inseln und ziemlich häufig auf Sikok, Nippon und Kiusiu, geht also bis zum 35° n. Breite. In der Lebensweise kommt er mit seinem nahen Verwandten, dem Hundsaffen überein und wird gleich diesem häufig zu allerhand Kunststücken abgerichtet. Die Japaner bezeichnen ihn mit dem Namen Saru, Sar', und er ist die einzige Art, die auf ihren Inseln vorkommt. Mit dem Hundsaffen stimmt er auch noch darin überein, daß er ganz außerhalb der tropischen Region seinen Aufenthalt hat [1]).

9. J. ecaudatus Linn., der Hundsaffe; cinereo-flavescens, facie carnea, appendice cutanea caudae loco.

Inuus ecaudatus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 149. — J. Pithecus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 31.

Bekanntlich nicht blos dem nordwestlichen Afrika angehörig, sondern selbst noch auf den Felsen von Gibraltar angesiedelt.

10. I. fusco-ater Schinz., der schwarze Makako; fusco-niger; artubus intus, antibrachiis tibiisque cinereis; cauda brevissima.

Macacus fusco-ater. Schinz synops. mamm. I. S. 58. — Papio ocreatus. Ogilb. ann. of nat. hist. VI. p. 517.

Schinz hat diesen Affen, der aus Celebes kommen soll, unter obigem Namen als eigne Art aufgestellt. Es ist ein Männchen, ohne Backenbart, die Kopfseiten nur dünn behaart, die Stirne gewölbt und die Schnautze wenig vorstehend, daher Schinz ihn für einen wahren Makako

1) Der von Ogilby nach einem jungen lebenden Männchen beschriebene Papio melanurus dürfte wohl nichts anders als ein junger J. speciosus seyn. Er beschreibt ihn als ähnlich dem J. ecaudatus, aber Kopf und Rücken schwärzlichbraun schattirt, die Unterseite blaß olivenbraun wie bei J. Rhesus und nemestrinus, die Haare ohne Ringelung, Gesicht und Ohren fleischfarbig, die Backen schwach mit Scharlach überlaufen; der Schwanz 1" lang, nackt. Letzteren Umstand mag man Abreiben im Käfig beimessen, und was die Angabe, daß dieser Affe von Madras kommen soll, anbelangt, so ist es bekannt, daß durch den Handel mitunter auch lebende Individuen vom J. speciosus ausgeführt werden.

und nicht für einen Pavian erklärt. Er ist ganz schwarzbraun, das Innere der Glieder, die Vorderarme und Schienbeine sind grau; das Gesicht olivenbraunschwärzlich. Seine Länge beträgt 1′ 6″, des Schwanzes 1″. — Schinz erwähnt, daß ein zweites Exemplar dieser Art sich im Frankfurter Museum befindet; es ist dieß dasselbe, über welches ich früher (Supplem. I. S. 148 Anmerkung) einige Notizen beigebracht und in ihm den räthselhaften M. maurus vermuthet habe. Jedenfalls kann dieses zweite Exemplar nicht zu Cynocephalus niger oder C. nigrescens gezählt werden, da ihm ein Schopf ganz fehlt.

Schinz bemerkt ferner, daß Ogilby's Beschreibung von Papio ocreatus ganz auf seinen Affen passe. Ogilby beobachtete nämlich in einer wandernden Menagerie einen Affen von einförmig trüb schwarzer Farbe, an dem nur die Vorderarme und Schienbeine, sowie die Gesäßschwielen dunkelgrau waren; der Hodensack war dunkel fleischfarbig, Gesicht und Ohren nackt und schwarz, Handsohlen braun. Die Physiognomie ähnelte der des J. nemestrinus, aber das Gesicht war schmächtiger; die Größe kam mit der des letzteren überein. — Nach dieser Beschreibung ist allerdings an der Identität des Papio ocreatus und J. fuscoater nicht wohl zu zweifeln, und es scheint dieser wirklich eine eigne Art zu bilden, die freilich noch einer genaueren Feststellung bedarf.

VI. CYNOCEPHALUS. Pavian.

Corpus robustum, rostrum valde elongatum, crassum, truncatum; cauda longiuscula apice penicillata aut brevissima simplex; ossa nasalia elongata.

Wie von den Makaken aus einerseits ein allmähliger Uebergang in die Meerkatzen erfolgt, so andererseits in die Paviane. Als durchgreifende Unterschiede der letzteren von den Makaken sind zu bezeichnen: 1) die langgestreckten Nasenbeine, die bei den Makaken nur kurz sind; 2) die Form des knöchernen Schnautzentheils, der nicht nur weit länger als bei diesen ist, sondern dessen Oberfläche einen senkrechten Winkel mit den Seitenflächen bildet, welche letztere überdieß grubenförmig eingedrückt sind; 3) wenn der Schwanz lang ist, endigt er mit einer Quaste, was bei den Makaken nicht der Fall ist.

1. Subgen. Cynopithecus Is. Geoffr.; statura gracilior, nares haud terminales, cauda subnulla, coma capitis compressa elevata. Mittelform zwiſchen den ſtummelſchwänzigen Makaken und den eigentlichen Pavianen; Aſien angehörig.

1. C. niger Desm., der kohlſchwarze Mohrenpavian; totus ater.

Innus niger. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 147. — Cynopithecus niger. Is. Geoffr. archiv. du mus. II. p. 575. — Papio niger. Temm. possess. Neerl. dans l'Inde archipel. III. p. 111.

Auf Celebes und den Molukken (Matchian) einheimiſch; wird bis 2' lang und iſt auf allen Theilen des Körpers intenſiv ſchwarz, mit Ausnahme der Schenkel, die graulichſchwarz ſind.

2. C. nigrescens Temm., der braunſchwarze Mohrenpavian; nigro-fuscus. — Tab. 6.

Papio nigrescens. Temm. possess. Neerl. dans l'Inde archipel. III. p. 111.

Temminck unterſcheidet dieſen Affen, der ebenfalls Celebes angehört, von dem vorigen alſo: „eine zweite verwandte Art oder Raſſe, proviſoriſch Papio nigrescens benannt, differirt von der vorhergehenden durch ein mehr zuſammengedrücktes Geſicht, durch einen ſehr wenig merklichen Schwanz und durch Geſäßſchwielen, die in zwei Stücke oder Maſſen ausgedehnt ſind, während beim Papio niger dieſe Parthien in vier Abtheilungen getheilt ſind. Der Pelz des P. nigrescens iſt bräunlich-ſchwarz, wobei erſtere Farbe auf dem Nacken und Rücken vorwaltet." — Unſere Sammlung beſitzt ein Weibchen von dieſer Art, das alle die genannten Merkmale an ſich trägt. Seine Farbe iſt ſchwarzbraun, am lichteſten auf dem Nacken und Schultern, abwärts an den Gliedmaſſen ins völlig Dunkle übergehend, der lange Schopf des Kopfes iſt kohlſchwarz. Der Vorderhals, die Bruſt und der Bauch längs ſeiner Mitte ſind faſt völlig nackt. Die Länge beträgt 1' 10½". Der rudimentäre Schwanz iſt kaum merklich. Der Schädel iſt wie der des C. niger ein ächter Paviansſchädel im Kleinen; die Naſenbeine ſind übrigens nicht, wie es Is. Geoffroy von dieſem angiebt, flach, ſondern gewölbt.

2. Subgen. Theropithecus Is. Geoffr.; statura robusta, nares haud terminales, cauda longiuscula apice penicillata. — Mittelform zwiſchen den Makaken mit mittellangem Schwanze und den eigentlichen Pavianen; in Indien und Abyſſinien einheimiſch.

3. C. Silenus Linn., der ſchwarze Bartaffe; niger, barba magna cinnescente faciem cingente.

Inuus (Macacus) Silenus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 141 tab. XI, XI*. — Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 1272. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 30.

Schädelform und Schwanzquaſte entfernen dieſen Affen von den Makaken, zu denen er gewöhnlich gezählt wird und reihen ihn unter die Paviane. Er findet ſich weder auf Ceylon, noch den anderen indiſchen Inſeln, dagegen häufig in Travancore und Cochin auf dem Feſtlande; ganz erwachſen wird er bis 2′ lang.

4. C. Gelada, Ruepp., der Gelada; fuscescens, genis comosis, occipite, cervice dorsoque longe jubatis; facie natibusque nigricantibus, naso concavo.

Cynocephalus Gelada. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 151. — Theropithecus Gelada. Is. Geoffr. archiv. d. mus. II. p. 576; catal. des Primat. pag. 32.

In Abyſſinien.

3. Subgen. Cynocephalus; statura robusta, nares terminales. — Die ächten Paviane, Afrika angehörig.

†) cauda longiuscula apice penicillata.

5. C. Hamadryas Linn., der graue Pavian; griseus, genis comosis, capite stethiaeoque longe jubatis, facie carnea; ♀ et catuli ollvaceobrunnea, neque comosa, neque jubata.

Cynocephalus Hamadryas. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 153. tab. X, X*. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 33.

Häufig in ganz Abyſſinien von der Küſte an bis zu einer Höhe von 8000′, auch in Sennaar, Kordofan und Darfur, ferner in Arabien in den Gebirgen der Wechabiten bei Gumfude.

* C. Toth Ogilb. [ann. of nat. hist. XII. p. 446; Fraser zoolog. typic. tab. 5] wird von Ogilby charakteriſirt als altes robuſtes Männchen, Geſicht ſchmutzig, fahl, fleiſchfarben, Rücken dunkel olivengrün, Unter- und Innenſeite gelblich grün, Bruſt, Kehle und Unterſeite des Kinns ſilbergrau, Geſäßſchwielen fleiſchfarben, die angrenzenden Hüftentheile dunkel purpur- oder violett-braun, Scrotum braun. Vordertheil länger behaart als der hintere. Nach dieſer Beſchreibung und noch mehr

nach der Abbildung von Fraſer, die beide vom nämlichen Exemplare herrühren, möchte ich dieſen C. Toth für ein zwar ziemlich erwachſenes, aber noch nicht ausgefärbtes und noch nicht zur vollen Mähne gelangtes Individuum des C. Hamadryas anſehen, um ſo mehr, als dieſe Umänderung in der Gefangenſchaft nicht zu erfolgen ſcheint.

6. C. Babuin Desm., der Babuin; olivaceo-flavidus, pilis late annulatis; genarum pilis striatis retroversis cinereis, facie nigricante.

Cynocephalus Babuin. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 156. — Is. Geoffr. archiv. du mus. II. p. 579 tab. 6; catal. des Primat. p. 34. — Peters Reiſe nach Moſſamb. I. S. 4.

β) saturate viridis.

C. Anubis. Fr. Cuv. l. c. — Schreb. tab. VI. C C. — Rüppell Verzeichn. I. S. 7.

Der Babuin iſt von Rüppell häufig in Abyſſinien, Sennaar und Dongola in einer Höhe von 2—5000′ über dem Meere, und neuerdings auch von Peters in Moſſambique gefunden worden. Er erreicht die Größe des vorigen. Die franzöſiſchen Abbildungen ſind von noch nicht vollſtändig erwachſenen Individuen entnommen. Mit dem folgenden ſehr nahe verwandt, von dem ihn Is. Geoffroy nicht blos durch den mehr olivengelben Farbenton, ſondern hauptſächlich durch den Umſtand unterſcheidet, daß die gelb und ſchwarzen Ringe, womit die Haare gefärbt ſind, ſehr ausgedehnt und daher nicht zahlreich vorkommen, während bei C. Sphinx die Ringe ſchmal und daher zahlreich ſind. Daraus folgt, daß der Babuin faſt einförmig olivengelb ausſieht, wenig verſchieden vom I. ecaudatus, während C. Sphinx faſt wie der C. Hamadryas geſtreift iſt. Noch bemerkt Is. Geoffroy, daß Fr. Cuvier in ſeiner Beſchreibung das Geſicht unrichtig als fleiſchfarben bezeichnet habe; es ſey vielmehr ganz ſchwarz. — Den C. Anubis, den Fr. Cuvier als dunkelgrün charakteriſirt mit ſchwarzem Geſichte, fleiſchfarbigen Augenkreiſen und Wangen, und violetten Geſäßſchwielen, wußte Is. Geoffroy ſo wenig als ich früher recht unterzubringen. Jetzt, wo ich weiß, daß der eigentliche Babuin auch ein dunkles Geſicht hat, bin ich der Meinung Rüppell's, daß beide einer und derſelben Art angehören. An einem vor Kurzem acquirirten Exemplare des C. Anubis erſehe ich auch, daß die

Haare meist nur einen, seltner 2 lichte Ringe haben, also im Hauptmerkmal mit dem lichter gefärbten Babuin übereinkommen [1]).

7. C. Sphinx Linn., der braune Pavian; olivaceo-fuscus, pilis anguste annulatis, genarum pilis retroversis, facie nigra.

Cynocephalus Sphinx. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 160, 157 Anmerk. — Fraser, ann. of nat. hist. IX. p. 262. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 34.

Weder von E. Verreaux und A. Smith im südlichen, noch von Peters im südöstlichen, noch von Rüppell und Ehrenberg im nordöstlichen Afrika gefunden, dagegen häufig am Senegal, und von Fraser auch als Bewohner der Nachbarschaft von Sierra Leone bezeichnet. Vom C. Babuin ist diese Art durch die mehr rothfalbe Färbung der Haare, so wie durch deren kleinere und daher zahlreichere Ringelung, die dem Pelz ein gesprenkeltes Ansehen giebt, zu unterscheiden. Hieher gehört auch das von mir in Schreb. Supplem. S. 157 in der 5ten Anmerkung beschriebene alte Männchen, wo ich durch die falsche Angabe von hellerer Gesichtsfärbung abgehalten wurde, es unbedenklich dem C. Sphinx einzureihen. Seitdem hatte ich Gelegenheit 2 lebende Individuen, Männchen und Weibchen, ganz von der Färbung jenes ersten zu sehen, aber mit rußschwarzem Gesichte, das Gesäß jedoch ebenfalls brennend roth. In den wandernden Menagerien werden diese Paviane nicht selten gesehen.

C. Choras. Ogilby hat [ann. of nat. hist. XII. p. 446] nach einem von der Niger-Expedition mitgebrachten halbwüchsigen Männchen einen C. Choras aufgestellt mit folgenden Merkmalen: Haare lang, flatternd, dunkel rostbraun, jedes Haar rostbraun und schwarz geringelt; Gesicht, Augenkreis, Finger, Gesäß und Hodensack dunkelbraun, nur die obern Augenlieder fleischfarbig. — Trotz des dunkeln Gesäßes könnte die-

[1]) Is. Geoffroy hat im Catal. des Primat. p. 34 und archiv. d. mus. V. p. 543 einen C. olivaceus aus dem Golf von Benin aufgestellt, den er durch seine olivengrüne und daher viel dunklere Färbung von C. Sphinx unterscheidet. Haare an der Basis grau, in der obern Hälfte mit langen schwarzen und gelben Ringen. Durch diese Merkmale nähert er sich dem C. Babuin, ist aber von ihm dadurch sehr verschieden, daß die Unterseite [statt weiß] wie die obere gefärbt ist. Is. Geoffroy hält ihn zum C. Anubis, den er übrigens nicht aus Autopsie kennt, gehörig; ich bin derselben Meinung.

ſer Affe doch nur dem jüngeren Zuſtande des C. Sphinx angehören, wofür auch ſeine Heimath ſpricht. Leider fehlt es bei den meiſten Pavians-Arten an Beobachtungen in ihren heimathlichen Wohnbezirken, ſo daß wir nicht bei allen über die Veränderungen, die ſich bei ihnen in Folge der Entwicklung ergeben, gehörig unterrichtet ſind.

8. **C. ursinus Penn., der Bären-Pavian; nigrescens, facie violaceo-nigra.**

Cynocephalus ursinus s. porcarius. Wagn. Schreb. Supplement I. S. 162. tab. VIII. B. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 35.

Südafrika.

††) cauda brevissima.

9. **C. Mormon Linn., der Mandrill; plicis ad latera nasi coeruleis, naso adultorum rubro.**

Cynocephalus Mormon. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 164. tab. LII, LIII. — Erbl, Tafeln z. vergl. Anatom. tab. 5. fig. 6. [Schädel]. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 35.

Guinea.

10. **C. leucophaeus Fr. Cuv., der Drill; facie unicolore nigra.**

Cynocephalus leucophaeus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 166. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 35.

Guinea. Das Geſicht iſt in allen Altersperioden ſchwarz, was ihn gleich von C. Mormon unterſcheidet.

II. Familie.

Simiae platyrrhinae. Amerikaniſche Affen.

Septum narium latum, meatus auditorius osseus brevissimus, margine circulari limbato circumdatus.

In meiner früheren Bearbeitung dieſer Familie bin ich theils durch den von Rengger gelieferten Nachweis von dem großen Kreiſe von Abänderungen, den manche exakt beobachtete Arten amerikaniſcher Affen darbieten, theils durch Mangel einer genauen Bekanntſchaft mit ihren geographiſchen Verbreitungsverhältniſſen verleitet worden, die Arten über Ge-

bühr zusammen zu ziehen. Durch die reichen, mit der größten Umsicht angelegten Sammlungen Natterer's, die ich seitdem vergleichen konnte, durch seine mündlichen Mittheilungen, wie durch die Ueberlassung der von ihm aufgezeichneten handschriftlichen Notizen bin ich in den Stand gesetzt worden, wenigstens die brasilianischen Affen, die doch die Mehrzahl aller amerikanischen ausmachen, mit größerer Sicherheit als früherhin zu bestimmen [1]). Von größter Wichtigkeit war es mir dabei zur Ueberzeugung zu kommen, daß diese Affen nicht, wie man sonst meinte, ohne Unterschied allenthalben in Brasilien durcheinander gemengt sind, sondern daß oft ganz nah verwandte Formen durch ihre Wohnbezirke weit voneinander getrennt werden und daher wenigstens ein provisorisches Recht auf Art-Selbstständigkeit ansprechen können. In dieser Ueberzeugung bin ich bestärkt worden durch die werthvollen Beobachtungen, die v. Tschudi über die peruanischen Affen in seiner ausgezeichneten Fauna peruana zur Vorlage brachte. Außerdem sind viele neue Arten, besonders durch Is. Geoffroy aufgestellt worden und in dieser Beziehung hat sich namentlich die Reise von Castelnau fruchtbar erwiesen. Somit kann ich mich bei dieser Familie noch weniger als bei der ersten mit der einfachen Zufügung der neu entdeckten Arten begnügen, sondern weit wichtiger ist die Vornahme einer kritischen Revision der von mir früher als zulässig erklärten älteren Arten, um deren Verwirrung soweit als möglich wieder in Ordnung zu bringen.

a) **Gymnuraе Spix; cauda prehensili, parte apicali subtus nuda, vertebris caudalibus ultimis valde latis.**

VIII. MYCETES. Brüllaffe.

Corpus crassum, caput pyramidale et barbatum, os hyoideum apparens, tumidum, cavernosum.

Gray hat vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, die Brüllaffen nach der Richtung der Stirnhaare in zwei Abtheilungen zu bringen:

---

1) Vergl. meine Beiträge zur Kenntniß der Säugthiere Amerikas: 4te Ordnung, Affen, in den Abh. der II. Klasse der k. Akademie der Wissensch. in München. V. 2. S. 407 u. f.

1) Stirne hoch, mit rückwärts gelegten, einen Kamm über die Mitte des Kopfs bildenden Haaren; 2) Stirne mit vorwärts gerichteten Haaren, Scheitel glatt mit ausstrahlenden Haaren. Ich habe jedoch gezeigt [1]), daß bei Arten, die Gray unter seine beiden Gruppen vertheilt, eine ganz gleichförmige Kopfbehaarung gefunden wird, also nach diesem Merkmale keine specifischen Sonderungen vorgenommen werden dürfen.

1. **M. fuscus** Geoffr., der braune Brüllaffe; fuscus, pilis annulatis apice flavescentibus.

Mycetes (Stentor) fuscus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 180. tab. XXV. E.; Abh. d. bayr. Akademie V. S. 409.

Ich hatte früherhin auf die Autorität des Prinzen von Neuwied den M. fuscus mit dem M. ursinus vereinigt. Indeß hatte dieser ausgezeichnete Naturforscher schon selbst bemerklich gemacht, daß er ersteren nur in den südlichen Gegenden der Ostküste Brasiliens angetroffen habe, während er in den nördlicheren Gegenden durch letzteren ersetzt werde. Diese Beobachtung ist von Natterer bestätigt worden, der seine meisten Exemplare von M. fuscus um Rio Janeiro und in der Provinz San Paulo zusammenbrachte; auch die Exemplare von Spix stammen aus letztgenannter Provinz. Die Verschiedenheit des Wohnbezirks der braunen und rothen Brüllaffen ist an und für sich schon ein wichtiger Grund, dieselben für zwei selbstständige Arten anzusehen. Dazu kommt nun noch die Verschiedenheit in der Färbung und zwar ohne Uebergang der einen in die andere: bei M. fuscus ist die Hauptfarbe braun mit gelber Ringelung, bei M. ursinus dagegen einfarbig rostroth und zwar sind bei letzterem, nach Natterers Beobachtungen, schon die ganz jungen Thiere rostroth. Das Braun des M. fuscus ist bald heller, bald dunkler, letzteres bis zum dunkel Schwarzbraun.

2. **M. ursinus** Geoffr., der rothe Brüllaffe; splendide rufus, pilis haud annulatis.

Mycetes ursinus. Wagn. Abh. d. bayr. Akadem. V S. 410.

α) vellere unicolore rufo.

Mycetes (Stentor) ursinus. Pr. v. Neuw. Beiträge II S. 48 mit Ab-

1) Wiegm. Archiv f. Naturgesch. 1846. 2. S. 137.

bild. — Humboldt recueil I. p. 331 tab. 30. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 179. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 52..

β) rufus, dorso aureo-flavo.

Mycetes (Stentor) seniculus Linn. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 179. (theilw.) tab. XXV. C. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 52. — (Alouate) Audeb. sing. V. 1. p. 7. tab. 7. — M. laniger. Gray ann. of nat. hist. XVI. p. 219. — M. auratus. Gray ebenda p. 220.

γ) saturate badius, dorso caudaeque dimidio apicali dilute fulvis.

Stentor chrysurus. Is. Geoffr. Guér. magas. 1832. n. 7; catal. des Primat. p. 52.

Nordwärts vom Wohnbezirk des M. fuscus bis nach Venezuela und Darien verbreitet. Ob M. ursinus und M. seniculus specifisch zu sondern sind, kann erst nach genaueren Untersuchungen in ihrer Heimath zur Gewißheit gebracht werden. Geoffroy's St. chrysurus scheint mir nur Varietät des M. seniculus zu seyn, da auch bei letzterem nicht selten die hintere Schwanzhälfte entschieden ins Gelbe fällt. Gray's M. laniger und auratus, von denen der erstere durch den Besitz von Unterwolle, der letztere durch andere Anordnung der Kopfhaare sich von M. seniculus unterscheiden soll, beruhen auf Merkmalen, die zur specifischen Scheidung nicht ausreichen.

3. M. Caraya Humb., der Caraya; facie nigricante, vellere ♂ atro, manibus concoloribus; vellere ♀ juniorumque cineraceo-flavicante.

Mycetes Caraya. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 182. tab. XXV. D; Abh. d. bayr. Akadem. V. S. 411. — Mycetes (Stentor) niger. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 66 mit Abbild. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 53. — M. barbatus. Spix sim. bras. tab. 32, 33. — Gray ann. of nat. hist. XVI. p. 220. — M. seniculus niger. Spix Denkschr. d. bayr. Akadem. 1813. S. 332. tab. 18.

β) vellere longiore molliore.

M. villosus. Gray a. a. O. S. 220.

Der Caraya ist auf der Ostseite der Kordilleren vom 28° bis zum 10° verbreitet. Die alten Männchen sind einfarbig schwarz, auch an den Händen und dem Schwanzende; die Weibchen und Jungen ohne Ausnahme graulichgelb. Die nackte Haut des Gesichtes und Schwanzes, so wie der Ohren und Sohlen ist ebenfalls schwarz; die Haut am Unterleibe dunkelbräunlich.

4. M. rufimanus Kuhl., der rothhändige Brüllaffe; in utroque sexu ater, manibus caudaeque apice rufis.

Mycetes rufimanus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 183; Abh. d. bayr. Akadem. V. S. 412. — Tschudi Faun. peruan. I. S. 37. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 53. — M. discolor. Spix sim. bras. tab. 34. — Simia Beelzebul Linn. Schreb. I. S. 112. tab. XXV. B. — Gray ann. of nat. hist. XVI. p. 220.

Diese Art, die früher mit Verlässigkeit nur nach dem einzigen Exemplare von Kuhl charakterisirt war, hatte ich so lange für nichts anderes als eine Farbenabänderung von M. Caraya gehalten, bis mich Natterer vom Gegentheil überzeugte, indem er mir seine Beobachtung mittheilte, daß bei M. rufimanus die Weibchen und Junge gleich den Männchen kohlschwarz sind. Dieselbe Erfahrung hat auch v. Tschudi in Peru gemacht. Die gleichartige schwarze Färbung beider Geschlechter in allen Altern, die rostrothe Behaarung der Hände und der Oberseite des Schwanzendes, sowie die Verschiedenheit in der geographischen Verbreitung unterscheiden den M. rufimanus in specifischer Weise von M. Caraya.

Von dieser Art erlangte Natterer drei Exemplare bei Borba (unweit der Einmündung des Madeira in den Amazonenstrom) und zwei andere am Rio Muria (nördlich von Para), über die ich hier einige Bemerkungen beizufügen habe.

Die drei Exemplare von Borba bestehen aus einem alten Männchen, einem alten Weibchen und einem jungen Männchen. Das alte Männchen ist auf der Aussenseite glänzend schwarz, auf dem Kreuz werden jedoch bereits die Haarwurzeln rostroth, was ebenfalls von den Hinterbeinen, zumal von ihrer Innenseite, gilt, doch verdecken die schwarzen Haarspitzen zum größten Theil das Roth, so daß dieses nur hie und da durchschimmert. Die Finger der Vorderhände und der größere Theil der Oberseite des Mittelfußes ist rostroth, die Mittelhand jedoch schwarz behaart. Der Schwanz ist schwarz mit langer rostrother Spitze, auch an der Unterseite der Schwanzwurzel herrscht das Rostrothe vor. Ein kleiner Haarwirbel findet sich auf dem Nacken; ein sehr deutlicher am Anfang der Aussenseite des Oberschenkels. Die gerade Höhe vom Scheitel bis zum After beträgt 1′ 9½″, die Länge des Schwanzes fast 2′. — Das alte Weibchen ist ganz einfarbig schwarz, ohne alle Beimischung von

Roſtroth. Wenn es in letzterer Beziehung vom Männchen abweicht, ſo kann es doch wegen des Geſchlechtsunterſchiedes nicht mit dem alten Caraya-Männchen verwechſelt werden. Seine Höhe beträgt 1′ 4″, die Schwanzlänge 1′ 9¼″. Das junge Männchen iſt gleich dem vorigen Weibchen ganz ſchwarz; auch die Hände und der Schwanz ſind wie bei dieſem einfarbig ſchwarz. Dieſes Individuum könnte nun allerdings leicht mit dem Caraya-Männchen verwechſelt werden, wenn nicht ſein Gebiß anzeigte, daß es noch nicht zu dem Alter gelangt iſt, in welchem der männliche Caraya den einfarbigen ſchwarzen Pelz erhält, was nach Rengger erſt im vierten oder fünften Jahr erfolgt.

Die beiden Exemplare vom Rio Muria erlegte Natterer aus einer kleinen Geſellſchaft. Es iſt ein altes Weibchen, das noch ſein Junges (männlichen Geſchlechts) auf dem Rücken herumtrug. Beide ſind ſchwarz, die Hände und Schwanzſpitze aber fuchsroth. Das Weibchen hatte im Ganzen eine Länge von 3′ 5¼″ rheinl., wovon der Schwanz 1′ 8¾″ wegnahm. Geſicht, Ohren, Haut am Unterleib, an den Handſohlen und am nackten Theil des Schwanzes waren bei ihm ſchwarzbraun, dagegen ein großer Fleck am Kropfe, dann einer in der Achſelhöhle, die Zitzen einſchließend, ſo wie die After- und Schwanzgegend fleiſchfarbig mit Ockerfarbig überlaufen.

Der rothhändige Brüllaffe tritt erſt an der Nordgränze des Wohnbezirkes vom Caraya auf, wofür Tſchudi den 7° ſ. Breite bezeichnet, breitet ſich aber da vom Oſtfuſſe der Kordilleren bis zum atlantiſchen Ocean aus, indem ihn Tſchudi in Peru, Natterer bei Borba und bei Para, Spix (ſeinen M. discolor) bei dem Fort Curupa an der Mündung des Amazonen-Stromes getroffen hat. Nordwärts ſcheint er ebenfalls eine weite Verbreitung zu haben.

5. M. flavicaudatus Humb., der gelbſchwänzige Brüllaffe; nigro-fuscus; cauda ex medio ad apicem striis 2 flavidis signata.

Mycetes flavicaudatus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 183. — Tschudi Faun. peruan. I. S. 38.

Ich hatte früher vermuthet, daß dieſer Affe nur einer der mit dem Alter vor ſich gehenden Farbenübergänge des Caraya ſeyn möchte; nach den Mittheilungen aber, die v. Tſchudi (zum Theil nach den Manuſcrip-

ten v. Humboldt's) sowohl über seinen Wohnbezirk als über die Beständigkeit seiner Färbung publicirt hat, bin ich jetzt geneigt in ihm eine eigenthümliche Art anzuerkennen, die indeß in keinem europäischen Museum repräsentirt zu seyn scheint. Nach v. Tschudi's Beschreibung ist der Rücken dunkelbraun, der Kopf braunschwarz, der Bauch etwas heller als der Rücken und die Gliedmassen schwärzlich; längs der hintern zwei Drittel des Schwanzes verläuft jederseits ein schwach gelber Strich. Die Färbung scheint sehr wenigen Abänderungen unterworfen zu seyn; nur die beiden Schwanzstreifen sind bald heller, bald dunkler. Humboldt fand diese Art in großen Schaaren in den Provinzen Jaen und Maynas und am oberen Amazonenstrom; mit ihren Fellen, die zu Satteldecken benützt werden, wird ein bedeutender Handel betrieben.

6. **M. palliatus** Gray, der gelbseitige Brüllaffe; **fusco-niger, pilis dorsi flavido-brunneis apice nigris, pilis laterum elongatis brunneo-luteis.**

Mycetes palliatus. Gray proceed. with. illustr. 1848 p. 138 tab. 6; ann. of. nat. hist. sec. ser. IV. p. 376.

Nach Exemplaren aus Caraccas hat Gray eine neue Art aufgestellt, aber nur einige, keineswegs ausreichende Notizen über sie mitgetheilt. Die langen bräunlich-gelben Haare an den Leibesseiten bilden eine Art Mantel. Die Stirnhaare sind kurz, rückwärts gewendet und bilden einen schwachen Kamm über dem Scheitel; am Hintertheil der Wangen sind die Haare verlängert und veranlassen einen schwachen Bart, der bei den Männchen deutlicher ist. Der untere Theil der Haare an den Schultern ist bisweilen gelblich. Nach der Abbildung ist das Gesicht bläulichschwarz und der Schwanz gleich den ganzen Gliedmassen schwarz.

7. **M. stramineus** Geoffr., der Coro; **in utroque sexu stramineus, facie incarnata.**

Mycetes (Stentor) stramineus. Spix sim. bras. p. 45. tab. 31. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 183 tab. XXV. D.; Abhandl. der bayr. Akadem. V. S. 414. — Tschudi Faun. peruan. I. S. 36. — ? D'Orbign. voy. mamm. p. 9.

Von dieser Art hat Spix ein männliches Exemplar mitgebracht, das ich, obwohl es an Größe und vollständiger Entwicklung des Gebisses mit den größten Männchen des Carayas überkommt und also sicherlich

ein altes Thier ist, dennoch, trotz seiner abweichenden Färbung, nicht von letzterem zu trennen wagte, sondern es nur für ein im Farbenwechsel verspätetes Individuum ansah, weil mir keine verlässige Angabe bekannt war, daß man solche Thiere in ganzen Schaaren beisammen gesehen hätte und die Angaben anderer Schriftsteller sich mir nur auf Weibchen und Junge des Caraya zu beziehen schienen, was allerdings theilweise wirklich der Fall ist. Von meiner früheren Meinung bin ich seit Natterer's erstem Besuche unserer Sammlung abgekommen, indem derselbe mir bemerklich machte, daß unter der großen Menge von Carayas, die er im lebenden Zustande beobachtete, niemals ihm einer vorgekommen wäre, dessen nackte Hauttheile fleischfarbig wie bei unserem M. stramineus gewesen wären. Dieß nun, in Verbindung mit der gesättigten gelben Färbung des letzteren, ferner seine Auffindung durch v. Tschudi in Peru und die genauere Bekanntschaft mit seinem Wohnbezirke, haben mich bestimmt in ihm eine selbstständige Art anzuerkennen.

Aus v. Tschudi's Beschreibung ist Folgendes hier beizufügen. Der Rücken längs der Haare betrachtet ist strohgelb, gegen dieselben mehr braun, seine Haare sind am Grunde dunkelbraun, die Spitzen gelblich. Der Bauch ist spärlich mit bräunlichen Haaren besetzt. Der Schwanz ist dem Körper gleichfarbig, dessen Spitze und die Außenseite der Enden der Gliedmassen dunkelbraun, fast schwärzlich. Das Gesicht ist dunkel graubraun, oft röthlichgrau; Spix bezeichnet es als fleischfarbig.

Der Coro tritt erst an der Nordgrenze des Verbreitungsbezirkes des Caraya auf, ohne sich mit letzterem zu vergesellschaften. Kein Reisender hat ihn in den mittleren oder südlichen Provinzen Brasiliens, wo doch der Caraya so häufig ist, wahrgenommen [1]). Natterer hat ihn überhaupt gar nicht aufgefunden und Spix ist ihm erst in den Waldungen zwischen dem Rio negro und dem Solimoes begegnet. Tschudi hat ihn

1) Schon aus diesem Grunde mag es ein Irrthum seyn, wenn D'Orbigny den ächten M. stramineus in Bolivia gefunden haben will. Die von ihm mitgebrachten Exemplare zählt Is. Geoffroy (catal. des Primat. p. 54) dem Caraya bei. In dieser Beziehung mag Letzterer Recht haben, so wie auch darin, wenn er das Original-Exemplar seines Vaters dahin weist. Wenn Is. Geoffroy dagegen noch im Jahre 1851 den M. stramineus im M. Caraya ganz aufgehen lassen will, so ist dieß nur ein Zeichen, daß er meine und Tschudi's Arbeiten nicht beachtet hat.

in den Waldungen Peru's angetroffen, doch nicht südlicher als bis zum 7° s. Breite. Wie weit er nordwärts geht, ist unbekannt; am Orinoko hat ihn jedoch schon Gumilla beobachtet.

IX. LAGOTHRIX. Wollaffe.

Corpus crassum, caput rotundatum et imberbe.

Die Wollaffen haben eine sehr enge geographische Verbreitung, indem sie auf den nordwestlichen Theil Südamerikas beschränkt sind.

11. **L. olivacea** Spix, der olivengraue Wollaffe; **olivaceo-cana, capite manibusque nigro-fuscis.**

Lagothrix olivacea. Wagn. Abh. der Münchn. Akadem. V. S. 416. — L. cana. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 186 tab. XXVI. F. — L. Humboldti. Tschud. Faun. peruan. I. S. 32. — Is Geoffr. catal. des Primat. p. 50.

Nordwestliches Brasilien, Peru und Ecuador. Der Körper wird an 2' lang und der Schwanz mißt ebensoviel. Tschudi ist der Meinung, daß L. cana Geoff. als Junges zu L. infumata Spix zu zählen sey; dagegen hält es jetzt Is. Geoffroy für zweifelhaft, ob jener von L. Humboldti getrennt werden dürfte; letztere Ansicht möchte wohl die richtige seyn.

2. **L. infumata** Spix, der rauchbraune Wollaffe; **fuscescens, gastraeo manibusque nigricantibus.**

Lagothrix infumata. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 187; Abh. d. Münchn. Akad. V. S. 417. — L. Castelnaui. Is. Geoffr. compt. rend. XXVII (1848) p. 498; catal. des Primat. p. 50; archiv. du mus. V. p. 544.

Is. Geoffroy hat unter den Wollaffen eine dritte Art als L. Castelnaui unterscheiden wollen, von der er folgende Charakteristik gibt: „Pelz braun, graugesprenkelt; Kopf, Hände, Füsse und Oberseite des Schwanzes gegen das Ende schwarz oder schwärzlich; am Bauche lange schwärzliche Haare." Bei Alten ist, wie er weiter sagt, die Oberseite röthlich- oder schokoladebraun und weiß gesprenkelt, indem die Haare am Grunde schwärzlich, dann im größten Theil ihrer Länge röthlich (roux), hernach in ihrem Endtheile schwarz und zuletzt weiß oder silbergrau sind. Oberkopf, die 4 Hände und die Unterseite des Schwanzes in seinem Endtheile sind schwärzlichbraun, was an einigen Stellen ins Schwarze über-

geht. Die Jungen ſchildert Geoffroy als weit mehr einförmig braun, indem theils Kopf und Hände noch nicht ſehr dunkel, theils die Haare des Körpers gegen ihre Spitze viel mehr braun ſind. Dieſe Beſchreibung weiſt die Uebereinſtimmung des L. Castelnaui mit L. infumata nach. Caſtelnau's Exemplare kommen alle aus Peru und Braſilien am oberen Amazonenſtrom; Spix hat die ſeinigen am Fluſſe Içа zuſammen gebracht. Die Unterſchiede, welche Geoffroy zwiſchen ſeinem L. Castelnaui und L. infumata findet, daß nämlich Spix den letzteren weit größer und die Rückenhaare mit ſchwarzer Zuſpitzung angiebt, gelten nicht von unſeren 3 Exemplaren, indem dieſe nicht die Größe der L. olivacea erreichen und ihre Färbung mit der der jüngeren Thiere von L. Castelnaui übereinkommt, wie denn auch ihr Gebiß ausweiſt, daß ſie noch nicht zum höchſten Alter gelangt ſind, daher auch ihr Kopf nur braun gefärbt iſt.

X. ATELES. Klammeraffe.

Artus elongati graciles; pollex manicularum nullus aut brevissimus.

Die Klammeraffen ſind über den ganzen Wohnbezirk der amerikaniſchen Affen verbreitet, ohne jedoch den 25° ſüdwärts zu überſchreiten.

1. Subgen. Ateles; **septum narium latum, vellus rude et longum.**

1. A. pentadactylus Geoffr., der fünffingerige Klammeraffe; **totus ater, facie nigro-fusca, manicuiis pollice brevissimo exunguiculato.**

Ateles pentadactylus. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 197; Abh. der Münchn. Akadem. V. S. 478 tab. XIV. fig. 3 (Handmuskeln). — Tſchud. Faun. peruan. I. S. 28. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 48.

Bewohnt die heißeſten tropiſchen Gegenden ohngefähr zwiſchen 8° ſ. und 8° n. Breite, von Peru an bis hinüber nach Guiana. Er ſtimmt mit dem folgenden in der Größe, Geſtalt und Färbung überein, unterſcheidet ſich aber durch das Vorkommen eines kurzen nagelloſen Daumens an den Vorderhänden und durch die Geſichtsfärbung. Daß mitunter der eine von dieſen Daumen fehlt, während der andere vorhanden iſt, habe ich an einem Falle dargethan. Auch Is. Geoffroy führt ein ähnliches Beiſpiel an. Auf die Belehrungen von Tſchudi hin habe ich die von

mit früher vereinigten 3 Arten: A. pentadactylus, A. Paniscus und A. ater, wieder voneinander geſondert.

2. A. Paniscus Linn., der Coaita; totus niger, facie brunneo-incarnata, maniculis pollice nullo.

Ateles Paniscus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 196; Abh. der Münchn. Akadem. V. S. 418. — Tſchud. Faun. peruan. I. S. 27. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 48.

Nach einem mir durch den Handel in Branntwein zugekommenen Exemplare, dem an der rechten Hand der Daumen wie bei A. Paniscus mangelte, während er an der linken wie bei A. pentadactylus vorhanden war, hatte ich im Schreber'ſchen Werke geſchloſſen, daß beiderlei Affen nur als Nominalarten einer und derſelben Species anzuſehen ſeyen. Dagegen hat neuerdings v. Tſchudi bemerklich gemacht, daß er dieſen Fall nicht für evident halte, indem der Daumen-Mangel an der einen Hand ein pathologiſcher Zuſtand ſeyn könne, auch ſonſt A. Paniscus und A. pentadactylus durch die Färbung des Geſichts und der Jungen, ſo wie durch differente Verbreitungsverhältniſſe von einander geſchieden wären. Obwohl ich nun verſichern kann, daß am gedachten Exemplare der Daumenmangel an der einen Hand nicht Folge einer ſpäteren Beſchädigung, ſondern ein angeborener Mangel iſt, wie dieß die Unterſuchung ſeiner Knochen- und Muskelbeſchaffenheit [1]) ſattſam ausweiſt, ſo will ich doch in Rückſicht auf die anderen Einwendungen vor der Hand zur Annahme mich verſtehen, daß A. pentadactylus eine beſondere Art ausmache, von der erwähntes Exemplar eine Abnormität hinſichtlich der einen Handbildung darſtelle. Ob dagegen der A. ater ebenfalls, wie Tſchudi neuerdings verſichert, als eine von A. Paniscus getrennte Art anzuſehen ſey, iſt mir noch nicht zur vollen Gewißheit geworden.

Dem A. Paniscus fehlt bekanntlich der Daumen an der Vorderhand ganz. An 7 Exemplaren, die noch ihre Handknochen enthielten, fand ich zwar einen ziemlich langen Daumenmittelhandknochen, aber keine Phalanx, höchſtens an deren Stelle ein kleines, meiſt ſeitwärts ſitzendes Ru-

1) Vergl. a. a. O. tab. 14 fig. 3, nebſt der dazu gehörigen Erklärung.

diment. Die Kopfbehaarung ist bei allen schwarz, ohne weiße Gesichtseinfassung.

Die geographische Verbreitung des Coaita ist bisher nicht gehörig bekannt gewesen und gewöhnlich wurde nur Guiana als seine Heimath aufgeführt. Er ist jedoch auch Brasilien zuständig, denn von daher hat ihn schon Spix mitgebracht, ohne daß er indeß die genauere provinzielle Bezeichnung angegeben hätte, da den von ihm in unserer Sammlung davon aufgestellten brasilischen Exemplaren die Notirung des Fundortes abgeht. Dagegen sagt v. Martius (Reise III. p. 1130), daß ihre Heimath der Amazonenstrom und Rio negro ist, und von 3 Exemplaren Natterer's, von denen ich sie aufzeichnete, rührt das eine vom Flusse Sarari in der Provinz Mato grosso, die beiden andern von Rio Madeira etwas oberhalb des Rio Abuna her[1]). Tschudi hat ihn nur am unteren Maranon gefunden. Ebenso ist es nicht zweifelhaft, daß er im französischen und holländischen Guiana sich aufhält, so daß er also die mittlere Region des tropischen Südamerikas einzunehmen scheint, wenn gleich es nur gewisse Localitäten seyn dürften, auf die er sich innerhalb derselben beschränkt.

3. A. ater Fr. Cuv., der schwarzgesichtige Coaita; vellere facieque nigris, maniculis pollice nullo.

Ateles ater. Wagn. Schreb. Suppl. I S. 197 tab. XXVI. A. — Tschud. Faun. peruan. I. S. 25.

Nach Tschudi zwischen dem 2 und 14° s. Br. und 70 bis 75° w. L. verbreitet. Ihm zufolge wechselt die Gesichtsfarbe aus dem tief schwarzen bis zum Kupferfarbigen des A. Paniscus, von dem er ihn durch folgende Merkmale unterscheidet: Augen bei A. ater weiter auseinander stehend, Schnauze mehr abgerundet, Gliedmassen und Schwanz im Ver-

---

1) Daß Natterer wirklich den ächten A. Paniscus, und nicht etwa A. ater vor sich hatte, beweist schon die Angabe der Gesichtsfärbung, wie er sie von einem alten Weibchen aufgezeichnet hat. Die Iris ist, wie er sagt, dunkel umbrabraun, die Gegend um die Augen, Nase und Mund röthlichbraun, wie bei einem dunklen Mulatten, die Nase etwas lebhafter roth. Die übrigen haarlosen Stellen an Händen, Füssen und dem Schwanze schwarz. Von derselben Farbe ist die 3″ lange, einem Penis ähnliche und am Ende mit einem abgestumpften Knopfe versehene Clitoris; doch wird sie gegen die Spitze heller und gelblich fleischfarbig.

hältniß zum Körper viel länger, Körper ſchlanker, Pelz intenſiver ſchwarz, bei A. Paniscus mehr ins Olivengrüne oder tief Schwarzgraue ſpielend; Junge von der Geburt an ganz ſchwarz, bei A. Paniscus ſchmutzig olivengrün. Es ſind dieß für die erwachſenen Individuen ſo ſubtile Unterſchiede, daß ſie an Bälgen nicht mehr wahrgenommen werden können.

4. A. marginatus Geoffr., der weißbärtige Klammeraffe; totus ater, pilis faciem cingentibus albidis, manicuiis pollice nullo.

Ateles marginatus. A. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 198. — Tſchud. Faun. peruan. I. S. 25.

Die einzige Notiz, welche zur Kenntniß dieſer Art hinzugekommen iſt, rührt von Tſchudi her, der in Peru auf eine Truppe von 8 Individuen ſtieß, wovon eines erlegt wurde. Er bemerkt, daß daſſelbe, mit Ausnahme der weißen Einfaſſung des Geſichtes, eben ſo einförmig ſchwarz war als A. ater. Daſſelbe habe ich bei dem im Berliner Muſeum aufgeſtellten Exemplare wahrgenommen. Wahrſcheinlich iſt daher Humboldt's Exemplar, von dem die Bruſt und Innenſeite der Arme und Schenkel als graulichweiß bezeichnet wird, nur ein junges Thier geweſen. Vielleicht gehört auch der A. frontalis Benn. als jüngerer Zuſtand zum A. marginatus.

5. A. Belzebuth Geoffr., der weißbäuchige Klammeraffe; supra ater, subtus albus; manicuiis pollice nullo.

Ateles Belzebuth. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 199 tab. XXVI. B. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 49.

Von Humboldt im ſpaniſchen Guyana aufgefunden, nach Is. Geoffroy auch in Peru, von wo ihn jedoch Tſchudi nicht anführt. Alt iſt dieſer Affe auf der ganzen Ober- und Auſſenſeite einfarbig ſchwarz, auf der Unter- und Innenſeite weiß, mitunter etwas gelblich überlaufen. Die rein ſchwarze Farbe tritt erſt im Alter ein, wenigſtens war das von Fr. Cuvier beſchriebene Weibchen anfänglich nur graulich ſchwarz. Ein junges, wahrſcheinlich weibliches Exemplar unſerer Sammlung iſt zwar bereits auf dem Kopf, Rücken, Oberſeite des Schwanzes, Außenſeite der Oberarme, den Händen und Knieen kohlſchwarz, aber nicht nur die ganze Unterſeite des Leibes und Schwanzes nebſt der Innenſeite der Glied-

massen ist schmutzig graulichgelb, sondern auch die Außenseite der Vorderarme und der Unterschenkel ist von derselben Farbe, doch mengen sich auf diesen Theilen der Gliedmassen bereits viele schwarze Haare ein. Dieses Individuum ist offenbar im Uebergangskleide zur Färbung der Alten.

5.a. A. variegatus Wagn.; der gelbschienige Klammeraffe; supra ater, gastraeo, artuum latere interno, tibiis antibrachiisque extus ferrugineo-ochraceis.

Ateles variegatus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 313; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 420.

Früherhin war ich zweifelhaft, ob ich diesen Affen für eine besondere Art oder nur für eine Varietät des A. Belzebuth anzusehen hätte; ich bin jetzt für letztere Meinung und habe deshalb auch das vorhin erwähnte Junge, das seiner Färbung nach eigentlich zum A. variegatus gehörte, gleich bei A. Belzebuth angeführt. Meine frühere Beschreibung ist nach einem alten Weibchen aus Natterer's Sammlung entworfen und nach seinen Notizen füge ich über dieses Individuum, das aus den nordwestlichen Theilen stammt, noch Folgendes bei.

Das sehr magere Gesicht ist schwarz, kaum der Rand der Nasenlöcher etwas röthlich; die Iris dunkel graubraun, am Außenrand etwas heller grau, die Ohren und Handsohlen schwarz. Die Haare auf dem Kopfe liegen nach vorn und bilden 3 Büschel: einen in der Stirnmitte und einen zu jeder Seite vor den Ohren hinter den Augen. Ein Büschel Haare auf der Stirne ist gelblich; vom Mundwinkel bis an die obere Ohrgegend verläuft ein schmaler weißer Strich, und am Kinne stehen sparsame weiße Haare. Die ganze Länge des Thieres bis zur Schwanzspitze beträgt 4′ 4¾″ rheinl., wovon der Schwanz 2½′ ausmacht. Die Clitoris ist 2″ 7‴ lang.

5.b. A. melanochir Desm.; der semmelrückige Klammeraffe; infra albidus, supra ater, dorso flavido-griseo.

Ateles melanochir. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 49. — A. Geoffroyi. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 200. tab. XXVI. C.

Obwohl Is. Geoffroy auch neuerdings noch die Selbstständigkeit dieser Art anerkennt, so ist sie mir dagegen problematischer als früher

geworden, wenigstens gesteht er selbst zu — und Tschudi hat dieß schon früher hervorgehoben — daß eines von den Individuen, auf welche Desmarest den A. melanochir begründete, dem A. Belzebuth zugetheilt werden müsse. Man kennt diese Affen nur aus einigen Menagerie-Exemplaren, die in der Färbung selbst nicht constant waren; ihre Wohnplätze sind ganz unbekannt. Mir scheinen sie nur in den Kreis der mit dem Alter erfolgenden Farbenübergänge des A. Belzebuth zu gehören.

6. A. hybridus Is. Geoffr., der braune Klammeraffe; canofuscus, infra albidus, macula frontali semilunari alba, maniculis pollice nullo.

Ateles hybridus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 201. — Is. Geoffr. catal. d. Primat. p. 50.

Es ist dies der einzige Klammeraffe aus der ersten Abtheilung, der nicht ganz oder doch wenigstens theilweise schwarz ist; er ist graubraun, die untern und innern Parthien nebst einem Stirnfleck sind weiß. Die pariser Sammlung besitzt davon 5 Exemplare beiderlei Geschlechts, wovon 3 durch Plee aus Columbien mitgebracht wurden. Diese Art scheint wohlbegründet zu seyn.

2. Subgen. Eriodes Is. Geoffr., septum narium angustatum, vellus lanuginosum.

7. A. hypoxanthus Nauw., der Miriki; ochraceus, facie carnea, maniculis pollice brevi.

Ateles hypoxanthus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 202; Abh. der Münchn. Akadem. V. S. 424. — Eriodes tuberifer et hemidactylus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 51.

Der Miriki unterscheidet sich vom Buriquim durch das Vorkommen eines kleinen Daumens an den Vorderhänden, der mit 2 Phalangen versehen ist, ferner durch die fleischröthliche Färbung des Gesichts und anderer nackter Hautstellen, so wie durch seinen nördlicher liegenden Wohnbezirk, der zwar an seiner Südgrenze noch mit dem des Buriquim zusammen zu treffen scheint, dann aber auf der Ostseite Brasiliens in seinem nördlichen Verlaufe bis zum 14° s. Br. sich erstreckt. Im Westen hat ihn Natterer nirgends getroffen.

8. A. arachnoides Geoffr., der Buriquim; ochraceus, facie nigricante, maniculis pollice nullo.

Ateles arachnoides. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 204 tab. XXVI. D.; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 421. — Eriodes arachnoides. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 51.

Geoffroy hatte zuerst dieſe Art aufgeſtellt, ohne daß er ihre Heimath anzugeben wußte. Zwar wurde vermuthungsweiſe auf Braſilien gerathen, da indeß weder der Prinz von Neuwied noch Spix ihn daſelbſt gefunden hatte, auch außer der Pariſer Sammlung keine Exemplare bekannt waren, und alſo keine Verſicherung beſtand, daß der Daumenmangel, durch den ſie allein von dem A. hypoxanthus unterſchieden wurde, ein conſtantes Merkmal bei ganzen Familien dieſer Thiere ſei, ſo hatte ich im Schreber'ſchen Werke die Vermuthung ausgeſprochen, daß ſichere Erfahrungen wohl die Vereinigung der beiden wollhaarigen Arten der Klammeraffen nothwendig machen würden. In dieſer Erwartung habe ich mich jedoch getäuſcht, denn Natterer's Angabe, der den A. arachnoides in großer Menge zu beobachten Gelegenheit hatte, ſo wie meine eigenen Unterſuchungen der von ihm mitgebrachten Exemplare haben mir zur Genüge gezeigt, daß A. arachnoides und A. hypoxanthus zwei verſchiedene Arten ſind, die ſich nicht blos durch die Beſchaffenheit des Vorderdaumens, ſondern auch der Geſichtsfarbe und der Wohnbezirke unterſcheiden. Durch das von Natterer geſammelte reiche Material bin ich demnach jetzt in Stand geſetzt, dieſe Art ſicher feſtzuſtellen und die bisherige mangelhafte Kenntniß von derſelben in befriedigender Weiſe zu vervollſtändigen.

Zuerſt theile ich von einem alten Mtznnchen die Beſchreibung mit, wie ſie Natterer nach dem friſchen Zuſtande entworfen. Die Schnautze iſt ſtark hervorragend, der Oberarm ſehr dünn, faſt dünner als der Vorderarm; die Vorderhand blos mit 4 ſehr langen und unter ſich faſt gleichen Fingern verſehen, deren Unterſeite, ſowie die Handſohle nackt iſt, Die Hinterhände haben einen ſtarken Daumen, der nur bis ans letzte Gelenk behaart iſt und einen abgerundeten Nagel trägt. Der Bauch iſt gewöhnlich ſehr groß, da ſich meiſt ungeheuer viel Nahrung in dem Magen findet, der gleich dem Blinddarm außerordentlich groß iſt. Der

Schwanz ist sehr stark, breit, unten flach und in der Mitte vertieft, dabei dicht behaart, mit Ausnahme des untern 9″ langen Endes, das ganz haarlos ist, und einer Stelle vom After etwa 3″ abwärts, die blos mit sehr kurzen Haaren besetzt ist. — Die Iris ist haselnußbraun, die Sclerotica, von der viel sichtbar ist, ist dunkelbraun. Die nackte Haut des Gesichts und am ganzen Körper, wo sie von Haaren entblößt ist, ist schwarzgrau. Die Aftergegend und die sehr großen, fast kahlen Geschlechtstheile sind von derselben Farbe; nur die Haut des Penis, die nicht zurückgezogen wird, ist mit rostfarbigen Haaren bedeckt.

Die Länge des größten, von Natterer gemessenen Männchens beträgt von der Schnautze über den Scheitel und Rücken bis zur Schwanzspitze 5′ rheinl., wovon der Schwanz, auf der Unterseite gemessen, 2′ 4½″, auf der Oberseite 2′ 9″ ausmacht.

Der Umfang des Leibes hinter dem Vorderarme beträgt		1′	5″
„ „	in der Mitte des Bauches	2	0
„ „	vor den Hinterbeinen	1	4½
„ „	Schwanzes an der Wurzel	0	6½

Das Gewicht machte 27 portug. Pfunde aus.

Zu diesen Angaben von Natterer füge ich noch einige Bemerkungen nach Ansicht der vielen von ihm mitgebrachten Exemplare bei. Der Daumen der Vorderhände fehlt ihnen total; nur bei 2 Stücken derselben hat sich eine Spur davon gezeigt, jedoch hat er sich nicht wie bei A. hypoxanthus als freies Organ losgelöst, sondern er stellt blos ein kleines angeheftetes nagelloses Rudiment dar. Trotz dieses gänzlichen Mangels des Vorderdaumens, oder doch wenigstens seines höchst rudimentären Zustandes, habe ich nicht blos den Mittelhandknochen des Daumens, sondern sogar die erste Phalanx desselben und zwar ziemlich entwickelt gefunden, indem der Mittelhandknochen 7½‴, die erste Phalanx 5‴ mißt; die zweite Phalanx fehlt dagegen allen Exemplaren. An den beiden Individuen, an denen ein scheinbares Daumenrudiment vorkommt, überzeugte ich mich durch Aufweichen der Hand, daß selbiges lediglich durch eine von der ersten Phalanx ausgehende Hautauftreibung hervorgebracht wird.

Die Färbung der von mir verglichenen Exemplare ist meist lichter als die von A. hypoxanthus, doch kommen auch solche ganz vom Tone des letztern vor.

Natterer hat diese Art um Ypanema in der Provinz St. Paulo, also im Süden Brasiliens aufgefunden, wo sie den Namen Mono-Buriquim führt.

9. A. frontatus Gray, der schwarzstirnige Spinnenaffe; fulvido-brunneus, fronte, brachiis manibusque nigris; maniculis pollice nullo.

Eriodes frontatus. Gray ann. of nat. hist. X. p. 256. — Brachyteles frontatus. Gray list of mammal. p. 10; zool. of the voy. of Sulphur 1 mit Fig.

Gray, der mit diesem Affen die Zahl der Arten von Klammeraffen vermehrte, begnügt sich mit folgender Charakteristik desselben. „Kein Vorderdaumen; röthlichbraun, unten gelblichbraun; Stirne, Ellenbogen, Kniee und Oberseite der Arme und der vier Hände schwarz. Junges gleich dem Alten, aber mit langen weißen Haaren an den Wangen und unter den schwarzen Stirnhaaren." — Als Heimath ist Südamerika, ohne nähere Angabe, bezeichnet. Diese angebliche Art erscheint um so problematischer, als Gray, wenn auch nur fragweise, mit ihr den A. melanochir zusammenstellt, der doch einer andern Gruppe von Klammeraffen angehört.

b) Cebidae; cauda undique villosa, volubili, vertebris caudalibus ultimis dilatatis.

XI. CEBUS. Rollaffe.

Caput rotundatum, artus mediocres robusti.

Die Rollaffen sind über den ganzen Wohnbezirk der amerikanischen Affen verbreitet. Die französischen Benennungen: Sai, Cayuasu, Sajou sind Verstümmelungen der guaranischen Namen Cay und Cay-guazu. Die Bestimmung ihrer Arten ist auch jetzt noch nicht mit Sicherheit möglich, da von den wenigsten der im System aufgeführten Rollaffen die Lebensgeschichte, ja selbst nicht einmal der Verbreitungsbezirk bekannt ist, während man nunmehr weiß, daß er für die meisten der letztern sehr beschränkt ist und bei manchen Färbung und Behaarungsweise nach Alter, Geschlecht und Individualität mehr oder minder großen Abänderungen

unterliegt. Die nach Menagerieexemplaren aufgestellten Species haben daher wenig Verläſſigkeit; ſie müſſen erſt durch Beobachtungen in ihren Heimathsſtätten ſicher geſtellt werden. Der nachfolgende Verſuch, die Rollaffen richtiger als bisher zu unterſcheiden und in welchem ich ſtatt der früher von mir ſtatuirten 2 Arten proviſoriſch 12 aufſtelle, ſtützt ſich hauptſächlich auf zwei Geſichtspunkte, nämlich auf Ermittelung der Wohnbezirke der einzelnen Arten und auf die Beobachtungen ihrer Abänderungen, ſoweit ſolche zur Zeit durch verläſſige Reiſende ermittelt ſind. Wo beide Anhaltspunkte abgehen, fehlt der Aufſtellung von Arten die ſichere Bürgſchaft und ich führe ſie an ohne weitere Gewähr. Leider bin ich nicht mehr im Stande geweſen mit Natterer alle von ihm mitgebrachten Exemplare dieſer Gattung zu vergleichen; der Tod übereilte ihn, ehe wir die Ausführung beendigt hatten, und ſomit bleibt manche braſilianiſche Art zweifelhaft, die außerdem durch die Mittheilungen des genannten höchſt umſichtigen und genauen Beobachters ſicher feſtgeſtellt worden wäre [1]).

†) pilis frontalibus adultorum erectis.

1. **C. Azarae** Rengg., der lichthändige Cay; flavido-brunneus, gastraeo manibusque pallidioribus, artubus caudaque extus obscurioribus; pilis frontalibus adultorum fasciculos duos formantibus.

Cebus Azarae. Rengger, Paraguay S. 26. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 210. — Azar. essais II. p. 230. — Cebus griseus (Sajou ♂). Fr. Cuv. mammif. p. 164. tab. 59; fol. I.

In Paraguay, alſo die ſüdlichſte Art. Der Körper iſt 1′ 5″, der Schwanz 1′ 7″ lang. Das Männchen iſt gelblichbraun, was auf der Unterſeite und den Händen ins Bräunlichgelbe übergeht, und an der Außenſeite der Gliedmaſſen und des Schwanzes ins dunkel Gelblichbraune fällt. Die Kopfplatte iſt ſchwarz, ihre Haare über der Stirne ſtehen aufrecht und bilden über jedem Ohre einen ſtarken Büſchel. Geſicht und Hände ſind graulichſchwarz, erſteres mit weißlicher Einfaſſung, durch

1) Is. Geoffroy zählt im Catal. des Primat. folgende 14 Arten von Cebus auf: C apella, C. robustus, C. variegatus (xanthosternos Sp.), C. cirrifer, C. vellerosus, C. frontatus, C. elegans, C. barbatus, C. flavus, C. capucinus, C. castaneus, C. chrysopus, C. hypoleucus.

welche ein ſchwarzer (bisweilen fehlender) Längsſtrich verläuft. Häufig überwiegt die gelbe Färbung über die braune. Die aufrecht ſtehenden Kopfhaare kommen erſt nach dem fünften Jahre zum Vorſchein, vorzüglich bei Männchen, indeß giebt es auch alte Individuen, jedoch meiſt Weibchen, deren Stirnhaare nie ſenkrecht emporſtehen. Bei Jungen iſt die Geſichtsfarbe heller. — Fr. Cuvier's Cebus griseus, auf ein junges Thier begründet, kommt ganz mit den Jungen von C. Azarae überein.

2. C. Fatuellus Linn., der gehörnte Rollaffe; ex nigro in brunneum transiens, artubus, manibus caudaque plus minus nigris; pilis frontalibus adultorum fasciculos duos formantibus. — Tab. 7.

Cebus Fatuellus. Schreb. S. 118. tab. XXVII. B.; Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 209. — Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 761 mit Abbild. — Is. Geoffr. dict. class. XV. p. 150. — Sajou cornu. Buff. suppl. VII. p. 110 tab. 29. — Audeb. sing. V. 2. p. 15. fig. 1. — C. frontatus. Kuhl Beitr. S. 34. — Audeb. sing. V. 2. p. 4. tab. 3. — C. Apella. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 42. — C. lunatus (Sajou cornu ♂). Fr. Cuv. mammif. p. 171. tab. 62; fol. I.

β) robustior, fasciculis frontalibus minoribus.

Cebus robustus. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 82 mit Abbild. — Tſchud. Faun. peruan. I. S. 41.

γ) pilis frontalibus erectis bifasciculatis, barba labri densa flavido-brunnea.

Sajou cornu var. à moustaches. Fr. Cuv. mammif. fol. IV.

δ) nigricans, facie taenia alba, supra frontem bicorniculata cincta.

Cebus cristatus (Sajou à aigrettes). Fr. Cuv. mammif. p. 173. tab. 63; fol. II. — C. cirrifer. Is. Geoffr. ann. XIX. p. 110. — Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 97 mit Abbild.

ε) fronte glabra.

Cebus Apella Auct. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 208. — Sai ♀. Fr. Cuv. mammif. p. 178. tab. 66; fol. I.

Vom ſüdlichen und weſtlichen Braſilien bis Columbien und Guiana verbreitet. Er hat die Größe des vorigen, von dem er ſich durch ſchwarze Färbung der Hände und des Schwanzes, wie überhaupt meiſt durch dunkleres Colorit unterſcheidet. Uebrigens iſt er höchſt veränderlich in ſeiner Färbung, ſowie in der Behaarungsweiſe des Scheitels. Aus dem einförmig Schwarzen, das den ganzen Pelz bedeckt, geht, nach Natterer's

Beobachtungen, die Farbe durch alle Zwischenstufen des Brauns, theils gleichartig, theils stellenweise dunkler schattirt, bis ins einförmig Gelbbräunliche über[1]), doch ist bei den lichteren Abänderungen jedesmal Kopfplatte, die vier Hände und der Schwanz schwarz gefärbt. Die dunkelbraunen Abänderungen finden sich in den Sammlungen gewöhnlich als Cebus (Simia) Apella benannt. Die Stirnbüschel sind bei C. Fatuellus von sehr verschiedener Form und haben Veranlassung zur Aufstellung mehrerer Nominalarten gegeben. Meist sind die gehörnten Exemplare schwarz, doch giebt es auch jüngere schwarze, die ungehörnt sind, und auch unter den braunen und bräunlichgelben finden sich gehörnte. Die schwarzen wurden von Natterer in den südlicheren Theilen Brasiliens, die helleren weiter nördlich beobachtet. Das Gesicht ist dunkel, seine Einfassung zum Theil mit, zum Theil ohne Beigabe weißer Haare.

Bei einer Art, deren Verbreitungsbezirk über den größten Theil des tropischen Südamerikas ausgedehnt zu seyn scheint, ist es nicht zu verwundern, daß sie mannigfache Abänderungen darbietet. So lange diese nach ihrer ganzen Lebensgeschichte nicht genauer als bisher gekannt sind, fehlt jeder sichere Halt zur Sonderung in Arten. Ich habe mich deshalb nicht entschließen können, sie specifisch zu scheiden und bin der Meinung, daß auch die neuerdings von Is. Geoffroy aufgestellten Species: C. elegans und C. vellerosus, sowie der C. barbatus und libidinosus, in den Kreis dieser Abänderungen einzureihen sind[2]).

---

1) Einer solchen hellfarbigen Abänderung ist Natterer häufig im mittleren Brasilien (am Araguahy urd Paraguay bei Villa Maria) begegnet. Die Hauptfarbe des langen Pelzes ist licht bräunlichgelb, fast wie Flachs oder getrocknete Erbsen, also ganz hellgelb; die Hände, die Vorderseite der Vorderarme und Oberschenkel, so wie die Oberseite und das Ende des Schwanzes sind schwarzbraun; die Scheitelplatte ganz schwarz. Die Stirnhaare sind bald gar nicht verlängert, bald in 2 Büschen aufgerichtet. Ein Exemplar von letzterer Form habe ich auf Tab. 7 abbilden lassen.

2) Aus den Abänderungen, die ich zu C. Fatuellus gestellt habe, hat Is. Geoffroy folgende 5 Arten gebildet:

1) C. Apella, mit folgenden Merkmalen im normalen Zustande: Pelz röthlichbraun, auf der Rückenlinie, dem Schwanze, Hintergliedern, Vorderarmen und Händen ins Braunschwarze übergehend; Oberseite des Kopfs und Wangenhaare schwarz oder schwärzlich; Oberarme falbgelb oder graulichgelb, was mit der dunkeln Farbe der Vorderarme contrastirt. Die Meisten haben eine einfache schwarze Scheitelplatte; Andere (C. Fatuellus) auf der Stirne beiderseits einen Haarpinsel.

*C. elegans Is. Geoffr. (compt. rend. XXXI, 1850 p. 875; catal. p. 45; archiv. d. mus. V. p. 548). Von Js. Geoffroy nach Exemplaren aus der brasilischen Provinz Goyaz und vom obern Amazonenstrom folgendermassen charakterisirt: Pelz oben und unten falb, was vom goldfalb bis zu graulichfalb variirt, Gliedmassen und Schwanz dunkler; Bart goldroth; lange Haare auf dem Kopf, die eine Art Toupet bilden, was durch eine Längsrinne in zwei Parthien getheilt ist. Durch letzteres Merkmal nähert er sich sehr dem C. cirrifer, aber bei letzterem ist der Rücken nicht falb, sondern kastanienbraun. Die Größe ist die des C. Apella.

** C. vellerosus Is. Geoffr. (catal. d. Primat. p. 44; archiv. d. mus. V. p. 550). Bewohnt die brasilische Provinz S. Paul und ist, wie Js. Geoffroy sagt, gleich dem vorigen mit C. cirrifer und C. frontatus bisher confundirt worden. „Er hat wie diese auf dem Kopf lange Haare, die eine Art Toupet bilden, was wie bei C. cirrifer zwei-

---

Js. Geoffroy zählt 6 Abänderungen auf: a) Pelz gewöhnlich, aber ohne Pinsel; von Guiana. b) Aehnlich, aber mit Pinsel, ebendaher. c) Farben ähnlich, aber blasser. d) Ohne Pinsel, Arme und Oberseite des Körpers goldigroth; vom obern Amazonenstrom. e) Ohne Pinsel, Färbung mehr einförmig braun, ebendaher. f) Pelz sehr mit Roth überlaufen; ein Individuum mit einem Toupet fast wie bei C. cirrifer.

2) C. robustus Nauw. Ein aus der Reise des Prinzen von Wied herrührendes Exemplar charakterisirt Js. Geoffr. als im Allgemeinen ziemlich lebhaft rostfarbig (roux), Gliedmassen und Schwanz schwärzlich, Arme dem Rücken gleichfarbig; Kopfplatte schwarz, ihre Haare meist von Aussen nach Innen gerichtet und eine Art mittleren Kamm bildend. Ein anderes Exemplar kommt vom Rio Doce.

3) C. cirrifer. Toupet zweitheilig, Pelz kastanienbraun, Brust roth oder goldigroth. Nach 3 Individuen unbekannter Heimath.

4) C. vellerosus; schon oben charakterisirt. Nach 2 Exemplaren aufgestellt; ein drittes ist dunkler und minder wollig, aber die Pinsel ebenfalls sehr ansehnlich.

5) C. frontatus; „verwandt den beiden vorhergehenden, aber oben schwarz und unten schmutzig bräunlichgrau, und ohne weiße Gesichtseinfassung; das Toupet bietet eine verschiedene Anordnung dar." — Von 2 Exemplaren hat das eine Kuhl als Typus seiner Art benützt; die Haare der Stirne und des Scheitels sind bei ihnen aufgerichtet, ohne Theilung in Pinsel. Bei einem dritten, gleichfalls männlichen Exemplare von sehr hohem Alter ist das Toupet merkwürdig, indem es aus sehr gedrängten und sehr langen (35 Millim.) Haaren besteht, ohne Theilung in Pinsel. Von allen diesen Exemplaren ist die Heimath unbekannt.

6) C. elegans; schon oben charakterisirt und fast ganz mit unserer vorhin in der Anmerkung angeführten erbsenfarbigen Abänderung übereinstimmend.

theilig ist; aber er ist im Allgemeinen mit sehr langen braunen, mehr oder minder wolligen Haaren bedeckt, denen einige noch längere und steife weiße Haare eingemengt sind. Die Einfassung des Gesichtes ist weiß. In der Jugend ist kein Toupet vorhanden, was bei den Alten sehr lang wird (35—40 Millim.). Nach dem sonderbar langen, buschigen und wolligen Pelz sollte man diese Art für einer viel kälteren Zone angehörig als seine Verwandten betrachten."

*** C. barbatus Geoffr. Wie Js. Geoffroy im Catal. p. 45 bemerkt, findet sich ein goldgelber Bart wie bei C. elegans, aber der Pelz ist fast einförmig falb, die Stirne weißlich und das Hinterhaupt ist nur etwas dunkler als der Rücken. Bei anderen Exemplaren ist die Farbe mehr graulich, der Bart blasser und minder reichlich; wieder andere neigen sich dem Albinismus zu und eines ist ganz weiß (C. albus Geoffr.) Nur von einem Individuum ist die Heimath bekannt und zwar Guiana. — Es ist zu wenig Auszeichnendes in diesen Merkmalen, als daß sich darauf eine besondere Art ausscheiden ließe.

**** C. libidinosus Spix; vom vorigen hauptsächlich nur durch die braune Färbung des Bartes unterschieden.

††) fronte glabra, statura mediocri.

3. **C. Capucinus Linn., der Kapuzineraffe; fuscus, artubus deorsum pallidioribus; pilis faciem obscuram aut carneam cingentibus, gutture, pectore humerisque flavido-albidis; capillitio glabro nigricante.**

Simia Capucina. Schreb. I. S. 120 tab. 29. — Fr. Cuv. mammif. tab. 60; fol. 1. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 208. — Isis 1844. S. 89. — Tschud. faun. peruan. I. S. 42. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 46.

In Guiana, Venezuela, Neu-Andalusien und Peru. Der Körper mißt 1′ 2″, der Schwanz 1′ 3″. Der Kopf ist klein, das Gesicht dunkel oder fleischfarbig, von einem breiten gelblichweißen Kranze umgeben, und diese lichte Färbung breitet sich auch über den Vorderhals, die Innen- und zum Theil auch die Vorderseite der Arme und über die Brust aus. Die Färbung der Oberseite fällt bald mehr ins dunkel Rostbraune, bald mehr ins Graubraune.

4. **C. olivaceus Schomb., der olivenfarbige Rollaffe; saturate**

olivaceus, pilis faciem nigricantem cingentibus humerisque flavidis; capillitio manibusque nigris. — Tab. 8.

Cebus olivaceus. R. Schomburgk, Reisen in Brittisch-Guiana III. S. 767.

In der Umgebung des Roraima im brittischen Guiana von R. Schomburgk gefunden. Der Körper mißt 16″, der Schwanz 18½″. Die Oberseite des Körpers und der Gliedmassen ist dunkel olivenfarben (die einzelnen Haare nußfarben, gegen die schwarze Spitze blaß goldgelb); Schultern und Arme strohgelb; Gesicht schwärzlich, Stirne, Wangen und Kehle sind nußgelb behaart. Hände und Innenseite der Unterarme und Unterschenkel sind schwarz; der Schwanz ist oben dem Rücken gleichfarbig, unten und an der Spitze schwarz. Ein diesem C. olivaceus höchst ähnlicher Affe, angeblich aus Columbien, steht in hiesiger Sammlung und ist auf Tab. 8 abgebildet. Beide sind dem C. Capucinus sehr nahe verwandt, wenn nicht eine der Abänderungen desselben.

5. C. hypoleucos Geoffr., der weißkehlige Rollaffe; **niger; sincipite, faciei carneae lateribus, gutture, pectore humerisque albis.**

Cebus hypoleucos. Geoffr. ann. XIX. p. 111. — Fr. Cuv. mammif. p. 176 tab. 65; fol. I. (Sai à gorge blanche). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 208, 313. — Gray, Zool. of the voy. of Sulphur. mamm. p. 10. — Audeb. sing. V. 2 fig. 5. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 47.

Nicht in Brasilien gefunden, sondern nur aus Guiana bekannt. Als eigenthümliche Art scharf charakterisirt durch die schwarze Farbe des Pelzes, den kahlen oder nur ganz kurz behaarten Vorderkopf, die weiße Gesichtseinfassung, welche Farbe sich bis auf die Oberarme herabzieht und durch die lichte Fleischfarbe des Gesichts und der Ohren. Humboldt's Simia hypoleuca scheint nicht hieher zu gehören.

6. C. nigrivittatus Natt., der schwarzbindige Rollaffe; **C. sordide flavido-brunneus, humeris limboque faciem cingente albido-lutescentibus aut sordide albidis; crista verticis angusta longitudinali nec non manibus nigricantibus aut ferrugineo-fuscis.**

Cebus nigrivittatus. Wagn. Abh. der Münchn. Akadem. V. S. 420.

Von diesem Affen erhielt Natterer 2 Exemplare, wovon er das eine, ein junges Männchen, eine Zeitlang lebend besaß, bis es einer Krankheit unterlag. Ein drittes Exemplar, unbekannter Herkunft, das nach dem starken Gebiß ein ganz erwachsenes Männchen ist, findet sich außer-

dem noch in der Wiener Sammlung vor. Das Münchner Museum hat keinen ähnlichen Affen aufzuweisen; auch ist mir keine auf ihn bezügliche Abbildung oder Beschreibung bekannt, da sowohl der C. griseus von Fr. Cuvier und Desmarest, als der Sajou gris von Buffon und die Simia hypoleuca von Humboldt entschiedene Differenzen von ihm darbieten.

Die von Natterer zurückgebrachten Exemplare sind sich in der Färbung ziemlich gleich. Die Wangen sind mit kurzen Haaren besetzt, die nach unten länger werden und über den Unterkiefer etwas herabhängen. Auf dem Vorderkopfe nach seiner ganzen Breite sind die Haare sehr kurz und werden rückwärts allmählig etwas länger. Längs der Mitte des Vorderkopfes verläuft von der Stirne an gegen das Hinterhaupt eine Binde aus längeren Haaren; diese ist anfangs schmal, erweitert sich aber schnell, so daß sie in der Mitte des Scheitels 1⅛ Zoll breit ist und spitzt sich dann bald gegen das Hinterhaupt zu. Diese Binde, welche keineswegs die ganze Breite des Scheitels zwischen den Ohren ausfüllt, sondern jederseits einen großen Zwischenraum zwischen ihrem Rande und dem Ohre freiläßt, ist schwarz und unterscheidet sich dadurch sehr von der übrigen Kopffarbe, welche am Vorderkopfe licht gelbbräunlich ist, was allmählig trüber wird, und am Hinterkopfe ins dunkler Rostbraune mit helleren Haarspitzen übergeht. Die nämliche Farbe herrscht längs des Rückgrathes und des Anfangs der Schwanzwurzel; nach den Seiten und dem Unterleibe herab wird sie etwas blasser. Die seitliche Gesichtseinfassung hat anfangs noch den gelbbräunlichen Ton der Stirnbehaarung, der abwärts aber durch Aufnahme von Gelb immer lichter wird. Der Vorderhals, der obere Theil der Brust, die Schultern und die ganzen Vorderarme sind weißlichgelb behaart, wobei die Haare einfarbig sind, während sie auf den Vorderarmen in ihren untern Theilen nußbraun werden und daher die lichte Färbung trüben. Die Hände sind ganz schwarzbraun, welche Färbung auch auf der Innenseite der Vorderarme von da an herrschend ist, oberwärts zu aber durch die gelblichen Haarspitzen aufgeklärt wird. Die Außenseite der hintern Gliedmassen ist trüb rostbräunlich, durch viele gelbe Haarspitzen lichter gemacht; auf der Innen- und Vorderseite herrscht das glänzend Fahlgelbe vor. Auf der Fußwurzel der Hinterhände

trübt sich wieder die Färbung und diese sind mit fuchsig schwarzbraunen Haaren besetzt. Der Schwanz ist rußig rostbräunlich und gelb melirt, auf der schmalen Unterseite eher etwas dunkler. Der Körper des jungen Männchens hat eine Höhe (vom Scheitel zum After) von 11½", der Schwanz mißt fast 16".

Das erwachsene Männchen, dessen gedacht wurde, kommt in der Färbung ziemlich mit den beiden andern überein. Es hat gleiche kurze Kopfbehaarung, die nur längs des Scheitels in einem dunkel rostbraunen Kamme hervorsteht. Die Außenseite ist schmutzig rostbraun, was auf dem Schwanz am trübsten ist, eben so an den vier Händen. Die Behaarung der Stirne und um das ganze Gesicht, sowie am Vorderhalse und auf den Oberarmen ist schmutzig weißlich. Das Gesicht scheint fleischfarben gewesen zu seyn. Die Nägel sind braun. Die Höhe dieses Individuums ist 14½", der Schwanz mißt 17".

Natterer hat seine Exemplare am oberen Rio branco erhalten.

Vom Caiarara unterscheidet sich diese Art durch ihre trübe Färbung anstatt der rostfalben, durch ihre weißlichen Vorderarme und die schmale Längsbinde längs des Vorderkopfes, welche das Hinterhaupt ganz frei läßt und auch auf dem Mittelkopfe, wo sie am breitesten ist, über die Seitentheile sich nicht ausdehnt.

7. **C. gracilis** Spix., der Caiarara; **fulvido-brunneus, subtus albido-lutescens, vertice et occipite fusco-nigris; facie carnea pilis albidis late cincta, vellere molliori.**

Cebus gracilis. Spix sim. bras. p. 8. tab. 5. — Wagn. Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 426.

Obwohl es mir wahrscheinlich erscheint, daß C. albifrons Humb., C. flavus Geoffr. und C. chrysopus Fr. Cuv. mit dem C. gracilis zusammen gehören dürften, so ist dies doch zur Zeit nicht mit Sicherheit nachweisbar und deshalb sollen auch die zuerst genannten 3 Arten am Schluße dieser Beschreibung besonders aufgeführt werden. Hier ist zunächst ausschließlich von dem Affen die Rede, den Spix als C. gracilis (Caiarara) bezeichnet und in 2 Exemplaren in der Münchner Sammlung aufgestellt hat; der nämliche, den Natterer unter gleichem indianischen

Namen Caiarara in denselben Gegenden erhalten und wovon er 3 Exemplare mitgebracht hat.

Nach den Exemplaren des Münchner Museums hatte ich diesen Affen anfänglich nicht als eigene Art anerkannt, sondern ihn nur für den jugendlichen Zustand des Cay, wie ihn Rengger beschreibt, gehalten. Der gestreckte Leibesbau, der kleine Kopf und die weiche Behaarung mußte mich auf diese Meinung führen, um so mehr, als beiden Exemplaren der knöcherne Schädel fehlt und ich deshalb für Bestimmung ihres Alterstandes keinen sichern Anhaltspunkt hatte. Die Untersuchung der Wiener Exemplare hat mich jedoch überführt, daß darunter wenigstens eines, nach der Abnützung der Schneidezähne zu urtheilen, den Jugendzustand überschritten hat. Hiezu kam noch die mit Spix Angaben gleichlautende Erklärung von Natterer, daß diese Affen in eigenen Gesellschaften sich zusammenhalten, ferner die Erwägung ihrer eigenthümlichen geographischen Verbreitung, wodurch sich mir die Berechtigung des Caiarara, als selbstständige Art zu gelten, klar und unzweifelhaft vor die Augen stellte.

Die 5 Exemplare, welche ich zur Vergleichung vor mir habe (zwei aus der Münchner Sammlung unbekannten Geschlechts, drei aus dem Wiener Museum, Weibchen), stimmen in folgenden Merkmalen mit einander überein. Die Gestalt ist zierlich, Leib und Gliedmassen gestreckt, der Kopf klein und schmal, im auffallenden Gegensatze zu dem des C. macrocephalus, unicolor und anderer großköpfiger Rollaffen. Der Pelz ist ziemlich lang und weich, auf der Unterseite des Leibes und der Innenseite der Beine sehr spärlich. Der ganze Vorderkopf ist nur mit kurzgeschornen rückwärtsgerichteten Haaren besetzt; die Wangen mit anliegenden Haaren bedeckt, die am Unterkiefer länger werden; im Gesicht stehen einzelne Härchen. Die nackte Haut ist fleischfarben, was an alten Exemplaren dunkler als an jungen erscheint; diese Farbe unterscheidet den Caiarara von den meisten andern Rollaffen. Die Färbung des Pelzes ist sehr einförmig: die Oberseite ist trüber oder heller rostbraun, mit mehr oder minder Roth gemischt, die Unterseite fällt ins licht Gelbliche oder Gelblichweiße, die Gliedmassen sind lebhafter rostfalb als der Rücken, was auf den Händen und Oberarmen eine blassere Farbe annimmt. Der

Schwanz ist auf der Oberseite dem Rücken gleichfarbig, auf der Unterseite heller bis ins Lichtgelbliche; überhaupt die Schwanzspitze nicht selten lichter als der übrige Theil. Sehr charakteristisch ist die Färbung der Behaarung des Kopfes. Der ganze Vorderkopf nebst den Wangen und dem Unterkiefer ist gelblichweiß, seltener gelbbräunlich. Der ganze Mittel- und Hinterkopf ist glänzend schwarzbraun, was in einem schmalen Längsstreifen bis zum Stirnrande sich fortsetzt, der mit einzelnen schwarzen Haaren besetzt ist. Nach der Angabe von Spix soll die Kopfplatte beim Weibchen dunkler als beim Männchen seyn; bei den 3 Weibchen des Wiener Museums wenigstens ist sie dunkel schwarzbraun mit fuchsigem Schimmer. Die Nägel sind mehr oder minder lichtbraun.

Einzelne Abweichungen, die ich an den mir zu Gesicht gekommenen Exemplaren beobachtet habe, sind von keiner großen Erheblichkeit. An dem einen Exemplar der Münchner Sammlung, das noch im jugendlichen Stande ist, ist das Roth an den Gliedmassen nur wenig merklich; der Unterrücken längs seiner Mitte und die Oberseite des Schwanzes bis über die Hälfte hinaus ist dagegen rostroth. Schöner rostroth wird diese Färbung an den andern größeren Exemplaren, die hintere Schwanzhälfte wird mehr rostig lichtgelblich und die hintern Gliedmassen nehmen mehr Falb auf.

Ein junges Weibchen aus der Wiener Sammlung ist längs des Rückens rußig rostbraun, was auf dem Unterrücken und der Schwanzwurzel ins trüb Rostrothe übergeht und im weitern Verlauf auf dem Schwanze, dessen Unterseite hell rostgelblich ist, lichter wird. An einem andern Weibchen, wo der Vorderkopf, statt gelblich weiß, bräunlich gelb ist, ist die Färbung des Rückens und Schwanzes noch trüber, doch wird letzterer gegen sein Ende, zumal auf der Unterseite, ebenfalls lichter, die hintern Gliedmassen und die Vorderarme sind ziemlich intensiv, wenn auch etwas trüb, rostroth. Noch schöner rostroth ist diese Färbung bei einem dritten Exemplare; der Schwanz desselben ist in der letzten Hälfte der Unterseite licht gelblich [1]).

---

1) Aus Natterer's Aufzeichnungen füge ich meiner obigen Beschreibung folgende Angaben über ein Weibchen bei. Die Iris ist dunkelbraun; das Gesicht und die nackte Haut des Körpers

An einem alten männlichen Exemplare, das Natterer lebend besaß, aber nicht nach Wien abliefern konnte, waren die Hinterbeine so schön als bei Cebus chrysopus gefärbt, daher er diesen für zu seiner Art gehörig ansah. Das Gesicht war an selbigem bräunlich fleischfarben, mit stark röthlicher Grundfarbe, die Nase mehr bräunlich; das Scrotum schwarz. Seine Totallänge betrug 3′ 2¼″, wovon der Schwanz, vom After an gemessen, 1′ 5″ rheinl. einnahm. Von drei anderen Exemplaren habe ich folgende Dimensionen bestimmt:

	Münchner Exemplare.	Wiener Exemplare.	
Höhe vom After zum Scheitel	13″ 9‴	13″ 6‴	12″ 0‴
Schwanz	17 0 [1])	14 6	13 9
Kopfbreite zwischen den Ohren	2 2	2 3	2 2

Nach Spix leben diese Affen familienweise in den Wäldern am Solimoês, von wo er namentlich einen der südlichen Seitenflüsse desselben, Teffé, anführt, und verbreiten sich gegen Peru zu. Natterer erhielt seine Exemplare ziemlich aus den nämlichen Gegenden, nämlich von Borba und der Barra do Rio negro, so daß der Caiarara also dem nordwestlichen Theile von Brasilien angehört und von da sich weiter in Peru und Columbien verbreiten mag.

Ich reihe hier noch obige als besondere Arten angesehene Affen an, deren specifische Selbstständigkeit wenigstens noch auf keinem sichern Nachweise beruht.

* **C. albifrons** Humb.

Simia albifrons. Humb. rec. I. p. 356. — Cebus albifrons. Tschud. faun. peruan. I. S. 42.

Humboldt hat diesen Affen am Orinoko aufgefunden und Tschudi sah von ihm lebende Individuen, die in den Thälern der peruanischen Provinz Maynas jung eingefangen worden waren. Nach des Letzteren

---

sehr blaß fleischfarbig, letztere ins Bräunliche ziehend, die großen Ohren gelbbräunlich fleischfarben und die Nägel kaum etwas dunkler.

1) An diesem Exemplar ist offenbar der Schwanz beim Ausstopfen zu stark in die Länge gedehnt worden.

Beſchreibung iſt der Scheitel, beſonders aber die Stirne, grauweiß, das Geſicht fleiſchfarben; der Geſichtskreis, ſowie der untere Theil des Körpers, des Schwanzes und die Innenſeite der Extremitäten ſind gelblich braun. — Nach dieſer Beſchreibung wüßte ich nicht, wodurch ſich C. albifrons weſentlich von C. gracilis unterſcheiden ſollte.

** C. flavus Geoffr., unicolor flavidus.

Cebus flavus. Geoffr. ann. XIX. p. 112. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 45. — C. fulvus. Desmar. mammif. p. 83. — D'Orbign. voy. mamm. p. 9. tab. 3. — Simia flavia. Schreb. tab. XXXI. B.

Is. Geoffroy, der dieſe Art als ſolche anerkennt, gab über ſie neuerdings folgende Bemerkung ab. „Eine Art, die nur auf junge und ſchlecht conſervirte Individuen begründet worden und deren Charakteriſtik daher zu berichtigen iſt. Sie hat, wie faſt alle Rollaffen, in ihrem vollkommenen und normalen Zuſtande eine ſchwarze Kopfplatte, die aber bei den jungen normalen Thiere braun, bei den Albinos, die bei dieſer Art beſonders häufig ſind, bräunlich oder ſelbſt nur gelb iſt. In allen Fällen bedeckt die Platte nur den Scheitel und das Hinterhaupt, mit einer kleinen, nach vorn gerichteten Spitze; der Reſt der Stirne iſt weiß. Der Pelz iſt bei den alten und normalen Individuen bräunlichfalb, bei den Jungen und Albinos rein falb oder licht falb.“ — Unter einer Reihe von Individuen bezeichnet Is. Geoffroy 3, welche durch D'Orbigny aus der boliviſchen Provinz Santa-Cruz mitgebracht wurden, darunter ein Albino, der das Original von des Letztgenannten Abbildung iſt. — Mit Natterer halte ich es für wahrſcheinlich, daß dieſer C. flavus oder C. fulvus [1]) nur eine Spielart von C. gracilis ſeyn könnte.

*** C. chrysopus Fr. Cuv., der goldfüßige Rollaffe; artubus belle auratis, capite majusculo.

Cebus chrysopus. Fr. Cuv. mamm. fol. III. — Schreb. Supplem. I. S. 209, 214. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 47.

Wie ſchon erwähnt, ſah Natterer dieſen Affen für nichts weiter als den älteren Zuſtand von C. gracilis an, und in der That unterſchei-

1) Der von Desmareſt gebrauchte Name C. fulvus beruht nur auf einem Druckfehler ſtatt C. flavus.

bei er ſich von den 5 Exemplaren, die ich von letzterem vergleichen konnte, lediglich durch die lebhaftere Färbung und den größern Kopf; Merkmale, die allerdings durch das Alter bedingt ſeyn können, ſo daß alsdann C. gracilis die noch nicht zur vollen Färbung und zur ganzen Stärke gelangten Individuen bezeichnen, C. chrysopus dagegen die vollſtändig erwachſenen und ausgefärbten Thiere der nämlichen Art darſtellen würde. Von 5 Exemplaren, die Is. Geoffroy in ſeinem Katalog aufzählt, weiß er nur von zweien die Heimath, nämlich Columbien, anzugeben. Von einem Menagerie-Exemplare bemerkt er, daß die Farben ähnlich vertheilt, aber ſehr verbleicht ſind, was er dem Einfluſſe der Gefangenſchaft zuſchreibt.

†††) fronte glabra, statura majore, capite permagno.

8. **C. versicolor** Pucн., der ſchwarzhändige Rollaffe; sincipite albo sine linea media nigra, artubus belle castaneo-rufis, manibus nigris.

Cebus versicolor. Pucheran rev. zool. 1845. p. 335; archiv. d. mus. V. p. 551. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 47.

Nach einem aus Columbien ſtammenden Männchen von Pucheran beſchrieben. Der Kopf bis hinter die Ohren, ſowie das Kinn und der Hals ſind weiß; die Gegend zwiſchen den Ohren iſt ſchwärzlich. Der Rücken iſt dunkel blond, was am Kreuz ins Röthliche, an den Seiten ins dunkel Braungraue übergeht; der Unterleib nebſt der Innen- und Außenſeite der Gliedmaſſen iſt lebhaft roth, die Hände ſind ſchwarz, der Schwanz iſt an der Wurzel von der Farbe des Kreuzes, was ins dunkel Braungraue übergeht und im letzten Drittel blond wird. Der Körper mißt 21″ 4‴. Is. Geoffroy erinnert, daß dieſer Affe ſehr nahe dem C. chrysopus verwandt iſt, daß ſich aber letzterer durch viel geringere Größe und die Färbung der Hände, die kaum dunkler als das Uebrige der Gliedmaſſen iſt, unterſcheide.

9. **C. xanthosternus** Neuw., der gelbbrüſtige Rollaffe; nigro et ochraceo aut fulvido-variegatus, mystacibus, manibus caudaque nigris; pectore humerisque flavidis; statura robusta, capite permagno.

Cebus xanthosternus. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 90 mit Abbild. — Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 209. — C. xanthocephalus. Spix sim. bras. p. 6. tab. 3. — C. monachus (Saï à grosse tête). Fr. Cuv. mammif. p. 175.

tab. 64; fol. I. — C. Frederici. Fisch. synops. mamm. add. p. 343. — C. variegatus. Geoffr. ann. XIX. p. 111. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 43.

β) facie capillamento densissimo porrecto circumcincta.

Cebus cucullatus. Spix sim. bras. p. 9. tab. 6. — Wagn. Schreb. a. a. O. S. 209, 213.

An der Oſtküſte Braſiliens zwiſchen dem 14 und 25° ſ. Br. verbreitet. Ein großer robuſter Affe mit auffallend großem Kopfe; der Körper mißt nach der Krümmung an 20″. Der Pelz iſt geſcheckt; am Vorderrücken die ſchwarze, an den Seiten des Hinterrückens die rothgelbe Färbung vorherrſchend; der Vorderhals, die Bruſt und Schultern ſind heller oder geſättigter ockergelb; das Geſicht iſt grauröthlich fleiſchbraun. Einzelne Farbenabänderungen ſind nicht weſentlich und hauptſächlich durch das Alter bedingt. — Es ſcheint dieſer Affe eine ſehr gut unterſchiedene Art auszumachen. — C. cucullatus kommt in der Färbung des Rumpfes und der Gliedmaſſen ganz damit überein, und unterſcheidet ſich nur durch reichlichere Behaarung und insbeſondere die dichte Pelzmütze, welche den ganzen Kopf bedeckt und nur das Geſicht frei läßt; es iſt wohl ein altes Thier im vollen Winterpelz.

10. C. macrocephalus Spix., der großköpfige Rollaffe; fuscus, capillitio, antibrachiis, tibiis, manibus caudaque nigris.

Cebus macrocephalus. Spix sim. bras. p. 3. tab. 3. — Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 208 (theilweiſe), 212.

Im nordweſtlichen Braſilien am Fluſſe Solimoes. Der Körper iſt 1′ 7″, der Schwanz 1′ 5¾″ lang. Wie ſchon Spix richtig bemerkt, die Simia Apella im Großen. Die Zuſammenſtellung mit C. robustus iſt ſowohl wegen der Verſchiedenheit der Kopfbehaarung als der Wohnbezirke unrichtig.

* C. unicolor Spix, der einfarbige Rollaffe; unicolor et sordide flavo-brunneus, vertice et cauda obscurioribus.

Cebus unicolor. Spix sim. bras. p. 7. tab. 4. — Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 208, 212.

Heimath, Größe und Geſtalt wie bei vorigem, von dem er ſich nur durch ſeine einförmige ſchmutzig gelbbräunliche Färbung unterſcheidet, was

auf dem Rücken und Schwanz eine dunklere Schattirung annimmt und am Hinterkopf eine schwarzbraune Platte bildet, von der ein dunkler Längsstreif bis zur Stirne verläuft. Vielleicht nur eine lichtere Abänderung des vorigen.

** C. castaneus Is. Geoffr., der kastanienfarbige Rollaffe; rufo-castaneus, fronte, genis humerisque pallide fulvidis, manibus fuscis.

Cebus castaneus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 46; archiv. d. mus. V. p. 550.

Aus Cayenne. „Verwandt dem Sai (C. capucinus), aber viel größer, Pelz roth kastanienfarbig, auf dem Leib mehr oder weniger gesprenkelt; Hinterglieder, Untertheil der Vorderarme, Schwanz und Rückenlinie dunkler; Schultern, Stirn und Kopfseiten licht röthlichfalb; Kopfmütze am Hinterhaupt röthlich, auf dem Scheitel schwarz, mit einer bis zur Stirn verlängerten schwarzen Linie; Hände braun." Bei einem Weibchen ist der Scheitel röthlichbraun, ohne scharf gezeichnete Kopfmütze. — Scheint auch nur zu den Abänderungen des C. macrocephalus zu gehören, wie denn Geoffroy selbst über die Selbstständigkeit dieser Art im Zweifel ist.

c) Aneturae; cauda laxa undique pilosa; vertebris caudalibus ultimis tenuissimis longissimis.

XII. PITHECIA. Buschaffe.

Caput rotundatum, cauda villosissima, dentes incisivi antrorsum versi, canini validi.

Nur der Nordhälfte des tropischen Amerikas angehörig, indem diese Affen in Brasilien nicht eher als gegen den 15ten Breitengrad auftreten und da blos in der Westhälfte, so daß sie erst gegen den Amazonenstrom hin in der ganzen Breite zwischen den Cordilleren und dem atlantischen Ocean erscheinen.

†) Pithecia; cauda circa longitudine corporis.

1. P. leucocephala Aud., der weißköpfige Buschaffe; villosissima, nigra aut luteo-irrorata, manibus nigris.

Pithecia leucocephala. Wagn. Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 436. tab. 14. Fig. 1 (Schädel). — Saki. Lamm. Isis 1844 S. 91.

α) ♂ adultus: unicolor niger, limbo faciali albido aut ochraceo.

Pithecia leucocephala. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 222. tab. XXXII. — Schomb. Lond. Edinb. phil. mag. X. p. 73. — P. chrysocephala. Is. Geoffr. rev. zool. 1851. p. 23; archiv. d. mus. V. p. 557. tab. 29. — Simia leucocephala. Audeb. sing. VI. 1. p. 9. fig. 2. — Saki. Buff. hist. nat. XV. p. 88. tab. 12; Daubent. p. 90.

β) ♀ et juniores; pilis nigris, apice lutescentibus.

Pithecia rufiventer. Geoffr. ann. XIX. p. 116. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 222. — Simia Pithecia. Audeb. sing. VI. 1. p. 7. fig. 1. — Pithecia rufibarbata. Kuhl Beitr. S. 44. — P. capillamentosa. Spix sim. bras. p. 16. tab. 11. — P. Pogonias. Gray ann. of nat. hist. X. p. 256; zool. of the Sulph. p. 13. tab. 2. — Yarké. Buff. suppl. VII. p. 113. tab. 30, 31.

Keine Art iſt ſo vielfach auseinander geriſſen worden als dieſe, und um ſo mehr erfreut es mich, durch Natterer die Mittel erlangt zu haben, der argen Confuſion ein Ende machen zu können.

Als ich den Text zu Schreber's Supplementen ausarbeitete, war mir von Pithecia leucocephala nur das männliche Geſchlecht, und zwar lediglich nach dem Exemplare der Erlanger Sammlung bekannt. Temminck's Meinung, daß Kuhl's P. ochrocephala blos das Weibchen oder Junge davon ſey, führte ich an, ohne daß ich im Stande geweſen wäre, ſie zu beſtätigen oder zu widerlegen. Die große Menge von Exemplaren, welche ſich Natterer von dieſer Art zu verſchaffen wußte, hat mir jetzt hinlänglich die Mittel geboten, über die Alters- und Geſchlechtsverſchiedenheiten der P. leucocephala die befriedigendſte Auskunft zu geben. Die Anzahl der Arten, welche ich ſchon ſehr zuſammengezogen hatte, wird hiedurch noch mehr vermindert.

Die alten Männchen einerſeits, ſowie die Weibchen und Jungen andererſeits, ſind in der Färbung ſehr verſchieden. Da dieſe Thiere vor Natterer in ihrem freien Zuſtand nicht beobachtet, alſo die Alters- und Geſchlechtsdifferenzen nicht bekannt worden waren und in den Sammlungen ſolche nicht ermittelt werden konnten, ſo ſetzten die Zoologen nach und nach eine ziemliche Anzahl von Arten feſt, die Leſſon ſogar in 2 Untergattungen Pithecia und Yarkea vertheilte.

Den verſchiedenen Alters- und Geſchlechtsſtänden der P. leucoce-

phala sind folgende Merkmale gemein. Die Behaarung ist außerordentlich lang, straff und grob; nur die Unterseite und die Hände sind sehr spärlich behaart; die Ohren kahl. Auf dem Hinterkopf steht ein Haarwirbel, von dem die langen Haare strahlenförmig nach allen Seiten auseinanderfallen. Eine kürzere weißliche oder ockerfarbige Behaarung faßt das Gesicht ein und hängt an den Wangen jederseits als ein Bart herab, der jedoch Kinn und die untere Seite des Unterkiefers ganz frei läßt. Noch kürzere Haare derselben Färbung finden sich an den Gesichtsseiten. Der Schwanz ist außerordentlich buschig, an seinem Ende nicht abgehackt, sondern spitzt sich hier etwas zu. Die 4 Hände sind schwarz behaart, was gleich von P. hirsuta, wo sie gelblich sind, unterscheidet.

Das alte Männchen ist am ganzen Körper einfarbig schwarz, nur an den Vorderarmen behalten die Haare meist kurze gelbliche Spitzen. Der ganze Vorderkopf bis zu den Augenbraunen herab ist dicht mit kurzen lichten Haaren besetzt; diese Binde ist jedoch längs der Mitte getheilt, so daß hier die schwarze Haut der Stirne zum Vorschein kommt. Erwähnte Binde setzt sich an den Wangen weiter herab fort, indem zugleich die Haare länger werden und zieht sich weit in die Gesichtsseiten mit viel kürzeren Haaren hinein; um die Lippen stehen ebenfalls einzelne lichte Haare. Diese ganze Gesichtseinfassung von ziemlicher Breite ist entweder fast ganz weiß bis gelblichweiß, was an den Seiten der Wangen herab und namentlich an dem Fortsatze in das Gesicht hinein immer mehr ins Ockerfarbige fällt, oder der Gesichtskreis ist schön ockergelb, was nach unten und auf dem nach der Nase hinziehenden Haarbesatz ganz rostroth wird. Da der rostfarbige Gesichtskranz nicht blos bei jungen, sondern auch bei vielen alten Männchen vorkommt, so kann man darnach unter letzteren 2 Abänderungen, die eine mit gelblichweißer, die andere mit rostfarbiger Gesichtseinfassung unterscheiden. Die Iris ist haselnußbraun, das Gesicht schwarz mit weißen oder rostfarbigen Haaren besetzt, die Ohren schwarz und fleischfarbig gefleckt, Sohlen, Finger und Nägel schwarz. So wie bisher beschrieben ist die ächte Simia (Pithecia) leucocephala.

Sehr verschieden hievon ist das Weibchen, das in seiner Färbung

der P. hirsuta sehr nahe kommt [1]). Alle Haare desselben auf der Ober- und Außenseite haben mehr oder minder lange gelbe Spitzen, ihr übriger längerer Theil ist braunschwarz. Die spärlich behaarte Unterseite ist licht ockergelb oder rosiröthlich. Der Schwanz ist von der Farbe des Rückens; die vier Hände sind schwarz behaart. Am Kopfe lassen sich, wie dieß schon Spix bei seiner P. capillamentosa bemerklich gemacht hat, dreierlei Haare unterscheiden. Unten am Hinterkopf ist der gewöhnliche Haarwirbel, von dem aus die langen Haare mit ihren gelben Spitzen nach allen Seiten hinfallen und auch den Vorderkopf bedecken, so daß nur die Stirne frei bleibt. Die Stirne ist mit kurzen Haaren besetzt, die beiderseits an den Wangen herabziehen, dabei länger werden und wie ein Backenbart herabhängen. Die Haare dieser Gesichtseinfassung sind nur am Grund schwarz, dann lichtgelb, so daß an ihr die gelbe Färbung, namentlich am unteren Bartende und in das Gesicht hinein, vorherrscht. Diese Stirnbinde ist nicht, wie beim Männchen, längs der Mitte getheilt, obschon sich ihre Haare am Vorderrande in der Mitte etwas auseinander begeben. Außer der eben erwähnten Stirnbehaarung sieht man noch eine kürzere Behaarung, die der vorigen von der Nasenwurzel aus sich entgegenwendet und divergirend von dieser aus kurze, schmutzig gelbliche Augenbraunen über das Auge aussendet. Gesicht, Ohren, Sohlen und Krallen sind dunkelfarbig.

Aehnlich wie die Weibchen sind die Jungen beiderlei Geschlechts gefärbt. Ein besonders lebhaft gefärbtes junges Männchen, etwas mehr als halbwüchsig und eben im Verwechseln seiner Zähne begriffen, das Natterer eine Zeit lang lebend unterhalten hatte, zeigt schmutzig fahlgelbe Haarspitzen auf der Ober- und Außenseite des Körpers, den Gliedmassen und am Schwanze. Die Unterseite des Körpers nebst der Innenseite der Gliedmassen ist schön rosiröthlich. Die Stirneinfassung ist breiter als beim Weibchen und geht bis zu den Augen vor; längs der Mitte sind ihre Haare zwar durch eine Längsfurche getheilt, aber diese reicht nicht bis auf die Haut. Erwähnte Stirnbinde ist ockergelb, indem der

1) Ein solches Weibchen hat Gray als besondere Art unter dem Namen Pithecia Pogonias unterscheiden wollen.

dunkle Grund an ihren Haaren ganz verdeckt ist. Dieß ist auch der Fall bei dem Besatz der Wangen, der stark ins Rosträthliche zieht. Die Hände sind schwarz behaart, mit einzelnen gelblichen Haaren untermischt [1]).

Mit dem Alter nimmt beim jungen Männchen das Schwarze immer mehr überhand und verdrängt zuletzt die gelbliche Färbung der Spitzen ganz. Dabei breitet sich dann die weißliche oder rostrothe Gesichtseinfassung immer weiter aus und wird ebenfalls einfarbig. Die ganze Länge eines erwachsenen Männchens bis zur Schwanzspitze beträgt 2′ 8¾″, des Schwanzes vom After bis an die Spitze der Haare 15½″ rheinl.

Mit diesem Affen wurden wir zuerst aus dem französischen Guiana bekannt. Schomburgk sagt, daß er im Innern des brittischen Guianas in beträchtlicher Anzahl vorhanden ist. Spix hat ihn von seiner Reise nicht mitgebracht; dagegen Natterer in vielen Exemplaren, und zwar nordwärts des Amazonenstromes von der Barra und dem Forte do Rio branco, also aus dem brasilischen Guiana. Der Amazonenstrom bildet die südliche Gränze von dieser Art, die der östlichen Hälfte des nördlichen Theils vom tropischen Südamerika angehört.

* **P. albinasa Is. Geoffr., der weißnasige Buschaffe; nigra, naso albo-maculato.**

Pithecia albinasa. Is. Geoffr. compt. rend. XXVII. (1848) p. 498.

Aus der brasilischen Provinz Para. „Pelz im Allgemeinen schwarz, auf der Nase ein weißer Fleck, Schwanz so lang als der Körper." — Mehr hat zur Zeit Is. Geoffroy über diesen Buschaffen nicht mitgetheilt, daher seine Anerkennung als Art noch zu verschieben, um so mehr, da schon Lamment bemerklich macht, daß beim Yargué der nackte Theil des Gesichts, nämlich Nase und Mund, schwarz oder mattweiß ist.

2. P. hirsuta Spix, der Zottelaffe; villosissima, pilis nigricantibus apice lutescentibus, sincipite manibusque stramineis.

---

1) Kuhls P. ochrocephala ist ein solches noch nicht erwachsenes Männchen, wahrscheinlich auch seine P. rufibarbata. Die P. capillamentosa von Spix scheint ein altes Weibchen zu seyn, wo die gelblichen Haarspitzen ziemlich geschwunden sind; wie Wagler (natürl. Syst. der Amphib. S. 7) bemerkt, kam übrigens dieses Exemplar nicht aus Brasilien. Unter Simia rufiventer etc. scheinen größtentheils Weibchen begriffen zu seyn.

Pithecia hirsuta. Spix sim. bras. p. 14. tab. 9. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 221. tab. XXXII. A.; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 441. tab. 14. fig. 2. (Schädel). — P. inusta. Spix p. 15. tab. 10. — P. Monachus. Geoffr. ann. XIX. p. 117. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 55.

Zahlreich im nordweſtlichen Braſilien von Mato groſſo an bis zum Rio negro. Die Länge vom Scheitel bis zum After iſt 1′ 4″, der Schwanz 1′ 5″. Beide Geſchlechter in der Behaarung und Färbung einander gleich; von P. leucocephala durch die gelbbehaarten Hände und den nochmals ſo ſchwachen und minder gekrümmten Jochbogen des Schädels verſchieden.

3. P. Satanas Hoffm., der Satansaffe; nigra aut fulvo-fusca, capite, barba crassa caudaque nigris; capillitio subradiato longitudinaliter diviso.

Pithecia Israelita. Wagn. Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 433. — P. Satanas. Tſchud. faun. peruan. I. S. 50.

α) nigra.

Cebus Satanas. Hoffmannsegg, Mag. d. Berl. naturf. Fr. I. S. 93. — Humb. rec. I. p. 315 tab. 27. — P. Satanas. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 218.

β) fulvo-fusca.

Brachyurus Israelita. Spix sim. bras. p. 11. tab. 7. — P. Israelita. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 219. tab. XXXII. B. — Simia sagulata. Traill mem. of. the Wern. soc. III. p. 167 mit Fig.

Von Peru aus längs des Amazonenſtroms bis zum atlantiſchen Ocean und nordwärts durch Guiana und die Länder am obern Orinoko. Die Höhe vom Scheitel bis zum After beträgt 1′ 3″, Schwanz 1′ 1″. Ich hatte früher P. Satanas und Israelita als 2 beſondere Arten aufgeſtellt, an den Exemplaren in Berlin und Wien habe ich mich jedoch überzeugt, daß beide nur Farbenabänderungen einer und derſelben Species ſind.

††) Brachyurus Sp.; cauda brevissima.

4. P. melanocephala Humb., der Cacajo; flavido-fusca, artubus intus pallidioribus, capite manibusque nigris; pilis capitis brevibus antrorsum versis.

Simia melanocephala. Humb. rec. I. p. 317, 359. tab. 29.

Ich hatte früher die P. melanocephala mit P. Ouakary vereinigt, in der Meinung, daß jene vielleicht den jüngern Zustand der letztern darstellen könnte; nachdem nun aber neuerdings noch 2 Arten angezeigt worden sind, ist es bis zur vollgültigen Entscheidung gerathener die frühere Trennung beizubehalten. Von Humboldt's S. melanocephala scheint in keiner Sammlung ein Exemplar aufgestellt zu seyn. Vom B. Ouakary unterscheidet sie sich 1) durch kurze Stirnhaare, 2) durch gelblichbraunen Farbenton, 3) durch noch lichtere Färbung der Unterseite und der Innenseite der Gliedmassen, 4) durch gelblichbraunen Schwanz mit schwarzer Spitze. Die Länge des Körpers beträgt 1′ 6″. Aus den Waldungen am Rio negro und Cassiaquare.

5. P. Ouakary Spix, der Vacary; fulveseens aut ferruginea, capite, manibus antibrachiisque extus et intus nigris, cauda femoribusque ferrugineis, pilis capitis longis antrorsum versis.

Brachyurus Ouakary. Spix sim. Bras. p. 12. tab. 8. — Pithecia melanocephala (theilweise). Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 223; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 435.

Im nordwestlichen Theile Brasiliens jenseits des Amazonenstromes. Die Höhe vom Scheitel zum After ist 1′ 3″, der Schwanz mit Haaren ohngefähr 6″. Der Rücken ist licht bräunlich fahlgelb, gegen das Kreuz rostroth, was noch mehr gesättigt Schwanz und Schenkel färbt. Kopf, Hände, untere Schienbeinhälfte, Vorderarme und ganze Innenseite der Gliedmassen sind schwarz. An einem Exemplare ist auch der Rücken rostroth überlaufen. Der Schwanz ist kurz, dünn, langbehaart und sein Ende wie abgehackt. Nach Natterer sind Ohren und Gesicht schwarz auf röthlichem Grunde, die Iris ist haselnußbraun, die Finger und Sohlen schwarz und die durchscheinende Haut am Unterleibe schwärzlich auf fleischfarbigem Grunde. Sowohl durch die Färbung des Pelzes und des Gesichtes, als auch durch die Behaarung des Kopfes und Schwanzes ist diese Art auffallend von den beiden nachfolgenden verschieden [1]).

1) Wenn Is. Geoffroy noch im Jahre 1852 klagt, daß die Beschreibung, die Spix von seinem B. Ouakary gibt, nicht ausreichend sey, so hätte er diesen Mangel ergänzen können, wenn er meine oben citirten Beschreibungen verglichen hätte.

6. P. calva Is. Geoffr., der kahlköpfige Buſchaffe; fulvida, gutture saturate rufo, manibus corpori concoloribus, sincipite plus minus denudato, facie rubicunda.

Brachyurus calvus. Is. Geoffr. compt. rend. XXIV. (1847) p. 576. — catal. des Primat. p. 57; archiv. d. mus. V. p. 560. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. V. p. 56 mit Abbild. des Schädels.

Dieſe und die folgende Art ſind erſt vor etlichen Jahren von Is. Geoffroy aufgeſtellt worden und zwar die erſtere nach 4 Exemplaren, die Caſtelnau am obern Amazonenſtrom zuſammengebracht hatte und nach einem fünften, das aus der Provinz Para herſtammen ſoll; eine Angabe, die mir ſehr zweifelhaft erſcheint. Die Schädelform und die ſchiefe Stellung der Schneidezähne iſt von der der Gattung eigenthümlichen typiſchen Anordnung. Der Pelz iſt im Allgemeinen falb, was bis ins goldig Falbe und ins graulich oder weißlich Falbe übergeht. Letzterer Ton herrſcht auf der Oberſeite vor, welche mit langen Haaren beſetzt iſt, wovon weit die meiſten einförmig und ſehr licht falb oder ſelbſt faſt weißlich ſind, während bei einigen anderen die Spitzen in größerer oder geringerer Ausdehnung ſchwarz ſind. Dieſelbe weißlich falbe Färbung findet ſich im Nacken und am Hinterkopf, wo die Haare von einem Mittelpunkt ausſtrahlen. Die Seiten, die Außenſeite der Gliedmaſſen und der Schwanz ſind etwas lebhafter gefärbt, nämlich falb oder ſelbſt goldfalb; die Oberſeite der Hände iſt von derſelben Farbe. Der Bauch und die hintere Hälfte der Bruſt ſind goldfalb, die vordere Hälfte derſelben iſt roth und die Unterſeite des Halſes und die Kehle iſt dunkelroth, was bis ins Schwarze verläuft. Sehr auffallend iſt der Kopf, indem er vom Hinterhaupt bis zur Stirne wie raſirt ſcheint; bald iſt er blos mit außerordentlich kurzen, vorwärts gerichteten Haaren beſetzt, bald iſt er gänzlich kahl; Letzteres beſonders bei alten Männchen. Alle dieſe Theile nebſt den Wangen und dem ganzen Geſicht ſind intenſiv roth. Der Schwanz iſt ſehr kurz, aber mit langen (4 Centim.) Haaren dicht buſchig beſetzt und deßhalb faſt ſo dick als lang. Die Länge des Thieres beträgt 4 bis 4½ Decim. (15—15½″), der Schwanz 1 Decim. (3″ 9‴).

7. P. rubicunda Is. Geoffr., der rothe Buſchaffe; splendide rufa, collo fulvido, sincipite plus minus denudato, facie rubicunda.

Brachyurus rubicundus. Is. Geoffr. compt. rend. XXVII (1848) p. 498; catal. des Primat. p. 57; archiv. d. mus. V. p. 564 tab. 30.

Auch dieſe Art iſt von Caſtelnau entdeckt worden und zwar kommt ſie gleich den andern ſtummelſchwänzigen Buſchaffen erſt auf dem nördlichen Ufer des Amazonenſtromes vor, wo er ſie ziemlich häufig in den Wäldern gegenüber von Olivenca antraf. Nach ſeinen Angaben ſcheint ſie nicht den Putumayo zu überſchreiten, zwiſchen welchem und dem Japura die P. calva auftritt; nach ihm gewordnen Berichten der Indianer ſoll noch weiter öſtlich, nämlich am Rio negro, eine dritte Art von ſchwarzer Farbe zum Vorſchein kommen und wirklich haben von dieſem Fluſſe her Spix und Natterer ihre Exemplare von der P. Ouakary erhalten. Allen dieſen ſtummelſchwänzigen Buſchaffen geben die Indianer den Namen Akari, was nur andere Ausſprache für Vakari, Ouakari iſt.

Die P. rubicunda kommt in der Größe, in der Länge und Anordnung der Haare, in der Kürze des Schwanzes, in dem kahlen oder nur ſehr ſpärlich und kurz behaarten Vorderkopf und in der Geſichtsfarbe ganz mit P. calva überein, unterſcheidet ſich aber in der Färbung des Pelzes. Während nämlich bei P. calva das weißlich Falbe vorherrſcht, findet ſich dieß bei P. rubicunda nur im Nacken, am Halſe und etwas auf den Wangen. Das Uebrige des Pelzes iſt lebhaft roth, was am Kinn und am Barte ins Braunrothe, und auf dem Vordertheil des Rückens und der vier Hände ins goldig Rothe, bisweilen ſelbſt ins goldig Gelbe übergeht. Die Farbenverſchiedenheit des Rückens rührt davon her, daß hier die rothen Haare falbe oder licht goldigrothe Spitzen haben; einzelne Haare mit ſchwarzen Spitzen ſind hier zwar auch eingemengt, aber kaum merklich. Das Geſicht iſt glänzend zinnoberroth, was nach dem Tode verſchwindet. — Ein nur wenige Wochen altes Junge zeigte bereits am Pelze und Geſicht die rothe Färbung.

XIII. NYCTIPITHECUS. Nachtaffe.

Oculi permagni nocturni, septum narium subangustum, cauda longa tenuis.

Der Wohnbezirk dieſer nächtlichen Thiere erſtreckt ſich vom 25° ſ. Breite bis zum 4° n. Breite. Die von mir in einer Art zuſammenge-

zogenen älteren drei Arten habe ich jetzt, auf beſſere Anhaltspunkte als früher geſtützt, in ihre Artrechte reſtituirt und eine vierte neuentdeckte beigefügt.

1. N. felinus Spix., der Mirikina; supra brunneo-cinereus, subtus ochraceus; taenia verticis nigra media lateralibus duplo latiore.

Nyctipithecus felinus. Wagn. Wiegm. Archiv f. Naturgeſch. 1843. 2. S. 21; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 443. — Gray ann. of nat. hist. X. p. 256. — Is. Geoffr. archiv. d. mus. IV. p. 19; catal. des Primat. p. 39. — Gleanings from the menag. at Knowsley. I. mit Abbild. — N. trivirgatus. Rengg. Paraguay. S. 58. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 226 (theilweiſe) tab. XXI. C. — Nocthora trivirgata. Fr. Cuvier mammif. fol. III. — Callithrix infulata Licht. Kuhl Beitr. S. 38. — Miriquouina. Azar. essai II. p. 243.

Die einzige Art von Nachtaffen, welche in den ſüdlichen Theilen der warmen Zone: Paraguay, ſüdweſtliches Braſilien und Mochos (Bolivia) vorkommt; die Angabe von Spix, daß ſeine Exemplare von Para herſtammen, erfordert weitere Beſtätigung.

2. N. trivirgatus Humb., der rückenſtreifige Nachtaffe; supra cinereus, gutture pectoreque brunneo-canis, taenia verticis tribus nigris aequalibus; stria dorsali flavido-brunnea.

Nyctipithecus trivirgatus. Gray ann. of nat. hist. X. p. 256. — Wagn. Wiegm. Archiv f. Naturgeſch. 1843. 2. S. 21, 1846. 2. S. 136; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 444. — Is. Geoffr. archiv. d. mus. IV. p. 24, 28. — Aotus trivirgatus. Humb. rec. I. p. 358, 305, tab. 28.

Von der vorhergehenden Art unterſcheidet ſich dieſe, mit der ſie gewöhnlich confundirt wurde, ſchon durch den ganz verſchiednen Wohnbezirk, indem ſie erſt nordwärts des Amazonenſtromes (am obern Rio negro Caſſiaquare und obern Orinoko) auftritt. Von Humboldt entdeckt, gelangten gleichwohl Exemplare von ihr erſt durch Natterer nach Europa und nach einem ſpäter acquirirten machte Gray mit einigen Worten auf die ſpecifiſchen Differenzen zwiſchen N. trivirgatus und N. felinus aufmerkſam. Zur vollen Evidenz wurde aber erſt dieſe Unterſcheidung durch die genaue Auseinanderſetzung von Natterer gebracht, die ich im Nachſtehenden mit ſeinen eignen Worten beifüge.

„Am obern Rio negro fand ich einen Nachtaffen, der mir zu viele Unterſchiede darbietet, um ihn nicht von der ſüdlichen Miriquina zu trennen. Er unterſcheidet ſich von dieſer durch viel kürzeren und weicheren Pelz, durch die ſchwarzen Streifen auf dem Scheitel, die von gleicher Breite, mehr getrennt ſind und faſt parallel laufen, durch braungraue, weißlich melirte Farbe der Kehle, des Vorderhalſes und der Bruſt, durch viel bläſſeren, weißlich ockerfarbnen Unterleib, durch mehr graue Grundfarbe des Oberleibes, ohne Beimiſchung von braungelblicher Farbe, durch einen breiten, hell gelblichbraunen Streifen vom Nacken bis an die Schwanzwurzel ohne Beimiſchung von Ockerfarben, und durch einfarbige Haare am ſchwarzen Theil des Schwanzes. Bei der Miriquina Azara's ſind die beiden ſchwarzen Seitenſtreifen des Scheitels ſchmäler als der mittlere, welcher noch einmal ſo breit iſt und einen ovalen, an beiden Enden zugeſpitzten Fleck darſtellt. Die ſeitlichen Streifen laufen gegen einander und vereinigen ſich auch manchmal mit dem mittleren. Kehle, Vorderhals und ganzer Unterleib ſind blaß ockerfarben. Die allgemeine Farbe der Oberſeite iſt mehr bräunlichgrau oder gelbbräunlichgrau, ohne Rückenſtreifen. Die Schwanzwurzel iſt ockerfarben, ſowie auch die Haare des ſchwarzen Theiles des Schwanzes an ihrem Grunde; der Schwanz ſelbſt iſt beſonders an der Spitze länger behaart. Der erſtgenannte nördliche Nachtaffe ſcheint nur eine etwas dunklere Abänderung der Simia trivirgata Humb. zu ſeyn; auch der N. trivirgatus von Gray wird ihm zugehören, obſchon bei letzterem die Kopfſtreifen ſich im Nacken vereinigen, wodurch er ſich zwar von dem Humboldt'ſchen und unſern Exemplaren unterſcheidet, was aber nicht von großem Belang ſeyn dürfte, da auch an der Miriquina die Streifen manchmal getrennt, manchmal vereinigt ſind." Soweit Natterer; die von ihm angegebenen Unterſchiede habe ich vollkommen richtig befunden.

3. N. Oseryi Is. Geoffr., der krummſtreifige Nachtaffe; supra rufo-canus, subtus flavidus; striis capitis lateralibus arcuatis; stria dorsali rufo-fusca.

Nyctipithecus Oseryi. Is. Geoffr. compt. rend. XXVII. (1848) p. 498; catal. des Primat. p. 39; archiv. d. mus. V. p. 555.

Eine Entdeckung von Caſtelnau und Deville, welche dieſen

Affen in einem Exemplare am obern Amazonenstrom in Peru fanden. Er ist, wie Is. Geoffroy sagt, ein Mittelglied zwischen dem N. felinus, dessen kurzen Pelz er hat, aber mit einer andern Färbung und dem N. lemurinus, dessen kurze Ohren er hat; er ist aber kleiner als dieser, hat viel kürzere Haare and eine verschiedene Färbung, die schwarzen Seitenstreifen des Gesichts sind wie ein S gekrümmt.

Die Haare der Oberseite sind von ihrem Grunde an braun, dann gelb und mit zwei kleinen schwarzen und falben Ringen geendigt, woraus im Allgemeinen eine röthlichgraue Färbung auf den Leibesseiten und der Außenseite der Gliedmassen hervorgeht; dagegen ist die Mitte des Rückens vom Halse an bis zur Schwanzwurzel rothbraun. Brust, Bauch und Innenseite der Schenkel und Arme sind gelblich falb, was unter dem Halse und Kinne und an der Außenseite der Vorderarme und Schienbeine ins weißlich Falbe übergeht; die Hände sind braun. An den Kopfseiten verlaufen zwei S förmig gewundene schwarze Streifen, ein ebenfalls schwarzer über die Mitte der Stirne; über jedem Auge steht ein schwarzer Fleck und unter jedem Ohre ein kleiner gelblicher. Der kurzbehaarte Schwanz ist auf seiner Unterseite und in seinem ersten Drittel brandroth, mit Ausnahme eines dreieckigen schwärzlichen Flecks an seiner Basis, das Uebrige des Schwanzes ist schwarz oder schwärzlich. Die Länge des Körpers erreicht noch nicht 3 Decimeter, der Schwanz mißt ohngefähr 33 Centim. — Geoffroy erwähnt noch eines zweiten Exemplars aus Columbien, das in der Färbung vollkommen mit dem vorhergehenden übereinstimmt, dessen Pelz aber an den Seiten mehr ins Graue fällt.

Der N. Oseryi nähert sich dem N. trivirgatus mehr als dem N. felinus, ist aber gleichwohl von ihm schon durch die gekrümmten Seitenstreifen des Gesichts und die Färbung des Schwanzes verschieden.

4. N. vociferans Spix., der wollige Nachtaffe; supra fulvido-cinereus aut fulvido-brunneus, vellere toto lanuginoso.

Nyctipithecus vociferans. Spix sim. bras. p. 25. tab. 19. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 227; Wiegm. Archiv f. Naturgesch. 1843. 2. S. 22, 1845. 2. S. 136; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 415. — N. lemurinus. Is. Geoffr. archiv. d. mus. IV. p. 25. tab. 2; catal. des Primat. p. 39.

Wenn auch Is. Geoffroy diese Art genauer und nach mehr Exem-

plaren als Spix charakterisirt hat, so ist er doch im Irrthume, wenn er seinen N. lemurinus für specifisch verschieden von N. vociferans ansieht; ich habe das Gegentheil schon seit geraumer Zeit nachgewiesen. Sie gehört dem nordwestlichen Theile der tropischen Zone an; von Spix wurde sie in den Wäldern am Solimoes entdeckt, Roulin hat ein Individuum in Bogota, das bei dem eine Tagreise davon entfernten Dorfe Mesa gefangen worden war, gesehen und Goudot hat sie zahlreich in den Waldungen von Quindin in Neu-Granada in einer Höhe von 1400 Meter und darüber gefunden.

Diese Art unterscheidet sich von den drei vorhergehenden schon gleich durch die Beschaffenheit ihres Pelzes, der eben so lang und wollig als bei den Makis ist. Zur Ergänzung füge ich noch die Charakteristik von Geoffroy bei. „Pelz oben grau mit Roth überlaufen, an den Seiten und der Außenseite der Gliedmassen grau, unter Bauch und Brust, aber nicht unter dem Halse orangegelb. Schwanz schwarz, mit mehr oder weniger Roth melirt, an der Basis unten rostroth, oben röthlichgrau. Ein wenig ausgedehnter mittelstirniger schwarzer Fleck zwischen zwei weißlichen und noch weiter auswärts zwei schwarze Streifen. Ohren sehr kurz." Die Hände sind falbgrau und schwarz gesprenkelt. Die Kehle ist blaß röthlichgrau. Die Färbung ist übrigens veränderlich, indem der Pelz mitunter mehr mit Roth oder mit Schwarz überlaufen ist. Die Länge des Körpers beträgt 36 bis 38 Centimeter. — Das Exemplar von Spix gehört zu den falben Abänderungen.

Wie Spix hat auch Goudot beobachtet, daß diese Thiere fast die ganze Nacht hindurch, zu welcher Zeit sie sehr beweglich sind, ein dumpfes Schreien hören lassen, was ziemlich gut mit dem Worte Douroucou ausgedrückt werden kann. In ihrer Heimath bezeichnet man sie mit dem Namen Mico-dormilon.

XIV. CALLITRIX. Springaffe.

Caput parvum longitudinale, dentes incisivi verticales, canini parvi, cauda longa tenuis villosa.

Der Wohnbezirk dieser Gattung wird südlich vom Wendekreise des Steinbocks, nördlich vom karaibischen Meere begrenzt; sie ist sehr aus-

gezeichnet durch die Beschaffenheit des Schädels (vgl. Abh. d. Münchn. Akadem. II. S. 441 tab. 2. fig. 5).

†) vellere longissimo laxo, itaque capite, trunco caudaque incrassatis; statura majore.

1. C. personata Humb., der schwarzköpfige Springaffe; brunneo-flavescens, capite toto manibusque nigris, cauda rufescente.

Callithrix personata. Spix sim. bras. p. 18. tab. 12. — Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 107 mit Abbild. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 229. tab. XXX. A.; Abh. d. Münchn. Akad. V. S. 446. — Tschud. faun. peruan. I. S. 46. — Simia personata. Humb. rec. I. p. 357.

Längs des Küstenstrichs an der Ostseite Brasiliens von den Wäldern bei Rio Janeiro bis zum St. Matthäusflusse; nach Tschudi auch im südlichen Peru, wenn anders hierunter nicht eine verschiedene Art zu verstehen ist. Von C. nigrifrons durch den ganz schwarzen und kleinern Kopf und die Männchen überdieß durch den lichten Nackenfleck verschieden.

2. C. nigrifrons Spix, der schwarzstirnige Springaffe; brunnescens, taenia frontali lata manibusque nigris.

Callithrix nigrifrons. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 231; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 447.

Die unter dem Namen Callithrix nigrifrons, melanochir, Gigot und cinerascens aufgestellten Arten sind bisher den Zoologen zum großen Anstoße gewesen. Ich hatte sie früher alle unter einer Art begriffen, für die ich den Namen C. melanochir auswählte [1]). Lesson [2]) ging noch weiter, indem er nicht blos C. infulata und donacophila dazu zog, sondern alle sammt und sonders der C. personata unterordnete, was freilich ein großer Mißgriff war. Temminck hielt die C. nigrifrons nur für das Junge von C. personata, worin er sich jedoch, wie ich dieß schon früher nachgewiesen habe, geirrt hat. Nach Untersuchung einer größeren Anzahl von Exemplaren bin ich jetzt zur Ueberzeugung gekommen, daß Spix ganz Recht hatte, wenn er C. nigrifrons von C. Gigot

1) Schreb. Supplem. I. S. 230. 2) Spec. des mamm. p. 163.

ſpecifiſch trennte. Ferner bin ich der Meinung geworden, daß der Gigot des Prinzen von Neuwied der Art nach von dem Spix'ſchen abweicht, und daß C. cinerascens ebenfalls eine eigene Art ausmacht.

Während ich früherhin von C. nigrifrons nur das eine von Spix mitgebrachte Exemplar zur Vergleichung benützen und von der Standhaftigkeit ſeiner Merkmale demnach zu keiner Verſicherung gelangen konnte, bot ſich dieſe mir leicht dar, als ich in Wien Gelegenheit bekam, nicht weniger als 12 Exemplare zu vergleichen, während ein 13tes ſchon früher an das Münchner Muſeum abgegeben worden war. Aus der Unterſuchung dieſer 14 Exemplare ergab ſich bald die Gewißheit, daß C. nigrifrons ſowohl von C. melanochir als von C. Gigot getrennt werden müſſe.

Alle 14 Exemplare ſtimmen in folgenden Merkmalen überein. Die Größe iſt anſehnlich. Der Pelz iſt außerordentlich lang und zottig, ſelbſt auf dem Kopfe und rings um ihn, wodurch dieſer ungemein dick wird und ſich hiedurch gleich von dem viel kleinern Kopfe der C. personata unterſcheidet. Auf dem Rücken und den Seitentheilen erreichen die Haare eine Länge von 3 bis 3½ Zoll und darüber. Auch der ganze Unterleib und Schwanz iſt reichlich behaart. Auf dem Geſichte ſitzen nur einzelne Härchen, während die Wangen weit einwärts von dem langen Pelze beſetzt ſind. Die nackte Haut iſt ſchwärzlich.

Der vorherrſchende Farbenton iſt ſchmutzig lichtbräunlich mit graugelblichem oder roſtigem Anfluge. Die Haare der Oberſeite ſind ſchwarz und licht fahlbräunlich geringelt, doch iſt die Ringelung wenig deutlich. An den Armen herab wird ſie merklicher; dieſe nehmen zugleich gegen die Handwurzel hin etwas mehr Schwarz auf und die Hände ſelbſt ſind ganz mit ſchwarzen Haaren bedeckt. Die hintern Gliedmaſſen erlangen gewöhnlich abwärts mehr licht Roſtroth, das auch noch theilweiſe den Mittelfuß bedeckt, während die Finger der Hinterhand glänzend ſchwarz ſind. Die Stirne iſt von einer zollbreiten, glänzend ſchwarzbraunen Binde bedeckt, die ſcharf von der licht graugelblichen Farbe des Kopfes abſticht. Dieſe dunkle Binde entſteht, indem die Kopfhaare (die weiter rückwärts blos in der untern Hälfte ſchwärzlich, in ihrer obern gelblich und braun melirt ſind) auf der Stirne faſt einförmig ſchwarzbraun, und nur am hintern Theile mit

einzelnen lichten Ringen unterhalb der Spitze besetzt sind. Auch in der Ohrgegend und an den Wangen herab sind die Haare zum Theil schwarzbraun, die Ohren auf ihrer Innenseite mit eben solchen Haaren bewachsen. Das dunkelfarbige Gesicht ist auf der Nasenkuppe, dem Kinn und beiden Lippen mit schmutzig weißlichen Härchen besetzt. Die Unterseite des Körpers nebst der Innenseite der Schenkel ist lebhafter oder trüber rostig gelblichbraun oder rostgelblich. Der Schwanz ist entweder mehr rostbraunroth oder mehr rostgelblich oder licht rostbräunlich; die äußerste Spitze fast immer schmutzig gelblich. Der Iris ist, nach Natterer's Angabe, licht umbrabraun, fast haselnußbraun; die nackte Haut des Gesichts graulichschwarz und die obere Hälfte der obern Augenlieder bräunlichweiß, was jedoch nur bei geschlossenem Auge sichtlich wird. Die Ohren sind grauschwarz mit weißlichbraunen Pünktchen; die Haut der Hände braunschwarz, das Scrotum dunkel braungrau. Beide Geschlechter sind gleichfarbig. Die ganze Länge des frischen Thieres beträgt, nach Natterer, 2′ 11″ rheinl., wovon auf den Schwanz 1′ 5¼″ kommt.

Alle Exemplare des Wiener Museums sind von Natterer in der Kapitanie von St. Paul und Rio de Janeiro gesammelt worden. Das Exemplar von Spix rührt aus Minas Geraes am Fluße „das Onças" her.

3. C. Gigot Spix, der rauchgraue Springaffe; sordide canescens, stria angusta frontali manibusque nigris, (capite crasso, vellere villosissimo laxo).

Callithrix Gigot. Spix sim. bras. p. 22. tab. 16. — Wagn. Abh. der Münchn. Akadem. V. S. 450.

Diese Art ist sehr ähnlich der C. nigrifrons, so daß ich sie früherhin, wo ich nur das eine Exemplar vor ihr, das Spix mitbrachte, untersuchen konnte, für identisch mit jener nahm. Jetzt, wo ich in Wien noch 2 Exemplare sah, die jenem vollkommen ähnlich sind, und durch diese überdieß von der Verschiedenartigkeit ihres Wohnortes überführt wurde, halte ich es besser, beide spezifisch zu sondern, selbst auf die Gefahr hin, daß künftighin es sich erweisen sollte, daß C. Gigot nur eine constante nördliche Varietät von C. nigrifrons oder melanochir ausmachen möchte.

An Größe und Länge des Pelzes kommt sie ganz mit C. nigrifrons

überein, eben so in dem dicken Kopfe. In der Färbung ist der Unterschied, daß statt eines gelblichbräunlichen Tones eine trüb braungraue Färbung vorherrscht. Die am Grunde dunkelbraunen Haare der Oberseite sind weiterhin trüb bräunlichgelb und schwärzlich gesprenkelt. Das Bräunlichgelbe bekommt nur längs des Kreuzes einen schwach rostbräunlichen Anflug, der jedoch durch die dunklen Spitzen fast ganz verdeckt wird, und in gar keinen Vergleich mit dem rostbraunen Unterrücken von C. melanochir gebracht werden kann. Die Unterseite ist nicht viel lichter als die obere. Die Stirne ist von einem schmalen schwarzen Querstreifen begränzt, indem die Kopfhaare hier ganz schwarz sind, oder nur einen schmalen gelblichen Ring unter der Spitze zeigen. Indem diese Ringe größer werden, wird weiterhin die Kopffarbe bräunlichgelb und schwarz gesprenkelt. Die Haare um die Lippen sind schmutzig weißlich. Die 4 Hände sind schwarz; die nackte Haut ebenfalls dunkelfarbig. Der Schwanz ist bei dem hiesigen Exemplare trüb und verwischt rostbräunlich mit Schwarz untermischt; im weitern Verlauf wird er etwas lichter, ohne eine reinere Färbung zu gewinnen. Bei dem einen Wiener Exemplare ist der Schwanz anfangs rostroth, in der letzten Hälfte schmutzig gelblichweiß; bei dem andern, wo jedoch die Spitze fehlt, ist er ganz rostfarben. Die Höhe vom After zum Scheitel beträgt 1' 4½", der Schwanz 1' 7." Spix hatte sein Exemplar aus den Waldungen an der Meeresküste bei Bahia erhalten; die des Wiener Museums sind ebenfalls von Bahia. Die C. Gigot tritt hier an die Stelle der weiter südwärts wohnenden C. nigrifrons.

4. **C. melanochir** Neuw., der rothrückige Springaffe; **cinerascens, tergo castaneo-fuso, manibus nigris.**

Callithrix melanochir. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 114. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 230 (theilw.); Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 451.

An der Ostküste Brasiliens. Vom vorigen durch die Färbung des Unterrückens verschieden, vielleicht nur Varietät desselben.

††) **vellere breviore, minus laxo, itaque capite caudaque gracilioribus; statura minore.**

5. **C. Moloch** Hoffm., der silberfarbige Springaffe; **murina, temporibus, genis gastraeoque flavo-ochraceis; cauda nigro-fusca apice pallidiore.**

Callithrix Moloch. Hoffmannsegg, Mag. d. Gesellsch. naturf. Fr. I.

S. 97. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 233; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 452. — Is. Geoffr. archiv. d. mus. IV. p. 31. tab. 3; catal. d. Primat. p. 41.

Von Para. Körper ungefähr 1′, Schwanz 15—16″.

6. C. cuprea Spix, der kupfrige Springaffe; dilute fuscescens, genis, gastraeo, artubus manibusque cupreo-rufis; sincipite toto concolore.

Callithrix cuprea. Spix sim. bras. p. 23. tab. 17. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 233; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 453. — C. discolor. Is. Geoffr. compt. rend. XXVII. (1848) p. 498; catal. des Primat. p. 41; archiv. d. mus. V. p. 551. tab. 28.

Am Solimoes gegen die peruanische Grenze hin, wo diese Art durch Spix in zahlreichen Schaaren entdeckt wurde; Natterer hat sie nicht gefunden. Der ganze Oberkörper, die Schultern und der größte Theil der Außenseite der Schenkel ist falb und schwarz gesprenkelt; die ganze Unterseite des Körpers und die Innerseite der Gliedmassen, nebst der Außenseite der Vorderarme, Unterschenkel und der vier Hände und die Wangen sind mit einfarbigen rostig kupferrothen Haaren besetzt, die bei manchen Individuen an der Außenseite der Gliedmassen in schwarze Spitzen endigen. Die falben Ringe der Rückenhaare ziehen bald mehr ins Rothe, bald mehr ins Graue. Am Kopf herrscht meist der röthliche Ton vor, sonst ist er gleichförmig wie der Rücken gefärbt, nur daß bei einigen Individuen zu Anfang der Stirnbehaarung die schwarze Farbe etwas die Ueberhand über die falbe gewinnt. Der Schwanz, der Anfangs von der Färbung des Rumpfes ist, ist weißlich gesprenkelt, wobei an manchen Exemplaren die weiße Farbe sich so sehr ausdehnt, daß sie die schwarze mehr oder minder verdrängt, so daß alsdann der Schwanz in der letzten Hälfte fast ganz schmutzig weiß erscheint. Die Länge des Körpers nach der Krümmung beträgt 15″, die des Schwanzes 18″.

Nach einer Reihe von Exemplaren hat neuerdings Is. Geoffroy eine neue Art: C. discolor aufgestellt mit folgender Diagnose: „Pelz oben grau, mehr oder weniger rostfarbig und gesprenkelt; unten und fast auf den ganzen Gliedmassen rostroth; Schwanz grau mit weißen Haarspitzen.“ Weder in dieser Diagnose, noch in der umständlichen Beschreibung findet sich aber ein Merkmal, das nicht auch bei der C. cuprea, die selbst einige Schwankungen in der Färbung zuläßt, ebenfalls zu

finden wäre, ja bei der schönen Abbildung von Geoffroy könnte man fast meinen, daß sie nach einem unserer Exemplare angefertigt worden wäre. Den Fehlgriff, eine alte Art als neu zu produciren, hätte sich Geoffroy leicht ersparen können, wenn er, durch die Angabe von Spix nicht befriedigt, meine schon vor 13 Jahren mitgetheilten Bemerkungen über C. cuprea in Berücksichtigung genommen hätte. Aus seiner Verkennung dieser Art ist es nun auch begreiflich, warum sie in seinem Katalog des pariser Museums fehlt. Uebrigens hat die C. discolor auch gleiche Heimath wie jene, denn Castelnau und Deville haben ihre Exemplare ebenfalls am obern Amazonenstrome, sowohl auf brasilischer als peruanischer Seite gefunden, dann aber auch noch an einem seinem Zuflüsse, dem Ucayali. Nach ihren Beobachtungen sind es halb nächtliche Thiere von großer Agilität, die sich von Früchten und Insekten nähren, leicht zahm werden und alsdann gekochtes Fleisch und Süßigkeiten vorziehen.

Jetzt, wo man von der C. cuprea eine Menge Exemplare mit gleichförmigen Charakteren kennen gelernt hat, ist die Selbstständigkeit dieser Art gesichert.

7. **C. cinerascens Spix, der graue Springaffe; cinerascens, dorso flavido-lavato, cauda subconcolore nigricante.**

Callithrix cinerascens. Spix sim. bras. p. 20. tab. 14. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 231; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 452.

Mit Unrecht hatte ich in den frühern Supplementen die C. cinerascens dem Gigo zugetheilt; ein Mißgriff, den ich schon in den Abhandlungen der Münchner Akademie verbesserte, indem ich hier ihre Selbstständigkeit aussprach, obwohl mir damals auch nicht mehr als das eine, von Spix aus den Wäldern am Putamais [Jça] an der peruanischen Grenze mitgebrachte Exemplar zur Verfügung stand.

Die C. cinerascens hat ganz die Größe der C. cuprea, von der sie sich aber schon dadurch auffallend unterscheidet, daß Ober- und Unterseite gleichförmig gefärbt sind. Es sind nämlich alle Haare schwarz und weiß, oder wie auf dem Rücken schwarz und licht röthlichgelb [falb] geringelt. Der Kopf hat keine schwarze Stirnbinde; die 4 Hände sind gleich den übrigen Theilen der Gliedmassen mit schwarz und weiß geringelten Haaren besetzt, wobei die dunkle Farbe etwas vorwiegt. Am Schwanze sind

zwar die Haare am Grunde schmutzig lichtgelblich, aber die längeren Enden sind schwarz, so daß der Schwanz fast einfarbig schwarz aussieht.

* C. donacophila D'Orb.

Callithrix donacophilus. D'Orbign. voy. dans l'Amériq. mérid. mammif. p. 10. tab. 5. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 232. — Is. Geoffr. catal. d. Primat. p. 40.

Die ganze Beschreibung, welche D'Orbigny von dieser Art giebt, beschränkt sich auf folgende Worte: „Das Gesicht ist nackt und schwärzlich, der ganze Körper rothgrau, am Kopf und Bauch dunkler. Die Haare des Körpers sind geringelt aus Schwarz, Weiß und Roth, die des Schwanzes sind einfarbig". Seine Exemplare hat er in Bolivien und zwar in den Provinzen Mochos und Santa-Cruz de la Sierra zusammen gebracht. Is. Geoffroy bemerkt von diesen Exemplaren, daß bei dem abgebildeten die Hände weiß waren, bei einem andern graulich, wieder bei einem andern, das überhaupt mehr roth überlaufen war, braun. Von einem vierten Exemplar sagt er, daß es viel röther war, indem es kein Weiß als an den Ohren hatte, der Schwanz dunkel. Noch erwähnt er eines Exemplares aus Peru als sehr ähnlich dem vorhergehenden.

Aus diesen wenigen Notizen, so wie aus der gegebenen Abbildung ist die große Aehnlichkeit der C. donacophila mit C. cinerascens nicht zu verkennen, zumal da jene in den Farbentönen mancherlei Abänderungen darbietet und beide einen zusammenhängenden Wohnbezirk einnehmen. So lange nun nicht die französischen Zoologen in genaueren Beschreibungen die Unterschiede ihrer C. donacophila von C. cinerascens nachweisen, halte ich mich einstweilen für berechtigt, beide miteinander zu vereinigen.

8. C. caligata Natt., der rostrothe Springaffe; dilute fuscescens, genis, gastraeo artubusque cupreo-rufis; sincipite nitide atro; manibus nigricantibus.

Callithrix caligata. Wagn. Wiegm. Archiv f. Naturgesch. 1842. 1. S. 337; Abh. d. Münchn. Akad. V. S. 453.

Die C. caligata steht in einem ähnlichen nahen Verhältniß zu C. cuprea, wie C. nigrifons zu C. Gigot. Sie hat mit der C. cuprea die gleiche Größe; die Wangen, die Unterseite und die Gliedmassen sind ebenfalls lebhaft rostig kupferroth, die Rückenfarbe ist ähnlich oder hat

mehr Roth, aber die C. caligata unterscheidet sich dadurch, daß der ganze Vorderkopf glänzend schwarz ist, was hinterwärts ins Fuchsige spielt, indeß bei C. cuprea der Vorderkopf mit dem Hinterkopf gleichfarbig ist. Während ferner bei C. cuprea die 4 Hände mit dunkel kupferrothen Haaren besetzt sind, sind sie es bei C. caligata mit schwarzen, denen einzelne bräunlichgelbe untermengt sind. Natterer hat von dieser Art 2 erwachsene männliche Individuen mitgebracht, wovon ich das durch seine Färbung ausgezeichnete näher beschreiben will.

Der Rücken und ein Theil der Aussenseite der Gliedmassen ist schimmernd rostrothbraun. Der Wangen, die spärlich behaarte Unterseite des Körpers, die Innen- und Vorderseite der vorderen Gliedmassen, die Innen- und Hinterseite der hintern Gliedmassen nebst den Unterschenkeln ist gesättigt rostkupferroth. Die Haare der Aussenseite sind am Grunde dunkel rostbraun, dann undeutlich rostroth und schwarz geringelt, während an C. cuprea die Ringelung sehr markirt ist. Am deutlichsten ist noch die Ringelung in der Kniegegend und auf den Vorderarmen. Der ganze Vorderkopf ist über einen Zoll breit mit glänzend schwarzen, rückwärts gerichteten Haaren besetzt, die hinterwärts, wo eine feine rostbraune Ringelung der Haare beginnt, einen fuchsigen Ton annehmen. Die Haare des Hinterkopfs sind rostgelb und schwarz geringelt, wobei die hellere Farbe vorherrscht. Die 4 Hände sind mit schwarzen Haaren besetzt, unter welchen sich einzelne rostgelbliche einmengen. Die Ohren sind außen nackt, innen mit einzelnen schmutzig weißen Haaren versehen. Der Schwanz ist im Anfang schmutzig gelblichweiß und schwarz gescheckt, indem hier die weißlichen Haare in der Mitte schwarze Ringe haben. Diese werden kleiner und verschwinden endlich, so daß die größere hintere Hälfte des Schwanzes einförmig gelblichweiß ist. Gesicht, Ohren und Sohlen sind schwarz; ersteres mit einzelnen schwärzlichen und um die Lippen mit einzelnen schmutzig weißlichen Härchen besetzt; die Krallen sind dunkelbraun. Die Höhe vom Scheitel zum After beträgt 12½", die Länge des Schwanzes 14½".

Das eine Exemplar stammt von Borba am Rio Madeira, nicht weit von dessen Einmündung in den Amazonenstrom, das andere ist vom Rio Solimoes. Da demnach C. caligata in der Nähe von C. cuprea

gefunden worden ist, so bleibt es weiteren Untersuchungen in der Heimath dieser Thiere vorbehalten, ob nicht Mittelglieder zwischen ihnen vorhanden sind, oder ob sie schroff gesondert neben einander stehen.

9. **C. brunnea** Natt., der braune Springaffe; **castaneo-fusca, taenia frontali lata manibusque nigris; occipite brunneo-lutescente, cauda fusca.**

Callithrix brunnea. Wagn. im Arch. für Naturgesch. 1842. 1. S. 357; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 455.

Eine von Natterer entdeckte Art, die sich zunächst an C. caligata anreiht, mit der sie in Größe, Gestalt und der schwarzen Stirnbinde übereinkommt, von derselben aber durch die rostig kastanienbraune Färbung, die ganz schwarzen Hände und den dunkeln Schwanz sich unterscheidet. Es könnte auch mit C. nigrifrons einige Aehnlichkeit gefunden werden, allein die C. brunnea unterscheidet sich gleich durch ihre Färbung, durch die geringere Größe, den kürzeren Pelz mit schlichten, nicht zotteligen Haaren, der namentlich am Schwanze glatt anliegt und diesen daher dünner erscheinen läßt, was auch von der Kopfbehaarung gilt.

Die herrschende Farbe ist ein etwas saftiges und schimmerndes rostiges Kastanienbraun mit lichten bräunlichen Spitzen. Diese Farbe wird gegen den Kopf ganz licht gelbbräunlich, während sie nach den Leibesseiten und auf den Gliedmassen immer dunkler wird; die 4 Hände sind ganz schwarz. Die Haare sind in ihrer untern Hälfte dunkel rußbraun, dann schwarz mit licht gelbbräunlichen Ringen. Auf dem Nacken und Hinterkopf ist die obere Hälfte der Haare einförmig licht bräunlichgelb, daher hier diese Farbe allein auftritt und scharf von dem dunklen Vorderkopf abschneidet. Dieser ist in seiner vordern Hälfte mit glänzend kohlschwarzen Haaren besetzt, die in seiner hintern Hälfte mit Rostroth untermengt sind, indem hier die Haare kurze fuchsrothe Spitzen haben. Die dunkle Färbung des Vorderkopfes schneidet quer über die Mitte des Scheitels scharf von der lichten Färbung des Hinterkopfes ab. Auch die Seiten-Einfassung des Gesichts ist gegen die Stirnbinde zu aus glänzend schwarzen Haaren gebildet; mit ziemlich langen Haaren von eben dieser Farbe ist das Ohr auf seiner Innenseite dicht besetzt. Der Unterleib ist spärlich mit schwarzbraunen, undeutlich geringelten Haaren versehen. Der Schwanz ist ein-

förmig dunkelbraun, mit sehr verwischter Ringelung, doch wird die äußerste Spitze etwas lichter. Gesicht, Ohren, die nackte Unterfläche der Hände und das Scrotum sind schwarz, ersteres an den Lippen mit weißlichen Härchen besetzt. Die Nägel sind schwarzbraun und die Iris haselnußbraun.

Die Wiener Sammlung besitzt 4 Exemplare von dieser Art: ein erwachsenes und ein junges Männchen, und 2 Weibchen. Die Höhe vom Scheitel bis zum After ist 12½", die Länge des Schwanzes 17½".

Natterer entdeckte diese Art auf seiner Flußreise auf dem Rio Madeira hinab, also an der Westgränze des mittlern Brasiliens.

10. **C. torquata Hoffm.**, der rostfarbige Kragenaffe; **supra castanea, subtus ferugineo-rufa, torque collari palmisque flavido-albis.**

Callithrix torquata. Hoffmannsegg, Mag. d. Gesellsch. naturf. Fr. I. (1807) S. 86. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 234 (theilw.).

Mit Is. Geoffroy halte ich es jetzt für gerathen, die C. torquata, von der mir freilich so wenig als ihm ein Exemplar zu Gesicht gekommen ist, von C. amicta zu trennen und zwar sowohl wegen Verschiedenheit des Wohnorts als der Färbung. Die C. torquata ist nämlich bisher nur aus Para, also aus den nordöstlichen Theilen Brasiliens bekannt. Nach der Beschreibung des Grafen Hoffmannsegg ist die Oberseite kastanienbraun, an den Untertheilen der Gliedmassen und in der hintern Schwanzhälfte allmählig ins Schwarze übergehend; die Unterseite fuchsroth, fast rostfarbig. Der Halskragen, der sich von dem einen Ohr abwärts um den Vorderhals bis zum andern Ohr zieht, ist gelblichweiß; die Vorderhände sind eben so gefärbt.

11. **C. amicta Humb.**, der schwarze Kragenaffe; **tota nigra aut supra rutilo-induta; torque collari palmisque flavido-albis.**

Callithrix amicta. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 234. — Tschud. Faun. peruan. I. S. 46. — Is. Geoffr. catal. p. 40. — C. lugens. Humb. rec. I. p. 320, 357.

Gehört dem nordwestlichen Brasilien und Peru an.

XV. CHRYSOTHRIX. Saimiri.

Caput oblongum, dentes canini longi, cauda longa tenuis villosa.

Mehr als durch die äußere Geſtaltung ſind die Saimiris von den Springaffen durch den Schädelbau verſchieden. Sie bewohnen die nordweſtlichen und nördlichen Theile Braſiliens nebſt den angrenzenden Ländern. Während ich von ihnen früher nur eine Art annahm, halte ich mich jetzt berechtigt drei zu unterſcheiden.

1. **Chr. sciurea** Linn., der gemeine Saimiri; **supra olivaceo-flavescens, nigro-adspersa, dorso splendide aurantiaco-mixta; capite supra e nigro flavidoque subtilissime punctulato vittisque privato; antibrachiis manibusque dilute rubiginoso-fulvis. — Tab. 9.**

Chrysothrix sciurea. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 237 (theilw.); Wiegm. Arch. f. Naturgeſch. 1846. 2 S. 135; Abh. d. Münchn. Akadem. V S. 458. — **Simia sciurea.** Schreb. I S. 121 tab. XXX. — **Saimiri.** Fr. Cuv. mammif. fol. I. — **Saimiris sciureus.** Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 37. — **Saimiris ustus.** Is. Geoffr. archiv. d. mus. IV p. 6 tab. 1; catal. des Primat. p. 38.

Dieſe Art, welche den nördlichen Theil Südamerikas bewohnt, ſcheint uns zuerſt bekannt geworden zu ſeyn. Sie iſt offenbar gemeint von Daubenton, Pennant (ſein Orange ape), Barrere, Froger und Fr. Cuvier. Zwar hat von ihr neuerdings Is. Geoffroy eine zweite Art als Saimiris ustus abtrennen wollen, damit aber nur Altersverſchiedenheiten bezeichnet, denn ſein S. ustus, den er nach einem einzigen, von ſeinem Vater aus Liſſabon mitgebrachten Exemplare charakteriſirte und dem er ſpäter noch ein ein zweites, von Caſtelnau eingeliefertes beifügte, iſt lediglich ein ganz erwachſenes altes Individuum, während ſein S. sciureus die jüngeren Altersſtufen der nämlichen Art darſtellt, vielleicht auch zum Theil der Ch. nigrivittata zufällt. Daß dieſe Behauptung richtig iſt, bezeugen die vielen von Natterer zurückgebrachten Exemplare aus den verſchiedenen Altersperioden, worunter die ganz alten vollkommen mit dem S. ustus übereinſtimmen.

Bei alten Individuen iſt das Orangen- oder Pomeranzenroth des Rückens ſehr lebhaft. Die Oberſeite des Kopfes, die immer ohne ſchwarze Zeichnungen iſt, iſt olivengelb und ſehr fein ſchwarz geſprenkelt, wobei

erstere Farbe vorherrscht. Vorderarme und Hände sind lebhaft goldig roth, ohne braune Beimischung.

Es ist diese Art schon lange aus dem französischen und holländischen Guiana bekannt; in Brasilien ist sie aber zuerst durch Natterer aufgefunden worden und zwar bei Borba, Barra do Rio Negro und am Rio Branco. Castelnau hat sie von Santarem am untern Amazonenstrome mitgebracht. Weder Spix, noch der Prinz von Wied haben diese Art angetroffen.

2. Chr. entomophaga D'Orb., der Saguhy; supra olivaceo-serina, nigro-adspersa, dorso splendide colorato, capite supra aterrimo; antibrachiis manibusque splendide aureo-fulvis. — Tab. 10.

Chrysothrix entomophaga. Wagn. Wiegm. Archiv 1842. 1 S. 357; 1846. 2 S. 135; Abh. d. Münchn. Akad. V. S. 459. — Saimiris (Callithrix) entomophagus. D'Orbign. voy. dans l'Amér. mérid. mamm. p. 10 tab. 4. — Is. Geoffr. catal. p. 38.

Diese Art war nur durch D'Orbigny's Abbildung angedeutet, bis ich sie, nach den beiden von Natterer mitgebrachten Exemplaren beiderlei Geschlechtes, durch eine Diagnose näher charakterisirte. Aus den kurzen Beschreibungen, die D'Orbigny und Is. Geoffroy später mitgetheilt haben, ersehe ich, daß die ihnen vorliegenden Stücke noch nicht die vollkommene Färbung hatten, daher ich ihre Angaben nach den Exemplaren Natterer's vervollständigen will.

Die ganze Kopfplatte ist kohlschwarz, doch haben die Haare lichte Wurzelhälften, die aber völlig verdeckt sind; von dieser schwarzen Platte verläuft ein schmaler Längsstreif am Nacken herunter, so wie jederseits eine Binde vor den Ohren herab bis zur Mitte der Wangen. Die Farbe der ganzen Ober- und Aussenseite ist schön zeisiggelb und schwarz gesprenkelt; letzteres ist am meisten dem Rücken und nächstdem der Aussenseite des Schwanzes, der Oberarme und der Ober- und Unterschenkel beigemischt. An den Seiten überwiegt die zeisiggelbe Farbe über die schwarze; auf den Unterleib und der Innenseite der Gliedmassen tritt sie rein hervor, wird gegen die Ränder an den Hinterfüßen lebhafter und geht so allmählig in die schöne goldrothe Farbe der letztern über, die an den Vorderarmen und Vorderhänden noch weit lebhafter ist. Gesicht und

Vorderhals ſind mit weißlichen Haaren beſetzt, die an den Ohren mehr gelblich werden. Der Schwanz iſt auf der Oberſeite dem Rücken gleichfarbig, unten einfarbig goldgelblich, die ganze Schwanzſpitze ſchwarz. Die Haut der Augengegend iſt, nach Natterer's Angabe, blaß fleiſchfarben, faſt weiß; die Naſe ſammt den beiden Lippen, wie bei den zwei andern Arten, von einem runden ſchwarzen Fleck bedeckt; die Unterſeite der 4 Hände iſt bräunlichgelb. Beide Geſchlechter ſind gleichfarbig. Die Höhe vom Scheitel bis zum After beträgt 11″, der Schwanz mißt 14½″.

Natterer entdeckte dieſe Art am Rio Mamore im Walde am linken Ufer, wo ſie in Geſellſchaft zuſammenlebt. D'Orbigny erhielt von ihr 2 Exemplare in der Provinz Guarayos in Bolivien; 2 andere erlangte Caſtelnau in der Miſſion Sarayacu im öſtlichen Peru. Der nach Poeppig in den Bergwäldern des obern Huallaga häufig vorkommende Saimiri wird wohl der nämlichen Art angehören.

3. Chr. nigrivittata Wagn., der ſchwarzbindige Saimiri; **supra olivaceo-cana, nigro-adspersa; dorso minus splendide colorato; vitta nigra utrinque ante et supra auriculas ducta; antibrachiis manibusque saturate ferrugineo-fulvis. — Tab. 11.**

Chrysothrix nigrivittata. Wagn. Wiegm. Arch. 1846. 2. S. 135; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 461.

So lange ich von dieſer Gattung keine andern Exemplare zur Anſicht hatte, als die von Spix geſammelten, hatte ich mit ihm und Wagler kein Bedenken, daß ſelbige der Simia sciurea Linn. zuzutheilen ſeyen. Nachdem ich nun aber die vielen Exemplare Natterer's mit denen von Spix vergleichen konnte, habe ich alsbald erkannt, daß letztere eine beſondere Art bilden müßten, der ich den Namen Chr. nigrivittata beilegte. Sie iſt bisher nicht beſchrieben, denn wenn auch Humboldt's Titi durch die Kopfzeichnung daran erinnert, ſo paßt doch die übrige Beſchreibung nicht dazu, wenn anders letztere ſich nicht auf Chr. sciurea bezieht, da Humboldt wirklich von 2 Arten ſpricht*).

Unſere Sammlung beſitzt 3 Exemplare aus verſchiedenen Altersſtu-

*) Humboldt's Titi de l'Orénoque ſcheint in keiner Sammlung vorhanden zu ſeyn, wenigſtens fehlt er auch in der pariſer.

fen. Die Färbung ist weit weniger lebhaft als bei Chr. sciurea, und an der Oberseite des Kopfes und der Außenseite der Gliedmassen herrscht der graue Ton über den blaß olivengelben vor. Der Scheitel ist schwarz und olivengelb gesprenkelt. Da, wo an den Kopfseiten oberhalb der Ohren die weiße Farbe von der gesprenkelten des Scheitels sich scheidet, läuft jederseits eine schwarze Binde hin, die sich zuletzt senkrecht an den Wangen herabzieht. Bei jungen Exemplaren ist zwar diese Binde nur schwach angedeutet, es kann jedoch gleichwohl keine Verwechslung mit der Chr. sciurea eintreten, da auf dem Scheitel sowohl die schwarze Sprenkelung vorwaltet, als auch das Gelb nur von einem blassen Tone ist. Den Händen und Vorderarmen ist braun beigemischt, daher diese nur rostig braunroth sind. Die Rückenhaare sind von unten nach oben grau, dann citronengelb, schwarz und rostfalb geringelt, mit kürzern oder längeren schwarzen Spitzen, daher der Rücken aus Schwarz, Rostfalb und Citronengelb gesprenkelt ist, was am intensivsten längs des Rückgraths, an den Seiten aber lichter wird, indem hier das Gelb vorwaltet. Die Haare des Gesichts, der Ohren, des Unterkiefers und Vorderhalses sind weißlich, was allmählich in die blaßgelbliche Farbe des Unterleibes übergeht. Der Schwanz ist auf der Oberseite von der Farbe des Oberarmes und der Schenkel, auf der Unterseite schmutzig weißgelblich; seine ganze lange Spitze ist schwarz. Die Innenseite des Oberarmes ist blaßgelblich, was an der des Vorderarmes immer mehr ins Falbe übergeht. Die Innenseite der Hinterbeine ist fast ganz gelblichweiß, was erst gegen die Fußwurzel ins Rostfalbe verläuft. Die Länge des Körpers beträgt 13½″, des Schwanzes mit den überragenden Haaren 16″.

Die Jungen haben eine sehr trübe Färbung, die erst mit dem Alter lebhafter wird, doch nicht in dem Maaße, wie bei den beiden anderen Arten.

Spix hat seine Exemplare bei Ega, an der Ausmündung des Teffe in den Solimoes erhalten; Natterer hat diese Art nicht angetroffen. Sollte Humboldt's Titi de l'Orénoque hieher gehören, was mir aber zweifelhaft erscheint, so würde sich diese Art nordwärts am Cassiguiare, Guaviare und obern Orinoco weiter ausbreiten. Aus Surinam sind Exemplare von dieser Art der k. Sammlung in Stuttgart und der hiesigen zugekommen.

c) Hapalidae (Arctopithecus Geoffr.); dentes molares utrinque quinque, cauda laxa villosa.

XVI. HAPALE. Seidenaffe.

Ungues omnes falculares, manus posterioris pollex solus unguiculo subplano tectus.

Unter den amerikaniſchen Affen diejenige Gattung, welche die meiſten Arten aufzuweiſen hat.

1. Subgen. Jacchus Geoffr.; dentes incisivi inferiores arcuatim positi, longi, cylindrici.

†) capite penicillato, cauda annulata.

1. H. Jacchus Linn., der weißpinſelige Sahui; cinerascens, dorso flavo alboque variegato; penicillo albo ante et pone auriculam, macula frontali alba.

Hapale Jacchus. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 126; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 464. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 59.

β. collo albescente.

Jacchus albicollis. Spix sim. bras. p. 33 tab. 25. — Is. Geoffr. l. c. p. 59.

Nicht in Guiana, ſondern im mittlern Theil der Oſtküſte Braſiliens zu Hauſe. Geoffroy's J. humeralifer dürfte wohl auch noch zu den Abänderungen des J. Jacchus gehören.

2. H. penicillata Geoffr., der ſchwarzpinſelige Seidenaffe; cinerascens, dorso flavo alboque variegato; penicillo ante auriculam, macula frontali alba; capite colloque nigris.

Hapale penicillata. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 242 tab. XXXIII. A; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 464. — Lund. Danske Vidensk. Selsk. Skrift. Kjöbenh. 1842 p. 15. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 59.

β. genis guttureque albis.

Jacchus leucocephalus Geoffr. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 135 mit Abbild. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 243 tab. XXXIII. B. — Is. Geoffr. l. c. p. 60.

Von der Oſtküſte Braſiliens von Rio Janeiro an bis zum 14° ſ. Breite und weſtwärts in der Provinz Minas Geraes zu finden. H. leucocephala iſt nur eine der Farbenabänderungen.

3. H. aurita Geoffr., der weißkämmige Seidenaffe; nigra, rufo-mixta; auriculis pilis longis interne obsitis nec non fronte facieque albo-pilosis.

Hapale aurita. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 243 tab. XXX. C; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 465. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 60.

Im ſüdlichen Braſilien (San Paulo und am Parana).

††) capite penicillato, cauda haud annulata.

4. H. chrysoleucos Natt., der blonde Sahũi; albida, manibus caudaque splendide rutilo-fulvis, auriculis albo-penicillatis.

Hapale chrysoleucos. Wagn. Wiegm. Archiv. f. Naturgeſch. 1842. 1 S. 357; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 466.

Eine ſchöne, von Natterer entdeckte Art, die der Form ihrer Schneidezähne nach zur Untergattung Jacchus gehört und in derſelben ein vermittelndes Glied zwiſchen der vorigen und letzten Gruppe bildet, indem die Ohren wie bei jener gepinſelt ſind, der Schwanz dagegen wie bei dieſer ungeringelt iſt.

Die Behaarung iſt ſehr weich und alle Haare ſind der ganzen Länge nach einfarbig. Die ſehr großen Ohren ſind beiderſeits mit langen Haaren beſetzt, die den ganzen Ohrenrand mit einem hohen Haarkamme einſäumen. Die ſämmtliche Behaarung des Kopfes, der Ohren, des Vorderkörpers und der Oberarme iſt weiß, was allmählig Gelb aufnimmt (an dem einen der 3 von Natterer eingelieferten Exemplare ſchon am Ohrenpinſel), ſo daß Vorderarme, der Bauch, der untere Rand von der Außenſeite der Oberſchenkel, der größere Theil der Außenſeite der Unterſchenkel, die vier Hände, Aftergegend und der ganze Schwanz mehr oder minder roſtgelb, ins Roſtrothe übergehend ſind. Die Haut des Geſichts iſt ſehr ſchön licht fleiſchfarben, gleich der Haut eines Weißen und mit einzelnen weißen Härchen beſetzt; die Naſenflügel ſind etwas bläulich, die Iris hell haſelfarben. Die Ohren, Sohlen und das Scrotum ſind dunkel fleiſchfarben. Die ganze Länge beträgt 2′ rheinl., wovon der Schwanz bis zur Spitze der überragenden Haare 13½″ wegnimmt.

Natterer entdeckte dieſe Art bei Borba gegen die Ausmündung des Madeira in den Amazonenſtrom, wo ſie im niedern Walde in kleinen Geſellſchaften gefunden wird.

†††) capite haud penicillato, cauda annulata.

5. H. pygmaea Spix, das Zwergäffchen; omnium minima, supra e brunneo — fulvido nigroque variegata; pilis capitis longioribus retroversis, auriculas obtegentibus.

Hapale pygmaea. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 243; Abh. d. Münchn. Akadem. V S. 467. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 61.

Anfänglich war ich geneigt in diesem Aeffchen nur das Junge irgend einer andern Art anzuerkennen; indeß bei genauerer Vergleichung seines Gebißes überzeugte ich mich, daß dasselbe vollkommen ausgebildet ist und daher ein erwachsenes Thier anzeigt, wozu noch eine Mittheilung des Herrn v. Martius kam, daß er dieses Individuum eine Zeitlang lebend gehalten habe. Dieß veranlaßte mich in den Abhandlungen der Münchner Akademie dem gedachten Aeffchen die Berechtigung als eigne Art zu gelten zuzugestehen, und alle Zweifel in dieser Beziehung sind vollständig beseitigt, seitdem Castelnau eine ganze Reihe Exemplare von dieser Art mitbrachte, worunter ein ganz junges, das schon den erwachsenen gleicht.

Von dem durch die bayerischen Reisenden für die hiesige Sammlung acquirirten Exemplare ist Folgendes zu bemerken. Das Gebiß ist das ächte eines Jacchus, im Sinne, wie Geoffroy diese Gattung begrenzte. Die Behaarung ist lang, reichlich und weich; besonders lang ist sie auch am Kopfe, zumal an den Seitentheilen, und dabei rückwärts gerichtet, so daß dadurch die Ohren ganz verdeckt werden. Die Ohren sind auf der Außenseite nackt, auf der Innenseite aber mit längeren, über den Rand etwas vorragenden Härchen besetzt; ein besonderer Ohrenpinsel fehlt gänzlich. Die Färbung der ganzen Ober- und Außenseite des Körpes ist aus lichtbräunlich Lehmgelb und Schwarz gescheckt, indem die lehmgelben Haare an der Wurzel und Spitze schwärzlich gefärbt sind, wobei letztere häufig noch von einem kurzen gelben Ende überragt wird. Diese rostiggelb und schwarze Färbung ist in der Weise angeordnet, daß sie auf Kopf und Nacken gesprenkelt, auf dem Rücken aber in abwechselnden Querbinden auftritt. Die Unterseite ist einfärbig lehmgelblich. Der Schwanz ist aus Rostgelb und Schwarz geringelt; die vier Hände sind rostiggelb behaart, die Krallen sind weißlich. Die Länge des Körpers nach der Rückenkrümmung beträgt etwas über 6″, der Schwanz scheint beinahe eben so lang zu seyn.

Dieſer Affe bildet auch ein Mittelglied zwiſchen der erſten und nachfolgenden Abtheilung, mit jener durch den geringelten Schwanz, mit dieſer durch den Mangel der Ohrenpinſel übeinſtimmend. Unter allen ächten Affen iſt er bei weitem der kleinſte.

Spix hat das von ihm beſchriebene Exemplar in den Wäldern von Tabatinga am obern Amazonenſtrom erhalten; noch weiter aufwärts bei Ega in Peru hat Caſtelnau ſeine, alle Altersſtufen repräſentirenden Exemplare geſammelt.

††††) capite haud penicillato, cauda non annulata.

6. H. melanura Geoffr. der ſchwarzſchwänzige Seidenaffe; supra fusca, infra fulvido-lutescens; femoribus rufo-fuscis, latere anteriore abrupte albidis; cauda nigra. — Tab. 13.

Hapale melanura. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 244; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 469. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 60. — Jacchus leucomeros. Gray ann. of nat. hist. XVIII p. 212.

Es iſt dieß eine bisher ſehr wenig bekannte und in den Sammlungen nicht häufige Art, von der noch keine vollſtändige Beſchreibung vorliegt und als deren Heimath nur im Allgemeinen Braſilien bezeichnet iſt. Die mir von Natterer an die Hand gegebenen Materialien laſſen das bisher Mangelnde vollſtändig ergänzen.

Die Oberſeite des Körpers iſt im Allgemeinen gelblich roſtigbraun; der Vorderhals gelblichweiß, was an dem Unterleibe ins licht Roſtbräunliche zieht, während die Seiten mehr ins Gelbliche fallen. Die Stirne iſt ſchwärzlich, der Vorderkopf dunkelbraun, was auf der Mitte des Scheitels in eine Spitze ausläuft, ſo daß dadurch ein Dreieck entſteht, das jedoch nicht immer deutlich iſt. Die Außenſeite der vordern Gliedmaſſen iſt gelbbräunlich, was gegen die Hände ins Dunkelbraune übergeht; die Innenſeite iſt heller und hat mehr Gelblich. Die Außenſeite der Hinterbeine iſt dunkel roſtbraun, während die Vorderſeite der Oberſchenkel von den Hüften an bis unter das Knie ſcharf abgeſchnitten gelblichweiß iſt. Die Innenſeite der Unterſchenkel iſt lichter roſtbraun als die Außenſeite, die Füße ſind auf der Oberſeite dunkelbraun behaart. Der Schwanz iſt einförmig ſchwarz; nur an der Unterſeite iſt ſeine Wurzel auf eine kleine Strecke hin roſtroth. Die einzelnen Haare des Rückens

sind in ihrer untern Hälfte schmutzig lichtgelblich, dann dunkelbraun mit kürzerer oder längerer graugelblicher Spitze. Die Haare der Unterseite, der Vorderseite und des Schwanzes sind einfarbig. Die Haare am hintern Rande der Außenseite der Hinterbeine sind am Grunde rosträthlich, dann braunschwarz mit graugelblichen Spitzen längs des Oberschenkels.

Die Iris ist haselbraun; die Haut des Gesichts dunkelbraun, ausgenommen die zwischen den beiden Nasenlöchern liegende Nasenkuppe, die blaß fleischfarbig ist, eben so wie der darunter liegende Theil der Oberlippe. Von einem Männchen giebt Natterer an, daß die Unterlippe an dieser Stelle von derselben Farbe war, während bei einem Weibchen sich daran nichts Fleischfarbiges zeigte. Die Ohren sind ziemlich groß, ganz fein mit Härchen beflogen, dunkelbraun, an der Wurzel röthlich, vorn mit einem bläulich fleischfarbigen Fleck, der jedoch von den bräunlichen Wangenhaaren bedeckt wird. Das Scrotum ist blaß fleischfarbig, die Sohlen sind hellbraun, ins Fleischfarbige übergehend, beim Weibchen sehr hell fleischfarbig; die Krallen sind dunkelbraun. Das Gebiß ist das ächte von Jacchus. Die Länge des Körpers beträgt 10″, des Schwanzes mit den Haaren 14½″.

Natterer fand diese Art bei Cuyaba und Caissara in der Provinz Mato grosso, also in der Westhälfte des mittleren Brasiliens. Wie Is. Geoffroy angiebt, hat D'Orbigny ein Exemplar aus Bolivia (Provinz Santa-Cruz de la Sierra?) und Castelnau 2 andere aus der Provinz Para mitgebracht.

7. H. argentata Linn., der Miko; argenteo-alba; facie, auriculis palmisque rubris; cauda nigra.

Hapale argentata. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 245; Abh. d. Münchn. Akadem. V S. 471.

Lange Zeit war von diesem schönen Aeffchen nur das einzige, im Pariser Museum aufgestellte Exemplar bekannt, das La Condamine, als er auf dem Amazonenstrome durch die Waldungen von Para reiste, von den Landeseingebornen als ein ihnen unbekanntes Thier im lebenden Zustand zum Geschenk erhielt. Aus denselben Gegenden stammen wahrscheinlich die beiden Exemplare in der Berliner Sammlung, da sie von Sie-

ber herrühren. Woher das hieſige und andere in verſchiedenen Muſeen aufgeſtellte Individuen gekommen ſind, iſt mir nicht bekannt. Natterer hat ſo wenig wie Spix dieſe Thiere irgendwo angetroffen. Von Is. Geoffroy's Vermuthung, daß der Miko entweder ein Albino von H. melanura oder deren erwachſener Zuſtand ſeyn möchte, iſt jedenfalls die letztere Alternative unrichtig, da wir nunmehr von dem ſchwarzſchwänzigen Sahui durch Natterer die Färbung alter Exemplare kennen; dagegen könnte allerdings der Miko ein Albino von H. melanura ſeyn, da man ihn nur vereinzelt, nirgends familienweiſe angetroffen hat.

8. **H. rufiventer** Gray, der mexikaniſche Seidenaffe; supra nigra, albido-adspersa, infra castaneo-fusca; cauda nigra.

Jacchus rufiventer. Gray ann. of nat. hist. XII p. 398; zool. of the voy. of Erebus n. 4 tab. 18.

Gray giebt von dieſer Art folgende Notiz: „ſchwarz, geſprenkelt durch die weißen Haarſpitzen, welche an den Lenden und Schenkeln zahlreicher ſind; Bruſt, Innenſeite der Gliedmaſſen, Unterſeite des Leibs und ein Fleck auf der Mitte des Scheitels kaſtanienbraun (chesnut-brown); Schwanz lang, ſchwarz; Ohren groß und ungepinſelt.“ — Nähert ſich in der Färbung der H. melanura, iſt aber von einem viel dunkleren, geſättigteren Tone. Gray bezeichnet Mexiko als die Heimath, was, wenn dieſe Angabe verläſſig iſt, intereſſant wäre, als alsdann H. rufiventer die am weiteſten gegen die Grenze der tropiſchen Region Amerika's vorgeſchobene Art abgiebt.

2. Subgen. Midas Geoffr.; dentes incisivi inferiores abbreviati, cestriformes.

†) capite haud jubato (Liocephali).

a. labiis nasoque albo-pilosis.

9. **H. Mystax** Spix, der weißbärtige Seidenaffe; subtus fuliginosa; capite, manibus caudaque nigris; tergo artubusque posterioribus extus ferrugineo-flavidis; barba labiali longissima.

Midas Mystax. Spix sim. bras. p. 29 tab. 22. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 246 (theilw.). — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 64.

Eine ſehr ausgezeichnete Art, die von Spix am obern Amazonenſtrom in Braſilien entdeckt und von Caſtelnau und Deville an dem-

ſelben Strome in Peru bei S. Paul gefunden wurde. Der ganze Kopf, Kehle, Vorderarme, Hände und Schwanz ſind kohlſchwarz; der Unterleib und die Oberarme mehr rußſchwarz. Der Rücken und die Außenſeite der hintern Gliedmaſſen iſt ſchwarz und glänzend rothgelb geſprenkelt, was auf erſterem in unregelmäßigen Bändern und auf letzterer mehr einfärbig roſtfalb erſcheint. Die Haare des Rückens ſind in ihrer untern Hälfte graulichweiß, dann ſchwarz mit falber Spitze; auf dem Unterleib ſind ſie in ihrer untern Hälfte ebenſo, dann rußſchwarz gefärbt. Die weiße Behaarung der Naſenkuppe und Lippen bildet einen langen kammartigen Schnurrbart, länger als bei den beiden nachfolgenden.

10. H. labiata Geoffr., der ſchmalbärtige Seidenaffe; supra extusque nigro-fusca, subtus intusque ferrugineo-rufa.

Midas labiatus. Geoffr. ann. XIX p. 121. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 63.

Nur nach dem einzigen Exemplar unbeſtimmter Heimath, das Geoffroy der Vater aus der Sammlung von Liſſabon nach Paris mitbrachte, bekannt. Rücken und Außenſeite der Gliedmaſſen ſind ſchwärzlichbraun; der Kopf, Schwanz und Hände ſchwarz; Bauch und Innenſeite der Gliedmaſſen lebhaft roſtroth; Naſe und Lippen mit kurzen weißen Haaren beſetzt. Das lebhafte Roth der untern und innern Theile unterſcheidet dieſe Art von H. Mystax.

11. H. pileata Is. Geoffr., der rothmützige Seidenaffe; e nigro griseoque variegata; gastraeo, artubus caudaque nigris; capillitio rufo.

Midas pileatus. Is. Geoffr. compt. rend. XXVI. (1848) p. 499; catal. des Primat. p. 63; archiv. d. mus. V. p. 569 tab 31.

Von Caſtelnau und Deville bei Pebas am obern Amazonenſtrome, jedoch nur in einem Exemplare, aufgefunden. Als eigene Art ſehr ausgezeichnet durch die lebhaft roſtrothe Kopfmütze, welche ſich von den Augenbranen bis zum Hinterhaupt erſtreckt. Der Umfang des Mundes und der Naſenlöcher iſt mit weißen Haaren beſetzt. Die Haare der Oberſeite ſind im größten Theil ihrer Länge roſtroth, gegen die Spitze aber weiß und ſchwarz geringelt, wodurch die Oberſeite grau und ſchwarz melirt erſcheint. Wangen, Vorderglieder, Schwanz, Füße und vorderer Theil

der Hinterbeine ſind ſchwarz; der hintere Theil der Schenkel und die Leibesſeiten ſind bräunlich. Auf der Innenſeite der Schenkel und gegen die Geſchlechtstheile und den After zeigt ſich ein weißer Fleck. Die Länge des Körpers iſt etwas unter 2 Decim., die des Schwanzes 2½ Decimeter.

b. labiis (nec naso) albo-pilosis.

12. H. fuscicollis Spix, der braunhalſige Seidenaffe; capite, artubus manibusque e brunneo-aut rutilo-flavido irroratis; dorso posteriore e nigro flavidoque variegato.

Midas fuscicollis. Spix sim. bras. p. 27 tab. 20. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 247.

β. manibus nigris.

Midas flavifrons. Is. Geoffr. compt. rend. XXVII (1848) p. 499; catal. des Primat. p. 64; archiv. d. mus. V p. 574.

Es folgt hier eine Gruppe von Seidenaffen, die durch weißen Haarbeſatz der Lippen, durch ſchwarze Färbung des Schwanzes, der jedoch an der Wurzel roth iſt, durch geſcheckte Zeichnung des Unterrückens, durch gleiche Größe und gleiche Heimathverhältniſſe (nordweſtliches Braſilien und die angrenzenden Theile von Columbien, Peru und Bolivia) mit einander ſehr übereinſtimmen, ſonſt aber in der Färbung mancherlei Verſchiedenheiten zeigen, deren ſpecifiſcher Werth noch nicht durchgängig ermittelt und die Feſtſetzung der Arten daher noch höchſt unſicher iſt. Spix hatte unter ihnen 2 Arten unterſchieden: Midas fuscicollis und nigricollis, die ich nach Temminck's Vorgang früherhin nur für jugendliche Zuſtände der H. Mystax hielt; eine Meinung, die ich jetzt als irrthümlich zurücknehme. Is. Geoffroy hat neuerdings in dieſer Gruppe nicht weniger als 6 neue Arten aufgeſtellt, in denen ich mich um ſo weniger vollſtändig zurecht finden kann, als er hiebei die beiden von Spix aufgeſtellten Species völlig ignorirt hat, während er doch zunächſt an dieſen die Selbſtſtändigkeit ſeiner Arten hätte bemeſſen müſſen.

Die H. fuscicollis, welche Spix am obern Amazonenſtrom entdeckte, iſt an den Wangen und auf der Oberſeite des Kopfes lichtbräunlichgelb und ſchwarz geſprenkelt, was an der Stirne ins Weißliche übergeht; ähnlich ſind Ober- und Vorderarme, Ober- und Unterſchenkel ge-

ſprenkelt, nur daß ſtatt Bräunlichgelb hier ein roſtröthlich Falb auftritt. Die vier Hände ſind nicht einfarbig ſchwarz, ſondern bräunlichgelb und ſchwarz geſprenkelt, wobei das Letztere vorwaltet. Der Rücken iſt bräunlichgelb und ſchwarz geſcheckt, was am Unterrücken mehr bänderartig erſcheint; die Haare ſind hier ſchwarz mit einem bräunlichgelben Ring vor der Spitze. Bei dem einen von unſern beiden Exemplaren iſt der Vorderrücken faſt ganz ſchwarz. Die Unterſeite iſt rußbraun mit roſtigem Anfluge. Der Schwanz iſt ſchwarz, an der Wurzel unten roſtigfalb.

Vom Midas flavifrons, von dem Caſtelnau und Deville 2 Exemplare von Pebas am obern Amazonenſtrom zurückbrachten, entwirft Iſ. Geoffroy folgende Beſchreibung. Weder iſt der ganze Kopf wie bei M. Devilli, noch auch lediglich die Stirne wie bei M. nigrifrons ſchwarz, ſondern dieſe iſt röthlichgelb und ſchwarz geſprenkelt, vorn ſehr hell, hinten dunkler, wo es in das mit Roth geſprenkelte Braun des Scheitels und der Wangen übergeht. Hinterhaupt, Hals, Vorderrücken, Kehle, Bruſt und Vorderglieder ſind röthlichbraun und etwas geſprenkelt. Der Unterrücken iſt unregelmäßig falb oder gelb und ſchwarz geſcheckt. Hinterglieder, Bauch und Schwanz ſind roſtroth, etwas ſchwarz geſprenkelt von der Farbe welken Laubes. Das Uebrige des Schwanzes und die vier Hände ſind ſchwarz. — Ich finde an dieſem Midas flavifrons keinen andern Unterſchied von unſerer H. fuscicollis, als daß die Hinterbeine etwas mehr mit Roth überlaufen und die Hände einförmig ſchwarz ſind: Abänderungen, die ſo unbedeutend ſind, daß ſie die Aufſtellung einer eignen Art nicht wohl rechtfertigen können.

13. H. nigricollis Spix, der ſchwarzhalſige Seidenaffe; capite superiore, stethiaeo, manibus caudaque nigris; genis brunneis; dorso infimo, femoribus tibiisque saturate ferrugineo-rufis.

Midas nigricollis. Spix sim. bras. p. 28 tab. 21. — Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 247. — Midas rufoniger. Is. Geoffr. compt. rend. XXVII p. 499; catal. des Primat. p. 64; archiv. d. mus. V p. 575.

Gleich der vorigen Art von Spix in nordweſtlichen Braſilien entdeckt. Wangen und Seiten des Vorderkopfs ſind lichtbraun, mit einzelnen ſchwarzen Haaren vermengt. Zwiſchen den Augen entſpringt ein ſchwarzer Streif, der über den Vorderkopf verlaufend immer breiter wird,

ſo daß der Hinterkopf ganz ſchwarz iſt; dieſe ſchwarze Färbung zieht am Rücken bis unter deſſen Hälfte hinab, und die ganzen Vorderglieder, die vier Hände und der Schwanz ſind ebenfalls ſchwarz. An den Seiten und dem Mittelrücken miſcht ſich roſtroth ein, was abwärts immer lebhafter wird, auch die Schwanzwurzel färbt und auf den Ober- und Unterſchenkeln als geſättigtes und lebhaftes kupferig Roſtroth ohne ſchwarze Sprenkelung auftritt. Der Unterleib iſt rußſchwarz, auf dem Bauche mit röthlichem Anfluge. Die Lippen ſind mit kurzen weißen Haaren beſetzt. Die ſchwarzen Haare des Vorderrückens werden nur gegen die Wurzel hin lichter. So ſind 6 von Spix mitgebrachte Exemplare, ſowohl Junge als Erwachſene, in gleicher Uebereinſtimmung und dieß berechtigt in ihnen eine eigenthümliche Art anzuerkennen.

Is. Geoffroy's Midas rufoniger kommt in allen Stücken ſo vollkommen mit unſern Exemplaren der H. nigricollis überein, daß man meinen ſollte, ſeine Beſchreibung ſey nach letzteren entworfen worden. Seine beiden Exemplare ſtammen ebenfalls vom obern Amazonenſtrome, und zwar von Pebas her.

Nachdem ich von den 6 Arten, die Is. Geoffroy neuerdings aufſtellte, 2 bei älteren unterbrachte, bleiben noch 4 übrig, über deren Selbſtſtändigkeit erſt dann ſicher wird entſchieden werden können, wenn einmal genaue, an ihren Wohnſtätten angeſtellte Beobachtungen vorliegen werden. Bis dahin mögen ſie proviſoriſch die Berechtigung von eignen Arten führen.

14. **H. Devilli** Is. Geoffr., der ſchwarzköpfige Seidenaffe; capite toto, stethiaeo, manibus caudaque nigris; dorso e nigro et griseo variegato; lumbis, femoribus tibiisque ferrugineo-rufis.

Midas Devilli. Is. Geoffr. compt. rend. XXXI p. 875; catal. des Primat. p. 64; archiv. d. mus. V p. 570.

Nach 2 Exemplaren aus der Miſſion Sarayacu in Peru von Is. Geoffroy beſchrieben. Der größte Theil der Wangen, die Oberſeite des Kopfs, die vier Hände und faſt der ganze Schwanz ſind ſchwarz; Nacken, Schultern und Vorderrücken ſind ebenfalls ſehr dunkelfarbig, aber ins Rothe ziehend und etwas geſprenkelt. Der übrige Rücken iſt ſchwarz und weiß melirt, was etwas bänderartig wird. Ober- und Unterſchenkel

nebſt dem hintern Theil der Lenden und der Schwanzwurzel ſind roſtroth, indem die ſchwarzen Haare mit rothen Spitzen enden; auch die ſchwarzen Haare der Bruſt haben rothe Spitzen. Der Umfang des Mundes und das Untertheil der Naſe iſt weiß. — Durch die grau und weiße Sprenkelung des Rückens und die ſchwarzen Wangen unterſcheidet ſich dieſe Art von H. nigricollis, mit der ſie ſonſt ganz in der Färbung übereinkommt.

15. **H. Weddellii** Deville, der weißſtirnige Seidenaffe; praecedenti simillima at fronte alba diversa.

Midas Weddellii. Deville rev. zool. 1849 p. 55; archiv. d. mus. V. p. 581. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 65.

Dr. Weddell erhielt von dieſem Affen ein männliches Exemplar in der boliviſchen Provinz Apolobamba. Kommt in der Färbung mit H. nigricollis und H. Devilli überein, unterſcheidet ſich aber von beiden dadurch, daß Stirne und Augenbrauen-Bögen weiß ſind. — Der ganze Vorderkörper, Arme, vier Hände und Schwanz ſind ſchwarz. Der Unterrücken iſt lebhaft roth und ſchwarz geringelt, wobei die Haare am Grunde goldgelb, dann im größten Theil ihrer Länge ſchwarz und am Ende roth und ſchwarz geringelt ſind. Ober- und Unterſchenkel ſind lebhaft roth; ihre Haare ſind roth mit einem ſchmalen mittelſtändigen ſchwarzen Ringe.

16. **H. Illigeri** Pucher., der columbiſche Seidenaffe; nigro flavidoque variegata, capite nigro, cervice artubusque rufescentibus.

Hapale Illigeri. Pucheran rev. zool. 1845 p. 335; archiv. d. mus. V p. 580. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 65.

Man kennt nur ein Exemplar von dieſem Affen, als deſſen Heimath Columbien vermuthet wird. Is. Geoffroy entwirft von ihm folgende Diagnoſe: „Kopf ſchwarz, Rücken und Lenden falb geringelt, der übrige Körper roth, Schwanz und Hände ſchwarz.“ — Pucheran beſchreibt daſſelbe Exemplar als auf der Oberſeite ſchwarz und blond geflammt, Kopf und Schwanz ſchwarz; Nacken, die Gliedmaſſen innen und außen, die ganze Unterſeite und die Schwanzwurzel röthlich. Die vier Hände ſind ſchwarz und roth geſprenkelt, was beſonders an den hintern ſehr deut-

lich sichtlich ist. — Die Rückenfarbe und der schwarze Kopf unterscheiden diesen Affen von den vorhergehenden.

17. H. nigrifrons Is. Geoffr., der schwarzstirnige Seidenaffe; capite, collo, dorso artubusque anterioribus flavido aut brunneo nigroque variegatis; artubus posterioribus rufescentibus; fronte nigra.

Midas nigrifrons. Is. Geoffr. compt. rend. XXXI p. 875; catal. des Primat. p. 64; archiv. d. mus. V. p. 572.

Beruht auf einem Exemplare unbekannter Heimath. Stirne, die Hände und der Schwanz sind schwarz. Der übrige Kopf, der Hals, die Vorderglieder und fast die ganze Unterseite des Leibes sind braun, was sehr fein roth gesprenkelt ist. Der Rücken ist schwarz und gelb gescheckt. Die Hinterglieder und die Schwanzwurzel sind von einem etwas schwarz gesprenkelten Roth, was aber an Lebhaftigkeit keineswegs dem von H. rufoniger, Devilli und Weddellii gleichkommt. — In der Färbung nähert sich dieser Affe demnach mehr der H. fuscicollis an, aber die schwarze Stirne unterscheidet ihn schon davon, während er sich von H. Devilli und Illigeri dadurch entfernt, daß bei ihm nicht der ganze Kopf schwarz ist.

c. labiis haud albo-pilosis.

18. H. Ursula Hoffm.; der Neger-Sahui; nigra, dorso rufo-undulato, manibus nigris.

Hapale Ursula. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 246; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 471. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 63.

Dem nordöstlichen Theile der tropischen Zone angehörig, wo er nordwärts vom Amazonenstrom an zwischen Para und Barra do Rio Negro nordwärts nach Guiana sich verbreitet.

19. H. Midas Linn., der Tamarin; nigra, dorso flavo undulato, manibus rufis.

Hapale Midas. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 245; Abh. d. Münch. Akadem. V S. 472. — Midas rufimanus. Tschud. faun. peruan. I. S. 53. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 63.

Bewohnt den nördlichen Theil der tropischen Zone von Guiana an bis zum nördlichen Peru.

20. H. bicolor Spix, der zweifarbige Seidenaffe; corpore anteriore toto albo, posteriore griseo-brunneo; cauda supra nigra, infra apiceque ferruginea. — Tab. 12.

Hapale bicolor. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 251; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 473. — Is. Geoffr. catal. p. 63.

Von dieſer ſchönen Art brachte Spix nur ein einziges junges Exemplar, und dies noch dazu im üblen Zuſtande, zurück, ſo daß ſeine Beſchreibung nicht vollſtändig ausfallen konnte und es deshalb Cuvier nicht zu verargen iſt, wenn er vermuthete, daß dieſe H. bicolor nur eine Varietät von H. Oedipus ſeyn dürfte. Jetzt, wo ich alte und junge Exemplare in Natterer's Sammlung verglichen habe, kann ich dieſe Vermuthung als ganz unbegründet abweiſen und durch eine vollſtändige Beſchreibung die ſpecifiſche Selbſtſtändigkeit dieſer Art außer allen Zweifel ſetzen.

Der ganze Vorderkopf bis zu den Ohren und der Mitte des Scheitels iſt bei alten Individuen faſt ganz nackt, fein runzelig und ſchwarz, und nur mit feinen weißen Härchen beflogen, die bloß an den Augenbraunen und Lippen länger ſind; bei jungen Thieren iſt jedoch, wie das Spix'ſche Exemplar es zeigt und die Angabe von Natterer beſtätigt, das Geſicht mehr behaart. Die eigentliche Behaarung des Kopfes beginnt erſt in der Gegend zwiſchen den Ohren und iſt am ganzen Halſe und dem Rumpfe ziemlich lang. Der Ohrenrand iſt oben etwas übergebogen, unten vorwärts geſchlagen. Das Hinterhaupt, der ganze Hals, die Bruſt und ein ſpitz auslaufender Streif am Bauch, ſo wie die Schultern und die ganzen Vorderglieder ſind ſchön weiß, mit Ausnahme des Hinterrandes der Vorderarme, der ockerfarbig überlaufen iſt. Der übrige Rumpf und die Außenſeite der Hinterbeine iſt bräunlich gelbgrau, mit etwas Schwarz geſprenkelt, wobei die Färbung auf dem Rücken dunkler als an den Schenkeln iſt. Die Vorder- und Innenſeite der Ober- und Unterſchenkel iſt licht roſtroth; die Oberſeite der Hinterhände und der Hinterbauch mehr licht ockerfarb. Der Schwanz iſt oben ſchwarz, auf der ganzen Unterſeite und an der Spitze roſtröthlich, was am lebhafteſten längs der Schwanzwurzel iſt. Beide Geſchlechter ſind gleichfarbig.

Die Rückenhaare einzeln betrachtet ſind ſchwarz, in der obern Hälfte mit zwei ſchmalen gelblichen Ringen, woran ſich meiſt eine kürzere oder längere ſchwarze Spitze anſetzt. Aehnlich iſt die Außenſeite der Hinterbeine, nur daß die gelben Ringe eine weit größere Ausdehnung gewinnen. Die weißen Haare ſind einfarbig. Die Haut des Geſichts und die Ohren

ſind ſchwarz; das Innerſte der letzteren und ein Fleck nahe am obern Rande fleiſchfarben. Die Haut der Finger und Sohlen iſt ſchwarz, die Krallen dunkelbraun. Das Scrotum iſt ſchwarzgrau mit fleiſchfarbigen Flecken. Die Clitoris iſt ſehr unſcheinlich und von den Schamlippen bedeckt, von denen ſich ein langer, breiter, flacher, ſchwarzbrauner Wulſt bis zum Anfang des Bauches hinzieht. Die Länge des Körpers beträgt 9½", des Schwanzes 12½".

Natterer hat dieſe Art in den Waldungen der Barra do Rio Negro angetroffen, woher auch das Exemplar von Spix rührt.

21. H. Geoffroyi Puch., der rothnackige Seidenaffe; supra e nigro flavoque undulata, subtus alba; zona verticis anguste pilosa antice alba, postice ferruginea; cauda nigra basi ferrugineo-mixta.

Hapale Geoffroyi. Pucher. rev. zool. 1845. p. 138; archiv. d. mus. V p. 579. — Midas Oedipus var. Spix, tab. XXIII. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 252.

Seitdem ich mit der ächten Simia Oedipus bekannt geworden war, hatte ich mich überzeugt, daß das hieſige Exemplar, welches von Spix und mir für eine bloße Varietät derſelben gehalten wurde, der Repräſentant einer eigenen Art ſey. Dieſe iſt ſeitdem auch von Pucheran aufgeſtellt worden; er ſcheint es jedoch ganz überſehen zu haben, daß ſie ſchon lange vorher von Spix beſchrieben und abgebildet worden iſt. Zu ihrer richtigen Kenntniß will ich noch folgende Charakterzüge nach dem Exemplare der hieſigen Sammlung beifügen.

Der ganze Kopf iſt mit feinen, anliegenden, weißen, hinter den Ohren auch ſchwärzlichen Haaren beflogen, zwiſchen denen allenthalben die nackte ſchwarze Haut ſichtlich iſt. Nur längs der Mitte des Oberkopfes verläuft ein eigentlicher dichter und längerer Haarbeſatz, der gegen die Stirne in einer Spitze ſich auskeilt und hinterwärts als eine ſchmale Binde am Hinterkopf ſich herabzieht und dann am Nacken ſich ausbreitet, ohne jedoch eine Mähne zu bilden, was ſchon gleich von der ächten Simia Oedipus unterſcheidet. Die Behaarung am übrigen Körper iſt ſehr reichlich und lang. Die Färbung iſt von Spix und mir angegeben worden und kommt mit der überein, wie ſie Pucheran beſchreibt. Die Länge des Körpers beträgt nach meiner Meſſung 10½", des Schwanzes 14".

Spix wußte ſelbſt nicht mit Sicherheit, woher das von ihm beſchriebene Exemplar gekommen war, indem er nur muthmaßlich Guiana als Heimath angiebt. Mit Zuverläſſigkeit iſt für ſelbige von Pucheran Panama bezeichnet worden und es ſteht alſo ſehr in Frage, ob dieſe H. Geoffroyi etwa noch bis in die nördlichſten Theile Braſiliens ſich herabzieht. Natterer hat ſie ſo wenig als H. Oedipus in Braſilien wahrgenommen.

††) capite jubato (Leontocebus).

22. H. Oedipus Linn., das weißmähnige Löwenäffchen; supra e cano fusca, subtus alba, capillitio verticis longo dependente albo; cauda rufa versus apicem nigra.

Hapale Oedipus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 251 (zum Theil). — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 62.— Pinche. Fr. Cuv. mammif. p. 200 tab. 72; fol. III. — Titi de Carthagène. Humb. rec. I p. 337.

Dem nördlichen Theil der tropiſchen Zone angehörig: Carthagena, Turbaco, Darien, Maynas, nach Is. Geoffroy auch in Guiana [ohne näheren Nachweis]. Schon durch die Kopfmähne, die in langen weißen Haaren in den Nacken herabfällt, von H. Geoffroyi verſchieden.

23. H. Rosalia Linn., das rothe Löwenäffchen; tota rufo-fulva.

Hapale Rosalia. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 250 tab. XXXV*; Abh. der Münchn. Akadem. V S. 477. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 62.

Auf den ſüdlichen Theil der Oſtküſte Braſiliens beſchränkt, nicht in Guiana.

24. H. leonina Humb., das dunkelbraune Löwenäffchen; olivaceo-fusca, juba concolore; facie nigra, ore albido.

Hapale leonina. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 249.

Am öſtlichen Abhang der Kordilleren zwiſchen 0° 15′ und 1° 25 n. Breite. Iſt in neuern Zeiten nicht wieder aufgefunden worden.

25. H. chrysopyga Natt., das goldſteißige Löwenäffchen; tota nigra, juba concolore; fascia frontali, natibus femoribusque extra et intus flavis.

H. chrysopyga. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 249; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 476.

Provinz St. Paulo in Braſilien.

26. **H. chrysomelas** Neuw., das goldmähnige Löwenäffchen; splendide nigra; juba, antibrachiis striaque dorsali caudae aureo-aut rufo-fulvis.

Hapale chrysomelas. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 248; Abh. d. Münchn. Akadem. V S. 476. — Tschud. Faun. peruan. I S. 53. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 62.

Vom Prinzen von Neuwied an der Oſtküſte Braſiliens zwiſchen 14 und 15½° ſ. Breite entdeckt, von Natterer im Weſten nicht wahrgenommen, daher es auffallend iſt, daß Tſchudi dieſe Art in Peru gefunden hat.

B. PROSIMII. Halbaffen.

Dentes primores inferiores 4 aut 2; superiores 4 per paria remoti; uterus bicornis.

III. Familie.

Lemuridae. Halbaffen.

Manus quatuor pollice distincti onstructael; ungues lamnares, digiti indicis posterioris falcula subulata.

Dämmerungs- oder Nachtthiere, welche die tropiſchen Gegenden der alten Welt, hauptſächlich Madagaskar, bewohnen. Die Zahl der Zitzen iſt hier nicht mehr conſtant ein Paar, ſondern kann ſich bis auf 3 Paare erſtrecken. Ebenſo iſt der Zahnbau verſchiedenen Abänderungen unterworfen, und insbeſondere der untere Eckzahn oft ſo wenig markirt, daß er Lage und Form der Schneidezähne annimmt. Ueberhaupt bilden die Halbaffen eine Uebergangsfamilie, die von den ächten Affen aus Anknüpfungspunkte an die Inſektenfreſſer (zunächſt an Galeopithecus), ſo wie an die Nager (zunächſt an Chiromys) darbietet. Eine vortreffliche ſyſtematiſche Bearbeitung iſt dieſer Familie durch van der Hoeven (Tijdschr. v. natuurl. geschied. XI. 1844 p. 1) zu Theil geworden, während die von Leſſon (Species des Mammifères bimanes et quadrumanes) mehr zur Verwirrung als zur Sichtung der Arten geeignet iſt und ſtatt der bisherigen guten Namen neue in Vorſchlag bringt, die ſchon ihrer ſprach-

widrigen Zusammensetzung wegen der Vergessenheit übergeben werden müssen.

a) Brachytársi; tarsus haud elongatus, auriculae breves.

XVII. LICHANOTUS. Indri.

Cauda minutissima; dentes 30.

Madagaskar angehörig. Der Kopf ist nicht so gestreckt als bei den Lemurs, namentlich die Schnautze kürzer; die Hinterbeine sind weit länger als die vordern. Die Zahnformel ist nach Blainville, van der Hoeven und Owen, welche im Unterkiefer nur 2 Schneidezähne annehmen und die diesen zunächst stehenden als Eckzähne betrachten, folgende: Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{5}{5}$.

1. L. brevicaudatus Geoffr., der Indri; niger, gula, natibus calcibusque albis.

Lichanotus brevicaudatus. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 257 tab. 38C. — Blainv. ostéograph. Lemur p. 36 tab. 4 (Skelet), tab. 8 fig. 1 (Schädel), tab. 11 fig. 7 (Zähne). — V. d. Hoeven tijdschr. XI p. 8, 44 tab. 1 fig. 5 (Schädel und Zähne). — Indris brevicaudatus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 68.

Van der Hoeven giebt die Länge des in Leiden aufbewahrten Exemplares zu 0,60, des Schwanzes zu 0,04 Meter an.

XVIII. HABROCEBUS. Bliesmaki.

Cauda longa, rostrum breve, vellus mollissimum, dentes 30.

Ebenfalls auf Madagaskar beschränkt. Mit den Indris verwandt durch die Beschaffenheit des Gebisses und der langen Hinterbeine, mit den Makis durch den langen Schwanz. Von den beiden Arten ist nur die erste ausreichend bekannt; die zweite blos mangelhaft, so daß es zweifelhaft bleibt, ob sie wirklich mit der ersten Art generisch verbunden werden darf.

1. H. lanatus Schreb., der Avahi; brunneus, infra griseus, pedibus caudaque rufescentibus.

Habrocebus lanatus. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 238 tab. 42 A. —

Lichanotus Avahi. V. D. Hoev. tijdschr. XI p. 27, 44 tab. 3 (Thier), tab. 1 fig. 6 (Schädel). — Lemur laniger. Blainv. ostéograph. Lem. tab. 8 fig. 2 (Schädel), tab. 11 (Gebiß). — Avahi. Jourd. instit. 1834 p. 231. — Avahis laniger. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 69.

Von der Oſtküſte Madagaskars. Nach v. d. Hoeven's Beſchreibung des Leidner Exemplares iſt der Rücken graubraun, dicht am Schwanz gelblichgrau, der Bauch grau, die Hinterſeite der Schenkel und Aftergegend weißlich, Schwanz und Hände roſtbraun. Die Rückenhaare ſind am Grunde grau, dann röthlich, im Nacken etwas dunkler. Der Körper iſt 0, 3, der Schwanz ohne Haare 0, 25 Meter lang.

2. H. Diadema Benn., der Schleiermaki; cinerascens, gastraeo fasciaque frontali albis, artubus caudaque fulvis, capite manibusque nigris.

Habrocebus Diadema. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 260. — Propithecus Diadema. Bennett proceed. of the committ. of the zool. soc. II p. 20. — V. D. Hoev. tijdschr. XI p. 44. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 68. — Lemur Diadema. Blainv. ostéograph. Lemur. p. 23, 37 tab. 8 fig. 3 (Schädel), tab. 11 (Gebiß). — Macromerus typicus. A. Smith, South Afr. quat. journ. 1833 p. 49.

Madagaskar. Körper 1′ 9″, Schwanz 1′ 5″. Seit Bennetts und A. Smith's Beſchreibung iſt über dieſe Art nichts weiteres publicirt worden, als was Blainville nach einem jungen Schädel beigebracht hat. Demnach hat derſelbe große Aehnlichkeit mit einem Schädel gleichen Alters vom Indri; an den Zähnen zeigte ſich aber der Unterſchied, daß die obern Schneidezähne viel ſtärker als bei allen andern Makis und die beiden erſten überdieß dreieckig, gekrümmt und convergirend ſind. Dieß möchte vielleicht auf generiſche Trennung dieſer Ar von der vorigen hinweiſen. A. Smith giebt nur $\frac{4}{4}$ Backenzähne an, weil er im Unterkiefer, der früheren Anſicht gemäß, 4 Schneidezähne annimmt.

XIX. LEMUR. Maki.

Cauda longissima villosa, rostrum attenuatum productum, auriculae breves, dentes 36.

Bewohnen ausſchließlich Madagaskar und einige benachbarte Inſeln, ſcheuen das helle Sonnenlicht und ſind gewandt und flüchtig in ihren Be-

wegungen. Die Zahnformel lautet: Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1-1}{1-1}$, Backenzähne $\frac{6-6}{6-6}$ = 36. Die Arten sind noch nicht alle näher bestimmt, da mehrere derselben Abänderungen unterliegen, deren Kreis, aus Mangel an Beobachtungen in ihrer Heimath, noch nicht scharf umgrenzt ist.

1. **L. Catta Linn.**, der **Mokoko**; **cauda albo nigroque maculata.**

Lemur Catta. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 266 tab. XLI, XLI*. — V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 32. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 70. — Peters Reise nach Mossamb. I S. 21.

Durch den geringelten Schwanz von allen andern Arten verschieden.

2. **L. Macaco Linn.**, der **Vari**; **maculis magnis albis nigrisque variegatus.**

Lemur Macaco. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 266 tab. XL. B. — V. d. Hoeven, tijdschr. XI p. 33. — Fr. Cuv. mammif. p. 223 tab. 82; fol. III. — L. varius. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 71.

β. totus niger.

Lemur niger Geoffr. Wagn. Schreb. a. a. O. tab. XL. A. — Peters Reise nach Mossamb. I S. 21.

Farbenvertheilung verschieden; Unterleib, Hände und Schwanz immer schwarz.

3. **L. ruber Geoffr.**, der **rothe Maki**; **castaneo-rufus; gastraeo, artubus intus, manibus caudaque nigris; macula nuchae albida.**

Lemur ruber. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 272. — V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 34. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 71.

Höchst ausgezeichnete Art.

4. **L. rubriventer Is. Geoffr.**, der **rothbäuchige Maki**; **rufo-brunneus; gastraeo, artubus barbaque malari castaneo-rufis.**

Lemur rubriventer. Is. Geoffr. rev. zool. 1851 p. 64; catal. des Primat. p. 71.

Diese und die nachfolgende Art, beide aus Madagaskar, sind erst vor Kurzem durch Js. Geoffroy aufgestellt worden. „Schöne neue Art, verschieden von allen andern durch die kastanienrothe Färbung ihrer untern Theile und Gliedmassen, die sehr wenig abweicht von der der Oberseite bei L. ruber; Oberseite gesprenkelt rothbraun, Schwanz schwärzlich, Backenbart kastanienroth".

5. L. flaviventer Is. Geoffr., der gelbbäuchige Maki; rufo-brunneus, subtus flavus, gutture albo; artubus barbaque malari castaneo-rufis.

Lemur flaviventer. Is. Geoffr. rev. zool. 1851 p. 24; catal. des Primat. p. 72.

„Verwandt der vorigen Art, gleich dieser oben rothbraun gesprenkelt mit kastanienrothen Gliedmassen und schwärzlichem Schwanze; dagegen Kehle weiß, Bauch gelb, Innenseite der Gliedmassen gelblich. Gesicht schwarz, Backenbart kastanienroth, wenig ausgedehnt."

6. L. collaris Geoffr., der Fuchsmaki; fulvo-fuscus, subtus dilutior; facie obscure violacea, barba malari fulvida.

Lemur collaris. Geoffr. ann. XIX p. 161. — Wagn. Schreb. Supplem. I S. 270 tab. 39 B. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 72. — L. Mongoz. V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 34. — Mongous. Fr. Cuv. mammif. p. 211 tab. 76; fol. I. — L. fulvus. Geoffr. ann. XIX p. 161; ménag. d. mus. II p. 22 mit fig.

β. brunneo-griseus, manibus albidis.

Lemur albimanus. Geoffr. ann. XIX p. 160. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 72. — Audeb. Mak. fig. 1.

Größe des Mongus, von dem sich der L. collaris durch seine falbbraune Färbung und hellrothen Backenbart unterscheidet. Kopf oben schwarz. — L. albimanus, nur nach einem Exemplar bekannt, ist oben grau, Kehle und Brust weiß, Bauch röthlich, Backenbart zimmtroth, Hände weißlich. Vorläufig als Varietät hieher gestellt. Is. Geoffroy, der den L. albimanus für eine eigene Art ansieht, bemerkt von ihm, daß er sich von L. collaris durch den Umstand, daß sich der Backenbart oben hinreichend verlängere, um das Ohr zu umgeben, besser unterscheide als durch die Farbe seiner weißlichen oder schmutzig gelben Hände.

7. L. brunneus Hoev., der braune Maki; obscure fulvido-fuscus, facie nigra, barba malari grisea.

Lemur brunneus. V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 35. — L. nigrifrons. Fr. Cuv. mammif. p. 222 tab. 81; fol. II. — Peters Reise nach Mossamb. I S. 21.

Von Farbe düsterer als L. collaris, das ganze Gesicht schwarz und der Backenbart grau; vielleicht doch nur eine Varietät desselben. Nicht mit L. nigrifrons von Geoffroy und Bennett zu verwechseln, der zu L. Mongoz gehört.

8. L. rufus Geoffr. der grauköpfige Maki; rufescens, subtus albidus; capite griseo aut albido, taenia frontali nigra.

Lemur rufus. Geoffr. ann. XIX p. 160. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 271 tab. 39C. — V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 37. — Menag. at Knowsley-Hall. I tab. 3. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 72. — Audeb. Mak. p. 12 fig. 2.

Oben falb, unten weißlich, Kopf längs der Mittellinie ſchwarz, an den Seiten weiß oder graulich, Backenbart gelblich roth. Zweifelhafte Art, die vielleicht doch nur Abänderung des L. collaris ſeyn könnte.

9. L. albifrons Geoffr., der weißſtirnige Maki; fuscus, subtus dilutior; facie nigricante fascia alba cincta.

Lemur albifrons. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 271 tab. 39D. — Fr. Cuv. mammif. p. 215 tab. 77; fol. I. — Benn. zool. gard. p. 299 mit fig. — V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 36. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 72. — Blainv. ostéogr. Lemur tab. 7 fig. 1 (Schädel).

Größe und Geſtalt des L. collaris, von dem er ſich durch die weiße Geſichtsfarbe und den Mangel eines rothen Backenbarts unterſcheidet.

10. L. Mongoz Linn., der Mongus; supra canus, fulvido-lavatus, fronte nigra, genis albidis.

α. vellere supra subuniformi, subtus rutilo-albido.

Lemur Mongoz. Geoffr. ann. XIX p. 161. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 267 (theilw.). — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 73.

β. stethiaeo supra cano, uraeo fulvido-cano, gutture pectoreque albis, ventre rufescente, fascia transversali frontali nigra.

Lemur nigrifrons. Geoffr. ann. XIX p. 160. — V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 35 (theilw.). — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 73. — L. dubius. Fr. Cuv. mamm. fol. IV.

Is. Geoffroy ſieht dieſe zwei Varietäten für geſonderte Arten an, was ich indeß bezweifle, da es an Uebergängen nicht fehlt. Nach Is. Geoffroy iſt bei L. nigrifrons Kehle weiß, Bauch röthlichgrau; Vorderrücken, Hals, Schultern und Vorderglieder rein graugeſprenkelt, Mittelrücken, Kreuz und Schultern röthlichgrau; Raum zwiſchen Augen und Ohren ſchwarz. — L. Mongoz hat auf dem Scheitel eine ſchwarze Binde, die bald nur die Mitte, bald den ganzen Kopf einnimmt. Geoffroy unterſcheidet ihn von L. nigrifrons, der auch eine ſchwarze Binde hat, durch

seine einförmigere Färbung, die oben grau und röthlich gewässert, unten röthlichweiß ist, und durch einen braunen Flecken an der Schwanzwurzel, der jenem fehlt.

11. L. anjuanensis Geoffr., der anjoanische Maki; stethiaeo supra subtusque cano, uraeo ferrugineo.

Lemur anjuanensis. Geoffr. ann. XIX p. 161. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 73. — Peters Reise nach Mossamb. I S. 21.

Nach einem weiblichen Individuum von der Insel Anjoan durch Geoffroy den Vater aufgestellt, und als eigne Art von dessen Sohn anerkannt, hat letzterer dasselbe kurz charakterisirt als: „oben und unten bis zu den Schultern grau, am ganzen übrigen Körper oben und unten roth, Schwanz und Schenkel röthlich". Peters verschaffte sich während seines Aufenthalts auf gedachter Insel 2 Exemplare: ein ganz junges Männchen und ein älteres Weibchen. Ersteres ist grau, die zerstreut hervorstehenden langen Haare sind schwarz, der Kopf und Nacken rostfarbig angeflogen, die Schnautze schwärzlich, die ganze Unterseite weiß. Am Weibchen, welches die Farben entwickelter zeigt, ist Oberkopf, Nacken, Oberrücken, Schwanz und die Außenseite der Vorderglieder grau, der übrige Theil des Rückens bis zur Schwanzwurzel und die Hinterglieder graubraun; die Seiten des Gesichts, die Kehle, Brust und Innenseite der Vorderglieder weiß; der ganze Bauch bis zur Schwanzbasis rostbraun, die nackten Theile des Gesichts und die Hände schwarz. Die Länge dieses Exemplars beträgt 13", des Schwanzes 19". — Der Maki d'Anjuan Fr. Cuv. (erwähnt mammif. fol. I.) kann dagegen nicht hieher gehören, da er einen rothen Backenbart hat, der den von Geoffroy und Peters beschriebenen Exemplaren abgeht; er wird daher wohl an die Abänderungen des L. collaris sich anreihen.

12. L. rufifrons Benn., der rothstirnige Maki; cinereus, subtus rutilo-albus, artubus rutilo-lavatis, fronte rufa stria nigra a naso excurrente divisa.

Lemur rufifrons. Bennett, proceed. 1833 p. 106. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 269. — Fraser zool. typ. p. 6.

Unterscheidet sich von L. Mongoz hauptsächlich durch die rothe Stirnbinde und die beiden weißen Augenflecke über und unter jedem Auge.

13. L. coronatus Gray, der gekrönte Maki; cinereus, gastraeo artubusque pallidioribus, rutilo-lavatis; facie albida fascia rufa cincta; macula nigra supra frontem.

Lemur coronatus. Gray ann. X p. 257; zool. of the voy. of Sulphur I p. 15 tab. 4. — V. d. Hoeven tijdschr. XI p. 37. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 74.

Nach Gray ist der Rücken aschfarbig; die Haare sind vom Grunde grau, dann schwärzlich mit grauweißen Enden und kurzen schwarzen Spitzen. Die Gliedmassen sind röthlich gewässert, der Unterleib ist blaß röthlich aschfarbig. Das Gesicht ist weißlich; die Wangen und eine breite halbmondförmige Binde an jeder Seite der Stirne sind licht röthlich, in der Mitte des Scheitels findet sich ein großer schwarzer Fleck, der Schwanz ist dick und röthlich, aber die Haare, zumal gegen das Ende, haben schwarze Spitzen. Körper 1' 5", Schwanz 1' 10". — Is. Geoffroy erwähnt eines Albinos, der ganz weiß ist, mit der für die Art charakteristischen gelben Binde und einigen gelben Haaren hinter derselben und gegen die Mundwinkel.

14. L. chrysampyx Schuerm., der rothbindige Maki; „supra cano-nigrescens, tergo rufescente tincto, subtus albidus; fascia frontali utrinque superciliformi aureo-rufa; cauda gracili nigro-canescente." Sch.

Lemur chrysampyx. Schuermans bullet. de l'acad. de Bruxell. 1847. I p. 78; mém. cour. et mém. des savants etrang. publ. par l'acad. de Belg. XXII p. 1 mit Abbild. des Thiers und Schädels. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 74.

Schuermans, der diese Art nach einem Weibchen aufstellte, erkärte dieselbe als sehr ähnlich dem L. coronatus, insbesondere auch durch die goldrothen halbmondförmigen Binden über den Augen; er unterscheidet sie aber von letzterem durch den Mangel des schwarzen Fleckes auf dem Scheitel, ferner sind Vorderglieder und Unterleib nicht röthlich überlaufen, sondern erstere sind grau und letzterer ist weiß, die rothen Stirnbinden stoßen nicht zusammen und der Schwanz hat nichts Rothes, sondern ist grauschwarz. Die Länge beträgt 15" 4"', des Schwanzes 16". Von den 3 Exemplaren beiderlei Geschlechts, welche das pariser Museum aus Madagaskar erhielt, bemerkt Is. Geoffroy, daß sie sich vom L. coronatus, von dem gedachte Sammlung 6 Exemplare besitzt, durch den Mangel des schwarzen Scheitelflecks und die weiße Färbung der untern und äußern Theile unterscheiden.

XX. GALEOCEBUS. Frettmaki.

Cauda corpore brevior, rostrum abbreviatum, auriculae majusculae nudae rotundatae, dentes 36, ungues carinati.

Eine von Is. Geoffroy unter der Benennung Lepilemur neu aufgestellte Gattung, deren sprachwidrig gebildeten Namen ich in Galeocebus umgewandelt habe. Der Kopf ist conisch, aber kurz, die Ohren sind ziemlich groß, der Schwanz hält ⅔ von der Körperlänge, alle Nägel, mit Ausnahme der beiden ersten an den Hinterhänden, sind längs der Mittellinie mit einer Art Kiel versehen. Die obern Vorderzähne fehlen, selbst nicht Spuren ihres frühern Daseyns sind vorhanden, gehen also sehr frühzeitig verloren. Die Eckzähne sind sehr zusammengedrückt, innen gefurcht, hinten mit starkem Ansatz. Der dritte Backenzahn hält nach Form und Dimensionen das Mittel zwischen den vorhergehenden und folgenden; letztere sind dreihöckerig. Unten ist der erste Backenzahn sehr groß, zusammengedrückt, einer vierseitigen Platte ähnlich; die 5 andern sind wie auf sich selbst von innen nach außen gewunden, indem sie von einer kleinen schiefen Längsfurche ausgehöhlt sind. Von Madagaskar.

1. G. mustelinus Is. Geoffr., der rothe Frettmaki.
Lepilemur mustelinus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 76.

Der Körper ist 3½ Decim. (16¾″), der Schwanz 2½ Decim. (9½″) lang. Der Pelz ist roth, die Kehle weiß, Stirne und Wangen grau, untere und innere Theile gelblichgrau, letztes Drittel des Schwanzes braun, das Uebrige, die Hände und der Untertheil der Schienbeine gelblichgrau. Die Ohren sind in ihrer hintern und obern Parthie dunkel, das Uebrige ist hellfarbig, im Leben wahrscheinlich fleischfarbig. Eine spätere ausführliche Beschreibung ist von Is. Geoffroy zugesagt.

XXI. CHIROGALEUS. Katzenmaki.

Cauda longa villosa, rostrum abbreviatum, auriculae breves, dentes 36, spatium interorbitale nasusque convexa.

Eine Gattung, die bisher in großer Verwirrung war sowohl in Bezug auf ihre generischen Merkmale als auch in Unterscheidung ihrer Ar-

ten. Ueber erstere ist man jetzt im Klaren, nicht so über letztere. Mit Lemur stimmen die Katzenmakis hinsichtlich des langen Schwanzes, der kurzen rundlichen Ohren, des Zahnbaues und der Beschränkung der Zitzen auf 2 brustständige überein, unterscheiden sich aber durch die abgestumpfte Schnautze und die Wölbung der Vorderstirne und der Nase. Van der Hoeven hat sie nur als Unterabtheilung von Lemur betrachtet; bei der Anfüllung dieser Gattung mit Arten mag man aber immerhin die Katzenmakis von ihnen als gesondertes Genus aufstellen, das Is. Geoffroy abermals in 2 getheilt hat: Chirogaleus und Hapalemur, welch letzteren Namen man schon wegen seiner sprachwidrigen Bildung nicht zulassen könnte. Die nach Zeichnungen von Commerson durch Geoffroy aufgestellten 3 Arten: Ch. major, medius und minor, muß man außer Acht lassen, weil sie nicht sicher bestimmbar und unrichtig gezeichnet sind. Auch der Ch. Commersonii von Vigors und Horsfield fällt hinweg, weil dieser, nach Gray's Erklärung (ann. of. nat. hist. X. p. 256), auf einer Verwechslung mit Nyctipithecus felinus beruht. Die Katzenmakis sind von mittlerer oder geringer Größe, gehören Madagaskar an, und führen eine nächtliche Lebensweise.

†) auriculae pilosae, dentium primorum superiorum interior ante exteriorem positus. Hapalemur Is. Geoffr.

1. Ch. cinereus Geoffr., der graue Katzenmaki; flavido-cinereus, subtus albidus, cauda corporis longitudine.

Chirogaleus cinereus. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 276 tab. 40. C. — Ch. griseus. V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 30, 38 tab. 1 fig. 1 (Schädel und Gebiß). — Lemur cinereus. Geoffr. magaz. encycl. I p. 20. — L. griseus. Audeb. Maki p. 18 fig. 7. — P. Gervais dict. univ. III p. 440. — Hapalemur griseus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 75. — Petit Maki. Buff. supplem. VII tab. 84.

Der Körper mißt nach der Krümmung 14", der Schwanz 15". Ein jüngeres Exemplar von 10½" Körperlänge charakterisirt v. d. Hoeven als graubraun, auf dem Rücken mit etwas Roth gemengt, Schultern und Vorderfüße mehr blaulichgrau, Bauch grauweiß; Schädel kurz und rund mit gewölbten Nasenbeinen. — Nach Is. Geoffroy ist die Oberseite und Außenseite der Gliedmassen hellgelblichgrau; Ohren, Wangen,

Kehle, Bruſt und Innenſeite der Glieder weißlich, Bauch gelblich, Schwanz und Hände grau, mit Schwarz gewäſſert.

*Ch. olivaceus Is. Geoffr., der olivenfarbige Katzenmaki.

Hapalemur olivaceus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 75.

„Pelz länger, dichter, buſchiger als beim vorigen und olivenfarbig mit rothem Anflug; Kehle mehr grau als weiß und in einer geringern Ausdehnung, Wangen grau ſprenkelig; übrigens äußerlich dem vorigen ſehr verwandt." — Geoffroy iſt ſelbſt zweifelhaft über die Selbſtſtändigkeit dieſer Art.

††) auriculae nudae, dentes primores in eadem linea positi. — Chirogaleus Is. Geoffr.

2. Ch. Milii Geoffr., der kleine Katzenmaki; fulvido-cinereus, subtus albus, macula alba inter oculos, cauda corpore longiore.

Chirogaleus Milii. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 275. — V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 38. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 77. — Maki nain. fr. Cuv. mammif. fol. II; Myspithecus typus ed. 4°. tab. 83. — Lemur Milii. Blainv. ostéograph. Lemur tab. 7. fig. 3 (Schädel).

Der Körper iſt 7½", der Schwanz 11" 4"' lang. Verſchieden von Ch. cinereus durch geringere Größe, weißen Fleck zwiſchen den Augen, rein weißen Unterleib und verhältnißmäßig längeren Schwanz. Das pariſer Muſeum beſitzt beide Geſchlechter.

3. Ch. furcifer Blainv., der Gabelmaki; cinereus, stria dorsali nigra ad occiput bifurcata: ramis usque ad oculos prolongatis.

Chirogaleus furcifer. P. Gervais dict. univ. III p. 440. — Is. Geoffr. rev. zool. 1851 p. 23; catal. des Primat. p. 77. — Lemur furcifer. Blainv. ostéograph. Lemur. p. 35 tab. 7 (Schädel).

Zur Zeit nur noch nach dem einzigen weiblichen Exemplare des pariſer Muſeums bekannt. Etwas ſchlanker als der Ch. Milii. Der Pelz iſt wollig, weich und aſchgrau mit einigen falben Tönen; der Unterleib iſt lichter, die Pfoten ſind ſchwärzlich roth; eine ſchwärzliche Binde beginnt vom Kreuze, erweitert ſich etwas auf dem Rücken, ſpaltet ſich am Hinterhaupt und jeder Aſt läuft zum Auge, geht darüber und endigt ſich an der Schnauze. Das Uebrige des Geſichts iſt licht. Der Schwanz iſt in der erſten Hälfte von der Farbe des Körpers, in der zweiten wird er

ſchwarz. Die Größe iſt nicht angegeben, doch nach der Abbildung des Schädels zu ſchließen, kann ſie die des Ch. Milii nicht viel überſteigen.

†††) species sedis incertae.

4. Ch. typicus Smith, der bräunliche Katzenmaki.

Chirogaleus typicus. A. Smith, South. Afric. quart. journ. 1833 p. 50.

Nach Smith's Beſchreibung mißt der Körper 10½", der Schwanz 9". Gebiß und Habitus von Chirogaleus, doch der Nagel des Zeigfingers an allen Händen ſpitz und aufrecht. Oberſeite des Kopfs, Halſes und Vorderrückens ſind blaß röthlichbraun mit Silbergrau geſprenkelt; Hinterrücken, Seite, Außenſeite der Beine und Schwanz ſind aſchgrau. Die Unterſeite des Leibs und der Innenſeite der Beine nebſt einem ſchiefen Streif an jeder Halsſeite ſind weiß oder aſchweiß; Geſichtsſeiten und Augenkreiſe ſchwarz. Von Madagaskar.

5. Ch. Smithii Gray, der zierliche Katzenmaki.

Chirogaleus Smithii. Gray, ann. of. nat. hist. X p. 257.

Nach Gray's Beſchreibung: „blaß braun; Strich auf der Naſe und Stirne, Kinn und Unterſeite blaſſer, Schwanz röther. Dieſe Art differirt von Ch. typicus durch geringere Größe und verſchiedne Färbung, die graubraun iſt, Kopf mehr röthlichbraun, Augenkreiſe ſchwarz, Wangen und Unterſeite weiß."

XXII. STENOPS. Lori.

Cauda nulla aut subnulla, rostrum abbreviatum, oculi magni approximati, dentes 36.

Durch die Bemühungen der holländiſchen Zoologen iſt jetzt dieſe Gattung ſowohl bezüglich ihres äußern und innern Baues als der Feſtſtellung ihrer Arten vollſtändig gekannt. Dieſes erfreuliche Reſultat iſt herbeigeführt worden durch van der Hoeven (Tijdschr. VIII p. 337: Syſtematik), Schröder van der Kolk (ebenda S. 277, XI p. 123: Anatomie), Vrolik (nieuwe Verhandel. der I. Klasse van het K. Nederl. Instit. van Wetenschapp. te Amsterd. X p. 75: Anatomie) und Schröder v. d. Kolk und Vrolik [in den Bijdrag. tot de Dierkunde

II. 1851 p. 29: Anatomie). — Der Kopf ist rundlich mit kurzer Schnauze, die Augen sind einander sehr genähert, vorwärts gewendet und ungemein groß, die Ohren von mäßiger Größe, die Vorderglieder lang, so daß sie von den hintern nur wenig an Länge übertroffen werden; der Zeigefinger der Vorder- wie der Hinterhände ist sehr verkürzt. Zitzen finden sich 2 Paare: das obere gegen die Achselhöhle, das untere gegen den Nabel; jede Warze ist mit einer besondern Milchdrüse in Verbindung. Die Loris bewohnen Indien und den indischen Archipel.

†) cauda nulla, nasus acutissimus. — Loris Geoffr.

1. St. gracilis Geoffr., der schlanke Lori; rufescens, subtus canoalbidus, dentes incisivi superiores 4 aequales parvi.

St. gracilis. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 287 tab. 38, 38*. — V. d. Hoeven tijdschr. XI p. 39 tab. 1 fig. 4 (Schädel). — Loris gracilis. Geoffr. ann. XIX p. 163. — Blainv. ostéograph. Lemur tab. 7 fig. 5 (Schädel), tab. 11 (Zähne). — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 79. — Templeton ann. of nat. hist. XIV p. 362.

Gemein im Flachlande auf der Ost- und Westseite von Ceylon. Körper 7—8″. Der Oberschenkel ist sehr verlängert, so daß er fast der halben Rumpflänge gleichkommt, während er bei den beiden folgenden Arten kürzer als ein Drittel des Rumpfes ist.

††) tuberculum caudale brevissimum, nasus obtusus. — Nycticebus Geoffr.

2. St. tardigradus Linn., der indische Lori; cinereo-flavus, stria dorsali fusca, fronte fusca; stria alba inter oculos angusta, supra oculos evanescente; incisivis superioribus 4 externis minoribus.

Stenops tardigradus. Wagn. Schreb. Supplem. I S. 285 (zum Theil). — V. d. Hoev. tijdschr. VIII p. 337 tab. 6 fig. 3, 4 (Schädel), 8 (Kopf); XI p. 39. — Vorlik, nieuwe Verhandel. X tab. 1 fig. 1 (Kopf). — Blyth ann. of nat. hist. XV p. 461. — Cantor, journ. of the Asiat. soc. XV p. 177. — Horsf. catal. p. 23. — Nycticebus bengalensis. Geoffr. ann. XIX p. 164. — Lemur tardigradus. Blainv. ostéograph. Lemur tab. 2. (Skelet), tab. 11 (Zähne). — N. tardigradus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 78. — Poukan. Fr. Cuv. mammif. tab. 85; fol. II. — Abbild. von Bosmaer, Buffon (suppl. VII tab. 36), Audebert (Loris tab. 1).

Weit verbreitet: Siam, Tenasserim, Sylhet, Assam, Arracan, Ben-

galen (jedoch nicht in den untern Theilen); ferner auf Sumatra und Borneo. Körper 11 bis 13".

3. St. javanicus Geoffr., der javaniſche Lori; **cinereo-flavus, stria dorsali fusca; regione interorbitali et fronte albis; dentibus incisivis superioribus tantum.**

Stenops javanicus. V. d. Hoev. tijdschr. VIII p. 337 tab. 6 fig. 2 (Schädel), 5 (Kopf), 6, 7 (Vorder- und Hinterhand); tab. 7 (Skelet). — Nycticebus javanicus. Geoffr. ann. XIX p. 164. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 78. — St. tardigradus. S. Müller verhandel. I p. 18. — Loris Kukang. Schröder u. Vrolik a. a. O.

Auf Java als Erſatz des St. tardigradus, mit dem er in der Größe und dem äußeren Habitus übereinſtimmt, aber ſich ſtandhaft dadurch unterſcheidet, daß die kleinen obern ſeitlichen Schneidezähne ganz fehlen oder wenigſtens ſehr frühzeitig ausfallen, daß die Stirne, welche bei St. tardigradus braun iſt, von einem großen weißen rautenförmigen Fleck bedeckt wird, und daß bei St. javanicus die weiße, längs der Naſe hinziehende Binde, ſo wie der weiße Fleck jederſeits zwiſchen Aug und Ohr viel deutlicher ausgedrückt iſt.

XXIII. PERODICTICUS. Potto.

Cauda brevis, rostrum abbreviatum, auriculae breves rotundatae, index anterior brevissimus muticus.

Der Repräſentant der indiſchen Loris auf der Weſtküſte des tropiſchen Afrikas, von welchen er ſich hauptſächlich unterſcheidet durch den zwar nicht ſehr langen, aber doch deutlichen Schwanz und durch den völlig rudimentären Zeigefinger der Vorderhand, der nur einen nagelloſen Höcker vorſtellt. Die Verkrümmung des Zeigefingers, die ſchon bei den Loris eintritt, iſt beim Potto am weiteſten vorgeſchritten. Im Uebrigen kommt er nach ſeinem äußern Habitus, Zahnbau und Knochengerüſt mit den Loris überein, ſo daß er ſtreng genommen mit denſelben in einer Gattung zu verbinden wäre, und ſeine generiſche Abſonderung eigentlich mehr durch die Verſchiedenheit ſeines Wohnbezirkes gerechtfertigt iſt. Bennett's Angabe, als ob die Fußwurzel verlängert wäre, iſt nicht

richtig befunden worden. Um die genauere Kenntniß dieſes Thieres hat van der Hoeven[1]) das Hauptverdienſt.

1. P. Potto Linn. Gm., der Potto; castaneus, infra pallidior, pilis raris cinereis interjectis; vellere lanato.

Perodicticus Potto. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 289. — P. Geoffroyi. Bennett, proceed. of the zool. soc. I. p. 109. — V. d. Hoev. tijdschr. XI. p. 20, 41 tab. 1 fig. 3 (junger Schädel), tab. 2. (Thier); verhandel. Neederl. Instit. IV. 3 tab. 1 (Thier und Weichtheile), tab. 2 (Skelet und Gebiß des alten Thiers).

Ein höchſt ſeltenes Thier von Guinea und Sierra Leone. Der Körper iſt etwas über 9″, der Schwanz ohne Haare 1¾″ lang. Der Pelz iſt röthlichbraun, die Rückenhaare mit ſchwarzen Spitzen, der Bauch iſt mehr graulichgelb, die Iris braun.

b) Macrotarsi; tarsus elongatus, auriculae magnae.

XXIV. MICROCEBUS. Zwergmaki.

Auriculae majusculae, tarsi mediocriter elongati, cauda longa villosa, dentes 36.

Mittelform zwiſchen den Makis und Galagos, deren große Augen nicht ſo entfernt von einander abſtehen wie bei jenen, während Tarſus und Hinterbeine nicht ſo geſtreckt als bei letzteren, auch die Ohren nicht ſo außerordentlich entwickelt ſind als es meiſt bei den Galagos der Fall iſt. Die Unterſchiede der Zwergmakis von den genannten andern beiden Gattungen hat Peters ausführlich auseinandergeſetzt, namentlich auch ſehr genau die Beſchaffenheit des äußern und innern Baues, ſowie des Gebiſſes charakteriſirt. In letzterer Beziehung muß ich jedoch bemerken, daß wenn er die Zahnformel zu $\frac{2}{2}^2$ Schneidezähne, $\frac{1}{1}$ Eckzähne und $\frac{3}{3}$ Backenzähne angiebt, ich ſie dagegen am frankfurter Exemplare zu $\frac{3}{2}^2$, $\frac{1}{1}$, $\frac{3}{3}$ gefunden habe, ſo daß bei dem von Peters beſchriebenen Schädel der unterſte hinterſte Backenzahn abging. Die Weibchen

1) Vgl. ſeine treffliche Abhandlung in den Verhandel. der I. Klasse van het K. Nederl. Instit. IV. (1851).

haben 2 Paar Zitzen, wovon das eine an der Brust, das andere am Unterleib liegt. Diese Gattung ist mit ihren 2 Arten auf Madagaskar beschränkt[1]).

1. **M. murinus** Blainv., der falbe Zwergmaki; fulvus, subtus albus, auriculis longitudine capitis dimidii.

Microcebus murinus. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 278 tab. XL. D. — M. rufus. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 80; compt. rend. XXXIV p. 77. — M. pusillus. Peters Reise nach Mossamb. I. S. 18. — Lemur pusillus. Geoffr. mag. I p. 20. — Audeb. Mak. p. 19 fig. 8. — Microcèbe roux. Geoffr. cours 11° leç. p. 26. — Galago madagascariensis. Geoffr. ann. XIX p. 166. — V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 43. — Lemur murinus. Blainv. ostéogr. Lemur tab. 11. — Rat de Madagascar. Buff. suppl. III p. 149 tab. 20.

Obwohl dieser Zwergmaki seit älterer Zeit öfters von der Ostküste Madagaskars nach Europa gebracht worden ist, hat es doch lange gedauert, bis man aus der Verwirrung desselben mit Formen anderer Gattungen herauskam. Der Lemur murinus Penn., der als grau angegeben wird, kann nicht hieher gehören, ist übrigens zu ungenau charakterisirt, als daß er mit einiger Sicherheit bestimmt werden könnte.

2. **M. myoxinus** Pet., der Bilchmaki; fulvus, subtus albus, auriculis capite tertia parte brevioribus.

Microcebus myoxinus. Peters Reise nach Mossamb. I S. 14 tab. 3 (Thier), 4 fig. 6—9 (Schädel).

Die Entdeckung dieser Art verdanken wir Peters, der 3 Exemplare derselben von der Westküste Madagaskars erhielt und von ihr eine meisterhafte Schilderung lieferte. Der Kopf ist katzenartig rund, die Schnautze spitzig, die Ohren um ⅓ kürzer als ersterer, die Behaarung fein und wollig. Die ganze Oberseite ist goldig mit rostbraunem Anfluge, an den Seiten und an der Außenseite der Gliedmassen matter. Die ganze Unterseite nebst der Innenseite der Gliedmassen und den vier Händen ist schneeweiß, was scharf von der dunklen Farbe abschneidet. Vom vordern Augenwinkel zieht sich nach oben und unten ein schwarzbrauner

1) Als dritte Art dürfte vielleicht noch Gray's Chirogaleus minor hieher gehören.

Fleck am Auge hin; die Iris ist rothbraun, längs des Nasenrückens verläuft bis zur Stirn ein weißer Streif. Die nackten Theile der Lippen, Ohren, die Nasenkuppe und Fußsohlen sind fleischfarbig. Der Schwanz ist glänzend goldgelb mit rostrothem Anfluge, an der Unterseite heller. Die einzelnen Haare der Oberseite des Körpers sind bis über ⅔ blaugrau schieferfarbig, die aus dem Pelze hervorragenden längern Spitzen rostbraun; die weißen Haare sind nur an der Grenzlinie der falben und weißen Färbung an ihrer Basis schieferfarbig. Die Schwanzhaare sind einfarbig braungelb, die Spitzen der zerstreuten längeren Haare rostroth. Die Nägel sind weiß. Die hauptsächlichsten Dimensionsverhältnisse beider Arten sind nach Peters folgende.

	M. myoxinus		M. murinus	
Länge des Körpers	5″	2‴	5″	4‴
— „ Schwanzes	5	11		
— „ Kopfes	1	3		
— der Ohren	0	10½	0	7
— des Unterschenkels	1	3		
— des ganzen Hinterfußes	1	3	1	2½

Nach Vergleichung zweier, dem pariser Museum gehörigen Exemplare von M. murinus mit seinem M. myoxinus unterscheiden sich, wie Peters bemerkt, beide höchst nahe verwandte Arten durch folgende Merkmale. Die Ohren sind bei M. murinus viel kürzer, nicht einmal halb so lang als der Kopf, die Schnautze ist spitzig, die Finger und Zehen etwas länger, die Farbe dunkler, die des Schwanzes nicht merklich von der des Rückens verschieden, die Ohren innen stärker und rostfarbig behaart und die Bauchhaare in ihrer untern Hälfte sämmtlich blaugrau. Am Schädel ist der Schnautzentheil schmäler, der vorspringende Theil der Zwischenkiefer länger, der Winkel, in welchem sich die Stirnbeine zwischen die Scheitelbeine hineinschieben, viel stumpfer und die Oeffnungen im Gaumentheil des Oberkiefers sehr viel kleiner.

Peters hielt 2 Individuen seines M. myoxinus zwei Monate lang lebend. Den Tag über lagen sie aufgerollt und schliefen, aber gegen Abend wurden sie lebendig und sprangen in großen Sätzen umher. Sie zeigten keine Unruhe, wenn man sie anfaßte und fraßen ohne Scheu aus

der Hand die Nahrung: Zuckerwasser oder saftige Früchte, Aepfel und Bananen.

XXV. OTOLICNUS. Galago.

Auriculae amplae nudae, tarsi longissimi, cauda longa villosa, dentes 36.

Gleich dem Potto Bewohner des Festlandes von Afrika, doch findet sich eine Art auch auf der Insel Fernando Po im guineischen Meerbusen. Sie haben eine weite geographische Verbreitung, indem sie über den ganzen tropischen Bezirk dieses Welttheils angesiedelt sind. Die Weibchen haben 3 Paar Zitzen.

1. O. crassicaudatus Geoffr., der große Galago; ferrugineo aut fulvido-canus, subtus griseus aut flavido-albus, auriculis capite tertia parte brevioribus, cauda villosissima.

Otolicnus crassicaudatus. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 292. — V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 42. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 82. — Peters Reise nach Mossamb. I S. 5 tab. 2 (Thier), 4 fig. 1—5 (Schädel).

Lange Zeit kannte man von dieser Art nur das einzige Exemplar, das Geoffroy aus Lissabon mitgebracht hatte, dessen Heimath unbekannt war und über dessen Beschaffenheit nur einige dürftige Bemerkungen mitgetheilt wurden. Erst als ein zweites Exemplar an Sundevall gelangte, erfuhr man durch die Mittheilungen van der Hoeven's, daß dasselbe von der Ostküste Afrikas herstamme und man erhielt zugleich eine genauere Charakteristik. Vollständig aber wurde diese Art, sowohl nach ihrem äußern wie nach ihrem innern Baue, erst durch Peters Beschreibung bekannt, aus der Nachstehendes entlehnt ist.

Die Größe ist die eines Kaninchens, der Schwanz 3 bis 4" länger als der Körper. Die Schnautze ragt mehr hervor als bei den andern Galagos, die Ohren sind um ⅓ kürzer als der Kopf, elliptisch, außen an den Rändern und an den Vorsprüngen der Innenseite sparsam behaart. Der Pelz ist lang und wollig und die Haare des Schwanzes sind doppelt so lang als die des Körpers. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt. Der Oberkopf ist rostbraun, der Rücken grau mit starkem rost-

farbigen Anflug, die Leibesseiten und die Außenseite der Gliedmassen ebenfalls grau, aber mit schwächerem Anfluge. Die ganze Unterseite ist grau oder auch gelblichweiß. Der Schwanz ist rostfarbig, aber blasser. Die Hände sind rostbraun und die kurzen Haare der Finger sind schwarzbraun. Das Gesicht ist gelblichbraun, von der Stirne zieht sich über die Nase eine hellere Binde, die Iris ist braunroth, die nackten Theile der Nase und Ohren sind von brauner Hautfarbe. Die einzelnen Haare sind am Grunde schwarzgrau oder blaugrau, die Enden silbergrau, schwarz und braun geringelt; die des Bauches sind am Grunde grau, am Ende weiß, zum Theil auch ganz weiß. Dem Rücken sind viele längere Haare mit schwarzen Enden eingemengt. — Bei den jungen Thieren tritt die rostbraune Farbe mehr zurück und sie erscheinen daher überall grau, in einzelnen Fällen fast weiß.

Länge des Körpers	12″	0‴
— des Schwanzes	16	0
— des Kopfs bis zur Gegend zwischen den Ohren . .	2	11½
— des Ohres	2	0
— des Unterschenkels	3	6
— des Hinterfußes bis zum Ende der Mittelzehe . .	3	3

Bemerkenswerth ist es, daß Peters bei einem alten Thiere, ausser den 6 obern Backenzähnen, jederseits oben noch einen kleinen siebenten fand, so daß dadurch die Anzahl der Zähne auf 38 stieg.

Die Heimath ist die Südostküste Afrikas bis zum 24° s. Breite; im Innern kommt diese Art wenigstens noch in Machinga, ungefähr 140 Meilen von der Küste, vor. Als nächtliche Thiere halten sie sich bei Tage verborgen und lassen zur Nachtzeit zuweilen ihre durchdringende laute Stimme hören. In der Gefangenschaft zeigen sie sich sanft, aber wenig zutraulich; ihre Nahrung besteht in größeren Insekten und Früchten.

2. **O. Garnetti** Ogilb., der schwarzbraune Galago; totus fuscus.
Otolicnus Garnetti. Ogilb. proceed. 1838 p. 6.

Ogilby's ganze Beschreibung besteht in folgenden Worten: „Farbe allenthalben oben wie unten von einem einförmigen dunklen Braun,

Ohren groß, schwarz und merklich abgerundet, Schwanz lang, cylindrisch und wollig, Größe ohngefähr die eines kleinen Makis oder beträchtlich größer als O. senegalensis." Es ist zu bedauern, daß Ogilby die seltene Gelegenheit ein lebendes Thier vor sich zu haben, nicht besser benützt hat; nicht einmal die Heimath ist angegeben, gleichwohl scheint es eine eigne Art anzuzeigen.

3. **O. Galago** Schreb., der gemeine Galago; **canus, auriculis longitudine capitis, cauda brunneo-cana apice floccosa.**

Otolicnus Galago. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 292 tab. XXXVIII. B. — V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 41. — Galago senegalensis. Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 81. — O. senegalensis. Peters Reise nach Mossamb. I S. 11.

α. sennariensis.

O. Teng. Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842 p. 201. — Wagn. Wiegm. Archiv f. Naturgesch. 1844. 2. S. 153. — O. senegalensis. Rüpp. abyss. Wirbelth. I. S. 8.

β. senegalensis.

O. senegalensis. Geoffr. mag. enc. VII p. 20 fig. 1. — Fr. Cuv. mamm. fol. II. — Audeb. Maki p. 27 fig. 1.

γ. australis.

O. Moholi. A. Smith illustr. of the Zool. of South Afr. I tab. 8, 8bis. — Wagn. Wiegm. Archiv 1841. S. 20. — Peters a. a. O. tab. 4 fig. 10, 11 (Schädel).

Die am weitesten verbreitete Art, bekannt aus Sennaar, Kordofan, Senegambien, Mossambique (im Innern des Landes) bis zum 25° s. Breite in Südafrika. Der Körper mißt 7½", der Schwanz mit Haaren 10½". Meine schon früher ausgesprochene Meinung, daß zwischen O. Teng, senegalensis und Moholi keine specifische Verschiedenheit bestehe, hat seitdem weitere Bestätigung erlangt. Is. Geoffroy hat erklärt, daß er nach Vergleichung eines der typischen Exemplare von O. Moholi keinen Grund habe, dasselbe specifisch von den senegalischen oder nubischen Individuen zu trennen. Van der Hoeven fand ebenfalls die Exemplare von Rüppell in Uebereinstimmung mit der Beschreibung des O. senegalensis, und an einem Exemplare von Smith's G. Moholi sah er keinen andern Unterschied, als daß sich bei diesem ein brauner Fleck an den Augen und ein weißer, gegen die Stirne

sich ausbreitender Streifen auf der Nase zeigte; Merkmale, die ich auch bei Exemplaren aus Kordofan wahrnehme. Ganz neuerdings überzeugte sich auch Peters, daß zwischen den 3 genannten Nominalarten keine specifischen Unterschiede nachgewiesen werden können.

Die Färbung ist ähnlich der der Chinchilla, bald mehr bald weniger gelblich oder röthlich angeflogen; die Haare sind zweifarbig, doch ist am Bauche der untere schieferfarbige Theil nur sehr kurz. Die Schwanzhaare verlängern sich allmählig; der Schwanz ist bald mehr schwärzlich, bald mehr rostfarbig grau.

*O. conspicillatus Is. Geoffr.

Rev. zool. 1851 p. 24; catal. des Primat. p. 81.

Nach einem von Delgorgue aus Südafrika mitgebrachten Exemplare stellte Is. Geoffroy eine neue Art auf. „Aehnlich, aber doch sehr verschieden von G. senegalensis; ihre Ohren sind noch größer, der Schwanz roth und jedes Auge von einem schwarzen Fleck umgeben, der besonders an den Seiten der Nasenwurzel sehr markirt ist; der Raum zwischen den beiden schwarzen Flecken ist weiß." — Da diese Flecke auch in gleicher Deutlichkeit an Exemplaren aus dem Sennaar vorkommen, so muß ich zur Zeit diese neue Art beanstanden.

4. O. Alleni Waterh., der langfingerige Galago; saturatius coloratus, digitis longissimis.

Otolicnus Alleni. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 294. — V. d. Hoev. tijdschr. XI p. 42.

Von Fernando Po.

5. O. minor Gray, der kleine Galago; minor, pallide canus, dorso brunneo-lavatus; cauda elongata depressa angusta.

Galago minor. Gray ann. of nat. hist. X (1842) p. 257.

Gray's ganze Beschreibung lautet folgendermassen: „blaßgrau, Rücken merklich brauner überlaufen, unten weißlich, Schwanz lang, niedergedrückt, schmal. Bewohnt Madagaskar. Brit. Mus. Nur von der halben Größe des O. senegalensis".

Wenn die Angabe der Heimath dieses Exemplares richtig ist, so gehört es wohl nicht zu den Galagos, von deren Vorkommen auf Madagaskar nichts

bekannt geworden iſt, ſondern eher zu Microcebus. Vielleicht daß es einerlei iſt mit Lemur murinus von Pennant oder von J. F. Miller (various subjects of nat. hist. 1785 tab. 8.), der auch grau iſt.

6. O. Demidoffii Fisch., der rothe Galago, fulvus, auriculis capite brevioribus.

Galago Demidoffii. G. Fisch. mém. de Mosc. I. (1806) p. 24. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 292. — Is. Geoffr. catal. des Primat. p. 81.

Von dieſer bisher nur durch Fiſcher nothdürftig gekannten, höchſt ſeltenen Art hat das pariſer Muſeum im Jahre 1833 vom Gabonfluſſe in Oberguinea ein Exemplar erhalten, über das Iſ. Geoffroy folgende Bemerkung beibringt: „Von der Größe des Microcebus rufus und gleich ihm mit rothem Pelze, woher die von Schinz und andern Zoologen kommende Confuſion von beiden, obwohl generiſch verſchiedenen Arten. Wir meinen, daß dieſe Art den Typus einer neuen, das Mittelglied zwiſchen den Zwergmakis und den eigentlichen Galagos bildenden Gattung werden wird."

XXVI. TARSIUS. Tarſer.

Cauda longissima apice floccosa, auriculae amplae nudae, ungues digiti secundi et tertii podariorum subulatae verticales; dentes 34.

Ueber die Inſeln des indiſchen Archipels verbreitet, aber nicht auf dem Feſtlande. Die Zahnformel heißt: Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1:1}{1:1}$, Backenzähne $\frac{6:6}{6:6}$. Zitzen finden ſich 2 Paare: das obere faſt in der Achſelhöhle, das untere ſeitlich neben und etwas vor dem Nabel. Die Augen ſind außerordentlich groß. Daß an den Hinterhänden 2ter und 3ter Finger, ſtatt des Plattnagels, eine aufrechte ſpitze Kralle tragen, zeichnet die Tarſer vor allen andern Halbaffen aus, bei denen nur der hintere Zeigefinger mit einer ſolchen Kralle verſehen iſt. Ueber ihren innern und äußern Bau hat uns Burmeiſter[1]) wichtige Aufſchlüſſe ertheilt.

1. T. Spectrum Pall., das Koboldäffchen.

---

1) Beitr. z. nähern Kenntniß der Gattung Tarsius. Berlin 1846.

Tarsius Spectrum. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 297 tab. 38 E. — V. d. Hoev. tijdschr. XI. p. 45 tab. 1 fig 7, 8 (Schädel und Hirn). — Blainv. ostéograph. Lemur tab. 1 (Skelet), tab. 11 (Gebiß). — Burmeister a. a. O. — S. Müller verhandl. I. p. 19. — Horsf. catal. of the East Ind. mus. p. 25.

Auf den Inseln Sumatra, Banka, Borneo, Salayer, Celebes und den Philippinen aufgefunden. Die ganze Länge beträgt 13″, wovon der Schwanz 8½ einnimmt. Fiſcher unterſchied 3 Arten: T. Pallasii, Daubentonii und fuscomanus, die Geoffroy auf 2 reducirte, indem er die beiden erſteren unter dem Namen T. Spectrum zuſammenfaßte. Noch weiter gieng Temminck, indem er nur eine Art anerkannte und derſelben auch den T. Bancanus Horsf. als einjähriges Junges beifügte. Neuerdings will Burmeiſter nach den beiden Exemplaren, die er zur Unterſuchung vor ſich hatte, abermals 2 Arten wie Geoffroy unterſcheiden: 1) T. Spectrum, Rippenpaare 14, obere mittlere Schneidezähne aneinanderſtoßend, Pelz gelbbraun, auf dem Rücken rothbraun überlaufen, Scheitel und Nacken dunkelbraun, Schwanzſpitze gelblich; 2) T. Fischeri (T. fuscomanus Fisch.), Rippenpaare 13, obere mittlere Schneidezähne ſchon vom Grunde an divergirend, Pelz röthlich gelbgrau, Scheitel und Nacken braungrau, hinter dem Ohr ein heller gelblichweißer Fleck, Schwanzſpitze rothbraun. Ueber die Identität oder Verſchiedenheit dieſer Arten können erſt umfaſſendere Unterſuchungen an zahlreicheren Exemplaren und mit Berückſichtigung der Heimathsverhältniſſe entſcheiden.

II. Ordnung.

Zahnlücker. EDENTATA.

Bei dieser Ordnung können wir uns auf Zufügung einiger Nachträge beschränken, welche das Neue, was seit dem Jahre 1844, in welchem meine Monographie der Zahnlücker publicirt wurde, erschien, beibringen sollen. Hinsichtlich der anatomischen Verhältnisse kann ich mich ohnedies begnügen, einfach auf die ausgezeichnete Arbeit von W. von Rapp: „anatomische Untersuchungen über die Edentaten," welche im Jahre 1852 in einer zweiten vermehrten und verbesserten Auflage erschien, zu verweisen. Die Nachträge, die hier zur Vorlage kommen sollen, beschränken sich demnach auf die Charakteristik und Revision der seit dem Jahre 1844 neu aufgestellten Arten und zwar betreffen diese blos die Gattungen Bradypus, Dasypus und Manis.

I. BRADYPUS. Faulthier.

Sechs Jahre später als meine Auseinandersetzung der Faulthiere erschien eine neue von J. E. Gray, die mich zur Publication von „Bemerkungen über den dermaligen Stand unserer Kenntniß der Faulthier-Arten" veranlaßte [1]) und welche ich hier mit einigen Aenderungen und Zusätzen wiederholt vorlege.

Linné hatte unter den Faulthieren überhaupt nur 2 Arten unterschieden: den Bradypus didactylus und B. tridactylus. Auch Schreber folgte in dieser Beziehung ganz seinem Vorgänger, obwohl er bereits auf

1) Münchner gel. Anzeig. XXXI. [1850] S. 73; Archiv für Naturgesch. 1850. I. S. 376.

die großen Verschiedenheiten aufmerksam machte, die hinsichtlich der Färbung des B. tridactylus in den Angaben der Schriftsteller vorlagen. Seitdem man nun aber durch Bereisung der Heimathsländer der Faulthiere mit diesen sonderbaren Geschöpfen näher bekannt wurde und eine größere Menge von Individuen in unsere Sammlungen gelangten, kam man allmählig zur Ueberzeugung, daß allerdings der B. didactylus nur in dieser einzigen Art vorhanden sey, daß aber unter dem B. tridactylus mehrere Arten mit einander confundirt würden.

Die erste Abtrennung von B. tridactylus erfolgte mit dem B. torquatus III., und sie erlangte alsbald die allgemeine Zustimmung, da in der Form und Färbung der Haare zu große Differenzen sich ergaben, als daß man nicht darin die Berechtigung zur Aufstellung einer besondern Art hätte finden müssen. Diese Berechtigung würde noch evidenter hervorgetreten seyn, wenn man auch die auffallenden Eigenthümlichkeiten im Bau des Schädels hätte mit in Betracht ziehen können; durch eine fatale Verwechslung des letzteren mit dem anderer dreizehiger Faulthiere konnte jedoch dieses Merkmal nicht zu seiner Bedeutung gelangen. Die Verwechslung ergab sich aber in folgender Weise.

Prinz Maximilian von Neuwied hat uns zuerst aus Autopsie mit den im östlichen Brasilien lebenden Faulthieren bekannt gemacht, von denen er daselbst 2 Arten auffand, den B. torquatus und eine andere, die er als B. tridactylus Auct. bezeichnete. Seine Beschreibung beschränkte sich jedoch nur auf die äußere Beschaffenheit dieser Arten; die Beschreibung ihrer Schädel überließ er Oken. Dieser lieferte auch eine sehr ausführliche Beschreibung der Schädel von den beiden Arten mit genauen Abbildungen derselben, doch war es ein Uebelstand, daß der eine an der Grundfläche des Schädels stark beschädigt war und daher bei ihm die Beschaffenheit des Flügelfortsatzes des Keilbeins nicht erkannt werden konnte.

Nach diesen Vorlagen von Oken hat nun wohl Wagler[1]) in seinen „Mittheilungen über die Gattungen der Sippe Bradypus“ einen in unserer Sammlung vorgefundenen Schädel als den des B. torquatus bestimmt und als

1) Isis 1831. S. 608.

solchen mit seiner eigenen Handschrift etikettirt. Er bemerkt von eben diesem Schädel, daß er „durch den sehr auffallenden Stirnbuckel und durch eine, bei Pr. M. sehr richtig angedeutete Ausbuchtung auf jeder Seite des Stirnrandes auffallend sich charakterisirt."

Diesen Schädel und ein ausgestopftes Exemplar von B. torquatus fand ich vor, als ich mich vor sieben Jahren in meiner Fortsetzung von Schreber's Naturgeschichte der Säugthiere an die Bearbeitung dieser Art zu machen hatte. Bei der Charakteristik ihres Schädels hielt ich mich zunächst an das mir vorliegende, von Wagler etikettirte Exemplar, machte indeß gleich aufmerksam, daß es schon nicht recht mit dem von Oken abgebildeten zusammenstimmen, noch weniger aber auf die Beschreibung von Cuvier und Blainville passen wolle. Die von beiden Letzteren erwähnte blasige Auftreibung des Flügelfortsatzes des Keilbeins fand sich an dem mir vorliegenden Schädel eben so wenig vor, als umgekehrt bei jenen der Orbitalfortsatz des Stirnbeins, der, wie Wagler schon bemerkte, an seinem Exemplar deutlich ausgeprägt war. Ich wußte mir aus diesem Dilemma damals nicht anders zu helfen, als mit der Bemerkung, daß die in den Beschreibungen von Cuvier und Blainville vorkommenden Abweichungen „vielleicht" auf Rechnung des jüngern Zustandes ihrer Exemplare zu schieben seyen. Es konnte mir jedoch selbst nicht verborgen bleiben, daß hiemit der erwähnte Widerspruch keineswegs befriedigend gelöst sey, und um ins Reine hierüber zu kommen acquirirte ich 2 Exemplare von B. torquatus: eines in Weingeist aufbewahrt, das andere ein Fell mit wohl erhaltenem, nur am Hinterhaupte etwas beschädigten Schädel, den ich in meiner Gegenwart aus dem Balge herausnehmen ließ, um jeder Verwechslung vorzubeugen. Beide Exemplare rührten von vollständig erwachsenen Thieren her. Zu meinem Erstaunen ergab sich das Resultat, daß bisher in unserer Schädelsammlung der B. torquatus gar nicht repräsentirt war, daß der von Wagler mit diesem Namen bezeichnete Schädel nicht dieser, sondern einer andern dreyzehigen Art angehörte, daß ferner Oken sowohl in seinen Beschreibungen als Abbildungen den Schädel des B. torquatus mit dem des B. tridactylus Neuw. verwechselt und daß nur Cuvier und Blainville den rechten Schädel des B. torquatus vor sich gehabt hatten.

Von den eigenthümlichen Merkmalen desſelben werde ich nachher zu ſprechen Gelegenheit haben.

Die weitere Abtrennung neuer Arten von B. tridactylus Auct. nahm Wagler in ſeinen ſchon erwähnten Mittheilungen über die Gattungen der Sippe Bradypus vor. Er löste nämlich den Collectivbegriff B. tridactylus, aus dem ſchon früher der B. torquatus ausgeſchieden worden war, in 3 Arten auf, die er B. cuculliger, B. Ai und B. infuscatus benannte. Der B. Ai iſt ihm der B. tridactylus des Prinzen von Neuwied aus dem öſtlichen Braſilien; B. cuculliger iſt ihm das in Guiana einheimiſche und ſchon von ältern Autoren erwähnte dreyzehige Faulthier; der B. infuscatus aber eine bisher noch gar nicht erwähnte, durch Spix aus dem nordweſtlichen Braſilien mitgebrachte Species. Von dieſen 3 Arten gab Wagler ſehr genaue Beſchreibungen, die ſich bezüglich der beiden erſteren auch auf den Schädelbau erſtreckten.

Von dieſer vortrefflichen Arbeit hatte Blainville, obſchon ſie in einer der bekannteſten deutſchen Zeitſchriften erſchien, gar keine Kenntniß, als er im Jahre 1840 in ſeiner Ostéographie die Faulthiere behandelte, und er wußte ſich daher auch in der Unterſcheidung ihrer Arten nicht zurecht zu helfen, ſondern blieb in der alten Confuſion ſtecken; nur den B. torquatus rechtfertigte er nach den Merkmalen des Schädels als eigene Art. Anders Rapp in ſeiner werthvollen Monographie der Edentaten, der Wagler's Arbeit bey ſeiner Aufzählung der Arten von Bradypus zu Grunde legte und vom B. cuculliger eine ſchöne Abbildung des Schädels beyfügte. Von einer neuen Art, die Rüppell als B. gularis unterſcheiden wollte, wies ich bald darauf in meinem über das Jahr 1842 ſich erſtreckenden Jahresbericht im Wiegmann'ſchen Archiv nach, daß er identiſch mit Wagler's B. cuculliger ſey.

Dieſe Arbeiten bildeten die Vorlagen, die ich bey meiner Auseinanderſetzung der Faulthier-Arten im Schreber'ſchen Werke vorfand; ich hatte aber vor Wagler den Vortheil voraus, daß ich mit der Autopſie nicht bloß auf das in hieſiger Sammlung befindliche Material beſchränkt war, ſondern auch noch das von Natterer in Braſilien zuſammengebrachte dazu benützen konnte. So war es mir denn möglich, daß ich die beiden Arten von Wagler, den B. Ai und B. infuscatus, beſſer zu begründen

und auch einen Irrthum desselben hinsichtlich der Unterscheidung der beiden Geschlechter von B. cuculliger zu berichtigen vermochte.

Seitdem erschien keine weitere monographische Arbeit über die Faulthiere, bis eine solche vor Kurzem J. E. Gray*), Curator des brittischen Museums, vorlegte. Es ist ihm aber fast die ganze hieher einschlägige deutsche Literatur unbekannt geblieben, denn was Wagler, Rapp, v. Tschudi und ich hierüber gesagt haben, ist von ihm unbeachtet. Wir wollen daher zusehen, wie viel unter dem Neuen, das er uns ohne Rücksichtsnahme auf die deutschen Leistungen ankündigt, wirklich neu ist, und welcher Gewinn aus seiner Arbeit zur Unterscheidung der dreizehigen Faulthiere der Therologie zugegangen ist.

Zuvörderst theilt Gray die dreyzehigen Faulthiere in 2 Gattungen: Bradypus (mit B. torquatus) und Arctopithecus (mit B. tridactylus Neuw.), die man allerdings als Unterabtheilungen der Illiger'schen Gattung Bradypus, wenn gleich nicht mit besondern Namen, beibehalten kann.

Die Gattung Bradypus charakterisirt Gray hauptsächlich durch den oberhalb der Stirne abgeplatteten Schädel, keine oder sehr rudimentäre Zwischenkieferbeine, stark aufgetriebene und eine weite Höhlung einschließende Flügelfortsätze des Keilbeins. — Diese Merkmale sind richtig, mit Ausnahme des von dem Zwischenkiefer hergenommenen, indem dieser nur dann fehlt, wenn er durch unvorsichtiges Präpariren weggeschnitten worden ist. An dem Skelet unserer Sammlung von B. torquatus, das von einem sehr alten Thiere herrührt, sind sogar die Zwschenkieferbeine dermassen angeschwollen, daß sie mit den Oberkieferbeinen zusammenstoßen. Noch ist von unsern 2 Schädeln zu bemerken, daß alle Näthe verschwunden sind. Hieher gehört der von Oken unter dem Namen B. tridactylus beschriebene und abgebildete Schädel (Neuw. Beyträge II. tab. 5.), an dem zwar die Flügelfortsätze abgebrochen sind, gleichwohl ihre breite ausgehöhlte Basis noch deutlich zu erkennen ist. Hieher gehört ferner der von Blainville in der Ostéograph. Bradypus tab. 3 abgebildete Schädel. Der von

*) Ann. of nat. hist. sec. ser. V. (1850) p. 225; proceed. with illustr. 1849 p. 67. tab. 10, 11.

Wagler erwähnte Schädel dagegen ist nicht dieser Abtheilung, sondern der folgenden zuständig.

Bisher ist von der osteologischen Beschaffenheit des B. torquatus weiter nichts als die des Schädels und der Zahl der Halswirbel bekannt gewesen [1]), welche letztere bei 2 Exemplaren nur zu 8 aufgefunden worden sind. Bey unserm Skelete sind aber, wie es bei dieser Gattung die Regel ist, 9 Halswirbel vorhanden, von denen der letzte durch seine starken Anhängsel an den Querfortsätzen sich bemerkbar macht. Als Eigenthümlichkeit, die ich an keinem andern Faulthier-Skelete gesehen oder erwähnt gefunden habe, zeigt sich bey unserem Skelete des B. torquatus der innere Condylus des Oberarmbeines von einem sehr geräumigen Loche durchbohrt; ein Merkmal, das man demnach zur weiteren Unterscheidung dieser Abtheilung von der folgenden benützen kann.

Gray zertrennt den B. torquatus in 2 Arten, die er B. crinitus und B. affinis nennt; die neuen Namen sind jedoch so wenig stichhaltig als die Arten selbst. Er hat sich nämlich zur Namensänderung bewogen gefunden, weil er in Browne's Bradypus crinitus, palmis tridactylis den B. torquatus erkennen wollte, was mir jedoch sehr zweifelhaft erscheint. Den B. affinis hat Gray bloß auf einen Schädel begründet, der etwas schmäler ist als der von seinem B. crinitus; ein Umstand, der bey allen Wirbelthieren eintritt und daher völlig werthlos für specifische Unterscheidungen ist.

Die Gattung Arctopithecus charakterisirt Gray durch folgende Merkmale: Schädel über der Stirne abgerundet; Flügelfortsätze zusammengedrückt, gerade, dünn, einfach; keine Zwischenkiefer; Unterkiefer am obern Rande zwischen den Zähnen nicht vorgezogen, aber vorn am Kinn schwach gekielt; Gesicht mit schwarzem Strich vom hintern Augenwinkel. — Unter diesen Merkmalen ist das hauptsächlichste das, welches von der Form des Flügelfortsatzes hergenommen ist, nächst dem kommt das von der Wöl-

---

1) Ich habe hier einen Schreibfehler in meiner Fortsetzung von Schreber's Säugth. Suppl. IV. S. 133 letzte Zeile zu berichtigen, wo statt torquatus zu lesen ist cucullger.

bung des Vorderschädels; dagegen beruht der Mangel des Zwischenkiefers lediglich auf sorgloser Behandlung des Schädels, indem dieser Knochen bei allen sorgfältig behandelten Schädeln dieser Abtheilung vorhanden ist. Die zwey zuletzt aufgeführten Merkmale sind keineswegs allgemeine, wie dieß gleich nachher erwiesen werden wird.

Gray bringt die Arten von Arctopithecus in 2 Unterabtheilungen: a) Pelz mäßig rigid, Rücken weiß gefleckt, Rückenstreif lang; hieher gehören: A. gularis Rüpp., A. marmoratus n. sp. und A. Blainvillei n. sp.; b) Pelz lang, sehr schlaff, weißlich, Rückenstreif sehr kurz, undeutlich und nur nach Abnützung der Haare sichtlich; hieher A. flaccidus = B. tridactylus Neuw. und A. problematicus n. sp. Somit wären in dieser Gattung den Faulthieren 3 neue Arten zugewiesen, deren Stichhaltigkeit nunmehr von uns geprüft werden soll.

Seinen A. gularis charakterisirt Gray als dunkel graubraun, Rücken weiß gescheckt mit langen weißen Streifen und breitem Fleck von weichen gelben Haaren jederseits zwischen den Schultern; Schädel mit breiter Stirne und stark gewölbt über dem Hintertheil der Augenhöhlen; Unterkiefer mit dünnem und spitz verlängertem Winkel und flachem, auf der Sutur nicht gekielten Kinntheil. — Gray hält diese Art für identisch mit Rüppell's B. gularis, worin er jedoch fehl gegriffen hat, denn 1) zeichnet sich dieser nicht wie der A. gularis durch dunkle Färbung aus, sondern ist ziemlich licht, 2) fehlt jenem der schwarze Strich hinter den Augen ganz, der bey dem Gray'schen A. gularis vorkommt, 3) giebt schon Rapp's Abbildung des Schädels von B. gularis zu erkennen, daß der Unterkiefer des letzteren am Kinntheil nicht platt, sondern in eine schnabelartige Spitze vorgezogen ist, was ich an meinen beyden Exemplaren bestätigen kann, und 4) ist es nicht wahrscheinlich, daß Gray's A. gularis, als aus Bolivia abstammend, einerley ist mit Rüppell's B. gularis, der in Guiana zu Hause ist. Was ist nun aber wohl jene Art? Ich glaube nicht zu irren, wenn ich darauf zur Antwort gebe, daß sie der von Wagler und mir beschriebene B. infuscatus, und zwar das männliche Geschlecht ist. Auf diesen paßt die ganze Beschreibung der Färbung und die Angabe des Wohnorts, denn da Spix und Natterer den B. infuscatus im nordwestlichen Brasilien gefunden haben, Tschudi aber dessen

Fauna Peruana freylich Gray ebenfalls ignorirt, ihn häufig in Peru gesehen hat, so läßt sich nicht zweifeln, daß er auch im angrenzenden Bolivia sich noch einstellt. Ueber die Beschaffenheit des Schädels von B. infuscatus kann ich nichts sagen, da mir ein solcher fehlt; dagegen kann ich aus Autopsie behaupten, daß Gray's Beschreibung des Schädels von seinem A. gularis nicht auf Rüppell's B. gularis (= B. cuculliger Wagl.) paßt.

Den A. marmoratus bezeichnet Gray ebenfalls als einförmig dunkel graubraun, auf dem Rücken und den Armen weiß gescheckt; der Unterkiefer hat einen langen und zugespitzten Winkel und sein Vordertheil ist am ältern Exemplare sehr vorspringend, am jüngern dagegen abgestutzt wie bey A. gularis. Gray macht selbst bemerklich, daß Bridges diesen A. marmoratus nur für das Weibchen von A. gularis erklärt und dieß ist auch in der That der Fall, wobei jedoch Gray wahrscheinlich die Weibchen des B. cuculliger (B. gularis) und B. infuscatus miteinander vermengt, wie dieß aus seiner Angabe von der verschiednen Beschaffenheit des Unterkiefers, so wie aus seinem Citat von Blainville's B. tridactylus guianensis (Ostéograph. tab. 3) hervorgeht, denn dieser Schädel gehört nach seiner Heimath und der vorspringenden Spitze des Unterkiefers nicht dem B. infuscatus (Gray's A. gularis), sondern unserem B. cuculliger an. Der jüngere Schädel, dessen Gray gedenkt, dürfte dagegen von B. infuscatus herrühren.

Mit seinem A. Blainvillei geht es Gray ganz eigenthümlich; denn, wie er selbst erklärt, lassen sich die 3 Exemplare, die ihm davon vorliegen, durch äußerliche Merkmale schlechterdings nicht von A. marmoratus unterscheiden; die Differenzen sind nur am Schädel wahrzunehmen, dessen Stirne stärker gewölbt und der Winkel schwächer ausgezogen ist. Zwei von den Unterkiefern haben auch einen deutlichen Kiel auf der Symphyse. Gray ist übrigens selbst bedenklich, ob diese Differenzen zu einer specifischen Trennung ausreichend sind, und ich theile nicht bloß dieses Bedenken, sondern kann mich auch durchaus nicht zu der Annahme verstehen, daß 2 wirkliche Arten in den äußerlichen Merkmalen gar keine Differenz sollten wahrnehmen lassen. Ueberdieß sind die Differenzen, die Gray vom Schädelbau angibt, gerade solche, die am ersten vom Alter

oder auch nur von der Individualität herrühren, wie dieß unsere Sammlung sattsam ausweist. Zu seinem A. Blainvillei citirt Gray Blainville's Abbildung von dessen B. trydactylus brasiliensis; ich möchte diese aber eher auf meinen B. pallidus beziehen.

Gray's A. flaccidus ist, wie er selbst erklärt, identisch mit des Prinzen von Neuwied B. tridactylus, aus dem Wagler seinen B. Ai gemacht hat; eine Name, der, weil er sowohl von dieser Art als von B. cuculliger gebraucht wird, von mir in B. pallidus umgewandelt wurde. Die Var. 1, die Gray hierzu zählt, könnte ihrer Färbung wie ihrer Heimath (Venezuela) wegen auf eine besondere Art schließen lassen. Ich reihe hieran noch folgende Bemerkungen über den Schädelbau von B. pallidus.

Wagler hat schon a. a. O. auf die Eigenthümlichkeiten desselben aufmerksam gemacht, und insbesondere die Wölbung der Stirnbeine und die Höhe des horizontalen Astes des Unterkiefers mit breitem, gerad aufsteigendem Vordertheile ohne zungenförmige Spitze hervorgehoben. Ueber die Form der Nasenbeine hat er nichts gesagt, obgleich hier Differenzen vorkommen, die Gray wahrscheinlich bestimmt haben würden, darnach 2 Arten zu errichten. Bei dem Exemplare nämlich, das Wagler zur Beschreibung auswählte, greifen die breiten, nach hinten erweiterten Nasenbeine mit einer ziemlich weit geöffneten Spitze in die Stirnbeine ein; bei einem andern Schädel von dieser Art, an dem zugleich längs der Symphyse des Unterkiefers ein Kiel aufsteigt, der oben einen schwachen spitzen Vorsprung bildet, sind umgekehrt die Nasenbeine an ihrer hinteren Grenze etwas ausgeschnitten und die Stirnbeine greifen mit ihrer Spitze in diesen Einschnitt ein. Den Grund dieser Differenz glaube ich aber nachweisen zu können. Ich habe nämlich ein ganz junges, in Branntwein aufbewahrtes Exemplar von B. pallidus skeletiren und den Balg ausstopfen lassen. Am Schädel desselben findet sich zwischen den Stirn- und Nasenbeinen ein länglich-ovales und an beyden Enden zugespitztes Zwickelbeinchen eingeschoben, von dem man an ältern Individuen keine Spur mehr wahrnimmt. Die Verwachsung desselben mag nun wohl auf zweierlei Art vor sich gehen: verschmilzt es mit den Nasenbeinen, so spitzen sich diese hinten bachig zu und greifen demnach in die Stirnbeine ein; verschmilzt es dagegen mit den Stirnbeinen, so greifen diese in den Aus-

ſchnitt der Naſenbeine ein. Die Form des Hinterrandes der Naſenbeine iſt demnach eine veränderliche und darf nicht zur ſpecifiſchen Sonderung verleiten.

Noch will ich Einiges über die Abbildungen ſagen, welche den Schädel des B. pallidus darſtellen mögen. Zuvörderſt gehört hieher die Abbildung in des Prinz von Neuwied's Beiträgen tab. 4., welcher Oken irrig den Namen B. torquatus beigeſchrieben hat. Eben ſo mag die Abbildung, welche Wiedemann in ſeinem Archiv für Zoolog. I. tab. 1. lieferte, von dieſer Art entnommen ſeyn. Auch bin ich nicht zweifelhaft, daß Blainville's B. tridactylus brasiliensis auf dieſe Art, nicht auf B. infuscatus, zu beziehen iſt. Endlich ſcheinen auch noch wohl Cuvier's Abbildungen in den Rech. V. 1. tab. 5. fig. 1 — 3 nach dieſer Art gefertigt worden zu ſeyn.

Die letzte Art, welche Gray aufſtellt, hat von ihm den ſehr bezeichnenden Namen Arctopithecus problematicus erhalten, ein Name, den er auch noch andern Arten hätte beilegen dürfen. Sie iſt bloß auf einen Schädel begründet, den er von Para bekommen. Er unterſcheidet dieſen Schädel von den 2 Schädeln des A. flaccidus dadurch, daß längs der Symphyſe des Unterkiefers ein Kiel aufſteigt, wodurch der obere Rand einen winkeligen Vorſprung bildet, und daß der Winkel hinterwärts viel weiter verlängert und aufwärts gebogen iſt. Ich ſehe hierin weiter nichts als eine leichte Differenz, die recht wohl noch in den Kreis der Schädelabänderungen des B. pallidus fallen kann, wie ich denn ſelbſt noch andere Abweichungen kenne, die ich hier indeß nicht weiter zur Sprache bringen will.

Soll ich nun ein Urtheil fällen über den Werth der von Gray hier beſprochenen Monographie der Faulthiere, ſo ergiebt ſich aus dem Vorſtehenden wohl von ſelbſt, daß ſie die Kenntniß und Unterſcheidung der Arten nicht nur nicht gefördert, ſondern daß ſie theilweiſe gut begründete Species verwirrt und 4 nicht haltbare Arten dagegen zugefügt hat. Vor dieſen Irrthümern wäre Gray größtentheils bewahrt geblieben, wenn er die deutſchen Leiſtungen benützt hätte. Er würde dann geſehen haben, daß ſein A. gularis nicht Rüppell's B. gularis iſt; er würde dann auch nicht die Männchen und Weibchen ſeiner erſten Abtheilung von Arctopithecus in verſchiedene Arten geſondert haben; er wäre überhaupt darauf

aufmerksam gemacht worden, ob nicht gerade diese Abtheilung an zwei durch uns wohl unterschiedene Arten (den B. infuscatus und cuculliger) zu vertheilen gewesen wäre: er würde endlich den Mangel des Zwischenkiefers nicht unter die generischen Merkmale aufgenommen und uns mit dem neuen Namen B. flaccidus verschont haben, da für diese Art bereits 2 ältere Namen, B. Ai von Wagler und B. pallidus von mir, zur Auswahl vorlagen.

Zum Schluße habe ich noch einige Bemerkungen über B. cuculliger und B. infuscatus beizufügen. Vom Knochengerüste des ersteren hatte ich, als ich meine Monographie der Faulthiere abfaßte, nichts weiter vorgefunden als das von Wagler erwähnte Skelet eines mittelwüchsigen Thieres. Seitdem habe ich von Dr. Krauß in Stuttgart, der von dieser Art aus Surinam eine große Anzahl Exemplare bekommen hat, ein erwachsenes Weibchen im Balg erhalten, den ich ausstopfen und den Schädel herausnehmen ließ. Der Schädel dieses erwachsenen Thieres bietet aber auffallende Differenzen von dem des halbwüchsigen dar, so daß ich, ohne Waglers Angabe vor mir zu haben, nicht gewagt hätte, beide einer und derselben Art zuzuschreiben. Um nur das Hauptsächlichste zu erwähnen, so hat zwar auch der Unterkiefer am Vorderrande die zungenförmige Verlängerung, aber das Schädeldach ist ganz flach, der Gesichtstheil weit mehr verschmälert und die Nasenbeine greifen mit einer ziemlich ausgezogenen Spitze in die Stirnbeine ein, während sie beim erwachsenen Thiere mit einem breiten, horizontalen, in der Mitte nur wenig vorgezogenen Rande an letztere sich anschließen. Diese Verschiedenheit kann übrigens von derselben Ursache herrühren, wie ich sie beim B. pallidus erklärt habe. Da in dem von Stuttgart erhaltenen Balge noch die Armknochen sich vorfanden, so kann ich die Bemerkung beifügen, daß wie am Skelete des jüngern Thieres das Oberarmbein am innern Condylus eben so wenig als bei B. pallidus durchbohrt ist.

Die beste Abbildung vom Schädel des B. cuculliger hat Rapp geliefert; Blainville's Abbildung des B. tridactylus guianensis (Ostéograph. tab. 3) ist ebenfalls von jenem entnommen. Dagegen hat sich Wagler geirrt, wenn er meint, daß die in den Beiträgen des Prinzen von Neuwied auf tab. 5 gelieferten und mit dem Namen B. tridacty-

lus bezeichneten Schädelabbildungen auf den B. euculliger zu beziehen sind. Ich habe schon vorhin nachgewiesen, daß dieser angebliche B. tridactylus der B. torquatus ist, und da dieser am Vorderrand des Unterkiefers ebenfalls wie der B. cuculliger eine zungenförmige Verlängerung hat, so ist hiedurch Wagler in Irrthum geführt worden.

Vom B. infuscatus habe ich bisher keinen Schädel besichtigen können, wenn aber, wie es höchst wahrscheinlich ist, Gray's A. gularis mit selbigem identisch ist, so würde sich jener von B. cuculliger durch den Mangel der zungenförmigen Verlängerung am Vorderrande des Unterkiefers unterscheiden. — Bei weiterer Untersuchung der von mir unter B. infuscatus zusammengefaßten 3 Varietäten möchte es sich wohl herausstellen, daß nur die erste und dritte diese Art constituiren, während die zweite Varietät als eigenthümliche Art sich rechtfertigen dürfte, die man mit dem Namen B. brachydactylus bezeichnen könnte [1]).

II. DASYPUS. Gürtelthier.

Außer etlichen Bemerkungen, die über einige der bereits bekannten Arten beizubringen sind, ist hauptsächlich der von Is. Geoffroy gelieferte Nachweis, daß unter dem Namen Dasypus tricinctus bisher zwei ganz verschiedne Arten begriffen wurden, in Berücksichtigung zu nehmen, wonach auch das Schema für die 5 Untergattungen von Dasypus in folgender Weise modificirt werden muß.

a) Pedes anteriores 5—dactyli, zonae 6—13.

I. Choloniscus.
1. D. gigas.

II. Xenurus.
2. D. gymnurus.

III. Euphractus.
3. D. setosus.
4. D. villosus.

---

1) Ueber B. infuscatus und torquatus theilte v. Tschudi (Faun. peruan. I. S. 202) werthvolle Aufschlüsse über ihre Lebensweise mit, zugleich mit sehr interessanten Auszügen aus v. Humboldt's zoologischen Manuskripten über denselben Gegenstand.

5. D. minutus.

b) Pedes anteriores 5- aut 4-dactyli, zonae 3.

IV. Tolypeutes.

6. D. tricinctus.

7. D. conurus.

c) Pedes anteriores 4-dactyli, zonae 6—9.

V. Dasypus.

8. D. novemcinctus.

9. D. uroceras.

10. D. hybridus.

1. D. gigas Cuv., das große Gürtelthier.

Eine schöne Abbildung des Skeletes dieser Art lieferte W. v. Rapp in der zweiten Auflage seiner Edentaten tab. IV^b, und eine Abbildung des Thieres Krauß in seinem Thierreich in Bildern. I. Säugth. t. 24 fig. 3.

Die Zahl der Zähne fand Rapp an 3 Schädeln in folgender Weise:

I.	oben	auf einer	Seite	18,	auf der	andern	17	}	zusammen
	unten	„	„	18,	„	„	21	}	74.
II.	oben	„	„	15,	„	„	17	}	71.
	unten	„	„	19,	„	„	20	}	
III.	oben	„	„	15,	„	„	15	}	65.
	unten	„	„	18,	„	„	17	}	

Krauß giebt an einem Schädel jederseits oben 18, unten 20, im Ganzen 76 Zähne an. — Natterer zählte an einem Schädel:

oben	rechts	20,	links	19	} 78 Zähne.
unten	„	21,	„	18	}

Den Magen fand Natterer bei einem erwachsenen Thiere, das er öffnete, voll von Ameiseneiern und Ameisen.

2. D. gymnurus Ill., das nacktschwänzige Gürtelthier.

Var. α) cauda tuberculis discretis obsita.

Dasypus verrucosus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 172.

Var. β) cauda nuda, apice subtus scutellata.

Dasypus gymnurus Ill.

Var. γ) cauda nuda, basi supra nec non apice subtus scutellata.

Dasypus loricatus Natt. in mscrpt.

Zu den beiden von mir schon früher angeführten Varietäten (α und β)

kommt nun noch eine dritte (γ) hinzu, denen vielleicht der Werth selbstständiger Arten beizulegen seyn dürfte.

Die Varietät α (Buffons Kabassu, D. verrucosus nob.) zeichnet sich durch den ganz nackten, nur mit Warzen besetzten Schwanz aus und ist lediglich aus dem nordöstlichen Südamerika (Guiana) bekannt. Auch das von Rapp untersuchte Thier, dessen „Schwanz überall mit glatten, flachen, elliptischen zerstreuten Warzen oder Knorpelscheibchen versehen ist", wurde von dorther, nämlich von Surinam, geschickt; seine Länge beträgt ohne den Schwanz 14½ Zoll.

Die Varietät β ist diejenige, welche am weitesten verbreitet ist, indem sie in Paraguay und im südlichen und mittleren Brasilien von der Ostküste an bis hinüber zur Westküste in Peru (nach Tschudi) gefunden wird. Bei ihr ist der Schwanz nackt, runzelig und nur unterhalb der Spitze mit rundlichen Schildchen besetzt. Vollständig erwachsene Exemplare erreichen nach Natterer eine Körperlänge von 20—23" rheinl., wozu noch 7½ bis 7¾" für den Schwanz kommen; die großen gekerbten Ohren sind 2" lang und 1¾" breit. In dem Magen mehrerer Individuen, die er öffnete, fand er Mäuse und Ameisen.

Die Varietät γ hat Natterer in seinen schriftlichen Notizen unter dem Namen D. loricatus als eigne Art unterschieden. Wie er bemerkt, ist sie dem D. gymnurus sehr ähnlich, jedoch viel kleiner. Im Nacken finden sich 2 Reihen Schilder, wovon die erste 3, die zweite 6 große viereckige flache Schilder enthält. Die erste Reihe am Rücken ist kurz und besteht aus 8 größeren Schildern, die auf beiden Seiten kleiner werden. Im Ganzen ist der Rumpf von 28 Querreihen Schilder, oder mit der halben am Anfange des Rückens mit 29 bedeckt, wovon 12 bewegliche Gürtel zu seyn scheinen. Die Zwischenräume sind mit wenigen steifen Haaren besetzt, so wie die der Schilder auf den Füßen. Die Krallen und Zehen sind wie bei D. gymnurus beschaffen. Der ganze Unterleib ist mit weit abstehenden runden Schilderchen versehen, an deren hinterem Rande einige Haare stehen. Die obere Seite des Schwanzes ist bis über die Hälfte mit solchen Schilderchen besetzt, die Spitze des Schwanzes aber auf der untern Seite. Länge des Körpers

14", Schwanz 5", Ohren 10'''. Von diesem D. loricatus finde ich in Natterer's Notizen nur ein Exemplar aufgeführt, während er von dem eigentlichen D. gymnurus (var. β) viele angiebt.

3. D. minutus Desm., der Pichiy.

Von dieser Art ist unserer Sammlung ein aus Patagonien herstammendes Exemplar zugekommen, das die Richtigkeit der früheren Beschreibungen bestätigt. Bemerkenswerth ist die sehr dünne, aber ziemlich lange und spitze Kralle, welche den Daumen der Vorderfüße bekleidet, während die andern 4 Krallen sehr plump sind. An unserem Exemplare mißt der Körper 9½", der Schwanz fast 4", die Daumenkralle 5½'''. Natterer hat weder diesen D. minutus noch den nahe verwandten D. villosus in Brasilien gefunden, wenigstens sind beide in seinen Notizen nicht aufgeführt.

4. D. tricinctus Linn., der fünfzehige Rolltatu; zonis 3 mobilibus, cauda brevissima depressa, pedibus anterioribus 5-dactylis.

Dasypus tricinctus Linn. Schreb. tab. LXXI. A. (fig. Seb.). — Cuv. règn. anim. I. p. 288. — Apar type. Is. Geoffr. rev. zool. 1847 p. 135. — Apar. Buff. X. p. 206.

Is. Geoffroy hat zuerst aufmerksam gemacht, daß unter dem Namen D. tricinctus 2 verschiedene Arten vermengt sind, auch daß noch überdieß alle bisherigen Abbildungen und die meisten Beschreibungen auf ein Individuum begründet wurden, das aus 2 verschiedenen Arten künstlich zusammengesetzt war. Das im pariser Museum seit mehr als einem Jahrhundert befindliche Exemplar ist nämlich dasselbe, welches zu den Abbildungen von Seba, Schreber, Cuvier und den Neueren gedient hat. Is. Geoffroy hat nun aber gefunden, daß dieses Individuum zusammengesetzt ist aus der obern Hälfte eines wirklichen D. tricinctus, die jedoch unter dem Panzerrande auf der untern Hälfte eines D. novemcinctus aufruht, woher denn die angebliche Uebereinstimmung im Fußbaue dieser beiden Arten rührt, nach welcher Cuvier und alle Neueren beide Species in eine Abtheilung zusammenstellten. Es hat sich aber dabei weiter gezeigt, daß die beiden Arten, welche bisher als D. tricinctus confundirt wurden, schon in der Zehenzahl der Vorderfüße von einander abweichen, wozu noch andere Differenzen kommen.

Den ächten Dasypus tricinctus charakterisirt Is. Geoffroy in folgender Weise. „Panzer gelblich, jedes Schildchen durch eine tiefe Furche umschrieben. Der Kopfpanzer, in dessen mittlerem Theile mehrere Schilder paarweise gestellt sind, bedeckt, außer der Oberfläche des Kopfs, einen dreieckigen Raum zwischen Aug und Ohr. An den Vorder-, wie an den Hinterfüßen 5 Zehen; die innere Zehe mit einem länglichen Nagel, die äußere rudimentär, aber sehr bezeichnet durch einen breiten, dreieckigen, ziemlich entwickelten Nagel. Haare der Unterseite weißlich; Schwanz sehr kurz, abgeplattet, dreieckig. — Breite an der Basis 4 Centimetres; Länge 5 Cent., 50. Bewohnt Brasilien."

Von dieser Art hat unsere Sammlung seitdem auch ein vollständiges Exemplar erhalten, das in allen Stücken mit obiger Beschreibung übereinkommt. Die Vorderfüße sind fünfzehig. Die Kralle der 3. Zehe ist die größte und stärkste, ragt aber doch nicht weiter vor als die zweite ebenfalls sehr starke, weil bei letzterer die Zehe um eben so viel verlängert ist, als der Kralle an Länge abgeht. Die 1. und 4. Kralle ragen wieder ziemlich gleich weit hervor, indeß ist die erste nur kurz, dünn und halbwalzenförmig, die vierte Kralle dagegen ist stark und dreiseitig. Sehr weit zurückgestellt ist die äußerste oder 5. Kralle und dabei kurz, aber breit und dreieckig. Von diesem Exemplare sind folgende Dimensionen gemessen.

Körper nach der Rückenlinie	12″	0‴
Schwanz	1	9
Ohren	1	0
1ste Kralle des Vorderfußes	0	3
2te „ „ „	0	5½
3te „ „ „	0	10
4te „ „ „	0	6
5te „ „ „	0	2½

Das fünfzehige Rollgürtelthier ist bisher aus der südlichen Hälfte von Südamerika nicht bekannt geworden, so daß es mehr dessen nördlicher Hälfte anzugehören scheint; wenigstens wird das von Markgrav als für fünfzehig angegebene Rollgürtelthier aus dem nordöstlichen Brasilien herstammen.

5. D. conurus Js. Geoffr., der dreizehige Rolltatu; zonis 3 mobilibus, cauda brevissima conoidea, pedibus anterioribus 4-dactylis.

Dasypus conurus. Js. Geoffr. rev. zool. 1845 p. 137. — D. tricinctus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 178 (zum größten Theil). — Tatou mataco. Azar. ess. II. p. 197.

Es ist dieß diejenige Art, welche Azara unter dem Namen Tatu mataco beschrieben hat und von der auch das pariser Museum ein Exemplar besitzt, wonach Js. Geoffroy folgende Charakteristik liefert. „Panzer schwärzlich, jedes Schildchen durch eine wenig tiefe Furche umschrieben. Der Kopfpanzer, in dessen mittlerem Theile fast lauter unpaarige große Schilder enthalten sind, verlängert sich nicht zwischen Aug und Ohr. An den Vorderfüßen nur 3 Zehen mit dem Rudiment einer vierten (innern Zehe); keine äußere Zehe. Haare der Unterseite bräunlich; Schwanz kurz, kegelig. — Breite an der Basis 4 Cent., Länge 7. Bewohnt den Tucuman und die Pampas von Buenos-Ayres (Azara), Santa Cruz de la Sierra (D'Orbigny)."

Diese allerdings wohl unterschiedene Art ist aber von noch weiterer Verbreitung als Js. Geoffroy angegeben hat, indem sie auch im südlichen Brasilien vorkommt, wo sie Natterer bei Caissara häufig antraf. Die Thiere hielten sich im Grase auf und suchten bei Annäherung eines Hühnerhundes nicht zu entfliehen, sondern rollten sich in eine Kugel zusammen.

Von einem Männchen bemerkt Natterer Folgendes. Die Vorderfüße sind vierzehig, die beiden äußersten Zehen sehr klein, besonders die innere. Die zweite Kralle von außen gezählt ist lang, breit, von den Seiten gedrückt und ziemlich gekrümmt. Die Ohren sind kurz, doch breit und in der Mitte wie ein Blatt Papier zusammengelegt. Vier bewegliche Gürtel, der letzte auf der rechten Seite unterbrochen. Der Panzer ist schmutzig graulichgelb; der übrige ziemlich stark behaarte Körper geht aus dem schmutzig Fleischfarbigen ins Graue über. Die ganze Länge sammt dem Schwanze beträgt 16½"; der Schwanz (vom After an gemessen) 3".

Von einem Weibchen giebt Natterer an, daß es drei Gürtel hatte. Die Clitoris ist sehr lang und läuft in eine feine Spitze aus. Die ganze Länge ist 17", der Schwanz 2" 10"'.

6. D. novemcinctus Linn., das langschwänzige Gürtelthier.

Schon Lund versuchte es den D. novemcinctus in 2 Arten zu trennen,

von denen die eine den nördlichen Theil, die andere den mehr südlichen Theil des tropischen Südamerikas inne haben soll. Auch Burmeister[1]) wollte neuerdings die Exemplare aus Guiana von denen aus Brasilien specifisch scheiden, jedoch nach andern Merkmalen als sie bisher berücksichtigt wurden. Ich habe keine guianischen Exemplare zur Vergleichung; bei unsern brasilischen finde ich aber, daß die Merkmale, auf welche Burmeister sich bezieht, manchen Schwankungen unterliegen und zum Theil selbst mit denen der guianischen Exemplare übereinkommen. Die Entscheidung bleibt daher weiteren Untersuchungen vorbehalten. Nach Tschudi ist der D. novemcinctus bis an den Ostabhang der Kordilleren in Peru verbreitet.

7. D. hybridus Desm., das kurzschwänzige Gürtelthier.

Bis jetzt war das Vorkommen dieser Art in Brasilien nicht bekannt. Natterer aber hat sie ziemlich häufig im Süden dieses Reiches, nämlich um Ypanema gefunden. Wie er in seinen Notizen von einem Exemplare bemerkt, hat dasselbe 6 Gürtel und an den Vorderfüßen 4 Zehen. Der Panzer ist schwarzbraun, an den Seiten mit runden, schmutzig röthlichweißen Flecken; die Gürtel mit solchen Längsstreifen. Der Kopf, die Ohren und die Oberseite der Füße nebst Krallen röthlichgrau; die Nase weißlich, Brust, Bauch und Aftergegend schmutzig ockerbraun. Die Oberseite des Schwanzes ist von der Färbung des Oberleibs, die Unterseite nebst den Seiten schmutzigweiß. Die ganze Länge des Thieres beträgt 1′ 3½″, der Schwanz 5¾″, die Ohren 14‴.

III. MANIS. Schuppenthier.

Focillon[2]) hat von dieser Gattung neuerdings eine Monographie bearbeitet, die sowohl durch ihre Genauigkeit als Literaturkenntniß sich auszeichnet. Auf die reiche Sammlung des pariser Museums gestützt, hat

1) Zeitung für Zoologie S. 199; im Auszuge im Archiv für Naturgesch. 1850. II. S. 27. 2) Revue zoolog. 1580 p. 465.

er nicht blos die von Sundevall aufgestellten Arten kritisch prüfen und in ihrer Richtigkeit mit Beifügung werthvoller Bemerkungen bestätigen können, sondern er hat auch die Zahl der Arten mit zwei neuen vermehrt, denen er den Namen Manis tridentata und M. Guy beilegte. Das Schema der Arten gestaltet sich dadurch, ihm zu Folge, in nachstehender Weise.

I. cauda corpore multum longiore.
  a) squamarum dorsalium seriebus 11.
    2 M. longicaudata.
  b) sq. d. seriebus 19 — 21.
    2. M. tricuspis.
    3. M. tridentata.

II. cauda longitudine corporis aut breviore.
  a) sq. d. seriebus 21.
    4. M. Guy.
  b) sq. d. seriebus 17.
    5. M. javanica.
    6. M. aspera.
    7. M. Dalmanni.
  c) sq. d. seriebus 11 — 13.
    8. M. laticaudata.
    9. M. Temminckii.

Außerdem hat Gray noch eine neue Art als Manis multiscutata und Blyth 2 andere als M. leptura und M. leucura aufgestellt.

1. **M. tricuspis** Sund., das dreizackige Schuppenthier; **cauda longitudinem corporis dimidio superante; squamis nonnullis tridentatis.**

Manis multiscutata. Gray proceed. of the zool. soc. 1843 p. 22; ann. of. nat. hist. XIII, p. 70. — Fraser ann. XIII. p. 227; zool. typ. mamm. tab. 28. — Wagn. Archiv für Naturgesch. 1845. 2. S. 37.

Gray, der seine M. multiscutata in 2 Exemplaren aus Westafrika erhielt, unterscheidet sie von M. longicaudata durch kürzeren Schwanz, der nur um die Hälfte den Körper an Länge übertrifft, durch doppelte Anzahl der Schuppenreihen auf dem Rücken (23) und durch spitzere

Schuppen, von denen jede 3 ſcharfe Spitzen hat. Zwei andere Exemplare brachte Fraſer von Fernando Po nach England mit und giebt über ihre Lebensweiſe einige intereſſante Notizen; über ihren äußern Bau erfährt man aber nicht mehr, als daß die Länge des Körpers 12" und die des Schwanzes 18" beträgt; dieſe beiden Exemplare erſcheinen ihm noch nicht ganz erwachſen zu ſeyn. — Ich habe ſchon in meinem Jahresbericht von 1844 die Meinung ausgeſprochen, daß dieſe M. multiscutata mit M. tricuspis identiſch iſt. Seitdem iſt freilich noch eine ſehr nahe verwandte Art in der M. tridentata unterſchieden worden und die von Gray und Fraſer mitgetheilten wenigen Notizen ſind nicht ausreichend, um eine genügende Vergleichung zuzulaſſen. Erwägt man jedoch, daß M. multiscutata im Längenverhältniß des Schwanzes zum Körper, ſo wie in dem geographiſchen Vorkommen mit M. tricuspis übereinſtimmt, ſo wird ſich ihre Identificirung mit letzterer bei genauerer Vergleichung wohl als gerechtfertigt erweiſen.

2. **M. tridentata** Focill., das ſchmalſchuppige Schuppenthier; **cauda longitudinem corporis quinta parte superante, squamis omnibus tridentatis angustatis.**

Manis tridentata. Focillon rev. zool. 1850 p. 472. tab. 11. — Rapp Edentat. 2 Aufl. S. 16 tab. IIa.

Nach 3 Exemplaren, die der Naturalienhändler Guy in Paris von der Küſte von Moſſambique erhalten hatte, hat Focillon dieſe neue, der M. tricuspis ſehr nahe verwandte Art aufgeſtellt und folgende Beſchreibung von ihr geliefert.

Der Schwanz iſt kürzer als bei M. longicaudata und tridentata, indem er nicht einmal 1⅕ der Länge des Körpers ſammt dem Kopfe mißt; übrigens iſt er deutlich, vom Anfange an, vom Rumpfe geſondert, ſchmal und geſtreckt.

Die Schuppen ſtehen auf dem Rücken und den Seiten in 19, bei einem Exemplare in 21 Längsreihen. Die mittlere Reihe, die ſich auf dem Kopfe nicht regelmäßig verfolgen läßt, zählt auf dem Kopf ohngefähr 10, auf dem Rumpf 15 bis 17 und auf dem Schwanz 30 bis 34 Schuppen, bis zu einer Entfernung von ohngefähr 1 Zoll vor dem Schwanz-

ende, wie bei den beiden vorhin genannten Arten. Die Schuppen beginnen auf dem Kopfe faſt in der Mitte des Raumes zwiſchen Naſe und Auge. Ziemlich klein anfangs, nehmen ſie nach hinten an Größe zu und zeigen einen mittlern Kiel, der ſich am freien Rande gewöhnlich mit einer ſehr feinen und beiderſeits mehr oder weniger ausgerandeten Spitze endigt, in der Weiſe, daß zwei andere Spitzen ausgeſchnitten werden. An dieſen Kiel ſchließen ſich ſehr tief markirte, parallele Längsſtreifen an, deren Zahl nach der Größe der Schuppen auf den verſchiednen Körperparthien von 10 bis 28 oder 30 ſteigt. — Auf dem Rücken erreichen die Schuppen ihre größte Entwicklung ohngefähr 40 Millimetres von der Wurzel nach der Spitze, bei 20 Millim. Breite an der Wurzel und 8 oder 9 Millim. am freien Rande. Letzterer iſt in der Mitte mit einer zugeſchärften, flachen und ſehr vorgezogenen Spitze bewaffnet und jederſeits mit einer minder zugeſpitzten, minder langen, aber ſehr wohl markirten Spitze. Die parallelen Streifen ſind ſehr tief eingravirt und die Schuppe iſt auf der Außenfläche etwas concav. Die Form der Schuppen bleibt faſt dieſelbe auf den Seitentheilen, außer daß ſich ihre Breite etwas vermindert und daß die mittlere Leiſte, auch auf den Schwanzſeiten, wieder erſcheint. — Auf dem Schwanze ändert ſich ihre Form etwas; ſie werden breiter und weniger geſtreckt. Länge 28 bis 30 Millim., Breite an der Wurzel 30 Millim., am freien Rand 8 — 9 Millim. Die Zähne ſind minder vorragend und weit weniger ſpitz. Die beiden äußern Reihen ſind aus Schuppen gebildet, die in einen ziemlich ſpitzen Winkel gefaltet und mit einer ſehr feinen Spitze geendet ſind. — Die Vorderglieder tragen nur an ihrer Baſis, ohngefähr bis Mitte des Vorderarms, Schuppen, die in 4 Reihen ſenkrecht auf die Achſe des Gliedes geſtellt ſind. Die Hinterglieder ſind auf der äußern Seite bis auf den Fuß beſchuppt, und man zählt 4 Reihen ſtark gekielter und parallel auf der Achſe des Gliedes ſtehender Schuppen. Alle dieſe Schuppen ſind dünn und elegant und zeigen zwiſchen ſich keine Haare. — Krallen klein, ziemlich zuſammengedrückt und gekrümmt; vorn die mittlere am größten, 20 Millim.; die zweite und vierte kürzer, 9 und 11 M., die erſte ſehr kurz, 4 M. und zurückgeſtellter als die fünfte, die 10 M. mißt. Hinten ſind die Krallen minder ſtark, die drei mittlern faſt gleich, 12 bis 13 M., die erſte und fünfte

4 und 10 M. — Die Unterseite, die Innenseite der Glieder und der schuppenlose untere Theil der Vorderbeine sind mit kurzen, spärlichen, lichten Haaren besetzt. — Kopf kurz und konisch, Ohr auf eine blose Hautfalte reducirt, Rumpf ziemlich gestreckt. — Länge von der Nase bis zur Schwanzspitze 640 bis 568 Millim., Schwanz 345 bis 335, Kopf bis zum Auge 30 bis 25, vom Auge zum Ohr 20 bis 18 M., Breite des Schwanzes an der Wurzel 55 bis 50 M.

Focillon hält diese Art, deren Ansehen schon sehr verschieden ist von dem der beiden andern langschwänzigen Arten, für sehr gut charakterisirt durch die Verhältnisse ihres Schwanzes, durch die Zähnelung, gestreckte und schmächtige Form und selbst die Streifung der Schuppen und endlich durch die allgemeinen Proportionen, die geringer als bei M. longicaudata und M. tricuspis sind. In dieser Beziehung stimme ich mit ihm überein und betrachte diese M. tridentata als den ostafrikanischen Repräsentanten der westafrikanischen M. cuspidata. Auch Rapp, der eine schöne Abbildung von dieser neuen Art lieferte, giebt gleich Focillon Mossambique als ihre Heimath an.

3. **M. Guyi** Focill., das vielschuppige Schuppenthier; **flavida, squamorum dorsalium seriebus 21, linea squamarum media ab apice caudae usque ad initium loricae producta.**

Manis Guy. Focillon, rev. zool. 1850 p. 513. tab. 10.

Es ist nur ein einziges, noch nicht vollständig erwachsenes und in Weingeist aufbewahrtes Exemplar, auf welches Focillon diese Art begründete. Gedachtes Individuum wurde ihm von Guy zur Beschreibung übergeben und diese nimmt eine sehr genaue Rücksicht auf die höchst nahe verwandten 3 Arten: M. javanica, M. aspera und M. Dalmanni, wodurch die unterscheidenden Eigenthümlichkeiten scharf hervorgehoben werden.

Der Schwanz ist länger als der Rumpf, aber nicht so lang als Rumpf und Kopf zusammen genommen. Die neue Art zeigt unter allen langschwänzigen Schuppenthieren die gröste Anzahl Längsreihen von Schuppen, nämlich 21, zugleich verläuft die Mittelreihe der Schuppen vom Schwanzende an in vollkommener Regelmäßigkeit bis zum Vorderrande des Schuppenpanzers auf dem Rüssel, während bei M. javanica, aspera und Dalmanni die unpaare niemals mit den vordersten Schuppen des

Rüſſels beginnt, ſondern erſt von den Ohren oder Augen an. Man zählt in dieſer Mittelreihe auf dem Kopf bis zu den Ohren 11, auf dem Rücken 25 und auf dem Schwanze 28 Schuppen. Die Kopfſchuppen ſind auch weit zahlreicher bei M. Guyi als bei den 3 andern Arten, denn während man auf der Oberſeite des Kopfs (vorwärts von einer durch die Ohren gezogenen Querlinie) bei letzteren ohngefähr 50 findet, bietet jene 72 dar. Die anfangs kleinen Schuppen wachſen allmählig an, bis ſie auf dem Kreuz in ihrem ſichtlichen Theile eine Breite von 32 und eine Länge von 15 Millimetern erreichen. Sie unterſcheiden ſich von den Schuppen der verwandten Arten durch ihre kurze breite Form, deren freier Theil in eine ſtumpfe Spitze geendigt iſt, aber nicht, wie bei M. Dalmanni, in einen queren, dreieckig abgerundeten, freien Rand. Durch ihre minder gedrängten und weniger feinen parallelen Längsſtreifen unterſcheiden ſich dieſe Schuppen, eben ſo wie durch ihre kürzere und minder zugeſpitzte Form von denen der M. javanica; dieſelbe Schuppe zeigt bei M. javanica 36 bis 40 und bei M. Guyi nur 28 bis 30 Streifen. Endlich erinnert die Bekielung, wenn ſie vorhanden iſt, keineswegs an die mit einem ſo vorſpringenden Kiele verſehenen Schuppen der M. aspera. Die Bekielung macht ſich bemerklich auf den 5 untern Reihen jeder Seite und auf den Hinterbeinen; die bekielten Schuppen ſind übrigens ſcharf zugeſpitzt. Auf der Oberfläche des Schwanzes iſt die Bekielung faſt null; ſie findet ſich nur auf ſeiner Unterfläche und in ſeinem hintern Theil. Alle dieſe Schuppen, deren jede an ihrer Baſis 4 Borſten trägt, haben eine licht falbe Färbung, welche lebhaft von der ſchwärzlichbraunen der M. javanica und der braunen der M. aspera abſticht, nur die M. Dalmanni zeigt an jungen Exemplaren eine ähnliche Färbung. Die Krallen ſind ziemlich ähnlich denen der M. javanica; die vordern etwas größer als die hintern, aber nicht in dem Verhältniß wie bei M. Dalmanni. Der Kopf iſt koniſch und mäßig verdünnt. Folgende Maaße ſind bemerkenswerth.

Länge bis zum Schwanzende	510	Millim.
Körper ohne Kopf	219	„
Schwanz	235	„
Mittlere Vorderkralle	29	„
„ Hinterkralle	22	„

Nach den vorliegenden Mittheilungen iſt es allerdings wahrſcheinlich,

daß M. Guyi als eigne Art anzuerkennen ist, zumal wenn sich die Angabe bestätigen sollte, daß sie in Afrika einheimisch ist, während die andern ihr verwandten Arten Südasien angehören.

4. M. javanica Desm., das sundaische Schuppenthier.

Diese wohlbekannte Art bringe ich hier nur deshalb in Erwähnung, weil Focillon bezüglich meiner Angaben der Zahl der Rumpf- und Schwanzschuppen längs der Mittelreihe auf eine Abweichung aufmerksam macht, die in dieser Hinsicht zwischen dem Exemplare der hiesigen Sammlung und den ihm bekannten besteht. Wie bei allen anderen Individuen sind auch an dem unserigen die Kopfschuppen so gestellt, daß sich keine deutliche, längs der Mitte in einer geraden Linie verlaufende Mittelreihe erkennen läßt. Diese beginnt erst vom Hinterhaupte an und verläuft bei den andern Exemplaren in einer ununterbrochenen Erstreckung bis zum Schwanzende, bei unserem dagegen hört sie schon in einer, wie es scheint, ziemlich beträchtlichen Entfernung von dem abgebrochenen Schwanzende auf, indem nur die 17 ersten Querreihen des Schwanzes fünfschuppig und mit einer regelmäßigen Mittelreihe versehen sind, während die darauf folgenden Querreihen, an Zahl 5 + . . ., nur vierreihig sind und deshalb einer einfachen Mittelreihe entbehren; statt der einfachen mittlern Reihe der fünfschuppigen Querreihen folgt auf den vierschuppigen eine gedoppelte Mittelreihe. Diese Abweichung halte ich indeß nicht für ausreichend, um darauf eine specifische Scheidung zu begründen [1]).

5. M. leucura Blyth, das weißschwänzige Schuppenthier; M. javanicae simillima, at cauda apice glauco-albida.

Manis leucura. Blyth, journ. of the Asiat. soc. of Bengal XVI part. 2 (1847) p. 1274.

Von einem Schuppenthiere, das in Arrakan gemein ist und auch noch in Sylhet vorkommt, giebt Blyth folgende Bemerkungen. Bei 7 oder 8 Exemplaren, die er untersuchte, ist der Endtheil des Schwanzes,

1) Nach Cantor (journ. of the Asiat. soc. XV. p. 259) kommt übrigens M. javanica nicht blos auf den sundaischen Inseln, sondern auch auf der malayischen Halbinsel vor.

von ⅓ bis zur Hälfte, weißlich, was scharf mit der übrigen Färbung contraſtirt. Das Ohr iſt deutlich, die Krallen von mäßiger Größe und an den hintern Füßen faſt ebenſo entwickelt wie an den vordern. Die Querreihen der Schuppen auf dem Rücken variiren von 17 bis 19 je nach den Leibestheilen, und die ſeitlichen Schwanzſchuppen betragen 28. Nur die ſeitlichen Schuppen des Leibes und die der Hinterbeine ſind deutlich gekielt, ſelbſt bei ſehr jungen Thieren; die der Vorderbeine ſind es nur ſehr ſchwach. Das größte Exemplar mißt wenig mehr als 3′, von welchen der Schwanz 17″ ausmacht; der letztere iſt an der Wurzel mäßig breit und flach, leichter gebaut und mehr ſich zuſpitzend als bei M. pentadactyla.

Blyth findet zwiſchen M. javanica und leucura keinen andern Unterſchied als daß der Schwanz bei jener in ſeinem Endtheile nicht, wie bei allen arrakaniſchen Individuen, weiß iſt. Er vermuthet daher, daß beide nicht ſpecifiſch verſchieden ſeyn dürften; eine Meinung, über die ich bei der Kürze der von Blyth gegebenen Notizen mich eines Urtheils enthalten muß [1]).

6. M. laticaudata Ill., das breitſchwänzige Schuppenthier.

Manis crassicaudata. Tickell, journ. of the Asiat. soc. of. Beng. XI. p. 221 mit Abbild. — M. pentadactyla. Blyth ebenda XI. 1. p. 453; XVI. 2. p. 1273. — Gray, catal. of Hodgson's collect. p. 36. — Focill. rev. zool. 1850. p. 526. — M. aurita. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. V. p. 234.

---

1) Blyth ſtellte (im Journ. of the Asiat. soc. XI p. 454 u. XVI part 2 p. 1274) noch eine andere neue Art als Manis leptura auf, jedoch nur nach einem einzigen Exemplare und dieſes überdieß unbekannter Heimath. Seine Länge beträgt 39″, wovon der Schwanz 18 mißt. Die Schuppen ſind ſtark abgenützt, die des Kopfes, die hinſichtlich ihrer Größe bei M. javanica nicht ſcharf von den Schuppen des Nackens ſich unterſcheiden, ſind bei M. leptura wie bei M. pentadactyla viel kleiner, auch ſind die Schuppen der Leibesſeiten nur ſehr ſchwach gekielt. Die Mittelreihe vom Hinterkopf bis zur Schwanzſpitze beträgt 53 Schuppen, wovon 28 dem Schwanze angehören. Auf dem Rücken finden ſich 19 Querreihen von Schuppen. Der Schwanz iſt ſchlanker als bei M. javanica und ſeine ſeitlichen Schuppen ſind mit der Spitze angedrückt, ſo daß der Rand faſt glatt iſt, während er bei letzterer Art ſtark gezähnelt iſt. Die Krallen der Vorder- und Hinterfüße ſind gleich ſtark. Die Farbe der Schuppen iſt dunkel rothbraun. — Dieſe Art iſt jedenfalls einer geſichertern Feſtſtellung bedürftig.

Von dieſer Art hat unſere Sammlung ein junges Exemplar erhalten, deſſen ganze Länge erſt 13½″ beträgt, wovon der Schwanz 5¼ ausmacht. Die Mittelreihe der Schuppen enthält auf dem Schwanze 15, auf dem Rumpf bis zum Hinterhaupt 16, auf dem Kopfe 11 Schuppen. Die Mittelreihe verläuft auf dem Schwanze in regelmäßiger Anordnung bis an deſſen Ende, und auch auf dem Kopfe iſt die Mittelreihe von ziemlich regulärem Verlaufe. Die Färbung des Panzers iſt ein ziemlich geſättigtes Röthlichbraungelb.

Eine intereſſante Beſchreibung der Lebensweiſe und der äußern und innern Beſchaffenheit, zugleich mit guten Abbildungen, hat Lieutenant Tickell nach 2 lebenden Individuen mitgetheilt. Daß Hodgſon's Manis aurita identiſch mit M. laticaudata iſt, wurde durch Ogilby, Blyth und Gray dargethan.

7. M. Temminckii Smuts, das kurzſchnautzige Schuppenthier.

Peters[1]) hat dieſe Art, die bisher nur aus dem nördlichen Theil der Kapkolonie bis zum Wendekreiſe des Steinbockes und aus dem Sennaar bekannt war, nunmehr auch in Moſſambique aufgefunden, ſo daß hiemit ihre ununterbrochene Verbreitung an der Oſtſeite Afrikas dargethan iſt. Zugleich hat gedachter Naturforſcher von dieſer Art ſehr genaue Angaben über die Beſchaffenheit ihrer Eingeweide vorgelegt.

1) Reiſe nach Moſſambique I. S. 174.

III. Ordnung.

Beutelthiere. MARSUPIALIA.

Die Beutelthiere bilden in meiner frühern Bearbeitung des Schreber'schen Werkes[1]) diejenige Ordnung, welche der meisten Nachhülfe bedürftig geworden ist, mehr noch, als selbst die der Affen. Erst seit meiner im Jahre 1842 bereits abgeschlossenen Bearbeitung dieser Ordnung erfolgten die zahlreichen Publikationen, namentlich englischer Zoologen, durch welche eine große Menge neuer Arten zugefügt, ungenau gekannte richtig gekannt, die geographischen Verbreitungsverhältnisse fester bestimmt und weitererе Beiträge zur Kenntniß des innern Baues geliefert wurden. Am werthvollsten unter diesen neueren Arbeiten ist für den Systematiker die von Waterhouse[2]) bearbeitete Monographie der Beutelthiere geworden, indem sie in gründlichster und streng systematischer Weise, von eigner reicher Autopsie und umfassender Literaturkenntniß unterstützt, die älteren Beschreibungen kritisch revidirte, unnöthige Trennungen der Arten aufhob, nothwendige nach sorgfältiger Prüfung einführte und viele neue Species zufügte. Owen[3]) hat mit bewährter Meisterschaft die allgemeinen Verhältnisse dieser Ordnung geschildert und insbesondere ihren anatomischen Bau, unter Beigabe vieler Holzschnitte, erläutert. Um die Kenntniß der australischen Beutelthiere insbesondere haben Gray[4])

---

1) Supplementband III, 1843. 2) Natural History of the Mammalia. Vol. I. Marsupiata 1842—1846. 3) Todd Cyclopaedia of Anatomy and Physiology. Vol. III. Marsupialia. 1842. 4) Im Append. zu G. Grey's Journals of two expedit. of discovery in North-West and Western Australia. Lond. 1841; ferner in den Proceed. of the zool. Society und in den Annals of nat. history.

und Gould[1]) das Hauptverdienst, zumal der letztere, der zum Behufe eigner Studien Australien bereiste und unübertreffliche Abbildungen im größten Maaßstabe lieferte. Von den auf den molukkischen Inseln und Neuguinea einheimischen Beutelthieren erlangten wir durch S. Müller und Schlegel[2]) genauere Kunde; von den südamerikanischen durch Natterer[3]) und v. Tschudi[4]).

So hat denn die Kenntniß der Ordnung der Marsupialien binnen den eilf Jahren, vor welchen meine Monographie derselben publicirt wurde, solche bedeutende Fortschritte gemacht, daß ich mich jetzt, wie bei der Ordnung der Affen, genöthigt sehe, eine ganze Umarbeitung vorzunehmen und zwar in der Art, daß ich die Gattungen und Arten in systematischer Reihenfolge aufzähle und die neuen Species nebst den nothwendigen Berichtigungen am gehörigen Ort einschalte, bei denjenigen Arten aber, die bereits in meiner ersten Arbeit sicher festgestellt sind, mich nur auf Angabe der Diagnose, des Wohnortes und der seitdem neu zugekommenen Literatur beschränke. Da auch die hiesige Sammlung in den letzten zehn Jahren an Beutelthieren sich sehr vermehrt hat, so bin ich nicht blos in den neuen Zusätzen auf die Literatur beschränkt, sondern sehe mich hiebei durch eine reichere Autopsie unterstützt[5]).

Die Frage, ob die Beutelthiere wirklich eine natürliche Ordnung bilden, ist neuerdings abermals und zwar von G. Meigen[6]) aufgeworfen und in verneinendem Sinne beantwortet worden. Er bemühte sich zu zeigen, daß die Merkmale, welche diese Ordnung bezeichnen sollen, sie nicht bezeichnen und unterscheiden, und daß die einzelnen Gattungen der Beutel-

---

1) Monograph of the Macropodidae Part 1—2 (1841, 1842); the Mammalia of Australia, seit 1845 vier Lieferungen, jede zu 3 Guineen. 2) Verhandelingen over de natuurl. geschiedenis der Nederland. overzeesche bezittingen. Zoologie. I. Leid. 1839—1844. 3) Archiv für Naturgesch. 1842. S. 358; Abh. der Akadem. der Wissensch. in München V. S. 119. 4) Fauna Peruana I. (1844—1846). 5) Eine vergleichende Aufzählung der seit meiner ersten Bearbeitung der Ordnung der Marsupialien zugegangenen neuen Arten wird am Schluße derselben nachfolgen. 6) De Marsupialium dispositione systematica. Diss. zoologica quam ad summos in philosophia honores etc. impetrandos scripsit G. Meigen. Bonn 1851.

thiere unter ſich mehr differirten als dieſelben von den entſprechenden Ordnungen der übrigen Säugthiere abwichen. Er will ſie daher unter letztere vertheilt wiſſen und zwar ſo, daß die Marsupialia carnivora mit den Fleiſchfreſſern, die M. glirina und frugivora mit den Nagern, die M. herbivora (Halmaturus, Hypsiprymnus) mit den Wiederkäuern (!) zuſammen geſtellt würden, jedoch immer als beſondere Abtheilungen unter denſelben. Ich kann dieſer Meinung ſo wenig als früher beitreten, da die Beutelthiere, trotz der großen Differenzen, die ſie in ihren Formen und ſelbſt in ihrer Lebensweiſe zeigen, anderſeits doch wieder ſo viel eigenthümliche Merkmale darbieten, daß ſie alle andern Ordnungen, in die man ſie vertheilen wollte, um deren natürlichen Charakter bringen und unter ihnen nur als fremdartige Eindringlinge auftreten würden. Eben deshalb wird eine naturgemäße Syſtematik die Beutelthiere in einer beſondern Ordnung belaſſen müſſen, wofür ſich neuerdings auch W. Vrolik[1]) ausge-

---

1) Tijdschrift voor de wis-en naturkundige Wetenschappen. Amsterd. IV. (1851). Nach einer ſehr ſorgfältigen Darſtellung der anatomiſchen Verhältniſſe des Sarcophilus ursinus erklärt Vrolik am Schluſſe, daß, wenn ihn nicht Alles trüge, auch ſeine Unterſuchung die Richtigkeit der Anſicht, welche hauptſächlich durch Owen entwickelt worden wäre, beweiſe, nämlich daß die Beutelthiere mit den Monotremen eine für ſich ſtehende Ordnung ausmachen müßten, welche durch ihre eigenthümliche Fortpflanzungsweiſe und insbeſondere durch den Mangel der Placenta den Namen im- oder aplacentalia führen dürfte. Bei ihrer großen Verſchiedenheit im äußern Baue, in der Beſchaffenheit der Zähne und der Lebensweiſe wirft er ſich allerdings, wie Meigen, die Frage auf, ob es nicht beſſer wäre, die Beutelthiere unter die übrigen Ordnungen der Säugthiere zu vertheilen, als ſie in einer beſonderen Ordnung beiſammen zu halten; er beantwortet jedoch dieſe Frage im entgegengeſetzten Sinne als Meigen, und weiſt dabei zunächſt auf ſeine Unterſuchung des Sarcophilus ursinus hin. Begnüge man ſich nämlich denſelben lediglich nach ſeiner äußern Beſchaffenheit, Nahrung und Lebensweiſe zu betrachten, dann ſtelle er ſich als ein Fleiſchfreſſer dar, dem man in der Nähe des Bären ſeinen Platz anzuweiſen hätte. Betrachte man ihn aber in ſeiner Totalität, dann überzeuge man ſich, daß er in den Hauptſtücken die eigenthümliche Struktur der Beutelthiere beſitze und nur in den Punkten den Fleiſchfreſſern ſich nähere, welche vermöge ſeiner Lebensweiſe eine nothwendige Uebereinſtimmung mit ihnen veranlaſſen müßten. In treffender Weiſe würde dieß ſchon durch das Knochengerüſte angezeigt. „Sein unvollkommener und theilweiſe offener Gaumen, die Art, in welcher die Carotiden-Kanäle den Körper des Keilbeins durchbohren, die Anweſenheit von 4, anſtatt von 3 ächten Backenzähnen, die eigenthüm-

sprochen hat. Dagegen möchte ich mit ihnen die Monotremen, obwohl sie mit den Beutelthieren in dem Mangel des Mutterkuchens und der Verkümmerung des Hirnbalkens übereinstimmen, nicht verbinden, da ihnen Beutel und Zitzen zugleich abgehen. Es dürfte überhaupt am gerathensten seyn, die Monotremen in eine von den übrigen gesonderte Ordnung zu verweisen, durch welche der Uebergang von den Edentaten zu den Marsupialien vermittelt wird [1]).

Hinsichtlich der systematischen Anordnung der Familien und Gattungen habe ich die 2 Hauptabtheilungen: Raubbeutler (Marsupialia rapacia) und pflanzenfressende Beutler (M. phytophaga), beibehalten und darunter die 6 Familien gruppirt.

---

liche Weise, in welcher der Winkel des Unterkiefers nach innen vorspringt, die Beschaffenheit der Handwurzel, das Verhalten der beiden Knochen des Schenkels und die Beutelknochen sind eben so viele Besonderheiten, durch welche sich der S. ursinus in seinem Knochengerüste von den placentaren Fleischfressern entfernt, als er dagegen den allgemeinen Bau der Beutelthiere aufweist. Mehr oder minder kommen die Skelete von allen übrigen überein, wie sehr sie sich sonst auch verschieden zeigen mögen. Nicht weniger deutlich ist die Uebereinstimmung, welche alle Beutelthiere in der Beschaffenheit der Bauchmuskeln darbieten, während ihr übriges Muskelsystem nach dem Behufe der Lebensweise und der dadurch nothwendig gewordenen Bewegungs-Verschiedenheit sich richtet. Die Untersuchung des S. ursinus bestätigt dieß in treffender Weise. In vielerlei Beziehungen hat sein Muskelsystem die Besonderheiten der Fleischfresser aufzuweisen und nähert sich hierin vor allen dem des Bären, während es durch die Bauchmuskeln eine unverkennbare Uebereinstimmung mit dem Känguruh zeigt. Das Gehirn hat bei allen Beutelthieren ein gemeinsames Merkmal, das in der mangelhaften Beschaffenheit des corpus callosum besteht. Dieß habe ich auch bei S. ursinus bemerkt. Fügt man nun noch hinzu, daß, so weit die Untersuchungen sich erstrecken, bei allen Beutelthieren der annulus oder fossa ovalis in der Scheidewand der beiden Herzohren fehlt, dann glaube ich, daß durch dieses Alles die Behauptung gerechtfertigt ist, daß die Beutelthiere eine natürliche Ordnung der Säugthiere bilden."

1) Ob den Beutelthieren ein eigentlicher Hirnbalken (corpus callosum) abgeht oder nicht, darüber ist in neuerer Zeit für und wider gestritten worden. Mayer (in seinen „neuen Untersuchungen aus dem Gebiete der Anatom. und Physiologie," 1842) und Pappenheim (compt. rend. 1847 n. 6) wollen ihnen ein ächtes corpus callosum zuerkennen, wogegen aber wiederholt Owen (ann. of nat. hist. XVI. p. 101) und später auch Vrolik remonstrirt hat. Mit Letzteren stimme ich ebenfalls überein, da bei den Beutelthieren höchstens von einer rudimentären Andeutung des Hirnbalkens die Rede seyn kann.

A. RAPACIA. Raubbeutler.

Dentes trium ordinum, primores parvi, canini longi, molares cuspidati; stomachus simplex, intestinum coecum nullum aut parum longum.

I. Familie.

Dasyurina. Raubbeutler.

Cauda pilosa, pedes posteriores 4—dactyli, pollice nullo aut brevissimo, digiti omnes liberi, dentes primores superiores 8, intestinum coecum nullum.

I. THYLACINUS. Beutelwolf.

Pedes posteriores 4—dactyli, cauda (apice excepto) brevissime pilosa, dentes 46, ossa marsupialia vera nulla.

Owen[1]) machte im Jahre 1844 die unerwartete Entdeckung, daß bei dem Beutelwolf die Beutelknochen nicht als Knochen existiren, sondern nur durch zwei kleine längliche, platte Faserknorpeln repräsentirt sind. Diese Knorpel sind eingelagert in den Pfeilern des Bauchrings und jeder erscheint als ein verdickter Theil der Sehne des äußern schiefen Bauchmuskels, welcher die obigen Pfeiler bildet. Die Länge des Marsupial-Faserknorpels ist 6 Linien, seine Breite bis 3 — 4, seine Dicke 1½ Linien. Von solcher Beschaffenheit fand Owen die Rudimente der Beutelknochen bei zwei erwachsenen Weibchen und einem Männchen; bei einem vierten großen und alten Männchen waren einige Partikeln von Knochenkernen in der Mitte des Faserknorpels abgelagert, die beim Querschnitt mit dem Messer ein Knirschen veranlaßten. — Der Beutel ist übrigens bei den Weibchen vorhanden und enthält vier Zitzen.

Die frühere Angabe von der Beschaffenheit des Schwanzes ist dahin zu berichtigen, daß derselbe allerdings schwach zusammengedrückt ist, aber nicht mehr als bei Dasyurus. Dabei ist er an der Wurzel dick und mit etwas wolligem Pelze wie am Leibe bedeckt; gegen Anfang des zweiten Viertels vom Schwanze aber werden die Haare kurz und starr und sind der

1) Ann. of nat. hist. XVI. p. 62.

Haut dicht angedrückt; an der Unterseite des Endtheils des Schwanzes so wie an der Spitze selbst sind sie verhältnißmäßig lang.

Das Gebiß theilt sich in $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$ Schneidezähne, $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$ Eckzähne, $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$ Lückenzähne, $\frac{4}{4}:\frac{4}{4}$ ächte Backenzähne = 46. Die obern Backenzähne sind an der Außenseite mit drei Zacken, wovon der mittlere der höchste, auf der Innenseite mit einem kleinen stumpfen Höcker versehen; die untern ächten Backenzähne sind ähnlich, aber ohne innern Höcker.

1. Th. cynocephalus Harr., der Beutelwolf; flavido-brunneus, supra fasciis transversis nigris ornatus; vellere brevi adpresso. — Tab. 14.

Thylacinus cynocephalus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 19. — Waterh. Nat. Library XI. p. 123. tab. 5; nat. hist. of mamal. I. p. 456. tab. 16. fig. 2. — Owen. cyclop. of anatom. III. p. 258 fig. 80. (Gebiß); odontograph. p. 373. tab. 98. fig. 1. (Gebiß). — Gould mamm. of Austral. part 3 mit 2 Abbild. — Peracyon cynocephalus. Gray list of the Brit. mus. I. p. 97.

Lediglich auf Vandiemensland beschränkt und dort in den unkultivirten Distrikten noch immer ziemlich häufig.

II. DASYURUS. Rauhbeutler.

Pedes posteriores 4- dactyli et verruca hallucari minima aut nulla, cauda undique villosa laxa, dentes 42.

Das Gebiß besteht aus $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$ Schneidezähnen, $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$ Eckzähnen, $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$ Lückenzähnen, $\frac{4}{4}:\frac{4}{4}$ Backenzähnen = 42. In Neuholland und Vandiemensland einheimisch.

†) corpore crasso, cauda breviuscula, pollice hallucari nullo. — Sarcophilus Fr. Cuv. (Diabolus Gray).

1. D. ursinus Harris, der bärenartige Rauhbeutler; niger, maculis nonnullis variabilibus albis. — Tab. 15.

Dasyurus ursinus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 22. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 448. — Owen cyclop. of anatom. III. p. 259. fig. 81. (Gebiß); odontograph. p. 374. tab. 98. fig. 2 (Gebiß). — Sarcorphilus ursinus. Fr. Cuv. mammif. fol. IV. — Mayer in D'Alton's u. Burmeist. Zeitschr. für Zoolog. I. S. 181 (Anatom.). — Vrolik, Tijdschr. v. de wis— en naturk. Wetensch. Amsterd. IV. (1851) p. 153 (Anatom. mit Abbildung des Gehirns). — Gould mamm. of Austral. part 3. — Diabolus ursinus. Gray in Grey's journals, append. n. 12.

Nach dem Beutelwolf das größte und ſtärkſte Raubthier unter den Beutlern, indem der Körper faſt eine Länge von 2 engl. Fuß erreicht und dabei kräftig und unterſetzt iſt, ſo daß das Thier einem jungen Bären ähnlich ſieht. Die weißen Abzeichnungen auf dem ſchwarzen Pelze ſind in Zahl und Form veränderlich. Selten fehlen ſie ganz, mitunter findet ſich nur ein weißer Fleck vor der Bruſt, häufiger bildet dieſer vor den Vorderfüßen eine halbmondförmige Binde, die ſich zuweilen bis über die Schultern erſtreckt, und nicht ſelten ſtellt ſich überdieß noch eine ähnliche quer über das Hinterende des Rückens verlaufende Binde ein. — Dieſe Art iſt gleich dem Beutelwolf auf Vandiemensland beſchränkt und von nächtlicher und ſehr räuberiſcher Lebensweiſe.

††) corpore attenuato gracili, cauda longa, pollice hallucari nullo. — Dasyurus Auct.

2. D. viverrinus Shaw, der buſchſchwänzige Raubbeutler; diverse coloratus, dorso albo-maculato, cauda immaculata.

Dasyurus viverrinus. Waterh. nat. hist. of mammal. I. p. 442. — Gould mamm. of Austral. part 3.

var. α) nigro-fuscus, albo-maculatus. — D. viverrinus Auct.

Dasyurus viverrinus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 25. tab. CLII. B. c.

var. β) olivaceo-flavescens, albo maculatus. — D. Maugei Auct.

Dasyurus Maugei. Wagn. a. a. O. S. 24. tab. CLII. B. b.

Daß D. viverrinus und D. Maugei nur Farbenabänderungen der nämlichen Art ſind, davon hatte Gould in Auſtralien häufig Gelegenheit ſich ſelbſt zu überzeugen, indem er oft in einem und demſelben Lager ſchwarze und gelblichgraue Junge beiſammen antraf; auch der nach Temminck in der Größe beſtehende Unterſchied iſt nicht begründet. Beide Geſchlechter variiren gleichmäßig in der Färbung. — Dieſe Art bewohnt ſowohl Vandiemensland als Neu-Südwallis, hält ſich bei Tag in Baumhöhlen und Felſenlöchern auf und überfällt zur Nachtzeit kleine Säugthiere und Vögel.

†††) corpore attennato gracili, cauda longa, pollice hallucari parvo exunguiculato. — Dasyurus Auct.

3. D. Geoffroyi Gould, der dünnſchwänzige Raubbeutler; flavido-griseus, albo-maculatus, cauda minus villosa, immaculata, apice nigra.

Dasyurus Geoffroyi. Gould proceed. of the zool. soc. VIII p. 151; mamm. of Austral. part. 3. — Waterh. nat. hist. of mammal. I. p. 437.

Eine seit meiner ersten Bearbeitung dieser Gattung durch Gould entdeckte Art, welche sich in ihrer Färbung dem D. Maugei annähert, von diesem aber leicht durch den Besitz eines Daumens an den Hinterfüßen und den viel minder buschigen Schwanz zu unterscheiden ist. Der Pelz ist mäßig lang, auf der Oberseite graulich mit starker gelblicher Beimischung und schwarzer Sprenkelung und mit vielen weißen Flecken geziert. Der Kopf hat nur einige kleine weiße Flecken und ist öfters von einem mehr grauen Tone als der übrige Körper, vor den Augen findet sich ein dunkler Fleck; die Ohren sind braun, außen kürzer, innen länger behaart. Die Unterseite ist weiß, die Vorderfüße bräunlich, die hintern weißlich oder gelblichgrau. Der Schwanz ist an der Wurzel gelb, aber reichlich schwarz gesprenkelt, indem die Haarspitzen von dieser Farbe sind; das Schwarze nimmt gegen das Schwanzende zu und gewöhnlich ist das letzte Drittel ganz schwarz. Die Länge des Körpers beträgt 14 bis 16″, des Schwanzes 10 bis 12″.

Unter den Rauhbeutlern ist diese die am weitesten verbreitete Art, indem sie die ganze südliche Hälfte Neuhollands von der Moreton-Bay im Osten bis zum Schwanenfluß im Westen bewohnt. Sie scheint in der Färbung nicht den Abänderungen wie der D. viverrinus unterworfen zu seyn.

4. D. hallucatus Gould, der lichtohrige Rauhbeutler; praecedenti similis, at minor, obscurius coloratus, auriculis pallidis.

Dasyurus hallucatus. Gould proceed. of the zool. soc. X p. 41; ann. of nat. hist. XI p. 232; mamm. of Austral. part. 3. — Waterh. nat. hist. of mamm. I p. 434.

Auch diese Art ist erst durch Gould bekannt geworden und von Waterhouse nach 4 Exemplaren sehr sorgfältig beschrieben worden. Sie kommt am nächsten dem D. Geoffroyi, unterscheidet sich aber 1) durch geringere Größe, 2) durch dunklere Färbung, 3) durch hellere, mit blassen Haaren besetzte Ohren, 4) durch längere Hinterzehen (zu 7‴, bei einem D. Geoffroyi von beträchtlicherer Größe nur 6¼‴) und 5) durch die Beschaffenheit der Sohlen an den Vorder- wie an den Hinterfüßen,

indem dieſe bei D. Geoffroyi mit kleinen, aber deutlichen fleiſchigen Warzen beſetzt ſind, während bei D. hallucatus dieſe vermißt werden und ſtatt ihrer zahlreiche ſchiefe oder quere Gruben ſich einſtellen.

Ein Weibchen beſchreibt Waterhouſe als auf der Oberſeite dunkelbraun, ins Schwarze ziehend, mit zahlreichen weißen Flecken, von denen ſich auch einige auf dem Kopf finden. Die Unterſeite iſt weiß, aber mit Gelb überlaufen; die Wangen, ein großer Fleck über dem Auge und die Leibesſeiten ſind graulich. Der Schwanz iſt ungefleckt, mit langen harſchen, aber keineswegs buſchigen Haaren beſetzt; im erſten Drittel iſt er bräunlich und der übrige Theil iſt faſt ganz ſchwarz. Die Füße ſind bräunlich. — Ein anderes Weibchen weicht von dem eben beſchriebenen darin ab, daß die Oberſeite gelblichbraun iſt; die Grundfarbe nämlich iſt ziemlich hellbraun, mit Gelb geſprenkelt. Zwei andere Exemplare, worunter ein Männchen, kommen mit dem erſten überein, indem die Grundfarbe des Rückens ſchwarz iſt. — Der Körper mißt 12″, der Schwanz 10″.

Alle bisher bekannten Exemplare ſtammen aus dem nördlichſten Theil Neuhollands her, namentlich von Port Eſſington an der Halbinſel Coburg.

5. D. macrurus Geoffr., der fleckenſchwänzige Rauhbeutler; castaneo-fuscus, albo-maculatus, cauda aequaliter maculata.

Dasyurus macrurus. Wagn. Schreb. Supplem. III. p. 23. — D. maculatus. Waterh. nat. librar. XI. p. 130. tab. 6; nat. hist. of mamm. I. p. 439. — Gould mamm. of Austral. part. 3.

Von allen andern Rauhbeutlern ſchon dadurch unterſchieden, daß nicht blos der Körper, ſondern auch der Schwanz gefleckt iſt. Waterhouſe giebt von einem Exemplare die Länge des Körpers zu 24″, die des Schwanzes zu 20″ an. Seine Heimath ſcheint nach neuern Erfahrungen lediglich auf Vandiemensland beſchränkt zu ſeyn.

III. PHASCOLOGALE. Beutelbilch.

Pedes posteriores 5-dactyli, pollice podariorum brevissimo at distincto, cauda tota brevipilosa aut apice longius penicillata, dentes 46.

Die Beutelbilche unterſcheiden ſich von den Rauhbeutlern nur durch ihre geringere Größe, welche die einer Ratte nicht überſteigt und durch

größere Anzahl von Zähnen, indem jederseits, oben wie unten, ein Lückenzahn mehr vorhanden ist. Die Zahnformel lautet: Schneidezähne $\frac{4}{4}:\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$, ächte Backenzähne $\frac{4}{4}:\frac{4}{4} = 46$. Zwar habe ich früher, nach Temminck's und Owen's Angaben, auch noch als Unterscheidungsmerkmale angeführt, daß bei den Beutelbilchen die beiden mittlern obern Schneidezähne größer seyen als die seitlichen, allein dieß Merkmal paßt nur auf zwei Arten, auf die andern aber nicht.

Es hat nämlich Waterhouse nach dem reichen Material, das ihm zur Vergleichung vorlag, zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß bei den Beutelbilchen Schneidezähne und Lückenzähne mancherlei Abänderungen aufzuzeigen hätten. Was zunächst den vordersten Schneidezahn anbelangt, so ist er nur bei Ph. penicillata und calura größer als die beiden seitlichen; bei den andern Arten aber ist er von gleicher Größe mit letzteren, ja bei Ph. albipes und crassicaudata sogar etwas kleiner. Der dritte untere Lückenzahn ist bei Ph. penicillata, leucura und apicalis viel kleiner als die beiden vorhergehenden; bei letzteren ist aber auch der dritte obere Lückenzahn sehr klein. Bei Ph. Swainsonii, flavipes und leucogaster ist der dritte obere Lückenzahn der größte und merklich kleiner als die zwei vorgehenden im Unterkiefer. Ph. leucopus, albipes und crassicaudata unterscheiden sich von den obigen nur dadurch, daß zweiter und dritter unterer Lückenzahn gleich sind. Wir finden also in der Beschaffenheit der Schneide- und Lückenzähne bei den Beutelbilchen ähnliche Verschiedenheiten wie bei den Spitzmäusen und darnach sind bei ihnen am besten Unterabtheilungen zu bilden. Ihre Backenzähne nähern sich in der Form noch mehr denen der Insektivoren an als es bei den Raubbeutlern der Fall ist.

Als ein merkwürdiger Umstand ist es hervorzuheben, daß nicht bei allen Weibchen ein Beutel vorhanden ist, und daß er wenigstens bei allen zur Unterabtheilung Antechinus gehörigen Arten zu fehlen scheint. Zitzen finden sich acht, die in einen Kreis gestellt sind. Die Verbreitung der Beutelbilche reicht von Neuguinea bis nach Vandiemensland.

†) cauda apicem versus pilis longissimis nigris vestita, dentes primores intermedii caeteris longiores. — Phascogale Temm.

1. Ph. penicillata Temm., der buſchige Beutelbilch; cinerea, subtusalba, cauda basi cinerascente.

Phasco [lo] gale penicillata. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 27. tab. CLII. B. d. — Waterh. nat. librar. IX. p. 136. tab. 8; nat. hist. of mamm. I. p. 407. — Owen cyclop. of anatom. III. p. 259. fig. 82. (Gebiß); odontograph. I. p. 375. tab. 98. fig. 3 (Gebiß). — Gould mamm. of Austral part. 1.

Die Oberſeite iſt ſilbergrau und ſchwarz geſprenkelt; die Unterſeite weiß, die Füße und Krallen fallen ins ſchmutzig Weiße. Die langen Schnurren ſind ſchwarz, die großen häutigen Ohren nur mit ganz kurzen braunen Härchen beflogen. Der Schwanz iſt an der Wurzel mit Haaren, ähnlich denen des Rückens, beſetzt, dann folgt eine etwas über 1″ lange Strecke, die nur mit kurzen ſteifen Haaren von ſchmutzig weißlicher Färbung, längs der Mitte der Unterſeite jedoch mit ſchwarzem Längsſtrich, bekleidet iſt. Der übrige Theil des Schwanzes (ohngefähr ⅔ ſeiner ganzen Länge) bildet einen buſchigen ſchwarzen Pinſel von langen glänzenden Haaren. Der Körper iſt 9″, der Schwanz 7″ lang.

Dieſe Art hat eine weite Verbreitung, indem ſie in Neu-Südwales, ſo wie im ſüdlichen und weſtlichen Neuholland gefunden wird. Sie klettert auf Bäume, um Inſekten zu ſuchen, und bereitet ſich ihr Neſt in den Höhlen der Stämme; ſie ſoll auch dem Geflügel nachſtellen.

2. Ph. calura Gould, der rothwurzelige Beutelbilch; cinerea, subtus flavido-alba, cauda basi ferruginea.

Phascologale calura. Gould proceed. of the zool. soc. XII. p. 104; mamm. of Austral. part 1. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 409. tab. 14. fig. 2.

Von Gould aufgeſtellt, bisher aber nur nach einem Exemplare vom Williams-Fluſſe im weſtlichen Neuholland bekannt. Iſt ſehr ähnlich der vorigen Art, aber kleiner, die Unterſeite leicht mit Gelb überlaufen und der Schwanz in der ganzen Wurzelhälfte mit kurzen angepreßten Haaren von ſchöner heller Roſtfarbe beſetzt; die Endhälfte bildet einen ſchwarzen Pinſel. Körper 5″ 3‴, Schwanz 5″ 2‴.

††) cauda tota brevissime pilosa, dentes primores intermedii caeteris aequales. — Antechinus Mac Leay [1]).

1) Der von Mac Leay gegebene Name Antechinus iſt mir ſeiner Ableitung nach unverſtändlich.

α) pedibus abbreviatis latis, auriculis minoribus.

3. Ph. melas S. Müll., der ſchwarze Beutelbilch; unicolor nigra.

Phascogalea melas. S. Müll. verhandel. Land- en Volkenkunde n. 1. p. 20; zool. I. p. 149. tab. 25. fig. 1—3. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 28.

S. Müller entdeckte dieſe Art in der Tritonsbay an der Weſtküſte von Neuguinea, wo er von den Eingebornen ein todtes männliches Exemplar erhielt. Die Größe iſt die einer Hausratte. Unter den Lückenzähnen iſt der dritte untere weitaus der kleinſte, aber auch der dritte obere iſt kleiner als ſeine Vorgänger; in beiden Beziehungen wie auch in der Beſchaffenheit der Schneidezähne ſchließt ſich Ph. melas an Ph. apicalis an. Die Ohren ſind mehr hoch als breit, dünn und nur mit kurzen ſchwarzen Haaren beſetzt. Der Schwanz läuft allmählig in eine Spitze aus und iſt auf der Unterſeite ſo ſparſam mit kurzen Haaren beſetzt, daß die ſchuppige, aber nicht in Ringe abgetheilte Haut allenthalben durchſchaut. Auf der Oberſeite ſtehn dagegen die Haare ſehr dicht, ſind zugleich länger, nehmen von der Hälfte des Schwanzes eine auf- und hinterwärtsgekehrte Richtung an und laufen auf dem Schwanzende in einen borſtenartigen Streif aus. Die Farbe des ganzen Pelzes iſt einförmig ſchwarz, ohne Ringelung, nur auf der Unterſeite etwas lichter; die Augen ſind ſchön braun. Körper 7″ 5‴, Schwanz 6″ 11‴.

4. Ph. Swainsonii Wat., der dunkelbraune Beutelbilch; saturate fusca, ferrugineo-adspersa, subtus flavido-cana, cauda pedibusque fuscis.

Phascogale Swainsonii. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 28. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 411.

Nächſt der vorigen die größte Art in dieſer Abtheilung, indem der Körper 7″, der Schwanz 4″ erreicht. Der dritte Lückenzahn iſt im Unterkiefer kleiner als der zweite und im Oberkiefer eben ſo groß als ſein Vorgänger, was gleich von Ph. apicalis unterſcheidet. Die Heimath iſt Vandiemensland.

5. Ph. apicalis Gray, der geſprenkelte Beutelbilch; ferrugineo-fusca, albido nigroque adspersa, subtus flavido-alba, artubus ferrugineo-lavatis.

Phascogale apicalis. GRAY ann. of. nat. hist. IX (1842) p. 518. — WATERH. nat. hist. of mamm. I. p. 413. — Antechinus apicalis. GOULD mamm. of Austral. part. 1.

Dieſe Art iſt ſchon dadurch ſehr ausgezeichnet, daß der dritte Lückenzahn im Ober- wie im Unterkiefer weitaus der kleinſte unter dieſen Zähnen iſt; außerdem macht ſie ſich auch noch bemerklich durch ihre Sprenkelung. Auf der Oberſeite ſind die Haare am Grunde dunkel ſchieferfarbig, in der Mitte licht roſtig-braun, dann weiß (auf dem Hinterrücken roſtig-weißlich) und zuletzt mit ſchwarzer Spitze. Auf der Unterſeite ſind die Haare ſchmutzig gelblich-weiß, am Grunde grau. Die Ohren ſind nicht ſonderlich groß und mit ſchwarz und falb geringelten kurzen Haaren beſetzt; die Gliedmaſſen, zumal die vorderen, ſind auf der Außenſeite hell roſtfarbig; die Füße ſchmutzig gelblichweiß oder licht gelbbräunlich. Der Schwanz iſt mit kurzen Haaren beſetzt, die auf der Oberſeite ſchwarz und bräunlichgelb geſprenkelt und auf der Unterſeite einfarbig hell bräunlichgelb ſind; das Ende mit kurzen überragenden Haaren iſt ſchwarz. Nach Waterhouſe mißt an einem alten Männchen der Körper 6″ 8‴, der Schwanz 4″, Ohren 5‴; an einem Weibchen der Körper 6″, der Schwanz 3″ 2‴; unſer Exemplar, ein Männchen, zeigt die Dimenſionen des letzteren, aber nach franzöſiſchem Maaße.

Es iſt dieſe Art am Schwanenfluß und König Georgs-Sund gefunden und ſcheint weit verbreitet in Weſtauſtralien zu ſeyn. Nach den Beobachtungen von Gilbert nähren ſich dieſe Thiere von Inſekten. An einem Weibchen fand er 7 Junge anhängend, die wenig mehr als ½ Zoll lang, ganz nackt und blind waren. Ueber den Zitzen der Mutter zeigt ſich eine ſehr kleine Hautfalte, von welcher die langen Haare der Unterſeite herab ſich ausbreiten und das Junge in der That bedecken und beſchützen. Dieſe Hautfalte am Unterleib iſt die einzige Annäherung an einen Beutel, welche Gilbert bei irgend einem Mitgliede dieſer Gattung fand.

6. Ph. flavipes WAT., der gelbfüßige Beutelbilch; saturate cana, fulvido-adspersa; gastraeo pedibusque fulvidis, gutture albido; cauda flavido nigroque adspersa, subtus flavida, apice nigra.

Phascologale flavipes. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 29. — WATERH.

nat. hist. of mamm. I. S. 415. — Ph. rufogaster. GRAY, Grey's journ. append. p. 407. — ? Antechinus Stuartii. MAC LEAY ann. of nat. hist. VIII. p. 242, 338. tab. 7.

Vom Gebiß iſt zu bemerken, daß der dritte Lückenzahn im Oberkiefer länger und im Unterkiefer kürzer iſt als ſeine beiden Vorgänger. Körper 5″ 4‴, Schwanz 3″ 2‴, Hinterfuß 9½‴. Bewohnt Neu-Südwales und Südauſtralien. Der A. Stuartii iſt nicht mit Sicherheit zu beſtimmen, da über ihn nur unzureichende Notizen vorliegen und das Original verloren gegangen iſt.

7. Ph. leucogaster GRAY, der weißbäuchige Beutelbilch; praecedenti simillima, at gastraeo guttureque albis, pedibus brunneo-albis.

Phascogale leucogaster. GRAY in Grey's journ. append. p. 407. — WATERH. nat. hist. of mamm. I. p. 417.

Dieſes Thier iſt in ſeinen Verhältniſſen, ſo wie in der Beſchaffenheit ſeines Schädels und der Zähne der Ph. flavipes ſo ähnlich, daß Waterhouſe ſehr zweifelhaft iſt, ob er es als beſondere Art, oder nur als lokale Varietät von jener beſchreiben ſoll. Indeß hat er mehrere Exemplare aus Weſt-Neuholland geſehen, welche vollkommen mit dem Original-Exemplar von Gray übereinſtimmen und von der Ph. flavipes differiren, indem die Unterſeite des Körpers weiß iſt und an den Leibesſeiten und den Füßen wenig oder kein Roſtiggelb ſich zeigt. Die Färbung der Oberſeite iſt auch etwas verſchieden, indem ſie weniger ins Graue fällt: an den Vordertheilen des Leibes iſt ſie bräunlichgrau und an den hintern ſchön braun. Die Füße ſind bräunlich weiß, hinten nicht ungewöhnlich mit Braun überlaufen. Der Schwanz iſt oben trüb braun, unten blaß braun, an der Spitze ſchwärzlich.

	I		II		III	
Körper	4″	5‴	4″	9‴	4″	6‴
Schwanz	2	10	3	2	3	2
Ohren	0	5	0	5	0	5
Hinterfuß mit Krallen . . .	0	8	0	9	0	9¼

Nachdem keines von dieſen Exemplaren die Größe von Ph. flavipes erreicht und bei allen die ganze Unterſeite weiß iſt, könnte Ph. leucogaster doch vielleicht eine eigne Art ausmachen.

8. Ph. minima Geoffr., der haſelfarbige Beutelbilch; fulvido-brunnea, subtus pallidior; cauda fusca, subtus pallidiore.

Phascogale minima. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 30. tab. CLII. B. c. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. S. 419. — Ph. affinis. Gray in Grey's journ. II. append. p. 406.

Waterhouſe, der in Paris das von Geoffroy beſchriebene Original-Exemplar verglich, findet daſſelbe zwar ſehr nahe verwandt mit Ph. flavipes, aber von dieſer doch verſchieden durch kleinere Ohren und größere Krallen. Dagegen kann er keine unterſcheidenden Merkmale zwiſchen jenem Exemplare und Ph. affinis ermitteln; denn daß erſteres kleiner und etwas anders gefärbt iſt, kann auf dem jüngeren Altersſtande und der langen Aufbewahrung in der pariſer Sammlung beruhen. Ph. affinis beſchreibt er als am Kopf und Vorderrücken bräunlichgrau, etwas mit Gelb überlaufen, am Hinterrücken tief falbbraun und auf der Unterſeite ſehr blaß gelblich. Die Füße ſind trüb braun und ſo iſt auch die Oberſeite des Schwanzes, der aber an der Baſis etwas gelb geſprenkelt iſt. Die Ohren ſind mit kurzen, meiſt gelblichen Haaren beſetzt. Die Haare ſind, auf der Ober-, wie auf der Unterſeite, am Grunde dunkel ſchieferfarbig; auf dem Rücken ſind ſie gelb geringelt und die Spitze iſt ſchwarz; am Hinterrücken iſt das Gelb durch ein ſchönes Roſtbraun erſetzt.

	Ph. minima		Ph. affinis	
Körper	3″	10‴	5″	6‴
Schwanz	2	6	2	10
Ohren	0	2¾	0	4
Hinterfuß mit Krallen	0	9⅛	0	10

Das eine Exemplar ſtammt aus Vandiemensland, das andere von der benachbarten Inſel Maria.

9. Ph. maculata Gould, der gefleckte Beutelbilch; nigro-fusca, flavido-adspersa, subtus cana, albido-maculata.

Antechinus maculatus. Gould proceed. of the zool. soc. 1851; mamm. of Austral. part. 3.

Neuerdings von Gould beſchrieben nach einem männlichen Exemplare, das im Buſchwerk am Clarence-Fluß in der Nähe der Moreton-

Bay gefangen wurde. Der Pelz ist kurz, dicht und anliegend. Die Oberseite ist dunkel schwärzlichbraun mit feiner gelblichbrauner Sprenkelung; der untere Theil der Seiten und die ganze Unterseite des Körpers dunkel bräunlichschiefergrau, mit länglichen, in unregelmäßige Längsreihen gestellten weißen Flecken; außerdem noch ein weißer Längsstreif längs der Mitte des Vorderhalses. Die Größe ist nach der Abbildung ohngefähr die der Ph. minima.

10. Ph. minutissima Gould, der zwergige Beutelbilch; cano-fusca, subtus pallida, cauda fere corporis longitudine.

Antechinus minutissimus. Gould proceed. of the zool. soc. 1852; mamm. of Austr. part. 4.

Das kleinste unter allen australischen Beutelthieren. Der Pelz ist kurz und dicht anliegend. Die ganze Oberseite mit Inbegriff des Schwanzes ist graulich braun, der letztere unten blasser; Kinn und Gurgel blaß falblich (buff.). Füße falblichbraun, Unterleib licht graufalblich, was allmählig ins Braun der Oberseite übergeht. Körper 2⅝″, Schwanz ebenso, Ohren 3‴, Hinterfuß 7/16″. — Bewohnt die Ostküste Neuhollands in der Nähe der Moreton-Bay; der einheimische Namen ist Pimburam.

β) pedibus elongatis gracilibus, rostro magis acuminato, auriculis longioribus [1]).

11. Ph. albipes Wat., der weißfüßige Beutelbilch; flavido-brunnea, nigro-adspersa, gastraeo pedibusque albis; cauda supra fusca, subtus albida.

Phascogale albipes. Waterh. proceed. of the zool. soc. 1842. p. 48; nat. hist. of mamm. I. p. 421. — Antechinus albipes. Gould mamm. of Austral. part 4.

In Größe und Färbung der Waldmaus ähnlich, von Gestalt schlanker als die vorhergehenden Arten, die Füße zierlicher und die Sohlen, welche bei jenen ganz nackt sind, mehr behaart, indem die Haare zu bei-

1) Nach Waterhouse's Bemerkung sind die fleischigen Ballen auf den Fußsohlen bei dieser und der folgenden Abtheilung mit kleinen Warzen besetzt, anstatt quergestreift zu seyn wie bei den beiden vorgehenden Abtheilungen.

den Seiten so eingreifen, daß dadurch der nackte Theil eingeengt wird. Der Schädel ist schmäler und weniger niedergedrückt als bei Ph. flavipes und deren Verwandtschaft. Der Pelz ist mäßig lang und weich. Die Haare sind am Grunde schieferfarbig, auf der Oberseite dann blaßgelb mit schwarzer Spitze, auf der Unterseite weiß. Die Augen sind schwarz eingefaßt; die Füße weißlich. Der Schwanz ist sehr kurz behaart, oben dunkel, unten schmutzig weiß. — Diese Art scheint über die ganze Südküste Neuhollands von Neu-Südwales an bis zum Schwanenflusse verbreitet zu seyn; die von der Westküste sind etwas dunkler gefärbt und die Ohren etwas minder groß.

* Phascogale leucopus. Gray ann. of nat. hist. X. (1842) p. 261; Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 423.

Dieser auf Vandiemensland vorkommende Beutelbilch stimmt in seiner Färbung mit den im Westen vorkommenden Individuen von Ph. albipes überein, indem der Rücken dunkler und die Oberseite des Schwanzes fast schwarz ist, so daß er wohl nur als deren lokale Varietät betrachtet werden darf.

	Ph. albipes.				P. leucopus.	
Körper	3″	9‴	3″	9‴	4″	4‴
Schwanz	3	2	3	2	3	7
Ohr	0	6	0	5	0	5
Hinterfuß	0	8½	0	8	0	8¾

12. Ph. murina Wat., der mausfarbige Beutelbilch; cinerea, flavido-lavata; gastraeo, pedibus caudaque albis.

Phascogale murina. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 30. — Waterh. nat. libr. XI. p. 143. tab. 10; nat. hist. of mamm. I. p. 425. — Antechinus murinus. Gould mamm. of Austral. part. 4.

Nach der Charakteristik von Waterhouse beträchtlich kleiner als Ph. albipes, die Färbung blasser, und der Schwanz einfarbig silberweiß; die Augen ebenfalls schwarz eingefaßt. Hiezu macht Gould die Bemerkung, daß der Schwanz an dem einen seiner Exemplare ebenfalls ganz weiß ist, an dem andern aber mit Braun überlaufen, zumal auf der Oberseite. Er hält das einfarbige Weiß des Schwanzes für ein Zei-

chen des jüngeren Zustandes; ich dagegen sehe es als Merkmal des erwachsenen an. Körper 3″ 3‴, Schwanz 2″ 10‴, Ohr 4½‴, Hinterfuß 7⅔‴. Von Neu Südwallis.

13. Ph. fuliginosa Gould, der rußfarbige Beutelbilch; fuliginosa-fusca, subtus cano-albida, pedibus albis, cauda fusca subtus cana.

Antechinus fuliginosus. Gould proceed. of the zool. soc. 1852; mamm. of Austral. part. 4.

Sehr ähnlich der Ph. albipes, aber durch Lebensweise wie durch viel dunklere Färbung verschieden. Die ganze Oberseite ist dunkel graulichbraun mit eingemengten längern Haaren, was ein rußiges Ansehen gibt. Gesicht hellerfarbig, Schnurren und eine schmale Einfassung der Augen schwarz, Ohren silberiggrau. Die Seiten der Brust schmutziggrau, was von der Mitte durch eine schmale falblichgraue, vom Kinn bis zur Einfügung der Vorderglieder verlaufende Linie getrennt ist. Die Unterseite ist blaß graulichweiß; Füße weiß, schwach mit Falb überlaufen; der Schwanz dunkel röthlichbraun, unten ins Graulichе übergehend. Körper 3¼″, Schwanz ebenso, Ohren 7/16″, Hinterfuß ⅝″. — Diese Art ist häufig im westlichen Neuholland, sowohl am Königs-Georgssund als in der Nähe von Perth. Sie hält sich am liebsten in frisch ausgebrannten Gegenden auf, zumal in solchen, die an Sümpfe und feuchte Wiesen grenzen. Unter den abgebrannten Stumpfen groben Grases gräbt sie die Erde aus und füllt die Höhle mit feinen Zweigen und Gras in der Form eines 2 oder 3 Zoll hohen Haufens, dessen Gipfel meist in gleicher Höhe mit der Bodenfläche liegt. Ein solcher Bau hat einen Durchmesser von 6 bis 12″ und eine Tiefe von 10 bis 15″; im Gipfel finden sich etliche Oeffnungen, die zu Gallerien führen, welche horizontal unter den Wurzeln des Gestrüppes verlaufen und in die sich das Thier bei Gefahr flüchtet. Es geht seiner Nahrung, die hauptsächlich in Insekten zu bestehen scheint, zur Nachtzeit nach.

γ) uti β. at cauda incrassata. — Podabrus Gould.

14. Ph. macrura Gould, der aschfarbige Beutelbilch; e nigricante cinerea, gastraeo pedibusque albis, cauda corpore dimidio longiore.

Podabrus macrourus. Gould proceed. of the zool. soc. XIII. (1845) p. 79;

mamm. of. Austral. part. 2. — Ph. (Antechinus) macroura. Waterh. nat. hist. of. mamm. I. p. 426.

Der Pelz ist mäßig lang und weich. Der Schwanz ist an der Basis sehr verdickt, von wo er sich allmählig gegen die Spitze verdünnt, diese Verdickung ist jedoch nur bei den Männchen beträchtlich, dagegen bei den Weibchen wenig merklich, obwohl auch bei ihnen der Schwanz dicker ist als bei den kleinen schmalfüßigen Beutelbilchen wie z. B. Ph. albipes. Die Oberseite des Körpers ist aschgrau mit Schwarz gesprenkelt, die Seiten sind lichter und schwach gelb überlaufen, die ganze Unterseite und die Füße sind weiß. Die Ohren sind mäßig groß, innen mit weißlichen, außen mit dunkeln Härchen besetzt. Von der Schnautze verläuft ein schwarzer Fleck, der sich auf dem Scheitel ausbreitet; die Augen liegen in einer schwarzen Einfassung. Der Schwanz ist blos mit kurzen Haaren besetzt, oben theilweise schwarz, theilweise gelb, im Endtheil aber ganz schwarz, seine Unterseite ist schmutzig weiß.

	Männchen		Weibchen	
Körper	4″	2‴	3″	11‴
Schwanz	3	3	2	10
Ohren	0	5	0	4¾
Hinterfuß	0	8½	0	7½

Die Schwanzdicke nahe an der Wurzel beträgt beim Männchen im Durchmesser 3¼ Linien, beim Weibchen etwas mehr als 2 Linien.

Bewohnt Neu-Südwales, wo Gilbert diese Art im Grasgebüsche auf offenen Ebenen auffand. Wie er bemerkt, differiren wie bei andern Arten dieser Gattung die Geschlechter sehr in der Größe; der Schwanz ist bei den Weibchen immer viel kleiner.

15. Ph. crassicaudata Gould, der dickschwänzige Beutelbilch; cinerea, flavido-lavata, gastraeo pedibusque albis, cauda corpore dimidio breviore.

Phascogale crassicaudata. Gould proceed. of the zool. soc. XII. (1844) p. 105. — Ph. (Antechinus) crassicaudata. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 428. tab. 15. fig. 2. — Podabrus crassicaudatus. Gould mamm. of Austral. part. 1.

Wie bei voriger Art ist der Schwanz des Männchens sehr verdickt, am meisten in der Mitte, so daß er 2½ Linien im Durchmesser hält;

bei einem Weibchen zeigt er sich kaum verdickt. Die Anschwellung rührt von Fettmasse her. Der Pelz ist lang und sehr weich, auf der Oberseite grau mit Gelb gewässert, an den Leibesseiten schön gelb und auf der Unterseite weiß. Sämmtliche Haare sind am Grunde dunkel schieferfarbig, auf der Unterseite mit weißen, an den Leibesseiten mit gelben Spitzen, auf der Oberseite mit gelbem Ringe vor der schwarzen Spitze. Die Füße und die Unterseite des Schwanzes sind weiß. Die Ohren sind groß und spärlich mit feinen, weißen Härchen beflogen, am Grunde der Außenseite mit schwarzem Fleck; die Augen sind schwarz eingefaßt. Von einem Männchen giebt Waterhouse folgende Ausmessungen an:

Körper	3″	9¾‴	Ohr	0″	9‴
Schwanz	1	9⅔	Hinterfuß	1	9⅜

Bewohnt den westlichen und südlichen Theil Neuhollands. Diese Art ist nahe verwandt mit Ph. macrura, aber letztere ist größer, ihre Ohren kleiner, der Schwanz länger und die Farbe aschgrau ohne Beimischung von Gelb, das sich nur an den Leibesseiten zeigt als eine Binde, welche das Grau der Oberseite von dem Weiß der Unterseite scheidet[1]).

IV. MYRMECOBIUS. Bänderbilch.

Pedes anteriores 5- dactyli, posteriores 4- dactyli, ungues fortes falculares, cauda tota villosa, dentes 54 minutissimi.

Mit dieser Gattung bin ich nun besser als früher bekannt geworden, indem ich von Dr. Preiß ein Exemplar mit dem Schädel acquirirte und

---

1) Noch beschreibt Tarragon (Revue zoologique 1847 p. 177.) nach einem Felle einen Beutelbilch, den er unter dem Namen Phascogale Virginiae als neue Art aufstellt. Der Pelz ist grau, dunkler auf dem Rücken, röthlich gewässert an den Seiten. Eine schwarze Binde geht von der Schnautzenspitze aus und verliert sich auf dem Scheitel in die dunklere Rückenfarbe; eine andere, ebenfalls von der Schnautzenspitze ausgehend, richtet sich gegen das Auge und umfaßt dasselbe. Ganze Unterseite weiß, Füße graulich, Schwanz fein behaart, oben von der Farbe des Rückens, unten blasser. Körper 10 Centimeter (3″ 8‴), Schwanz fast eben so viel. — Nach dieser Beschreibung, die wesentliche Verhältnisse unberücksichtigt gelassen hat, läßt sich mit Sicherheit kein Urtheil fällen; die meisten Merkmale würden so ziemlich auf ein Weibchen der Ph. macrura passen.

überdieß noch anderweitige Beiträge zu ihrer genauern Kenntniß hinzugekommen ſind. Nach ihrem äußern Habitus, der buſchigen Beſchaffenheit des Schwanzes und dem Fußbaue ſchließt ſie ſich an Dasyurus und Phascologale an; an letztere Gattung überdieß noch durch die äußern Umriſſe des Schädels und den Mangel von Leiſten auf demſelben, ſo wie durch das Fehlen des Beutels. Dagegen entfernt ſie ſich dem Zahnbaue nach ſo ſehr von allen übrigen Daſyurinen, daß ſie nur als ein über den Typus ſtark ausſchreitendes Mitglied derſelben betrachtet werden kann, noch weniger aber einer andern Familie zuzutheilen iſt.

Meiner frühern Beſchreibung des Zahnbaues habe ich nur noch Folgendes zuzuſetzen. Das vollſtändige Gebiß enthält 54 Zähne, nämlich $\frac{4}{4}:\frac{4}{4}$ Schneidezähne, $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$ Eckzähne, $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$ Lückenzähne und $\frac{8}{8}:\frac{8}{8}$ Backenzähne; eine Zahl, welche von keiner andern Gattung der Beutelthiere erreicht wird. Dabei ſind alle Zähne winzig klein und ſämmtlich von einander abgerückt, ſo daß auch im Oberkiefer keine vorn, ſondern alle ſeitlich ſtehen: Verhältniſſe, die an das Gebiß der Gürtelthiere erinnern. Bei der Schwäche der Zähne und der Länge der Zunge ſcheinen die Berichte begründet zu ſeyn, daß der Bänderbilch hauptſächlich von Ameiſen ſich ernährt.

Nach den Angaben von Waterhouſe ſind 53 oder 54 Wirbel vorhanden, nämlich 7 Halsw., 13 Rückenw., 6 Lendenw., 4 Kreuzw. und 23 oder 24 Schwanzwirbel. Die Gaumenbeine ſind ſehr ausgedehnt und ohne Oeffnungen. Nach den Mittheilungen von Dr. Preiß[1]) und Gilbert fehlt dem Weibchen der Beutel; der einzige Schutz für die Jungen ſind die langen Haare am Bauche der Mutter. Das Weibchen ſcheint 8 Zitzen zu haben, wenigſtens ſah Gilbert bei einem ſolchen

1) Dem Exemplare, welches ich von Dr. Preiß erhielt, war folgender Zettel beigefügt. „Myrmecobius fasciatus Waterh., ab orig. „Numbat“, ab incolis “anteater.“ ♂ adult. Lingua longa lineari-lanceolata. Von mir zuerſt im J. 1839 im York-Diſtrikte entdeckt. Gräbt in die Erde. Die Geburt findet Ende Sommers (März) ſtatt. Das Weibchen hat keinen Beutel, ſondern die Jungen, deren immer nur 4 von der Größe einer Erbſe bis zur Haſelnuß, nackt und blind angetroffen werden, haben die 4 — 5 Linien langen Zitzen im Munde, von welchen ſie mit einiger Gewalt geriſſen werden müſſen.“

7 Junge an den Warzen hängen. Die Bänderbilche bewohnen den westlichen und südlichen Theil Neuhollands.

1. **M. fasciatus** Wat., der Numbat; ochraceo-fulvescens, tergo nigrescens, fasciis transversis albis ornatus. — Tab. 16.

Myrmecobius fasciatus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 33. — Waterh. nat. libr. XI. p. 145. tab. 11; nat. hist. of mamm. I. p. 396. tab. 14. fig. 1. (Thier), tab. 21. fig. 1. (Schädel u. Gebiß). — Gould mamm. of Austral. part. 1. — Owen cyclop. of anatom. III. p. 260. fig. 83. (Schädel); odontograph. p. 377. tab. 98. fig. 4. (Gebiß).

Wenn der Numbat, wie Gilbert angibt, auf dem Boden läuft, sieht er einem Eichhörnchen ähnlich und macht auch solche Sprünge, wobei er den Schwanz etwas erhebt. Bei Gefahr flüchtet er sich in liegende hohle Stämme, wo er leicht gefangen wird und dann so harmlos sich zeigt, daß er nicht einmal zu beißen versucht.

II. Familie.

Syndactylina. Haftbeutler.

Rostrum porrectum attenuatum, pedes posteriores elongati, digitis secundo et tertio coadunatis, dentes primores superiores 10.

Eine ausgezeichnete Familie, indem sie dem Gebiße nach den Raubbeutlern angehört, während die Hinterfüße denen der Känguruhs ähnlich sind [1]). Unter allen australischen Beutelthieren besitzt diese Familie die größte Anzahl von obern Vorderzähnen, in welcher Beziehung nur die amerikanischen Beutelratten ihr gleichkommen. Die Zahnformel lautet: Schneidezähne $\frac{3}{3}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{3}{3}$, ächte Backenzähne $\frac{4}{4}$ = 48. Die Weibchen sind mit einem Beutel versehen.

V. PERAMELES. Bandikut.

Pedes anteriores 5-dactyli: digitis 2 exterioribus minutissimis amotis.

Von Neuguinea bis nach Vandiemensland verbreitet. Die bei mei-

1) Die Füsse von Perameles obesula hat Waterhouse in seiner Nat. hist. of mamm. I. tab. 12. fig. 6. abgebildet.

ner ersten Bearbeitung noch höchst unsicher gekannten Arten sind jetzt, hauptsächlich durch die Bemühungen von Waterhouse, meist evident festgestellt.

. †) cauda elongata supra cristata, vellere molli, pollice podariorum nullo. — Macrotis Reid, Peragalea Gray.

1. P. lagotis Reid, der kammschwänzige Bandikut; grisea, lateraliter vinaceo-rufescens, subtus alba; auriculis longitudine capitis.

Perameles lagotis. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 61. — Waterh. nat. librar. XI. p. 153. tab. 12; nat. hist. of mamm. p. 360. tab. 13. fig. 1. (Thier), tab. 20. fig. 1. (Schädel). — Owen odontograph. p. 379. tab. 98. fig. 5. (Gebiß). — Peragalea lagotis. Gray, Grey's journ. II. app. p. 401; list. of mamm. p. 96. — Gould mamm. of Austral. part. 1.

Von den andern Arten sehr unterschieden durch den langen, oben buschigen Schwanz, die langen Ohren, den gänzlichen Mangel des Hinterdaumens und den weichen Pelz, der keine Beimischung starrer Haare hat.

Nach eigener Ansicht eines Exemplares füge ich noch folgende Bemerkungen bei. Die Schnautze ist sehr lang und sehr spitz; die Ohren beträchtlich groß, denen des Hasen ähnlich, lang oval, zugespitzt, an der Wurzel vom Kopfpelz umgeben, dann nackt mit einzelnen braunen Härchen. Der Schwanz ist an den Seiten spärlich, oben und unten mit längeren, straffen Haaren besetzt. Die Haare der Oberseite bilden hinter der Mitte des Schwanzes einen schmal zusammengedrückten Kamm von langen steifen, hinterwärts und aufwärts gerichteten Borsten, die am Ende überragen und hier am längsten sind, während dagegen die Behaarung der Seiten und der Unterseite an Länge und Reichlichkeit immer mehr abnimmt und im letzten Drittel nur noch aus angedrückten Härchen besteht, zwischen welchen die Haut durchscheint. — Die Oberseite ist trüb aschgrau, mit ziemlich einfarbigen Haaren, die Unterseite ist weiß, ebenfalls einfarbig; beide Farben an den Seiten durch einen licht weinröthlichen Anflug geschieden. Die Füße sind weiß, die Hinterläufe mit schwarzbraunen Haaren besetzt, die Krallen gelblich weiß. Der Schwanz ist auf eine kurze Strecke ähnlich dem Rückenpelz behaart und gefärbt, dann bis etwas hinter die Mitte schwarz, zuletzt weiß.

Körper	16″	2‴	Schwanz oben mit Pelzbeſatz auf	1″	7‴
Ohren	3	6	— „ ſchwarz	4	4
Schweifrübe	9	9	— „ weiß bis zur Spitze		
Ueberragendes Haar . .	1	4	der Schweifrübe faſt.	4	0

Dieſe Art findet ſich ziemlich häufig in den innern Diſtrikten der Schwanenfluß-Kolonie, wo ſie Gänge in den Boden gräbt und von Inſekten ſich nährt. Die Angabe, daß ſie auch auf Vandiemensland vorkomme, ſcheint auf Irrthum zu beruhen.

††) cauda breviuscula, brevipilosa, vellere rudi, pollice podariorum brevissimo exunguiculato. — Perameles Geoffr.

2. P. macrura Gould, der borſtenſchwänzige Bandikut; supra flavido nigroque adspersa, subtus flavescens, pedibus brunneo-albidis; cauda subelongata rattiformi.

Perameles macroura. Gould proceed. of the zool. soc. X (1842) p. 41. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 366.

Die Haare der Oberſeite ſind ſo ziemlich zu gleichen Theilen ſchwarz und gelb geſprenkelt, an den Seiten herrſcht das Gelbe vor, die Unterſeite iſt zart gelb oder gelblich weiß. Die unter den Stichelhaaren liegenden Wollhaare ſind bräunlich grau. Die Füße ſind bräunlichweiß, die hintern undeutlich mit Gelb überlaufen. Der Schwanz gleicht dem einer Ratte, indem er nur ſpärlich mit kurzen Haaren, die unten die ſchuppige Haut nicht verdecken, beſetzt iſt; er iſt ohngefähr von halber Leibeslänge, oben ſchwarz, unten bräunlich weiß. Die Ohren ſind mäßig groß, innen mit kurzen gelben Haaren beſetzt, außen mit dunkeln, mit Ausnahme des hintern Theils, wo ſie blaß ſind.

Körper	16″	0‴	Von der Naſe zum Ohr . .	3″	6‴
Schwanz	7	2	Vorderfuß mit Kralle . . .	1	7
Ohr	0	10	Hinterfuß „ „ . . .	3	2

Um Port Eſſington im nördlichen Theil von Neuholland. P. macrura gleicht ſehr der P. obesula, aber erſtere wird größer, der Schwanz iſt länger, die Hinterfüße ſind faſt einfarbig, nicht ſchwarz geſprenkelt, und der hintere obere Schneidezahn iſt in Berührung mit den andern.

3. P. obesula Shaw, der kurzſchnauzige Bandikut; supra flavido nigroque adspersa, subtus flavido-alba, pedibus flavescentibus, parum nigro-adspersis; cauda abbreviata.

Perameles obesula. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 59; Wiegm. Archiv f. Naturgesch. VII (1841) 1. S. 290. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 368. tab. 20. fig. 2. (Schädel). — P. fusciventer. Gray in Grey's journ. II. append. p. 407. — P. affinis. Gray list. of mamm. p. 96.

Zur Zeit meiner ersten Bearbeitung der Beutelthiere war diese Art so unbestimmt beschrieben, daß ich ein in unserer Sammlung aufgestelltes Exemplar von ihr verkannte und es für P. nasuta hielt und es bei letzterer Species beschrieb. Die genaue Beschreibung, welche seitdem Waterhouse, der sich an dem Original-Exemplare Shaw's orientiren konnte, von der P. obesula beibrachte, ließen mich meinen Irrthum erkennen und (a. a. O.) zeitig berichtigen. Zur Sicherstellung dieser Art mögen aus der von Waterhouse gelieferten Charakteristik noch einige Mittheilungen hier folgen.

Der Pelz ist sehr grob, die Färbung dunkler als bei den andern Arten (mit Ausnahme von P. macrura), oben schwarz und schön gelb gesprenkelt, auf der Unterseite gelblich weiß. Die Ohren sind klein, innen mit kurzen gelblichen, gegen den Rand bräunlichen Härchen besetzt, außen sind diese dunkel, aber blasser am hintern Rande. Die Vorderfüße sind weißlich, die hintern sind schmutzig gelblichweiß, auf der obern Seite etwas schwarz gesprenkelt, auf der innern schön gelb. Der Schwanz mißt ⅓ oder weniger von der Körperlänge, ist oben dunkel, unten gelblichweiß. Der Schädel unterscheidet sich von dem der meisten andern Arten, daß er weniger gestreckt und verschmächtigt und der knöcherne Gaumen minder durchbrochen ist, indem die Löcher verhältnißmäßig kleiner sind. Der hinterste obere Schneidezahn ist kleiner als der vierte und liegt näher an demselben als bei den meisten andern Arten.

Körper	15″	6‴	Von der Nase zum Ohr . . .	3″	2‴
Schwanz	5	6	Vorderfuß mit Kralle	1	6
Ohr	0	9	Hinterfuß „ „	2	8

Maaße vom knöchernen Schädel nach Waterhouse's Angabe:

Länge des Schädels . .	3″	0‴	Nasenbeine	1″	3½‴
Breite „ „ . . .	1	4	Vom vordersten Schneidezahn		
Länge des Gaumens . .	1	9¾	bis hinter den letzten Backenzahn	1	7½

Diese Art hat eine ungemein weite Verbreitung, indem sie in Neu-

Südwallis, Südaustralien, König-Georgssund, am Schwanenflusse und auf Vandiemensland gefunden wird. Was P. fusciventer und affinis anbelangt, so erklärt Waterhouse, daß er keinen Grund finde, selbige von P. obesula specifisch zu scheiden. In einem von Frank mir zur Ansicht zugeschickten Exemplare von P. fusciventer konnte ich auch nichts anders als die P. obesula im noch nicht erwachsenen Zustande erkennen.

4. P. nasuta Geoffr., der langschnautzige Bandikut; supra brunneo nigroque adspersa, subtus flavido-alba; cauda supra fusca, subtua albida, rostro longissimo.

Perameles nasuta. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 57. (zum Theil). — Waterh. nat. libr. XI. p. 155. tab. 13; nat. hist. of mamm. I. p. 374. — Owen, cyclop. of anatom. III. p. 260. fig. 84. (Gebiß).

Ich habe schon bei P. obesula bemerklich gemacht, daß das von mir aus der hiesigen Sammlung als P. nasuta beschriebene Exemplar nicht dieser, sondern jener Art angehört. Zur sichereren Unterscheidung soll hier Waterhouse's Beschreibung von P. nasuta folgen.

Die Schnautze ist länger als bei andern Arten. Der Pelz ist grob, oben blaß braun und schwärzlich gesprenkelt, an den Seiten, wo das Schwarz fast ganz fehlt, blaß weinröthlich, unten gelblich weiß; die Füße schmutzig weiß. Die Ohren sind mäßig groß, innen mit weißlichen, außen mit dunkeln Härchen, doch lichtbraun am vordern Winkel, besetzt. Der Schwanz ist oben mit dunkeln, unten mit schmutzig weißen, kurzen, steifen Haaren besetzt.

Körper	16″	0‴	Von der Nase zum Ohr .	4″	1‴
Schwanz	5	0	Vorderfuß	1	11
Ohr	1	4	Hinterfuß	3	5

Im Oberkiefer sind 4ter und 5ter Schneidezahn durch einen Raum von 2‴ getrennt; vom Vorderrand des ersten Schneidezahns bis zum ersten ächten Backenzahn ist ein Raum von 1″ 4¼‴.

Bewohnt Neu-Südwallis[1])

1) Waterhouse betrachtet die P. Bougainvillei (Schreb. Supplem. III. S. 58) nicht, wie ich mit Cuvier und Temminck vermuthete, als das Junge von P. nasuta,

5. P. doreyanus Quoy, der Kalubu; supra e rufescente fusca, subtus flavescens, cauda pilis raris brevibus obsita.

Perameles doreyanus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 60. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 386.

Zur Kenntniß dieser auf Guinea vorkommenden Art sind keine weitere Beiträge erschienen.

6. P. Gunnii Gray, der weißschwänzige Bandikut; supra brunneo nigroque adspersa, subtus alba, tergo fasciis lateralibus quaternis ornato; cauda alba, basi supra macula fusca notata.

Perameles Gunnii. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 61. — Waterh. natur. libr. XI. p. 156. tab 15; nat. hist. of mamm. I. p. 376.

Von dieser Art hat seitdem die hiesige Sammlung ein erwachsenes weibliches Exemplar erhalten, wonach mit Beiziehung der Beschreibung von Waterhouse unser früherer Artikel ergänzt werden kann.

In der Größe und in der Verlängerung der Schnautze kommt P. Gunnii mit P. nasuta überein. Die Haare der Oberseite sind falbbräunlich und schwarz gesprenkelt, wobei Letzteres hinterwärts überwiegt. Sehr ausgezeichnet ist diese Art durch die 4 weißen Querbinden, welche den dunkeln Grund des Hinterrückens durchziehen, doch so, daß sie längs der Mitte durch einen dunkeln Längsstreif unterbrochen sind. Von diesen 4 halbirten Querbinden verläuft die vorderste vor den Oberschenkeln, die 3 folgenden wenden sich dagegen immer mehr hinterwärts. Die ganze Unterseite, die Füße und der Schwanz sind weiß, letzterer an der Wurzel mit einem kleinen schwarzen Fleck auf der Oberseite. Die Ohren sind ziemlich groß und zugespitzt, von lichter Farbe, spärlich mit lichtgelblichen Härchen besetzt, am Vorderrande der Außenseite mit längeren Haaren, die in der Mitte einen schwarzbraunen, an der Basis bräunlichfalben Fleck bilden.

Körper	16″	6‴	Von der Nase zum Ohr .	4″	4‴
Schwanz	4	0	Vorderfuß	1	6
Ohr	1	2	Hinterfuß	3	0

sondern als selbstständige Art, was jedoch noch des Beweises bedürftig ist. Dagegen stimme ich ihm bei, daß P. Lawsonii (Schreb. a. a. O. S. 63) wohl nichts anderes als P. nasuta seyn wird.

Der hinderſte Schneidezahn iſt ſpitz, größer als ſein Vorgänger und von ihm weit abgerückt.

Bewohnt Vandiemensland.

7. P. fasciata Gray, der gebänderte Bandikut; praecedenti simillima, at minor, cauda longiore, supra usque ad apicem nigra.

Perameles fasciata. Gray in Grey's journ. II. append. p. 407. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 379. — Gould mamm. of Austral. part. 2.

In der Geſtalt und Färbung ganz und gar mit P. Gunnii übereinſtimmend, mit der Ausnahme, daß P. fasciata kleiner iſt, die Ohren verhältnißmäßig länger ſind, der Schwanz ebenfalls länger und auf ſeiner ganzen Oberſeite (nicht blos an der Wurzel wie bei P. Gunnii) ſchwarz gefärbt, ferner die Füße und Schnautze ſchlanker. Zur Vergleichung der Dimenſionsverhältniſſe ſind den Ausmeſſungen von einem erwachſenen Exemplar der P. fasciata die von einem jungen Individuum der P. Gunnii beifügt.

	P. fasciata		P. Gunnii	
Körper	11″	3‴	11″	9‴
Schwanz	4	0	2	8
Ohr	1	2½	0	11½
Von der Naſe zum Ohr	3	6	3	1½
Vorderfuß mit Krallen	1	2	1	2
Hinterfuß „ „	2	3½	2	5½

Bewohnt die öſtlichen und ſüdlichen Theile Neuhollands, wo dieſe Art als Repräſentant der auf Vandiemensland einheimiſchen P. Gunnii auftritt. Wenn ſie gejagt wird, läuft ſie mit großer Schnelligkeit und mit einer Bewegung, die dem Galoppiren eines Schweines vollkommen ähnlich iſt. Das Fleiſch iſt, wie das anderer Arten, ſehr ſchmackhaft.

8. P. myosuros Wagn., der buntohrige Bandikut; supra brunneo nigroque adspersa, subtus alba, tergo fascia transversali nigricante ornata; auriculis majusculis extus tricoloribus.

Perameles myosuros. Wagn. Schreb. Säugth. tab. CLV. A. d. (1842); Wiegm. Archiv f. Naturgeſch. VII. 1. (1841) S. 293. — Gould mamm. of Austral. part. 1. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 381. tab. 20. fig. 3 (Schädel). — P. arenaria. Gould proceed. of the zool. soc. 1844 p. 104.

Gould und Waterhouse haben es richtig erkannt, daß meine P. myosuros mit der später publicirten P. arenaria identisch ist.

Die Schnautze ist sehr gestreckt und spitz, die Ohren ziemlich groß, der Schwanz kurz, die Wollhaare außerordentlich reichlich, zumal am Hintertheile, und grau. Die Oberseite ist falbbraun und schwarz gesprenkelt, was Letzteres an den Seiten allmählig verschwindet; die Unterseite und Füsse sind weiß. An der Stelle, wo bei P. Gunnii in der Lendengegend die erste weißliche Querbinde verläuft, zieht sich auch bei P. myosuros eine lichtere Binde hin, und dahinter verläuft, wie bei jener Art, ebenfalls eine schwarze Querbinde, hinter der aber keine andern nachfolgen. Durch diese lichtere Querbinde, die nur ein Ausfluß der gleichfalls lichteren Seitentheile des ganzen Körpers ist, bildet die dunkle Rückenfärbung eine Art Sattel, wie es übrigens auch bei P. Gunnii der Fall ist. Die Ohren sind innen mit gelblichen Härchen beflogen; auf der Hinterseite sind sie am Grunde lichtfalb, dann schwarzbraun und an der Spitze licht bräunlichgrau. In der Angabe der Beschaffenheit des Schwanzes stimmen Waterhouse und Gould nicht ganz mit mir überein, indem sie ihn zwar ebenfalls mit kurzen Haaren besetzt angeben, dabei aber doch so dicht, daß die Haut unten ganz verdeckt wird, oben dunkelbraun, unten weißlich. Diese Differenz bewog mich, mein Exemplar nochmals näher zu prüfen, und da fand es sich, daß dessen Schwanz nicht mit dem Balg verwachsen, sondern eingesetzt ist, so daß er also wohl beim Abbalgen verloren gegangen seyn mag, und durch den irgend eines andern Thieres ersetzt wurde [1]). Waterhouse gibt folgende Maaße an:

Körper	11″	0‴	Von der Nase zum Ohr . .	3″	1‴
Schwanz	0	3	Hinterfuß	2	4
Ohr	1	3			

Der Schädel ist sehr ähnlich dem von P. Gunnii, doch ist der hin-

1) Gilbert macht die Bemerkung, daß unter allen Beutelthieren keines so schwierig abzuziehen sey als dieses wegen der außerordentlich dünnen Beschaffenheit des Felles, und er habe (wie dieß Gould bei Choeropus anführt), häufig Exemplare von dieser P. myosuros gesehen, bei denen der Schwanz durch irgend einen Zufall verstümmelt oder ganz fehlend war.

terſte Schneidezahn nicht ſo nahe an den Eckzahn gerückt wie bei jener, ſo daß er mehr in die Mitte zwiſchen letzterem und dem vorletzten Schneidezahn zu ſtehen kommt[1]).

Der buntohrige Bandikut bewohnt den Schwanenfluß-Diſtrikt und die Umgegend des König-Georgs-Sund. Er hält ſich in dichtem Geſtrippe auf und legt auf dem Grunde ein Neſt aus Gras und andern Materialien an; er gräbt in der Erde mit großer Schnelligkeit und nährt ſich von Inſekten und Sämereien[2]).

VI. CHOEROPUS. Beutelferkel.

Pedes anteriores tantum 2-dactyli.

Die höchſt mangelhaften und zum Theil irrigen Angaben, auf welche ich mich in meiner frühern Arbeit ſtützen mußte, ſind nun zur Genüge ergänzt und berichtigt.

Die Geſtalt iſt ſchlank und ſchmächtig. Die Schnautze iſt ſehr geſtreckt und ſpitzig, die Gliedmaſſen ſind ziemlich lang, ſehr dünn und fein, die Vorderfüſſe haben nicht mehr als zwei Zehen und dieſe ſind klein, gleichlang und mit kurzen zuſammengedrückten Nägeln verſehen. Die Hinterfüſſe ſind vierzehig, indem die innere Zehe fehlt, aber das Auffallende iſt, daß von den andern nur eine wohl entwickelt iſt, während die beiden verwachſenen Zehen ſehr klein und weit abgerückt ſind, was noch mehr von der äußern gilt. An den Hinterfüſſen haben zwar ebenfalls alle Zehen Nägel, aber nur an der großen iſt er deutlich entwickelt und hat eine zuſammengedrückte coniſche Form; die Nägel der andern Zehen ſind ſehr klein. Die Ohren ſind groß und ſpitz. Der Schwanz fehlt nicht, wie die erſten Nachrichten von dieſem Thiere angaben, ſondern er iſt kurz, dünn und mit kurzen Haaren beſetzt, von denen die auf der Ober-

1) Vgl. übrigens meine Beſchreibung des Schädels und Gebißes in Wiegm. Archiv a.a.O. 2) Wie Waterhouſe (a. a. O. S. 388) bemerklich macht, iſt ſeine Perameles Harveyi (proceed. X. p. 47) und Gray's P. Tuckeri (Schreb. Supplem. III. S. 62) aus der Liſte der Bandikuts zu ſtreichen. Beide gehören zu Hypsiprymnus, und zwar die erſte zu H. Grayi und die andere zu H. murinus.

ſeite länger ſind als die andern. Der Beutel iſt abwärts gerichtet wie bei den Bandikuts.

Die Beſchaffenheit des Schädels und Gebißes iſt ziemlich dieſelbe wie bei den Bandikuts. Zwar giebt Owen[1]) im Oberkiefer nur 8 Schneidezähne an, wonach alſo 2 weniger als bei jenen vorhanden wären, allein Waterhouſe[2]) bildet nicht blos 5 + 5 obere Schneidezähne ab, ſondern ſagt ausdrücklich in ſeiner Beſchreibung, daß dieſe Anzahl vorhanden iſt. Demnach kommt das Gebiß von Choeropus in der Zahl mit Perameles vollkommen überein. In der Form unterſcheidet es ſich von letzterer Gattung hauptſächlich dadurch, daß alle Zähne klein, die obern Schneidezähne alle aneinander ſtoßend und nicht zuſammengedrückt, ſondern mehr coniſch ſind, ferner ſind die Lückenzähne, nach Owen, ebenfalls getrennt, was von Waterhouſe wenigſtens für den erſten obern angegeben wird; die ächten Backenzähne ſind wie bei den Bandikuts. Das Gebiß von Choeropus iſt demnach im Weſentlichen das von Perameles, aber mit Hinneigung zu dem von Myrmecobius.

In der Lebensweiſe kommen die Beutelferkel mit den Bandikuts überein.

1. Ch. castanotis Gray, das Beutelferkel; supra brunneus, subtus albidus. — Tab. 17.

Choeropus castanotis. Gray, ann. of nat. hist. IX. (1842) p. 42. — Gould, mamm. of Austral. part. 1. — Waterh. nat. librar. XI. p. 163; nat. hist. of mamm. I. p. 391. tab. 13. fig. 2. — Ch. ecaudatus Ogilb. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 64.

Der Pelz iſt lang und ziemlich weich. Die Oberſeite iſt braungrau oder braun mit roſtfarbigem Anfluge, die Unterſeite weiß oder gelblichweiß. Die Ohren ſind mit kurzen roſtgelben Härchen beſetzt, gegen die Spitze aber ſchwärzlich. Die Vorderfüſſe und die große Zehe der Hinterfüſſe ſind weißlich, die Tarſen blaß roſtfarbig. Der Schwanz iſt auf der Oberſeite und an der Spitze ſchwarz, auf der Unterſeite bräunlichweiß oder licht roſtfarbig. Die Unterwolle iſt ſo reichlich wie bei P. myosuros. Der Körper mißt 9½ bis 11″.

1) Odontograph. p. 379. 2) Nat. hist. of mamm. I. p. 380. tab. 20. fig. 4. (Schädel und Gebiß).

Körper	9″	6‴	Von der Naſe zum Ohr . .	2″	7‴
Schwanz	4	0	Vorderfuß	1	½
Ohr	1	11	Hinterfuß	2	7¾

Das Beutelferkel findet ſich in den weſtlichen und ſüdlichen Theilen von Neuholland.

III. Familie.

Pedimana. Daumenfüßer.

Pedes 5-dactyli, posteriores pollice distincto oppositionabili instructi; cauda elongata plus minus nuda.

Eine Familie, die ausſchließlich auf Amerika beſchränkt iſt. Die Zahnformel lautet: Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{3}{3}$, ächte Backenzähne $\frac{4}{4}$ = 50 Zähne.

VII. DIDELPHYS. Beutelratte.

Digiti omnes liberi.

Die meiſten Zuſätze zu dieſer Gattung ſind durch Natterer's, von mir publicirten Entdeckungen [1]) nöthig geworden.

†) mastotheca ventrali ampla; vellere aut omnino brevi laneo aut setis rigidis longioribus intermixto.

α) vellere setis longioribus intermixto.

1. **D. virginiana** Shaw, die weißköpfige Beutelratte; **Cati magnitudine, pilis laneis basi albis, apice fuscis; sericeis longis toto albis; capite colloque pure albidis.**

Didelphys virginiana. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 37. tab. CXLV*. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 465. — Meigs ann. of nat. hist. XX. (1847) p. 324. — Dekay nat. hist. of Neu York, zool. I. p. 3. tab. 15. fig. 2.

Den gemäßigten Gegenden Nordamerikas angehörig.

2. **D. poecilotis** Natt., die ohrfleckige Beutelratte; **Cuniculi**

1) Zuerſt habe ich in Wiegm. Archiv f. Naturgeſch. 1842. 1. S. 358 die Diagnoſen der neuen Arten, dann die ausführlichen Beſchreibungen in den Abh. der Münchner Akadem. der Wiſſenſch. V. S. 125. mitgetheilt.

magnitudine, pilis laneis albidis, sericeis plerumque basi albis, apice nigris, nonnullis totis albis; auriculis albido-carneis, basi nigro-maculatis, gastraeo albido.

Didelphys poecilotis. Wagn. im Arch. für Naturgesch. 1842. S. 358; Abh. der Münch. Akadem. V. S. 126.

Wie bei mehreren anderen Beutelratten sind auch bei der D. Azarae etliche Arten bis auf die neueste Zeit mit einander vermengt und verwechselt worden. Temminck, der sie zuerst absonderte, ließ sie gleichwohl noch mit dem von Azara[1]) beschriebenen Micouré propement dit beisammen, was nicht zu billigen ist, da sowohl Azara als Rengger[2]) und Waterhouse[3]) diesem Thiere röthlichweiße Ohren mit schwarzer Basis zuschreiben, während die brasilische D. Azarae und cancrivora in all den vielen Exemplaren, die ich gesehen habe und womit auch der Prinz von Neuwied übereinstimmt, schwarzbraune Ohren zeigt. Behält man für diese brasilischen Exemplare den Namen D. Azarae bei, so muß dem von Azara beschriebenen Thiere, als einer davon verschiedenen Species, ein anderer gegeben werden; der Name Didelphys leucotis möchte der bezeichnendste seyn.

Von den großen schwarzöhrigen brasilischen Beutelratten ist aber weiters noch eine andere, jedoch ebenfalls Brasilien angehörige Art zu sondern, welche in der Färbung der Ohren ganz von diesen abweichend, an die von Azara beschriebene erste Beutelratte sich anschließt. Wenn ich sie gleichwohl nicht mit dieser specifisch vereinige, so kommt dieß nicht blos aus der Bedenklichkeit her, daß mir die angeführte paraguay'sche Beutelratte aus Autopsie nicht bekannt ist, sondern noch mehr deßhalb, weil ich bei Vergleichung unserer Exemplare mit den vorliegenden Beschreibungen auf etliche erhebliche Differenzen gestoßen bin, von denen am Schlusse die Rede seyn wird.

Der Kopf ist spitz, die Nasenkuppe unterwärts breit ausgehöhlt; die Schnurren lang und steif; die Ohren groß und fast ganz nackt. Die Hinterfüße sind kurz, mit großer Spannhaut zwischen dem Daumen und

1) Ess. I. p. 233. 2) Säugth. v. Paraguay. S. 243. 3) Marsup. p. 83. Tab. I.

der zweiten Zehe; die Zehen sehr spärlich behaart, die Sohlen nackt. Dem weichen Wollpelz sind auf dem Rücken 1½ bis 2″ lange Stichelhaare eingemengt, die an der Seite spärlicher und kürzer sind. Der Schwanz ist durchgängig geschuppt, was an der Wurzel auf eine gute Strecke hin durch lange Stichelhaare ziemlich verdeckt wird; wo diese aufhören, folgen nur noch kurze angedrückte Härchen.

Die Farbe der Wollhaare ist gelblich weiß. Die langen Stichelhaare des Rückens sind in ihrer kleinern Hälfte weiß, in der obern schwarz, doch sind ihnen einige ganz weiße Stichelhaare, aber sehr spärlich eingemengt. An den Seiten herrscht die gelblichweiße Farbe vor, indem die Stichelhaare hier nicht blos seltener, sondern auch mit kürzern und heller schwärzlichen Spitzen versehen sind, überdieß ein guter Theil von ihnen ganz weiß ist. Die ganze Unterseite des dicht behaarten Unterleibes ist einfarbig gelblichweiß, indem hier Woll- und Stichelhaare ihrer ganzen Länge nach gleichförmig gelblich weiß sind. Der ganze Kopf und Hals ist ebenfalls von letztgenannter Farbe, was nur durch 3 Längsstreifen unterbrochen ist. Der mittelste beginnt am hintern Ende des Nasenrückens, zieht als ein schmaler schwarzer Streifen zwischen den Augen und Ohren hindurch, breitet sich auf dem Hinterkopf etwas aus, verengt sich dann in eine schmale Linie auf dem Hinterhalse, und indem er sich am Nacken wieder ausbreitet, verbindet er sich mit der schwarzen Rückenfarbe. Die Augen liegen in einem schmalen braunen Ringe, der sich etwas rück- und vorwärts in einen verwischten lichtbräunlichen Streif verlängert. Die Schnurren sind schwarz; die Ohren weißlich fleischfarben, mit großem schwarzem Fleck am Grunde. Die Gliedmassen sind in ihrem untern Theile schwarz behaart. So weit der Schwanz an seiner Wurzel mit langen Stichelhaaren bedeckt ist, sind diese schwarz und haben nur im Anfange eine kurze weißliche Basis. Wo sie aufhören, was unten eher eintritt als oben, ist der Schwanz auf eine kurze Strecke schwarz, und die kurzen angedrückten Borstenhaare sind es ebenfalls; die größere Endhälfte ist aber weißlich fleischfarben und ihre Borsten sind schmutzig weißlich.

Körper	13″	10‴	Von der Nase zum Auge	1″	4‴
Schwanz	9	7	Von der Nase zum Ohr	2	10

Behaarter Theil desselben oben ohngefähr	3″	9‴	Ohr	1″	7‴
Weißes Endstück des nackten Theils	5	3	Hinterfuß	1	3½

Natterer brachte zwei gleichgroße Weibchen dieser Art von Angaba mit, die beide mit einem Beutel versehen sind.

Daß diese D. poecilotis von D. Azarae wie von D. cancrivora spezifisch abweicht, wird nicht wohl bestritten werden können. Nicht so leicht ist die Entscheidung in Bezug auf D. leucotis, zu der sie in nächster Verwandtschaft steht. Als Unterschiede habe ich folgende aufgefunden. Azara, Waterhouse und Rengger geben gleichmäßig an, daß bei ihrer Art nur die kurzen Wollhaare schwarzspitzig, die langen Stichelhaare dagegen sämmtlich weiß sind; bei unserer Art dagegen sind die Wollhaare weißlich und die langen Stichelhaare schwarzspitzig; nur einzelne, höchst seltene von letzteren sind ganz weißlich. Ferner geben Rengger und Waterhouse den Bauch als schwarz oder braun an, während er bei unserer Art weiß ist. Endlich nimmt nach des Letzteren Angabe die weiße Schwanzspitze nur ⅓ der ganzen Schwanzlänge ein, während sie bei unserer Art über die Hälfte mißt. Ich bin daher der Meinung, daß unsere D. poecilotis nicht sowohl als eine constante Varietät von der D. leucotis, sondern als eine selbstständige Art anzusehen ist.

Markgraf's Tai-ibi Brasiliensibus, Lusitanis Cachorro do mato, scheint am besten auf unsere D. poecilotis zu passen; die weißen Ohren wenigstens, die er ihr zuschreibt, kommen bei keiner andern bekannten brasilischen Art vor. Auch Lund's[1]) D. albiventris, die aus denselben Gegenden, als Natterer's Exemplare herrührt, wird wahrscheinlich identisch mit unserer D. poecilotis seyn, obwohl er die Länge des Schwanzes und der Ohren anders angiebt, indem er die ganze Länge zu 22″ festsetzt, wovon der Körper die eine Hälfte (also der Schwanz die andere) wegnimmt, und die Höhe der Ohren zu 2″ 3‴ bestimmt. Ob in dieser Beziehung Lund oder wir uns geirrt haben, kann ich dermalen nicht entscheiden.

---

1) Det K. Danske Videnk. Selsk. Afh. VIII. p. 236.

3. **D. leucotis** Wagn., die weißohrige Beutelratte; **praecedenti simillima, at pilis laneis nigro-apiculatis, sericeis omnibus albis; gastraeo nigricante.**

Didelphys leucotis. Wagn. Abh. der Münchn. Akadem. V. S. 127. — D. Azarae. Rengg. Säugth. von Paraguay S. 223. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 38. (zum Theil). — Waterh. natur. librar. XI. p. 83. tab. 1; nat. hist. of mamm. I. p. 470. tab. 18. fig. 2. — Temm. monogr. I. p. 30. (zum Theil). — Micouré premier. Azar. ess. I. p. 244.

Die Unterschiede der D. leucotis von der D. poecilotis sind schon bei letzterer angeführt worden. Sie scheint wirklich als besondere Art, nicht blos als Spielart, angesehen werden zu dürfen und ihren Wohnort mehr südwärts zu haben, indem sie nur aus Paraguay und vom La Platastrom bekannt ist.

4. **D. Azarae** Temm., die schwarzohrige Beutelratte; **Cuniculi magnitudine, pilis laneis nigro-apiculatis, sericeis omnibus albis; auriculis nigris basi sola albido-carneis.**

Didelphys Azarae. Temm. monogr. I. p. 30. (größtentheils). — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 38. (größtentheils). — Tschudi Faun. peruan. I. S. 143. — D. marsupialis. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 387 u. 413. — D. aurita. Pr. v. Neuw. a. a. O. S. 395. — Lund, K. Danske Vidensk. Selsk. Afh. VIII. p. 236.

Unterscheidet sich von der vorhergehenden südamerikanischen Art, mit der sie die langen weißen Stichelhaare gemein hat und mit der sie deshalb gewöhnlich verwechselt wurde, schon gleich sehr auffallend durch die schwarzbraunen, nur am Grunde licht fleischfarbigen Ohren. Hieher gehört die Beschreibung von Temminck, welche ich ebenfalls a. a. O. aufgenommen habe, und die von Tschudi; beide Beschreibungen unter dem Namen D. Azarae. Ferner ist dieser Art angehörig des Prinzen von Wied D. marsupialis und D. aurita, dagegen sind Rengger's und Waterhouse's D. Azarae ganz von der unserigen auszuschließen. Es ist dieß eine weit verbreitete Art, indem sie von der brasilischen Ostküste bis hinüber nach Peru zu finden ist.

5. **D. californica** Benn., die langköpfige Beutelratte; **fere Cuniculi magnitudine, pilis laneis nigro-apiculatis, sericeis albis; auriculis totis nigris, capite fere toto fusco.**

Didelphys californica. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 40. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. S. 476. — D. pruinosa. Wagn. Wiegm. Archiv f. Naturgesch. 1842. 1. S. 358; Schreb. a. a. O. S. 40.

Genauer als Bennett hat Waterhouse nach denselben 2 Exemplaren eine Charakteristik von D. californica geliefert, wovon Nachstehendes das Wesentlichste. Demnach sind die Wollhaare schmutzig gelblichweiß mit schwarzen Spitzen, die langen Stichelhaare ganz weiß; das Weiß der Wollhaare wird übrigens nicht ganz zurückgedrängt von dem Schwarz der Spitzen, so daß namentlich am Unterleib das Weiße nur wenig verdeckt ist. Die Ohren sind ganz schwarz; der Kopf ist fast einförmig dunkelbraun, doch ist sein Mitteltheil und eine Binde durch die Ohren merklich dunkler, und unter letzterer liegt eine weißliche Binde. Der Schwanz ist anfangs noch vom Pelze des Rückens bedeckt; der übrige nackte Theil ist zuerst schwarz, aber sein größerer Theil scheint weiß gewesen zu seyn.

Körper	17″	0‴	Ohren	1″	5‴
Schwanz	14	0	Von der Nase zum Ohr . .	3	11

Nachdem Waterhouse selbst erklärt hat, daß meine D. pruinosa wegen der ganz schwarzen Ohren eher zu D. californica als zu D. breviceps gehören werde und ich auch sonst keine weitere Differenz von ersterer finde, als daß der nackte Theil des Schwanzes bei D. pruinosa auf eine längere Strecke schwarz ist (wobei zu bemerken, daß der schwarze Ueberzug leicht abfällt), so halte ich jetzt letztgenannte Beutelratte für zugehörig der D. californica.

6. D. breviceps Benn., die kurzköpfige Beutelratte; praecedenti simillima at capite breviore, auriculis nigris apice albo-maculatis.

Didelphys breviceps. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 40. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 478.

Wie Waterhouse nach demselben Exemplare, das Bennett vor sich hatte, bemerkt, kann von der Färbung kaum gesagt werden, daß sie von der der D. californica differire. Die Unterschiede liegen darin, daß bei D. breviceps der Kopf viel kürzer ist, und die schwarzen Ohren an der Spitze weiß gescheckt sind. Von Waterhouse sind nachstehende Dimensionen bestimmt.

Körper	14″	0‴	Ohr	1″	1‴
Schwanz	12	0	Von der Naſe zum Ohr .	3	2

Bewohnt Kalifornien.

7. D. cancrivora Linn. Gm., der Krabbenbeutler; Cuniculi magnitudine, pilis laneis albidis, sericeis nigris; auriculis nigris.

Didelphys cancrivora. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 41. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 473.

Unterſcheidet ſich ſchon durch ſeine im Allgemeinen ſchwarze Farbe von den andern großen Arten und iſt weit verbreitet, indem er ſich vom ſüdlichen Braſilien an bis nach Guiana hinein zieht.

β) vellere brevi aequali laneo.

8. D. Quica Natt., der Quica; D. Oposso paululum major, brunneo-cinerea, argenteo-irrorata, subtus alba; macula supraorbitali albida utrinque; cauda corpore vix longiore, basi incrassata pilosa, dein nigra, parte apicali albida. — Tab. 18.

Didelphys Quica. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 42. — Waterh. nat. hist. of. mamm. I. p. 480.

Wird häufig in Braſilien gefunden, kommt aber auch, nach Waterhouſe, noch in Surinam vor. Aus Natterer's ſchriftlichen, nach friſchen Exemplaren entworfenen Notizen habe ich meiner früheren Beſchreibung noch Folgendes zuzuſetzen. Die Iris iſt dunkelbraun, faſt ſchwarz, die Naſe und Zehen dunkel fleiſchfarben, die Ohren blaß fleiſchfarbig, gegen den Rand breit braun geſäumt. Bei einem Weibchen fand Natterer im Beutel, deſſen Oeffnung 1½ Zoll lang und 1¼ Zoll breit iſt, 7 lange zugeſpitzte Zitzen und 5 nackte blinde Jungen. Dieſe Art macht ſich auf niedern Bäumen ein Neſt aus zuſammengelegten Baumblättern. Natterer brachte ſeine ſämmtlichen Exemplare im ſüdlichen Braſilien zuſammen [1]).

9. D. myosuros Temm., der Scheiben-Schupati; brunneo-fulvida, subtus flavescens, macula supraorbitali flavida utrinque; cauda corpore longiore, basi anguste pilosa, dein nigra, parte apicali albida.

---

1) Auf unſerer Abbildung von D. Quica iſt der Kopf nach einer Handzeichnung von Natterer dargeſtellt worden, alſo genau in ſeiner natürlichen Form.

Didelphys myosuros. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 43. — Tschud. Faun. peruan. I. S. 145. — D. nudicaudata. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 482.

Unterscheidet sich von der vorigen Art durch den rostig falben Ton der Oberseite, den schwarzen scheibenartigen Fleck auf dem Mittel- und Hinterkopf und den etwas längern, dabei an der Wurzel nur auf eine sehr kurze Strecke behaarten Schwanz, indem der behaarte Theil ohngefähr ½" mißt, während er bei D. Quica und D. Opossum mindestens 2" beträgt. Die Färbung ist bald lebhafter, bald düsterer. An einem großen Exemplare der Wiener Sammlung fließen die Binden auf der Schnautze fast zusammen und der dunkle Scheitelfleck setzt sich in einen unbestimmten Längsstreif bis zur Wurzel fort. An einem andern Exemplar ist der Schwanz ganz weiß. Diese Art ist weit verbreitet, indem sie vom südlichen Brasilien an bis nach Guiana und Pern gefunden wird.

10. D. Opossum Linn., das Opossum; Sciuro europaeo major, fulvido-cinnamomea, subtus flavido-alba, macula supraorbitali alteraque postauriculari utrinque albida; cauda basi incrassata pilosa, dein nigra, apice albida.

Didelphys Opossum. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 44. — Tschud. Faun. peruan. I. S. 144. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 485.

Den beiden vorhergehenden Arten ähnlich, aber schon durch die länger gestreckte Schnautze und die rostigfalbe Färbung des Kopfes und des Rückens verschieden. Von Guiana an bis nach Pern verbreitet; in Brasilien scheint diese Art seltener zu seyn.

11. D. Philander Linn., die langschwänzige Beutelratte; Opasso major, supra fulvo- aut cano-rufescens, subtus albido-lutescens; rostro abbreviato tristriato; cauda corpore multum longiore, basi longius pilosa, dein nuda, albido-carnea, initio supra subtusque fusco-maculata, dimidio exteriore immaculata.

Didelphys Philander. Linn. XII. p. 72; ed. Gmel. I. p. 103. — Schreb. Säugth. III. S. 541. tab. 147. — Temm. monogr. I. p. 43. tab. 6 (mit Skelet.) — Wagn. Schreb. Suppl. III. S. 45; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 130. — Waterh. nat. librar. XI. p. 102; nat. hist. of mamm. I. p. 487. — Didelphys Cayopollin. Schreb. Säugth. III. S. 544. tab. 148. (fig. Buff.) — Linn. Gmel. I. p. 106. — Geoffr. catal. p. 142. (zum Theil). — Cuv. règn.

anim. I. p. 177. — Desmar. mamm. p. 257. — Mus americanus. Seba thes. I. p. 49. tab. 31. fig. 4. — Mus africanus Kaiopolin dictus. Seba thes. I. p. 49. tab. 31. fig. 3. — Cayopollin. Buff. hist. nat. X. p. 350. tab. 35; Daubent. p. 353.

Faras ou Ravale. Gumilla. Orin. III. p. 238?

Unter der Benennung D. Philander ſind mehrere Arten confundirt worden, wie dieß Temminck gründlich auseinander geſetzt hat. Aber auch nachdem man mit dieſem Naturforſcher die gehörigen Berichtigungen vorgenommen hat, können noch 3 Arten als D. Philander miteinander verwechſelt werden. Zwei davon ſind eine Entdeckung von Johann Natterer; die eine von ihnen gehört dem Süden, die andere dem Weſten Braſiliens an. Schon aus dieſer Angabe der Lokalitäten geht es hervor, daß erwähnte beide Arten den älteren Naturforſchern nicht wohl bekannt ſeyn konnten, da Braſilien bis auf die neueſten Zeiten ganz geſperrt war. Auf die ächte D. Philander werden daher alle ältern Autoritäten bezogen werden dürfen, da dieſe Art dem nordöſtlichen Südamerika angehört, was ſeit zweihundert Jahren fortwährend oder doch zeitweiſe zugängig geweſen iſt.

Aus dem eben angeführten Grunde wird man wohl Seba's[1]) Mus africanus, Kayopolin dictus, mas, ſo wie ſeinen Mus s. Sorex silvestris, americanus mas, hieher rechnen dürfen, da der gefleckte Schwanz und die Form und Streifung des Kopfes entſchieden auf eine der drei genannten Arten hinweiſt, ohne daß jedoch die Zeichnungen von Seba die nöthige Genauigkeit hätten, um unter ihnen ſicher die wahre Species auszuwählen. Dagegen gehört ſein Tai-ibi[2]) weder zu unſerer Art, noch zu Markgraf's[3]) Tai-ibi; auch iſt dieſer nicht, wie Lichtenſtein und Fiſcher meinen, mit unſerer D. Philander identiſch, ſondern zu jener Abtheilung von Beutelratten zu zählen, welche durch D. Azarae und cancrivora repräſentirt wird.

Dagegen kann man mit Sicherheit hieher rechnen Buffon's und Daubenton's Cayopollin, wie dieß aus der Angabe des Flecken-

1) Thesaur. p. 49. tab. 31. fig. 3 und 4. — 2) A. a. O. S. 57. tab. 36. fig. 4. 3) Hist. Bras. p. 223.

beſatzes des Schwanzes und ſeiner relativen Verhältniſſe zur Körperlänge am Deutlichſten hervorgeht[1]). Die geringere Größe dieſes Exemplares rührt von ſeinem jugendlichen Zuſtande her, da der Oberkiefer noch nicht einmal ſämmtliche Backenzähne aufzuweiſen hatte. Geoffroy vermengt unter ſeiner D. Cayopollin zwei oder mehrere Arten, indem er zum Buffon'ſchen Exemplare auch noch ein Weibchen ohne Beutel ſtellt. Schreber's D. Philander iſt die unſrige, und nach einem Originale von ihm beſchrieben; ſeine D. Cayopollin beruht größtentheils auf der von Buffon, doch mit unrichtigen Zuſätzen, wie unter andern dem von dem Mangel des Beutels. Desmareſt wiederholt nur Daubenton's Beſchreibung, ſpricht alſo auch von unſerer Art; Linne's D. Philander iſt dagegen nur muthmaßlich hieher zu rechnen.

Unzweifelhaft beziehen ſich die citirten neuern Beſchreibungen auf unſere D. Philander. Dieß iſt der Fall bei dem Prinzen von Neuwied und bei Temminck. Meine Beſchreibung in Schreber's Supplementen iſt gleichfalls von einem ächten Exemplare dieſer Art entnommen; auch die Hauptbeſchreibung von Waterhouſe bezieht ſich auf dieſelbe. Da demnach dieſe Beutelratte durch die angeführten Beſchreibungen hinlänglich charakteriſirt iſt, ſo brauche ich im Nachfolgenden nur auf ihre Hauptmerkmale aufmerkſam zu machen; zuvörderſt will ich indeß auf die Kennzeichen hinweiſen, welche einerſeits die drei verwandten Arten mit einander gemein haben, und welche andrerſeits ſie von einander unterſcheiden.

Ihre Größe geht von der der Ratte bis über die des Opoſſums hinaus. Der Kopf iſt abgekürzt und mit drei dunkeln roſtbraunen Längsſtreifen bezeichnet, ohne die weißen Augenflecke des Opoſſums. Die Ohren ſind groß, nackt, nur am Grunde der Hinterſeite mit Wolle beſetzt. Der Schwanz iſt ſo lang oder länger als der Körper, an der Wurzel auf eine ziemliche Strecke von dem Rückenpelze überzogen, der plötzlich und

1) Die Körperlänge gibt Daubenton in gerader Linie zu 7″ 3‴ an, den Schwanz zu 11″ 5‴. Vom nackten Theil des Schwanzes ſagt er, daß er braune Flecken auf gelblichem Grunde hat, während die Schwanzſpitze ganz gelblich iſt. Im Oberkiefer waren jederſeits nur 6 Backenzähne vorhanden.

gleichförmig aufhört, indem er auf der untern Seite soweit als auf der obern vorreicht. Der übrige Theil des Schwanzes ist nackt, mit kleinen Schuppen bedeckt, ohne Härchen, licht fleischfarben und verschieden gefleckt. Die Färbung des Pelzes ist auf der Oberseite roströthlich, auf der untern gelblich weiß. — Die Unterschiede der drei Arten begründen sich hauptsächlich auf das Verhältniß der Schwanz- zur Körperlänge, auf die Art und Weise seines Fleckenbesatzes und auf das Vorhandenseyn oder den Mangel eines Beutels bei den Weibchen.

D. Philander hat unter den drei verwandten Arten die ansehnlichste Größe. Der Schwanz ist bei ihm weit länger als der Körper, sein nackter Theil anfangs auf eine ziemliche Strecke dunkelbraun, dann weißlich fleischfarben, mit braunen Flecken oben wie unten besetzt, zuletzt mit langer, ungefleckter, einfarbig lichter Spitze. Das Weibchen ist mit einem Beutel versehen.

Bei D. dichrura ist der Schwanz so lang als der Körper; sein nackter Theil oben mit rundlichen schwarzen Flecken besetzt, die aber der ganzen Unterseite, so wie der Schwanzspitze ringsum, völlig fehlen. Das Weibchen hat einen Beutel.

Bei D. affinis hält die Schwanzlänge das Mittel von den beiden ersten Arten. Als Grundfarbe des nackten Theils des Schwanzes ist die dunkelbranne anzusehen, welche der ganzen Länge nach bis zur Schwanzspitze, oben wie unten, mit weißlich fleischfarbigen Flecken besetzt ist. Das Weibchen ist ohne Beutel.

Vermittelst dieser Merkmale kann man die drei verwandten Arten leicht von einander unterscheiden. Was unsere D. Philander insbesondere anbelangt, so ist noch zu bemerken, daß das Exemplar der Münchner Sammlung, so wie zwei der Wiener (ein altes Männchen und Weibchen) auf der Oberseite schön rostfalb gefärbt sind, was auf dem Vorderkopf, den Seiten, Gliedmassen und dem Schwanze lichter wird, während ein anderes Männchen eine licht röthlichgraue Färbung hat. Die Unterseite ist an allen Exemplaren schön lichtgelb, um den Beutel der Weibchen rostig goldfarben. Ohren und Sohlen sind ziemlich hellfarbig; die Krallen weißlich.

Von einem sehr großen Weibchen der Wiener Sammlung, aus der Gegend von Borba, habe ich folgende Maaße abgenommen.

Körper	11″	0‴	Von der Nase zum Ohr . .	2″	1‴
Schwanz	15	0	Ohr	1	2
Behaarter Theil desselben .	2	8	Hinterhand	1	6
Von der Nase zum Auge .	0	11			

An einem Männchen mißt der Körper 9″, der Schwanz 14″, der behaarte Theil desselben 2″ 3‴.

Natterer brachte 2 Exemplare von Borba, und eines vom Rio Branco, also aus den nordwestlichen Theilen Brasiliens, mit.

12. D. dichrura Natt., die blaßfarbige Beutelratte; D. Philandro affinis at minor, supra cano-rufescens, subtus albido-lutescens; capite abbreviato tristriato; cauda longitudine corporis, basi pilosa, dein nuda, albido-carnea, supra fusco-maculata, subtus apiceque immaculata. — Tab. 19.

Didelphys dichrura. A. Wagn. im Archiv für Naturgesch. 1842. S. 358; Abh. der Münchn. Akadem. V. S. 134. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. S. 492.

Durch die bei D. Philander angegebenen Merkmale ist diese Art leicht von ihr, so wie auch von D. affinis zu unterscheiden. Sie ist eine der vielen Entdeckungen Natterer's und scheint bisher von keinem Schriftsteller erwähnt worden zu seyn. Sie ist bedeutend kleiner als die vorige Art, der Kopf eben so verkürzt, die Furchung der Nasenkuppe, die Schnurren, Ohren, Hände und der Beutel der Weibchen von derselben Beschaffenheit. Der Pelz ist fein und weich; der nackte Theil des Schwanzes wie bei D. Philander beschuppt.

Die Farbe aller mir vorliegenden Exemplare ist lichter als bei D. Philander und affinis. Sie ist auf der Oberseite licht rostig grauröthlich, was auf dem Kopfe am lebhaftesten ist, an den Seiten aber bald in's Grauliche fällt; die Keulen und die Außenseite der Gliedmassen ist licht gelbgraulich. Die ganze Unterseite des Körpers, nebst der Innenseite der Beine, ist schön ockergelblich, was bei den Weibchen an dem Rande des Beutels in ein dunkleres Rothgelb übergeht. Die Haare der Oberseite sind in ihrer untern Hälfte schiefergrau, und diese Farbe ist viel weiter an ihnen ausgebreitet als bei D. affinis; auf den Gliedmassen sind nur die Spitzen lichtgelblich, das Uebrige ist trübgrau. Auf der Unterseite

ſind die Haare einfarbig. Die Kopfſärbung iſt wie bei D. Philander und affinis: ein ähnlicher Längsſtreif von der Stirne zur Naſenkuppe nebſt einem gleichfarbigen Augenringe, der jedoch rückwärts nicht, wie bei letzterer Art, zum Ohre fortgeſetzt iſt, auch vorwärts ziemlich matt iſt. Die Schnurren ſind gleichfalls ſchwarz; die Ohren ſind röthlichgrau oder fleiſchfarbig ins Kaſtanienbraune ziehend, die Naſenkuppe, Zehen und Sohlen hell fleiſchfarben; die Nägel weißlich. Die vorherrſchende Farbe des Schwanzes iſt weißlich fleiſchfarben, auf der Oberſeite mit ſchwarzen Flecken, die allmählig ſpärlicher werden, der Unterſeite aber, wie überhaupt der ganzen Schwanzſpitze, völlig fehlen. Das Scrotum iſt nackt, nur an der vordern Seite behaart und ſchön hell graublau.

Von einem erwachſenen Weibchen ſind folgende Maaße abgenommen worden.

Körper	8″	6‴	Von der Naſe zum Ohr .	1″	6½‴
Schwanz	9	1	Ohr	1	0
Behaarter Theil deſſelben .	1	3	Hinterhand	1	3
Von der Naſe zum Auge .	0	8			

Nach Natterer's Abnahme maaß an einem andern Weibchen der Körper 10½″ und der Schwanz ebenſoviel; an einem Männchen der Körper 8¾″, der Schwanz 11½″, wovon auf den behaarten Theil 1¼″ Wiener Maaß kam.

Natterer fand dieſe Art nur um Ypanema (im ſüdlichen Braſilien), wo ſie im Walde häufig vorkommt. Ein Weibchen hatte im Beutel 4 Junge, die an den Zitzen feſthielten, doch auch mit den Füſſen ſich anklammerten; ſie waren blind, fleiſchfarbig und mit ſehr wenigen Härchen verſehen.

††) mastothecae loco plicis 2 ventralibus; pilis omnibus laneis.

a) cauda corpore longiore, supra usque ad medium vellere vestita.

13. **D. ornata** Tschud., die weißrückige Woll-Beutelratte; **D. Oposso major, lanuginosa, supra rubiginosa-fusca, subtus albida, interscapulio macula subcordata alba ornato; cauda supra usque ad medium pilosa, subtus per tres quadrantes nuda albida.**

Didelphys ornata. Tſchud. Faun. peruan. I. S. 146. tab. 6. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 525.

var. *β*) macula interscapulii angustiore, argenteo-cana; artubus anterioribus infra albis, cauda parte nuda maculata.

Didelphys Derbiana. Waterh. nat. librar. XI. p. 97. tab. 2; nat. hist. of mamm. I. p. 493.

Es folgen nun 3 Arten, die durch ihren wolligen Pelz, der überdieß den Schwanz auf der obern Seite viel weiter als auf der untern überkleidet, sich von den andern Beutelratten auffallend unterscheiden, dagegen in der Färbung sich sehr nahe kommen, so daß man wohl Acht haben muß auf die Differenzen, um sie nicht miteinander zu verwechseln. Ein Uebelstand ist es, daß bisher nur wenige Exemplare bekannt geworden sind, so daß die Farbenänderungen, die etwa bei der einen oder andern Species vorkommen mögen, noch nicht ermittelt werden konnten.

Von seiner D. ornata giebt Tschudi folgende Beschreibung. Der Pelz ist sehr weich, sammetartig und wollig; der Schwanz ist auf der Oberseite bis zur Hälfte seiner Länge behaart, auf der untern nur bis zum ersten Viertel, wobei die Haare sich tief an den Seiten herunter erstrecken. Die Ohren sind groß und nackt. Die Füsse sind nur mit sehr spärlichen kurzen steifen Haaren besetzt. Die Schnautze ist schwärzlich, auf der Mittellinie verläuft über die Stirne ein schmaler schwarzer Streifen, der jederseits neben sich eine etwas breitere graulichweiße Binde hat. Die Augen liegen in einer braunen Einfassung, die Ohren sind braunroth, die Wangen graulichweiß, die Schnurrhaare an der Schnautze schwarz mit weißen Spitzen, die zwischen Auge und Ohr ganz weiß. Der Hinterkopf ist röthlichbraun, der Rücken etwas dunkler und schwarz gewellt, besonders nach hinten zu, wo zahlreiche schwarze Stichelhaare den hellen Wollhaaren, die am Grunde mattgrau und nach der Spitze schwarz und röthlichbraun geringelt sind, untermischt sind. Auf dem Vorderrücken zwischen den Schulterblättern ist ein fast herzförmiger 2″ langer weißer Fleck. Die Außenseite der Gliedmassen ist heller als der Rücken, die innere graulich; die Füsse sind oben dunkelbraun, die Sohlen hellbraun. Die Kehle ist grau, die Brust blendend weiß, der Bauch weißlichgrau. Die Schwanzhaare sind röthlichgrau, unten heller als oben; der nackte geschuppte, mit einzelnen kurzen Borsten versehene Theil des Schwanzes ist gelblich. Tschudi hat von dieser Art nur ein einziges Exemplar, ein Männchen, in Peru erhalten, wo diese Thiere in der mittlern und tiefern Waldregion leben.

Auch Waterhouse's D. Derbianus beruht nur auf einem einzigen Exemplare, deſſen Geſchlecht und Heimath unbekannt iſt. Die Farbe iſt auf der ganzen Rückenſeite und der Außenſeite der Hinterbeine licht bräunlich roſtfarben, die Unterſeite ſchmutzig weiß. Zwiſchen den Schultern entſpringt ein kurzer ſilbergrauer Streif, der in der Mitte des Rückens aufhört. Der Kopf iſt bräunlichgrau, mit dunklerem Mittelſtrich, woneben die Seiten lichter grau als anderwärts ſind; die Augen liegen in einer braunen Einfaſſung, die Oberlippe iſt weiß; die Ohren ſind ziemlich groß, nackt und gleich den Sohlen blaß. Die untere Hälfte der Vorderglieder iſt weiß, ebenſo die Vorderfüſſe; die Hinterfüſſe ſind dunkel.

Ein hellgrauer Streif zieht ſich gleich hinter den Vordergliedern aufwärts an den Seiten; ein anderer zieht ſich vom Knie an aufwärts am Schenkel hin. Die Pelzbedeckung des Schwanzes, die ſich auf der Oberſeite viel weiter als auf der untern erſtreckt, iſt trübbraun, unten ſchmutzigweiß; der nackte Theil iſt blaß, aber mit ſchwarzen Flecken beſetzt, die anfangs zahlreich ſind, allmählig aber ſpärlicher werden.

	D. ornata.	D. Derbiana.
Körper	11″ 0‴	13″ 6‴
Schwanz	12 0	17 0
Länge des behaarten Theils oben .	6 6	7 6
— " " " unten	3 6	
Ohr	1 0	1 2

Nach Vergleichung mit Tſchudi's Darſtellung der D. ornata erklärte Waterhouſe, daß er jene in allen weſentlichen Punkten mit ſeiner D. Derbiana übereinſtimmend finde[1]), und wenn auch der lichte Fleck auf dem Vorderrücken bei jener breiter zu ſeyn ſchiene, ſo ſehe er doch keinen Grund, an der ſpecifiſchen Identität der D. ornata und D. Derbiana zu zweifeln. An dieſer Erklärung können wir uns auch zur Zeit genügen laſſen.

14. **D. lanigera** Desm., die gleichfarbige Woll-Beutelratte; **D. Oposso major, lanuginosa, supra brunneo-fulvescens, subtus flavido-alba; oc-**

1) Den weißen Streif am Vorderrande des Oberſchenkels zeigt auch die Abbildung von D. ornata.

cipite, nucha artubusque anterioribus rubello-fulvidis; lateribus albidis; cauda supra usque ad ultimum quadrantem pilosa, infra per tres quadrantes nuda albida.

Didelphys lanigera. Desmar. mamm. p. 258. — Rengger's Säugth. v. Paraguay. S. 225? — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 46; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 139. — Waterh. natur. librar. XI. p. 98.; nat. hist. of mamm. I. p. 494. — Micouré second ou Micouré laineux. Azar. essai I. p. 275.

Daß das von Natterer mitgebrachte Exemplar, nach welchem nachstehende Beschreibung entworfen ist, mit Azara's Micouré laineux zu einer Art gehört, ist mir nicht zweifelhaft; dagegen bin ich nicht so sicher, ob Rengger's D. lanigera ebenfalls hieher zu rechnen ist, da seine Beschreibung in der Größe, Färbung und Schwanzbehaarung merkliche Differenzen von Azara's und meinen Angaben darbietet. Waterhouse hatte kein Original-Exemplar vor sich und konnte daher nur Azara's und Rengger's Beschreibung wiederholen. Da unser Exemplar gegenwärtig vielleicht das einzige ist, das in einer europäischen Sammlung existirt, so will ich dasselbe umständlicher beschreiben, um hiernach die Art-Merkmale genau festzusetzen.

Der Pelz ist sehr weich und reichlich, und fühlt sich so linde wie Wolle an. Wie gewöhnlich sind die Gliedmassen dicht damit besetzt, während die vier Hände nur ganz fein und spärlich mit anliegenden Härchen bekleidet sind. Die Nasenkuppe ist nackt und längs der Mitte gespalten. Die Schnurren reichen bis etwas hinter das Ohr und sind an der Wurzel ziemlich starr; über dem Auge entspringen noch zwei kürzere Borsten und tief unter denselben drei andere. Die Ohren sind groß, oval, nackt, nur in der untern Hälfte ihrer Hinterseite mit Wolle bedeckt. Die Sohlen sind nackt, der Hodensack mit einigen Härchen beflogen. Der Schwanz ist an der Wurzel dick und wollig behaart, was auf der Oberseite über drei Viertel von seiner Länge bedeckt; auf der Unterseite dagegen ist der Schwanz nur in seinem ersten Viertel mit Pelz besetzt, das Uebrige nackt. Ganz nackt ringsum ist also nur das letzte Viertel des Schwanzes; der nackte Theil desselben ist mit kleinen gekörnten Schuppen, die gegen das Ende glätter werden, versehen.

Die Farbe der Oberseite ist licht rostbräunlich falb, was an den

Seiten noch viel blässer wird, am Hinterkopfe, dem Nacken und der Aussenseite der obern Gliedmassen aber schön zimmtroth ist; etwas lichter und mit mehr Braun gemengt ist diese Farbe auf den vier Händen und auf der untern Hälfte der Hinter- und Vorderseite des Unterschenkels. Die Farbe der ganzen Unterseite des Körpers, so wie der Innenseite der Gliedmassen ist gelblichweiß; der gelbliche Anflug ist sehr lebhaft am Unterkiefer, Vorderhalse und dem Unterbauch, dagegen an den Leibesseiten kaum merklich, wo die Farbe, ohne scharf abzusetzen, in die der Oberseite übergeht. Die Haare der Ober- wie der Unterseite sind gegen ihren Grund rußig graubraun, was auf jener dunkler als an dieser ist. Von der rußig zimmetröthlichen Stirne verläuft ein trüb roströthlicher Längsstreif gegen die nackte Nasenkuppe; ein ähnlicher umgiebt das Auge und breitet sich, blasser werdend, über die Seiten der Schnautze aus. Die Stelle jederseits zwischen dem Längsstreif und Augenring ist graulich weiß; die ganze untere Hälfte der Kopf- und Halsseiten ist weiß. Die Schnurren sind glänzend schwarz, die Nasenkuppe und die Sohlen sind im Leben bräunlich fleischfarben; die Ohren sind am Grunde ebenfalls fleischfarben, weiter aufwärts geht dieses ins licht-Violette und das Uebrige ins violett-Schwarzbraune über. Die Iris ist haselnußbraun, das Scrotum bläulich. Die hintern Gliedmassen sind auf der Aussenseite sehr licht falbbräunlich, mit viel Weiß untermischt. Der Pelzbesatz auf dem Schwanze ist licht rostgelblich, wobei die Haare nur am Grunde etwas dunkler sind; der nackte Theil ist bräunlich fleischfarben.

Zur Vergleichung füge ich meiner Maaß-Abnahme die von Azara bei.

	Eigene Messung.		Nach Azara.	
Körper	12″	3‴	8″	8‴
Schwanz	15	0	13	6
Behaarter Theil desselben oben	10	6	9	0
" " " unten	3	3	4	6
Kopf	2	6	2	3
Von der Nase zum innern Augenwinkel	1	0		
" " " " Ohre	2	1		
Ohrlänge	1	2	1	0
Ohrbreite	0	9	0	6
Hinterfuß mit Mittelkralle	1	8		

Als Heimath war bisher nur Paraguay bekannt. Azara hatte ein Exemplar von Caazapa, 50 Stunden von Asuncion, ein anderes von dem Dorfe St. Maria erhalten. Rengger bemerkt, daß er seine D. lanigera blos in den Missionen und bei Villa Rica angetroffen hat. Durch Natterer ist es nun nachgewiesen, daß sie auch in den südlichen Provinzen Brasiliens vorkommt, indem er ein Exemplar (ein Männchen) in Caissara erhielt. — Von D. ornata ist sie schon durch den Mangel des weißen Rückenflecks verschieden.

15. **D. ochropus** Natt., die kleine Woll-Beutelratte; **D. lanigera minor, lanuginosa, subcrispa, supra ferrugineo-rufescens, subtus albida, lateribus canescentibus; cauda supra panlulum ultra dimidium pilosa, parte nuda maculata.**

Didelphys ochropus. Wagn. Archiv. f. Naturgesch. 1842. S. 359; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 141.

Diese neu entdeckte Art, zur Zeit nur durch ein männliches Exemplar bekannt, hat mit der D. lanigera die größte Aehnlichkeit, unterscheidet sich jedoch durch geringere Größe und einen andern Farbenton. Der Pelz ist weit mehr wollartig als bei dieser, indem er nicht bloß sehr weich sich anfühlt, sondern zugleich etwas kraus ist. Und während der großen Woll-Beutelratte längere Haare, die über den Pelz vorragen, fast ganz abgehen, sind sie bei der kleinen in großer Anzahl vorhanden und stehen in ziemlich gerader Richtung weit über den Pelz vor. Ohren, Schnurren, Nasenkuppe und Hände sind wie bei D. lanigera beschaffen, doch sind Finger und Zehen weit mehr von Haaren entblößt. Die wollartige Behaarung des Schwanzes reicht auf der obern Seite etwas über die Hälfte hinaus, auf der untern Seite nimmt sie kaum das erste Viertel ein; der nackte Theil ist mit kleinen körnigen Schuppen besetzt.

Die Färbung der Oberseite ist licht rostig zimmtröthlich, was gegen die Kruppe und Schenkel blasser wird, und auf dem Hinterkopfe, Nacken und der Vorder-, auch zum Theil der Aussenseite der vordern Gliedmassen am lebhaftesten ist. Die Unterseite längs ihrer schmalen Mitte, so wie die Innenseite der Gliedmassen, ist gelblich weiß, ihre breiten Seitentheile, so wie die des Kopfes sind licht grau. Von derselben licht aschgrauen Farbe ist ein großer Fleck, der etwas über dem Ellenbogen

beginnt und den hintern Theil des Vorderarms bis zu deſſen Mitte abwärts einnimmt. Der Oberkopf hat einen ähnlichen dunkel roſtbraunen Längsſtreif und Augenkreiſe, dazwiſchen mit lichtgraulichem Zwiſchenraume wie bei D. lanigera aufzuweiſen. Die Ohren ſind leberbraun, was am innern Grunde ins Violette zieht. Naſenkuppe und Sohlen ſind im Leben fleiſchfarbig; die Schnurren ſind ſchwarz, doch häufiger mit helleren Spitzen, der Hodenſack graulich violett. Die Hinterbeine ſind an der Seite mit viel Grau gemiſcht; die Unterſchenkel an der untern Hälfte weiß roſtröthlich; die Krallen weißlich. Die Haare ſind an ihrem Grunde dunkler als bei voriger Art. Der behaarte Theil des Schwanzes iſt ganz licht roſtröthlich, mit bräunlicher Beimiſchung; der nackte Theil iſt ſchmutzig weiß, unterhalb der Behaarung mit faſt zuſammenfließenden ſchwarzbraunen Flecken.

Die Maaße von dem einzigen Exemplare, einem Männchen, das Natterer einbrachte, ſind folgende:

Körper	9″	8‴	Von der Naſe zum Auge	0″ 8½‴
Schwanz	13	5	„ „ „ „ Ohre	1 9½
Behaarter Theil deſſelben, oben .	7	9	Ohr, ohngefähr . . .	1 0
„ „ „ unten .	3	0	Hinterfuß	1 6

Die Heimath des erwähnten Exemplars iſt Barra do Rio Negro, ſo daß alſo dieſe Art als der nördliche Repräſentant der Woll-Beutelratten anzuſehen iſt.

β) cauda corpore longiore aut parum breviore, vellere basi sola et aequaliter vestita.

16. D. affini's Natt., die ſcheckſchwänzige Beutelratte; **Philandro affinis, at minor, supra rufescens, subtus albido-lutescens; capite abbreviato tristriato; cauda corpore paululum longiore, basi longius pilosa, dein nuda, fusca subtusque usque ad finem albido-maculata.**

Didelphys affinis. Wagn. im Archiv für Naturgeſchichte. 1842. S. 358; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 136. — Waterh. nat. hist. of mamm. II. p. 493.

Dieſe Art, welche ebenfalls Natterer entdeckte, iſt mit D. Philander, noch mehr aber mit D. dichrura, mit der ſie auch in der Größe übereinſtimmt, verwandt[1]), unterſcheidet ſich aber von beiden ſchon da-

1) Es ſcheint faſt, als ob Waterhouſe unſere D. affinis mit D. Philander zuſammengeſtellt hätte. In ſeiner Nat. hist. of Marsup. ſagt er nämlich (S. 103) in de

durch, daß die Weibchen keinen Beutel haben, wie sich Natterer hievon an zwei frischen Exemplaren versichert hat und ich mich ebenfalls durch Untersuchung der Felle von diesen überzeugt habe.

Die Größe ist ohngefähr die einer Ratte. Der Kopf ist kurz; die nackte Nasenkuppe mit deutlicher Längsfurche, die Schnurren und Ohren wie bei den verwandten Arten. Die vier Hände haben nur einen sehr spärlichen und feinen Haaranflug. Der Pelz ist so weich als bei D. dichrura und hüllt die Schwanzwurzel in gleicher Weise ein, reicht aber um etwas weiter vor; der übrige Theil ist ganz nackt und mit kleinen Schuppen besetzt.

Die Farbe der Oberseite ist rostbraunröthlich, was auf dem Scheitel und Hinterkopfe mehr in's Röthliche, auf den übrigen Theilen mehr in's Rostbräunliche fällt, an den Seiten heller und auch auf dem Rücken durch die glänzenden hellern Haarspitzen lichter wird. Die ganze Unterseite des Körpers nebst der Innenseite der Beine ist schön lichtgelblich; da den Weibchen der Beutel fehlt, so ist auch an der Stelle, wo er bei andern Arten sich findet, keine dunklere rostrothe Färbung sichtlich. Die Haare der Oberseite sind an ihrem Grunde grau, werden dann rostfarbig und ihre Spitzen sind lichter und glänzender. Auf der Unterseite sind die Haare einfarbig. Wie bei D. Philander und dichrura verläuft von der Stirne ein rostbrauner Längsstreif zur Nasenkuppe und die Augen liegen in einem gleichfarbigen Streifen, der sich rückwärts bis zum Ohre, vorwärts bis zu den Schnurren erstreckt; letztere sind schwarz. Der Zwischenraum zwischen jedem Augenkreise und dem Längsstreifen ist graulich weiß. Die Ohren sind im Leben bräunlich fleischfarben, ins Röthlichbraune übergehend und am Grunde der Hinterseite mit gelblicher Wolle besetzt. Die Aussenseite der Gliedmassen ist licht roströthlich, auf den hintern mit viel Graulichweiß untermischt. Die Iris ist braunroth und die Nase blaß violett. Die Sohlen sind fleischfarben; die Nägel weißlich. Der nackte Theil des Schwanzes ist dunkelbraun, und seiner

---

Beschreibung von D. Philander, daß er in Paris ein Exemplar gesehen hätte, an welchem der Schwanz fast ganz schwarz sey, indem er nur einige weiße Flecken hätte. Dieß kann nicht wohl eine andere Art als unsere D. affinis seyn.

ganzen Länge nach bis zur Spitze, oben wie unten, mit weißlich fleischfarbigen, meist kleinen Flecken besetzt, die im Anfange spärlich, gegen das Ende häufiger sind.

Körper	8″	0‴	Von der Nase zum Ohre	1″	5½‴
Schwanz	9	0	Ohr	1	0
Behaarter Theil desselben . .	1	6	Hinterhand	1	3
Von der Nase zum Auge . .	0	8			

An einem anderen Weibchen mißt der Körper 9″, der Schwanz 10″.

Natterer brachte diese Art in zwei Exemplaren aus Matto grosso mit, also aus den westlichsten Gegenden des mittlern Brasiliens.

17. D. cinerea Neuw., der graue Schupati; Ratti magnitudine, supra rubello-cinerea, infra fulvescens aut albida; oculis limbo fusco circumdatis; rostro abbreviato; cauda gracili, corpore multum longiore, basi late pilosa, parte nuda dimidia nigricante, dimidia alba.

Didelphys cinerea. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 47. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 501.

Bewohnt das östliche Brasilien.

18. D. dorsigera Linn., der braunschwänzige Schupati; Ratti magnitudine, supra flavo-brunnea, rostro ex albo flavicante, oculis limbo fusco circumdatis; cauda gracili, corpore multum longiore, parte nuda unicolore fusca.

Didelphys dorsigera. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 48. — Waterh. nat. hist. of. mamm. I. p. 507.

Aus Surinam bekannt.

19. D. noctivaga Tschud., die seidenhaarige Beutelratte; praecedente minor, brunnea, nigro-irrorata, subtus flavido-alba, lateribus fulvidis; cauda corpore longiore, basi anguste pilosa, parte nuda fusca.

Didelphys noctivaga. Tschud. Faun. peruan. I. S. 148. tab. 8.

Eine Entdeckung von Tschudi. Der Pelz ist sehr weich, dicht und lang. Die Oberseite ist lichtbräunlich mit röthlichem Anfluge und schwarzer Sprenkelung: die einzelnen Haare sind schiefergrau mit gelblichgrauen Spitzen, außerdem finden sich unter ihnen einzelne schwarze oder silberweiße Steifhaare. Die Leibesseiten sind röthlichgelb. Der Bauch ist gelblichweiß, wobei die Haare auf der Mittellinie einfarbig sind und an den

Seiten mit schiefergrauer Basis; Kehle und Brust mit röthlichgelbem Anflug. Ueber die Mittellinie der Stirne verläuft ein gelblichweißer Streifen, die Augen liegen in einer schwarzbraunen Einfassung, die ziemlich großen Ohren sind nackt und röthlich, das Gesicht weißlichgelb, die untere Ohrgegend röthlichgelb. Die Gliedmassen sind außen von Rückenfarbe, innen gelblichgrau, die Füsse hellbraun, die Zehen weißlichgelb, die Sohlen fleischfarben. Die sehr kurz behaarte Schwanzwurzel ist rauchbraun, der übrige Schwanz nackt, mit verschoben viereckigen rothbraunen Schuppen besetzt. Die Weibchen haben Bauchfalten.

Körper	6″	9‴	Ohr	0″	9½‴
Schwanz	7	4	Von der Nase zum Ohr	1	3

Bewohnt in Peru die mittlere und untere Waldregion. — Die D. noctivaga unterscheidet sich von D. dorsigera durch etwas geringere Größe, verhältnißmäßig kürzeren Schwanz, und den höchst kurzen Pelzbesatz der Schwanzwurzel. Mit D. murina und deren Verwandten ist sie durch ihre überlegene Größe nicht zu verwechseln.

20. D. impavida Tschud., die zimmtfarbige Beutelratte; praecedentis magnitudine, supra fulvido-brunnea, postice obscurior; subtus alba; cauda basi anguste pilosa, corpore paulum breviore.

Didelphys impavida. Tschud. Faun. peruan. I. S. 149. tab. 9.

Ebenfalls eine Entdeckung von Tschudi. Der Pelz ist weich und schlicht. Die Oberseite ist glänzend rostig zimmtfarben, auf dem Nacken und Hinterrücken mit schwärzlichen Schattirungen: die einzelnen Haare sind am Grunde zu ⅔ schiefergrau, dann röthlichbraun mit feiner schwarzer Spitze, welche am Hinterrücken länger schwarz sind. Die Seiten sind mehr röthlichgelb; Kehle, Brust und Bauch sind ganz weiß: die Haare einfarbig, und nach den Seiten hin sind sie am Grunde grau. Die Nasenkuppe ist rothbraun und von ihr aus verläuft über die Mittellinie zur Stirne ein weißlichgelber Streif, der hinten in die Rückenfarbe übergeht; die großen Ohren sind dunkel; die Augen liegen in einer schwarzbraunen Einfassung. Die Füsse sind schmutzig graulichweiß, die Nägel hellbräunlich. Der Schwanz ist graubraun mit sehr feinen Schuppen und silberweißen Härchen besetzt. — Die Weibchen haben Bauchfalten.

Körper	6″	3‴	Ohr	0″	9‴
Schwanz	5	4	Von der Nase zum Ohr	1	6

Hat gleichen Aufenthalt wie D. noctivaga, von der sie sich durch lebhaftere Färbung und viel kürzeren Schwanz unterscheidet; durch letzteres Merkmal so wie durch ansehnlichere Körpergröße kann sie auch nicht mit D. murina und deren Verwandten verwechselt werden.

21. **D. murina** Linn., der Maus-Schupati; **Nitelae magnitudine, supra cano-fulvescens, subtus e lutescente albida; oculis limbo fusco circumdatis; auriculis minoribus; pedibus posterioribus gracilibus; cauda gracili, corpore paululum longiore, basi anguste pilosa, parte nuda unicolore rubello-albida.**

Didelphys murina. Linn. XII. 1. p. 72. — Schreb. Säugth. III. S. 545. tab. 149. — Desmar. mamm. p. 259. — Temm. monogr. I. p. 50. — Prinz v. Neuw. Beitr. II. S. 411. — Cuv. régn. anim. I. p. 177. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 49 (zum Theil); Archiv für Naturgesch. 1842. S. 359; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 143. — Waterh. nat. librar. XI. p. 105; nat. hist. of mamm. I. p. 308. — Tschud. Fauna peruan. I. S. 146.

Wie bei D. Philander giebt es auch bei gegenwärtiger Beutelratte drei Arten, die ächte D. murina, dann die D. macrotarsus und D. microtarsus, die leicht mit einander verwechselt werden können. Wenn dieß bisher nicht öfters geschehen ist, so liegt der Grund davon wohl nur in dem Umstande, daß die beiden letztgenannten Arten erst durch Natterer im Innern entdeckt wurden, während die D. murina an der Küste bis nach Guiana sich zieht, und daher wohl die einzige von diesen Beutelratten seyn wird, die schon in frühern Zeiten nach Europa gebracht wurde.

Alle drei Arten stimmen darin miteinander überein, daß sie ohngefähr die Größe eines Gartenschläfers haben, ferner einen spitz zulaufenden Kopf, einen breiten schwarzen Streif, der jederseits von dem Ursprunge der Schnurren an durch das Auge verläuft und dazwischen den lichtgelben Schnautzenrücken frei läßt, der von keinem Längsstreif, wie bei D. Philander, durchzogen wird. Außerdem ist die Schwanzwurzel nur in einem ganz schmalen Ringe vom Rückenpelze umfaßt; der übrige Schwanz nackt und einfarbig. Die Oberseite ist graulichfalb gefärbt, die untere gelblich weiß. Die Weibchen haben keinen Beutel. Dieß sind die wesentlichsten Merkmale, in welchem die drei nahe verwandten Arten mit einander über-

einſtimmen; ihre Hauptunterſchiede liegen in der Größe der Ohren, der Länge und Breite der Hinterhände, und in der Färbung des Schwanzes. Als die länger bekannte Art iſt die ächte D. murina wohl unter den Beſchreibungen der ältern Schriftſteller zu ſuchen; doch läßt ſich hierüber nicht mit Sicherheit abſprechen. So iſt z. B. gleich Buffon's und Daubenton's Marmoſe nicht mit Evidenz einer der drei Arten zuzuweiſen, da die Färbung des Schwanzes nicht angegeben iſt; aus der Größe der Hinterfüſſe und Ohren möchte man faſt auf D. macrotarsus ſchließen. Auch bei Pennant iſt nicht ſicher auszuſcheiden, und Shaw hat offenbar etliche ſehr verſchiedene Arten zuſammen geworfen. Desmareſt hat nur die Beſchreibung von Daubenton wiederholt, daher dieſelbe Ungewißheit. Schreber ſcheint unſere Art vor Augen gehabt zu haben; dieß iſt unbeſtreitbar der Fall bei dem Prinzen von Neuwied, Temminck und Waterhouſe, wahrſcheinlich auch bei Tſchudi. Ich dagegen hatte in meinen Supplementen zu Schreber nur die D. macrotarsus zur eigenen Vergleichung vor mir gehabt, ſo daß ich wegen der ächten D. murina auf die eben genannten Gewährsmänner verweiſen muß.

22. D. macrotarsus Natt., die langpfotige Beutelratte; supra cano-fulvescens, subtus e lutescente albida; oculis limbo fusco circumdatis, auriculis majoribus; pedibus posterioribus elongatis robustis; cauda gracili, corpore longiore, basi anguste pilosa, parte nuda omnino calva, saturate rubello-cinerea. — Tab. 20.

Didelphys macrotarsus. Wagn. Arch. für Naturgeſch. 1842. S. 359; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 145.

Dieß iſt diejenige Art, welche ich in meiner Fortſetzung des Schreberſchen Werkes, aus Mangel eines ächten Originals von D. murina, mit dieſer noch unter einer Art zuſammengeſtellt und von ihr die Maaße angegeben habe. Die Unterſuchungen in der Wiener Sammlung haben mich von meinem Irrthume überführt, und vermittelſt der hier mitgetheilten Diagnoſen und Beſchreibungen wird es von nun an ein Leichtes ſeyn, dieſe D. macrotarsus ſowohl von D. murina als von D. microtarsus ſicher zu unterſcheiden.

Geſtalt und Größe iſt wie bei voriger, aber die nackten Ohren ſind

ansehnlich größer, und die Hinterfüsse länger und robuster. Die Nasenkuppe hat eine Längsfurche; der Pelzbesatz des Unterschenkels hört bald unter dessen Mitte auf; die Füsse sind dünn behaart. Der Schwanz ist wie bei D. murina nur an der Wurzel auf eine ganz schmale Strecke vom Rückenpelz überzogen, dann ganz nackt ohne Haaranflug.

Die Farbe der Oberseite ist trüb rostbräunlichfalb, was an dem Vorderkopfe, den Seiten und auf den Gliedmassen lichter wird, und hier mehr mit Grau überlaufen ist. Die Unterseite ist weiß mit gelblichem Anfluge; der Hodensack der Männchen mit gelblichweißem Haaranfluge. Die Haare der Oberseite sind im größten Theile ihrer Länge schieferfarben, nur die Spitzen sind rostfalblich; die der Unterseite sind einfarbig. Der Augenring, der sich vorwärts in einen breiten Streifen fortsetzt, ist schwarzbraun; der Schnautzenrücken ist von licht rostgelblicher Farbe, die beiderseits scharf von dem erwähnten Streifen absetzt. Die Schnurren sind schwarz, Sohlen und Füsse lichtfarbig. Der Schwanz ist auf seinem nackten Theile einfarbig dunkel röthlichgrau.

Von zwei Männchen habe ich nachfolgende Maaße entnommen:

Körper	4″	8‴	5″	0‴
Schwanz	5	8	6	0
Behaarter Theil desselben	0	3	0	3½
Von der Nase zum Auge	0	6⅓	0	6½
„ „ „ „ Ohre . . .	1	2	1	2
Ohr	0	8	0	8
Hinterhand	0	8	0	9½

Natterer entdeckte diese Art während seiner Flußreise den Madeira hinab.

23. D. microtarsus Natt., die kurzpfotige Beutelratte; supra saturate fulvescens, subtus lutescens, oculis limbo fusco circumdatis, auriculis majoribus, pedibus posterioribus abbreviatis gracilibus; cauda gracili, corpore longiore, basi anguste pilosa, parte nuda saturate rubello-cinerea, subtus tenuissime albido-pilosa. — Tab. 21.

Didelphys microtarsus. Wagn. Arch. für Naturgesch. 1842. S. 359; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 147.

Die kurzpfotige Beutelratte kommt mit der langpfotigen in der Größe der Ohren und der Färbung des Schwanzes überein; aber ihre Hinter-

hände haben die kleinere zierliche Form der D. murina und die Färbung der Ober- wie der Unterseite hat mehr Roth beigemischt und ist daher gesättigter als bei den beiden andern Arten.

Die Farbe der Oberseite ist rostig bräunlichroth, was auf den Seitentheilen lichter wird, am hellsten aber auf dem Schnautzenrücken ist, der dadurch sehr von der schwarzen Augenbinde absticht. Die Unterseite ist ockergelb, an den Seiten hie und da mit rostigem Anfluge. Nicht nur die Haare der Oberseite sind im größten Theil ihrer Länge schieferfarben, so daß das äußere Farbenkleid blos von den Haarspitzen ausgeht, sondern auch die der Unterseite sind in ihrer untern Hälfte schieferfarben. Durch letzteren Umstand unterscheidet sich D. microtarsus ebenfalls von D. macrotarsus, bei welcher die Haare der Unterseite einfarbig sind; ein weiterer Unterschied ist der, daß bei dieser die Schieferfarbe lichter, bei unserer D. microtarsus dagegen ungleich dunkler und schieferblauschwarz zu nennen ist. Nur längs der Mitte des Vorderhalses sind die gelben Haare einfarbig. Der Hodensack ist mit ziemlich langer Wolle dicht besetzt. Der Pelzbesatz des Unterschenkels erreicht die Ferse nicht. Die Schnurren sind schwärzlich, die Augen schwarz, die Ohren nackt und braungrau, an der Wurzel schmutzig orangefarben; die Nase und Füsse fleischfarbig, letztere mit feinen weißen Härchen besetzt, die Sohlen etwas ins Gelbliche ziehend, die Nägel weißlich. Der Schwanz ist in seinem nackten Theile einfarbig dunkel röthlich grau, in der letzten Hälfte seiner Unterseite mit kurzen, anliegenden, bräunlichen Härchen besetzt, was bei D. macrotarsus nicht der Fall ist.

Körper	4″	8‴	Von der Nase zum Ohre .	0″	11‴
Schwanz	5	4	Ohr	0	7½
Behaarter Theil desselben . .	0	4	Hinterhand	0	7½
Von der Nase zum Auge . .	0	5¾			

Natterer fand diese Art blos um Ypanema im südlichen Brasilien. Beide Geschlechter sind gleichfarbig. Das Weibchen hat keinen Beutel, aber am Unterleib 13 Zitzen, von denen 12 in eine nach hinten erweiterte Ellipse gestellt sind und die 13te in deren Mittellinie nahe an ihrem Hinterrande liegt. Die Zehen an den Vorder- und Hinterfüssen halten diese

Thierchen im Leben immer sehr weit auseinander gespreizt. Den Schwanz tragen sie fast immer gerollt und zwar in mehrere Ringe [1]).

24. D. Musculus Cab., der Brand-Schupati; praecedenti affinis, at multo minor.

Didelphys Musculus. Cabanis in R. Schomburgk's Reisen in Britisch-Guiana III. S. 778.

Wir theilen hier die von Cabanis gelieferte Beschreibung mit. „Hat in der Größe und Färbung annähernde Aehnlichkeit mit der Brandmaus (Mus agrarius). Die Haare der Oberseite sind am Grunde schiefergrau, an den Spitzen rostbraun. Unterseite gelblichweiß. Von der Nase durch die Augen läuft ein dunkler Strich, unmittelbar hinter der Nase von rothbrauner, weiter nach hinten von schwärzlicher Färbung. Die Ohren sind nackt, ziemlich abgerundet und, mit Ausnahme der gelbgefärbten Basis der inneren Seite, schwärzlich. Schwanz nur an der Wurzel behaart, sonst nackt. Länge von der Nase zur Schwanzwurzel 3¾ Zoll, Schwanz 4¾ Zoll."

Diese kleine Beutelratte wurde von R. Schomburgk in der Karaiben-Niederlassung Arrai am obern Pomeroon im brittischen Guiana häufig angetroffen. Sie gehört allem Anscheine nach zur Gruppe der D. murina und steht am nächsten der D. microtarsus, wenigstens bezüglich der Färbung, von der ich sie aber getrennt habe wegen der weit geringeren Größe der D. musculus. Genauere Vergleichungen der letzteren mit jenen nahe verwandten Arten sind indeß noch vorzunehmen, bevor die Selbstständigkeit dieser Art als gesichert anzusehen ist.

25. D. pusilla Desm., die Zwerg-Beutelratte; minima, murino-cana, subtus albida, cauda corpore longiore nuda albida.

Didelphys pusilla. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 50. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 514.

Waterhouse erwähnt eines im brittischen Museum aufbewahrten Exemplares, das ganz mit Azara's Beschreibung von seinem Micouré nain übereinkommt und gleiche Größe hat.

---

1) Unsere Abbildung ist die Kopie eines von Natterer nach dem Leben gezeichneten Originales.

Körper	3″	3‴	Ohr	0″	5½‴
Schwanz	3	9½	Hinterfuß	0	6

Die Heimath dieses Exemplares ist unbekannt; die beiden von Azara beschriebenen gehören Paraguay an. Durch ihre graue Farbe unterscheiden sie sich von den vorhergehenden kleinen falben Arten [1]).

* D. incana Lund.

Lund, det K. Danske Vidensk. Selsk. Afh. VIII. p. 236. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 503.

Wird von Lund folgendermassen charakterisirt: „alle obern Theile rein grau, Unterseite weiß, durch das Auge eine schwarzbraune Binde; Schwanz lichtbraun, gegen das Ende weißlich, nackt bis zur Wurzel, Ohren grau; sehr verschieden von D. cinerea Temm." Körper 4″, Schwanz 5″. Von Lund in der Provinz Minas Geraes (Brasilien) gefunden. — Vorstehende Angaben sind nicht ausreichend, um bemessen zu können, ob diese D. incana von D. pusilla specifisch verschieden ist.

26. D. elegans Wat., die chilische Beutelratte; **Musculi magnitudine, supra cano-brunnea, nigro-irrorata, subtus alba; capite abbreviato, pedibus gracilibus; cauda circa longitudine corporis, plerumque incrassata, supra fusca.**

Didelphys elegans. Waterh. zool. of the voy. of Beagle, mamm. p. 95. tab. 31; natur. librar. XI. p. 106; nat. hist. of mamm. I. p. 515. tab. 16. fig. 1. — Gay, hist. fisica y politica de Chile. zool. I. p. 84. — D. hortensis Reid. proceed. of the zool. soc. V. (1837) p. 4. — Thylamys elegans. Gray list of the mamm. p. 101.

Von dieser durch mehrere Merkmale leicht unterscheidbaren Art besitzt unsere Sammlung seit einigen Jahren auch ein Exemplar. Der Kopf ist kurz und zugespitzt, die Ohren sind ziemlich groß und nur spärlich mit Härchen beflogen; die Füsse, zumal die vordern, sehr zierlich. Der Schwanz

---

1) Die verwandte D. grisea Desm. (Schreb. Supplem. III. S. 52) kann ins System nicht eingereiht werden, bis sie genauer gekannt seyn wird. — Ein Exemplar im Museum zu Zürich, von dem Schinz (synops. mamm. I. p. 369) sagt, daß es ganz mit D. grisea übereinkommt, kann gleichwohl nicht letzterer angehören, da seine Länge des Körpers zu 5″ 9‴ und die des Schwanzes nur zu 5″ bestimmt ist, während nach Azara's Angabe der Körper 3″ 9‴ und der Schwanz 5″ mißt.

ist bei den meisten Exemplaren auffallend dick, doch hat Waterhouse auch solche gesehen, bei denen er verhältnißmäßig kaum dicker war als bei andern Beutelthieren. Wenn der Schwanz verdickt ist, so ist er dieß am meisten zu Ende des ersten Viertels von seiner ganzen Länge, von wo an er sich ziemlich schnell verschmälert. An der Wurzel ist er deutlich eingezogen und unterhalb der Schwanzspitze ist er auf ungefähr ¼″ nackt; der übrige Theil ist mit feinen anliegenden Härchen beflogen. Der Pelz ist lang und weich, aber nicht wollig, sondern schlicht. Die Farbe der Oberseite ist im Allgemeinen bald mehr aschgrau, bald mehr gelbbräunlich, in beiden Fällen fein schwarz gesprenkelt. Die ganze Unterseite ist schön weiß, was an den Leibesseiten von der obern dunklen Farbe durch einen gelbbräunlichen Streifen getrennt wird. Die Haare der Oberseite sind im größten Theil ihrer Länge schiefergrau, dann gelbbräunlich oder aschgrau mit kurzen schwarzen Spitzen; an den Seiten sind die Haare gleichfalls am Grunde schieferfarbig, an den Spitzen licht gelbbräunlich; die weißen Haare sind längs der Unterhälfte der Seitentheile gleichfalls am Grunde noch schieferfarbig, längs der Mitte des Unterleibs aber einfarbig weiß. Die Füsse sind ebenfalls weiß. Die Augen haben eine schwarze Einfassung, die Ohren sind graubräunlich, unten lichter. — Von den nachstehenden Maaßen sind die 3 ersten von Waterhouse entlehnt; die der vierten Spalte sind vom hiesigen Exemplare genommen.

	I.		II.		III.		IV.	
Körper	5″	5‴	4″	6‴	4″	1‴	4″	0‴
Schwanz	4	2	4	4	4	3	3	9
Ohr	0	7¾	0	7¼	0	7¾	0	7
Von der Nase zum Ohr . . .	1	½	1	1½	0	11½	0	11

Es ist diese Art als die einzige in ganz Chile zahlreich verbreitet und kommt schon bei Valparaiso im Gebüsche, das an den Felsen wächst, vor; sie klettert mit ziemlicher Leichtigkeit auf Bäume.

γ) cauda corpore quarta parte breviore, basi incrassata.

27. **D. velutina** Natt., die Sammet-Beutelratte; **Musculi magnitudine, mollissima, supra umbrino-fusca, subtus abrupte lutescens; capite acuto, auriculis majusculis; cauda corpore paululum breviore, basi anguste villosa, dein nudiuscula, obscura, acuminata, pilis brevissimis glabris adpressis vestita.**

Didelphys velutina. Wagn. Archiv für Naturgesch. 1842. S. 360; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 155.

Der Habitus dieser Beutelratte ist ganz der einer jungen D. murina, auch die Färbung hat viele Aehnlichkeit, aber der Schwanz ist völlig verschieden und bringt unsere Spezies in Verbindung mit D. brachyura und den damit verwandten Arten.

Der Kopf läuft spitz zu, und die Nasenkuppe ist in der Mitte gefurcht. Die Schnurren sind kurz und schwach, die Ohren ziemlich groß, nackt, oval und über den Scheitel weit überragend. Die Füsse und Hände sind klein und zierlich. Der Schwanz, welcher dem Körper an Länge etwas nachsteht, ist nur an der Schwanzwurzel auf eine ganz kurze Strecke vom Rückenpelz umhüllt. Sein entblößter Theil, der anfangs ziemlich dick ist, spitzt sich allmählig zu, zeigt keine merkliche Beschuppung und ist mit kurzen, fest angeklebten Härchen besetzt. Der Pelz ist glatt, reichlich, ziemlich lang und fühlt sich so weich wie Sammet an; am Unterschenkel hört er auf, bevor er dessen unteres Ende erreicht. Der Hodensack ist dicht mit zottigen weißlichen Haaren besetzt. Das Weibchen ist noch unbekannt, wird aber wohl ohne Beutel seyn.

Die Farbe der Oberseite ist fein braunschwarz und licht gelbbräunlich gesprenkelt; die Seiten und der Unterleib sind hell isabellgelb. An der Grenze beider Farben verläuft an den Rumpfseiten eine schmale, verwischte, licht roströthliche Binde, die an den Halsseiten mehr Lebhaftigkeit gewinnt und sich breiter ausdehnt; auch der Vorderhals hat einen rostigen Anflug, während Kehle und Unterkiefer ins Gelblichweiße erblassen. Die Haare sind dem größten Theile ihrer Länge nach dunkel schieferblauschwarz; auf der Oberseite mit bräunlich gelben und schwarzbraunen Spitzen, auf der Unterseite mit gelben. Die Augen liegen in einem schwarzen Ringe, der übrigens weder vor- noch rückwärts in eine Binde ausläuft. Sonstige Abzeichen am Kopfe sind nicht vorhanden. Schnurren und Ohren sind ziemlich dunkel. Die Hinterbeine sind auf der Aussenseite von der Farbe des Rückens, die vordern gehen bald in's trüb Isabellfarbige über; die Zehen sind schmutzig weißlich, die Nägel weißlich mit dunklerem Fleck; die Sohlen hellfarbig. Der Schwanz hat auf der Oberseite eine etwas

fettige nußbraune Farbe, die unten merklich lichter ist. Der hellfarbige Hodensack ist mit weißlichen Zottenhaaren besetzt.

Körper	3″	7‴	Von der Nase zum Auge	0″	5‴
Schwanz	2	9	„ „ „ „ Ohre	0	11
Behaarter Theil desselben . . .	0	4½	Ohr ohngefähr . . .	0	5½
Umfang des Schwanzes nahe an der Wurzel	0	9	Hinterhand	0	5½

Von Natterer im Walde bei Ypanema im südlichen Brasilien entdeckt.

δ) cauda corpore dimidio breviore.

28. **D. unistriata** Natt., die einstreifige Beutelratte; **supra e ferrugineo et cano mixta, subtus lateribusque ferrugineo-rufescens; stria dorsali impressa obscuriori; capite abbreviato, auriculis breviusculis; cauda pilosiuscula, vellere brevissimo.**

Didelphys unistriata. Wagn. Archiv für Naturgesch. 1842. S. 360; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 148.

Der Habitus dieser Art ist ganz wie der von D. glirina, aber die Größe ist etwas geringer, der Schwanz von anderer Beschaffenheit. — Der Körper ist langgestreckt und kurzbeinig. Der Kopf ist etwas dick und dabei kurz, die Nasenkuppe gefurcht, die Schnurren kurz und fein; die Ohren klein, nicht über den Scheitel vorragend, halbrundlich, unten ausgeschnitten und nackt, mit einem zarten Haaranfluge. Die Vorderfüsse sind robuster als die hintern, welche fein und schmal sind. Der Schwanz ist noch nicht halb so lang als der Körper, an der Wurzel etwas vom Rückenpelze bedeckt, dann bis an seine Spitze mit abstehenden Härchen ziemlich dicht besetzt. Von dem Schwanze der D. glirina und velutina weicht er darin ab, daß er an der Basis nicht so dick und überhaupt nicht kegelförmig gestaltet, seine Behaarung nicht angedrückt, sondern abstehend und rauher ist; endlich daß er nicht, wie bei jenen, gerade ausgestreckt, sondern am untern Ende hakenförmig eingekrümmt ist. Aus dieser Umbiegung scheint mit ziemlicher Sicherheit hervorzugehen, daß der Schwanz der D. unistriata zum Greifen bestimmt ist, was auch noch dadurch bestätigt werden möchte, daß die Haare auf der Unterseite der Schwanzspitze mehr angedrückt sind. Der Hodensack ist dicht behaart.

Das Weibchen ist noch nicht bekannt, wird aber wohl ohne Beutel seyn. Die Behaarung ist sehr kurz angedrückt und fühlt sich nicht weich an.

Die Farbe der Oberseite ist rostbraunroth mit feiner weißlicher Sprenkelung. Die sämmtlichen Seitentheile und die ganze Unterseite ist einfarbig und licht roströthlich, was von der Rückenfarbe scharf abschneidet und auf der Unterseite etwas heller wird. Vom Widerrist bis zur Schwanzwurzel verläuft ein etwas eingedrückter schmaler Streifen von einfarbig dunkel rostbraunrother Farbe. Die gesprenkelten Haare des Oberkopfes und Rückens sind in ihrem untern Theil grau, dann gelblich mit rostbraunrothen Spitzen; die Haare an den Seiten und dem Unterleib sind einfarbig, doch gegen ihre Wurzeln lichter. Der Kopf ist ohne besondere Auszeichnung; die Schnurren sind schwärzlich, die Wangenborsten weißlich. Die Gliedmassen sind rostfalb wie die Seiten, doch zieht sich an der Aussenseite der hintern die gesprenkelte Rückenfarbe etwas herab. Die Krallen sind gelblich weiß mit dunklem Fleck. Der Schwanz ist oben dunkel rostbraun, unten schmutzig rostgelb behaart. Der schwarze Hodensack ist mit rostgelblichen Haaren bedeckt. Die Sohlen scheinen im Leben fleischfarben zu seyn.

Körper	5″	7‴	Von der Nase zum Ohre . .	1″	1‴
Schwanz	2	5	Ohr	0	5
Von der Nase zum Auge .	0	6½	Hinterhand	0	6¾

Von Natterer bei Ytararé im südlichen Brasilien gefunden.

29. D. tristriata Kuhl, die dreistreifige Beutelratte; **ferrugineo-brunnea, subtus dilutior, striis 3 dorsalibus longitudinalibus nigris.**

Didelphys tristriata. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 52. — Waterh. natur. librar. XI. p. 107. tab. 3; nat. hist. of mamm. I. p. 518.

Eine in unsern Sammlungen noch sehr seltene Art, die erst jetzt durch Waterhouse genauer bekannt geworden ist und über die ich aus Natterer's Manuscripten noch wichtige Angaben beifügen kann.

Aus Waterhouse's Beschreibung eines Exemplars hebe ich Folgendes hervor. Die Schnauze ist scharf zugespitzt; die Ohren sind klein, rundlich und fast nackt, nur mit sehr kurzen braunen Härchen beflogen. Der Pelz ist kurz, mäßig weich, ziemlich dicht dem Körper anliegend und

die Haare ſind auf der Ober- wie auf der Unterſeite am Grunde grau. Die Oberſeite iſt ſchön braun, die Haare tief gelb und ſchwarz geſprenkelt; Letzteres nimmt an den Seiten allmählig ab, ſo daß ein lebhaftes Roſtgelb vorherrſcht, was auch die ganze Unterſeite einnimmt. Die 3 ſchwarzen Rückenſtreifen ſind ziemlich breit: der mittlere zieht ſich von der Naſenſpitze längs der Mitte des Kopfs und Rückens bis zur Schwanzwurzel und iſt auf der Mitte des Rückens ¼ Zoll breit; die beiden andern Streifen ſind nicht ſo breit und erſtrecken ſich vom Ohr bis zur Schwanzwurzel. Der Schwanz hat einzelne kurze Haare, oben von ſchwärzlichbrauner, unten von brauner Farbe; ein, dem des Rückens ähnlicher Pelz bedeckt die Schwanzwurzel nur auf ⅓ Zoll Länge.

Aus Natterer's Angaben, die ſich auf ein altes lebendes Weibchen beziehen, iſt Folgendes hier anzuführen. Die Naſe iſt ſchwärzlich fleiſchfarben, die Iris ſchwarz, die Ohren ſtark nach vorn gekehrt, braun und mit ſehr feinen Härchen beſetzt. Hände und Füſſe ſammt Schwanz ſind braun und mit ſehr feinen Härchen bekleidet, auf den Zehen jedoch ſo ſparſam, daß ſie faſt nackt ſind; die Nägel ſind weißlich. Der Schwanz iſt kurz, rundlich, an der Wurzel auf eine Erſtreckung von 5 Linien behaart, und nach einwärts gekrümmt. Das Weibchen hat keinen Beutel und die 15 Zitzen ſtehen am Bauche zwiſchen den Hinterfüſſen, in der Weiſe, daß 11 einen Kreis bilden, innerhalb deſſen die 4 anderen paarweiſe hintereinander ſtehen.

	Nach Waterhouſe.		Nach Natterer.	
Körper	4″	3‴	4″	9‴
Schwanz	2	1	2	1
Ohr	0	3	0	4
Hinterfuß	0	8¾	0	8

Natterer fand ſein Exemplar bei Ypanema im ſüdlichen Braſilien.

30. D. brachyura Schreb., die kurzſchwänzige Beutelratte; Nitelae magnitudine, supra cinerea, lateribus fulvida, subtus pallidior; auriculis abbreviatis; cauda basi incrassata villosa, dein pilis brevibus tecta.

Didelphys brachyura. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 51. (theilweiſe). — Waterh. natur. librar. XI. p. 111; zool. of the voy. of Beagle, mamm. p. 97.

tab. 22; nat. hist. of mamm. I. p. 522. tab. 16. fig. 2. — Temm. monogr. I. p. 53. — Lund, det Danske Vidensk. Selsk. naturv. Afh. IX. p. 135; VIII. p. 236 (als D. tricolor). — Micouré a queue courte. Azar. ess. I. p. 295.

β) obscurius colorata.

Didelphys brachyura. Schreb. III. S. 548. tab. 151.

Es ſcheint mir nicht zweifelhaft, daß unter der Benennung von D. brachyura Thiere zuſammengeſtellt wurden, die nicht einer und derſelben Art angehörig ſind; indeß fehlt es mir an Material, um eine ſchärfere Ausſcheidung der Angaben der Schriftſteller durchgreifend vorzunehmen, daher hier nur einige Hinweiſe.

Nach Waterhouſe's Beſchreibung eines durch Darwin von Maldonado mitgebrachten Exemplares iſt der kurze und dichte Pelz auf der Oberſeite aſchgrau gefärbt, an den Seitentheilen und auf der Unterſeite roſtgelb, auf letzterer indeß merklich heller; die Füſſe ſind gelblich. Die Haare des Rückens ſind am Grunde grau, die des Unterleibs einfarbig. Der Schwanz iſt ziemlich gut mit kurzen ſteifen Haaren beſetzt, die, mit Ausnahme des Wurzeltheils, nicht zahlreich genug ſind, die nackte Haut unten zu verdecken; an der Schwanzſpitze iſt unten ein kurzer nackter Fleck von ungefähr 1/4 Zoll Länge.

Hiemit ſtimmt auch die Beſchreibung von Azara's Micouré à queue courte überein, der keineswegs, wie fälſchlich angegeben, zu D. tricolor gehört. Nach ſeinen Angaben iſt der Körper flacher und dicker als bei andern Beutelratten, der Pelz kurz und weich, die Ohren nackt und kurz, der Schwanz dick, greifend und, mit Ausnahme des 5‴ langen Wurzeltheils, nackt; das Weibchen ohne Beutel und mit 14 Zitzen. Die Oberſeite iſt bräunlich aſchfarben, durch einige weißſpitzige Haare geſprenkelt, die Körperſeiten ſind lebhaft zimmtfarben, was auf der Unterſeite lichter wird.

Waterhouſe macht von einem braſiliſchen Exemplare die Bemerkung, daß die Seiten und der Unterleib ungewöhnlich blaß ſind: erſtere ockergelb, letzterer gelblichweiß. Der Rücken iſt aſchgrau und ſchwarz geſprenkelt, die Füſſe blaß ſchmutzig gelb; der nackte Schwanztheil mit ſchwarzen Härchen gut beſetzt. Auch Lund unterſcheidet ſeine D. brachyura von der durch Azara und Temminck beſchriebenen dadurch, daß

die Leibesseiten weder zimmtfarben noch rostroth, sondern blaß ockergelb sind.

Von den nachstehenden Maaßen sind die 3 ersten von Waterhouse entlehnt, und zwar I. das Exemplar von Maldonado, II. das aus Brasilien, III. eines im pariser Museum (wahrscheinlich auch aus Brasilien); IV. und V. von Azara.

	I.		II.		III.		IV.		V.	
Körper	6″	0‴	6″	6‴	6″	9‴	6″	0‴	4″	4‴
Schwanz	2	8	2	7	2	6	2	6	2	0
Ohr	0	3¼	0	4	0	3¼	0	4		
Von der Nase zum Ohr	1	6	1	4½	1	3	1	5		

Temminck's hauptsächlich auf surinam'schen Exemplaren beruhende Beschreibung, die ich im Supplementband aufgenommen habe, giebt die Rückenfarbe als ähnlich der der Wanderratte an, die der Seitentheile als lebhaft rostroth, die der untern als gelblichroth. Die Länge des Körpers bezeichnet er nur zu 4″ 3‴, die des Schwanzes zu 2″ 3‴; erstere also merklich geringer als sie Waterhouse und Azara, letzterer wenigstens vom Männchen, angiebt.

Am weitesten von diesen Beschreibungen weicht Schreber[1]) ab, indem er die Färbung viel dunkler schildert und die Größe noch geringer[2]).

31. D. glirina Natt., die Bilch-Beutelratte; Nitelae magnitudine, supra cinerascens, subtus cano-lutescens, lateribus pallide rutilo-ochraceis; capite abbreviato, auriculis mediocribus; cauda abbreviata, basi anguste pilosa, dein nuda, acuminata, pilis nonnullis subtilissimis adpressis obsita.

Didelphys glirina. Wagn. Archiv für Naturgesch. 1842. S. 359; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 150.

Diese Art ist der D. brachyura sehr nahe verwandt, scheint aber

1) Waterhouse (natur. librar. XI. p. 110; nat. hist. of mamm. I. p. 524) stellte eine Art als D. Hunteri auf, die er aber selbst als nicht hinlänglich begründet bezeichnete. Sie kommt in der Größe und Verhältnissen mit D. tricolor und brachyura überein, unterscheidet sich aber durch die Färbung, die oben einförmig braunschwarz, unten blaß braun ist. Dieses Thier erinnert sehr an Schreber's D. brachyura. 2) Geoffroy's im Catal. des mamm. p. 145 aufgeführte D. brachyura scheint mir jetzt unzweifelhaft mit D. tricolor identisch zu seyn.

erſt durch Natterer ihren Weg in ein europäiſches Muſeum gefunden zu haben[1]).

Der Kopf unſerer D. glirina iſt kurz, ebenſo die Schnurren und nackten Ohren; von der Stirne an verläuft eine Rinne bis zum Anfang des Rückens. Die Beine ſind kurz; die Hinterhände ziemlich ſchmal. Der Schwanz iſt kürzer als der halbe Körper, nach innen gebogen, nur an der Wurzel auf eine ſehr kurze Strecke vom Rückenpelze und zwar oben wie unten gleichförmig bedeckt, dabei in dieſem Theile von gewöhnlicher Dicke, die auf dem nackten Theile immer mehr abnimmt, ſo daß die Schwanzſpitze ziemlich dünn wird. Auf dem nackten Theile ſieht man feine Schuppenringe, die aber von einem zarten anliegenden Haaranfluge meiſt verdeckt werden. Der Hodenſack iſt kugelig; das Weibchen noch unbekannnt, ſicherlich aber ohne Beutel.

Die Färbung der Oberſeite iſt ſchwarzgrau mit feiner lichtgranlicher Sprenkelung; die Seiten ſind abgeſchoſſen roſtröthlich, was am lebhafteſten an den Halsſeiten und den Hinterkeulen auftritt; die Unterſeite iſt blaß graugelblich. Alle Haare ſind in ihrer untern Hälfte ſchiefergrau; auf der Oberſeite folgt dann ſchwarzbraun mit licht graulichgelben Spitzen, an den Seiten ſind die Spitzen roſtröthlich, auf der Unterſeite hellgelb. Der Kopf hat auf der Oberſeite die Färbung des Rückens; Augenringe oder ein mittlerer Längsſtreif fehlt ganz. Die Ohren ſind röthlichgrau, innen am Grunde fleiſchfarbig; die Naſe iſt ſchwärzlich auf ſchmutzig karminrothem Grunde. Die Wangen fallen ins trüb Roſtgelbliche, was hinterwärts lebhafter, unterwärts blaſſer wird. Der Vorderhals hat einen ſtark ockergelblichen Anflug, während der Unterleib nur blaß graugelblich iſt. Die Außenſeite der Gliedmaſſen iſt wie die Seiten blaß roſtröthlich mit Grau gemiſcht, die Vorderhände ſind lichtbräunlich, die

1) Es müßte denn nur ſeyn, daß die von Waterhouſe in ſeiner Natural History of the Mammalia I. S. 523 beſchriebene lichtere Abänderung von D. brachyura nicht dieſer, ſondern unſerer D. glirina zuſtändig iſt, wogegen jedoch die geringe Ohrgröße der erſteren ſpricht. Eher dürfte Lund's vorhin angeführte D. brachyura (früher D. tricolor von ihm benannt) unſerer D. glirina angehören, worüber ſich jedoch aus Mangel einer detaillirten Beſchreibung nicht entſcheiden läßt.

Hinterhände schmutzig weißlich; die Nägel hell gelblich; die Sohlen fleischfarbig. Der behaarte Theil des Schwanzes ist roströthlich, oben mit dunklerer Schattirung; der nackte Theil ist oben schwärzlich braun, unten und an den Seiten ins Fleischfarbige ziehend. Der Hodensack ist schwarz, mit dichtem weißlichem Haaranfluge.

Körper	6″	2‴	Von der Nase zum Ohre . .	1″	2‴
Schwanz	2	6	Ohr	0	6
Behaarter Theil desselben .	0	4½	Hinterhand	0	8
Von der Nase zum Auge .	0	7			

Das einzige Exemplar wurde von Natterer bei Cachoeira do Pau grande am Rio Mamoré gefunden. Von D. brachyura unterscheidet sich D. glirina durch minder lebhafte Färbung, größere Ohren und zweifarbige Haare.

32. D. domestica Natt., die Haus-Beutelratte; Ratto minor, supra sordide cinerascens, subtus lateribusque lutescens; capite haud striato, auriculis majusculis; cauda abbreviata, incrassata, pilis albidis brevissimis adpressis vestita.

Didelphys domestica. Wagn. Arch. für Naturgesch. 1842. S. 369; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 153.

Leib und Kopf sind langgestreckt, die Gliedmassen kurz und dick, die Hinterhände schmal. Die Schnurren sind kurz und schwach, die Nasenkuppe nackt und in der Mitte getheilt; die Ohren sind groß, abgerundet und nackt. Der Schwanz erreicht nicht die Hälfte der Körperlänge, ist dick, nimmt nur wenig an Umfang gegen die stumpfe Spitze ab, ist ohne merkliche Beschuppung, scheint im Leben licht fleischfarbig gewesen zu seyn, und ist mit kurzen, feinen, anliegenden Härchen beflogen, die unten und an den Seiten weißlich, oben schwärzlich sind und bei ihrer Kürze und Spärlichkeit die nackte Haut nicht verdecken können. Die Männchen haben einen voluminösen Hodensack; die Weibchen sind ohne Beutel, und haben zwischen den Hinterbeinen 13 Zitzen, wovon 10 einen Kreis bilden, in dessen Mitte noch 3 stehen. Der Pelz ist verhältnißmäßig kurz und glatt anliegend; an den Gliedmassen läuft er, immer kürzer werdend, bis zu den Fingern und Zehen herab, die nur einzelne Härchen aufzuweisen haben; die Schwanzwurzel ist vom ihm nicht überzogen.

Die Farbe der Oberseite ist aus Schwarz und schmutzig Gelblich gesprenkelt, was einen trüben Ton hat und wobei die erstere Farbe vorherrscht. An den Seiten gewinnt bald die graulichgelbe Farbe die Oberhand und die ganze Unterseite ist schmutzig gelb, was am Unterkiefer in's trüb Weißliche fällt. Die Haare sind in ihrem untern Theile grau, was auf der Oberseite einen größern Theil ihrer Länge, auf der untern einen kleinern wegnimmt. Die Haarspitzen sind hiernach länger oder kürzer gelb, und indem sich auf dem Rücken und Oberkopfe viele ganz schwarze Haare einmengen, erlangen diese Theile eine gesprenkelte Färbung, während die Seiten nebst der Unterseite, wo die schwarzen Haare fehlen, einförmig schmutzig gelb sind. Der Kopf hat keine Auszeichnung, indem ihm sowohl Augenringe als Längsstreifen abgehen; die Ohren sind bräunlichgrau. Die Aussenseite der Beine zieht in's licht Braungraue mit lichten Haarspitzen; die Hände sind weißlich behaart, die Krallen gelblichweiß. Die Nasenkuppe ist dunkel, die Sohlen sind lichter. Der Hodensack ist schwarz, dicht mit weißlichen Härchen bewachsen. Die Schnurren sind schwärzlich, zum Theil mit hellen Spitzen.

Körper	7″	0‴	Von der Nase zum Ohr . . .	1″	6½‴
Schwanz	2	8	Ohr	0	9
Von der Nase zum Auge	0	9	Hinterhand	0	8½

33. D. tricolor Geoffr., die dreifarbige Beutelratte; supra e griseo nigroque mixta, lateribus abrupte ferrugineo-rufis, gastraeo albido; cauda basi crassissima, supra ultra medium pilosa, apice subtusque nuda.

Didelphys tricolor. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 50. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 520.

Häufig in Guiana. Die Angabe, daß sie auch in Paraguay vorkomme, beruht auf Verwechslung von Azara's D. brachyura mit unserer D. tricolor.

VIII. CHIRONECTES. Schwimmbeutler.

Pedes posteriores lati palmati.

Als ich in meiner Fortsetzung des Schreber'schen Werkes der Reihenfolge gemäß die Gattung Chironectes in Bearbeitung nehmen mußte,

war es mir nicht möglich eine vollständige Schilderung zu liefern. An Originalbeschreibungen lagen nur zwei vor, nämlich von Buffon[1]) und Ogilby[2]). Ersterer hatte blos ein junges Thier vor sich; letzterer gab ebenfalls nur nach einem solchen von dem Gebisse eine Beschreibung, welche der von Fr. Cuvier[3]) und Owen[4]) hierüber mitgetheilten Notiz bezüglich der Zahl der Lücken- und ächten Backenzähne geradezu widersprach; auch hatte er das Vorkommen von sehr großen Backentaschen behauptet, was bisher weder von dem Schwimmbeutler, noch von irgend einem andern Beutelthier bekannt war und daher höchst zweifelhaft erscheinen mußte. Die von meinen Vorgängern gelassenen Lücken auszufüllen oder das Zweifelhafte sicher zu stellen, war mir damals nicht möglich, da ich von dem Schwimmbeutler kein Exemplar zur eignen Untersuchung auftreiben konnte. Auch die bald darauf erschienene Beschreibung von Waterhouse[5]), so genau sie auch die äußere Beschaffenheit erörtert, vermochte doch nicht die durch Ogilby angeregten Bedenklichkeiten zu lösen, da er in allen englischen Sammlungen nicht mehr als ein unvollständiges Exemplar auffinden konnte.

Das schöne Material, welches Natterer auch von dieser Gattung zusammenbrachte, läßt alle Zweifel beseitigen, und eine genaue Beschreibung dieses merkwürdigen, und in den Sammlungen noch höchst seltnen, Thieres mit besonderem Bezug auf die erwähnten strittigen Punkte entwerfen. Mit solchen Hülfsmitteln versehen, wird überdieß über die Berechtigung des Schwimmbeutlers als eigne Gattung im Systeme Platz zu nehmen, eine sichere Entscheidung herbeigeführt werden können.

Der äußere Habitus des Schwimmbeutlers ist der der langschwänzigen Beutelratten, wie es schon von meinen Vorgängern bemerklich gemacht worden ist, daher es auch keiner ausführlichen Beschreibung desselben, sondern nur einzelner Bemerkungen bedarf, hauptsächlich solcher, welche zur Entscheidung über die Gattungs-Ansprüche dieses Thieres hervorgehoben

1) Suppl. III. p. 159. tab. 22. 2) Lond. and Edinb. Phil. Mag. IX. (1836) p. 510; Proceed. IV. p. 56. 3) Dents des mammif. p. 75. 4) Odontograph. p. 381. 5) Nat. librar. XI. p. 112. tab. 4; neuerdings in der Nat. Hist. of the Mammal. I. p. 529.

werden müſſen. Vorder- wie Hinterfüſſe ſind mit 5 Zehen verſehen. Die Zehen der Vorderfüſſe ſind lang, ſchmächtig, ganz von einander getrennt, mit ſehr ſchwachen Krallen, die über die breiten angeſchwollenen Ballen nicht vorragen, noch weniger ſie der Breite nach überdecken, ſondern in dieſe eingebettet ſind. Der Daumen an den Vorderfüſſen iſt verhältnißmäßig lang und hat eine ähnliche Kralle. Einen auf den erſten Anblick ſehr befremdlichen Eindruck gewährt es, daß hinter dem fünften Finger ein Anhängſel mit knöcherner Ausfüllung zum Vorſchein kommt, das wie ein kleinerer ſechſter Finger, jedoch ohne Kralle, ausſieht. Owen hat uns indeß ſchon belehrt, daß dieſer ſcheinbare Finger lediglich durch die ungewöhnliche Entwicklung des Erbſenbeines hervorgebracht wird. Die Handſohlen ſind ſehr angeſchwollen und nackt.

Die Hinterfüſſe ſind kurz, und, abgeſehen vom Hinterdaumen, erinnern ſie gleich durch ihre ungemein breite platte Form, die großen Schwimmhäute und ihre angeſchwollenen nackten Sohlen an die der Biber; es ſind alſo Schwimmfüße im vollkommenſten Sinne dieſes Wortes und hiedurch von den Füſſen aller Beutelratten weſentlich verſchieden. Die Schwimmhaut, welche alle Zehen eines jeden Fuſſes einſchließt, reicht bis gegen die Wurzel der Krallen vor. Die Krallen ſind ſtärker und länger als an den Vorderfüſſen, über die Ballen vorragend, ſichelförmig, von beiden Seiten ganz ſchmal zuſammengedrückt; der anſehnlich lange und nicht ſo weit als bei den Beutelratten abgerückte Daumen iſt nackt.

Der lange Schwanz iſt nur an ſeiner Wurzel vom Rückenpelz bezogen, der in gleicher Erſtreckung, oben wie unten, plötzlich aufhört. Der ganze übrige Theil des Schwanzes iſt nackt, im Leben oben cylindriſch gewölbt, unten flach gedrückt, dabei nach unten gekrümmt; derſelbe iſt mit lauter kleinen, meiſt etwas rhomboidalen Schuppen bedeckt, die jedoch keineswegs in wirtelartige Reihen geſtellt ſind; zwiſchen ihnen kommen, zumal auf der Unterſeite, einzelne kurze anliegende Härchen zum Vorſchein, die erſt bei näherer Beſichtigung in die Augen fallen[1]).

1) Wie Ogilby vom Schwanze des Schwimmbeutlers ſagen kann, daß dieſer dem des Hydromys chrysogaster ſo vollkommen gleiche, daß man dieſe Theile, wenn ſie von den Thieren getrennt wären, unmöglich zu unterſcheiden vermöchte, iſt nicht wohl begreiflich.

Die Männchen haben den gewöhnlichen hängenden Hodensack der Beutelratten; die Weibchen, wie wir dieß zum erstenmal durch die von Natterer gesammelten Exemplare in Erfahrung bringen, einen vollständigen Beutel.

Der Pelz ist sehr dicht und weich, namentlich auf der Unterseite, wo er sich wie die feinste Baumwolle anfühlt und einen seidenartigen Glanz hat. Auf der Oberseite sind ihm viele längere steifere Borstenhaare eingemengt, die auf der Unterseite weit seltener sind. An den Gliedmassen hört der Pelz am Hand- und Fuß-Gelenke auf; nur die Mittelhand ist auf der Oberseite etwas mit Härchen besetzt. Die Ohren sind kahl. Schnurrhaare finden sich nicht nur an den Nasenseiten, hinter dem Auge und auf den Wangen, sondern auch am Unterkinne. Der Hodensack ist dicht filzig behaart.

Ogilby schreibt, wie erwähnt, dem Schwimmbeutler große Backentaschen zu. Da gedachter Naturforscher keine frischen Exemplare untersuchen konnte, sondern nur 2 Bälge, wovon der eine, nach dem hauptsächlich seine Beschreibung entworfen ist, von Natterer ihm zur Ansicht bewilligt worden war, so ist nicht abzusehen, wie sich Ogilby einer solchen Thatsache versichern konnte. An unsern Exemplaren konnte er wenigstens solche nicht ausmitteln, und von Natterer rührt eine derartige Mittheilung auch nicht her, da er keine Backentaschen beobachtet hatte. Die Angabe von ihrem Vorkommen fußt demnach auf keinem Grunde.

Vom Gebisse geben, wie erwähnt, Fr. Cuvier und Owen an, daß es sich ganz wie das von Didelphys verhalte, nämlich: $\frac{4}{4}$ Schneidezähne, $\frac{1}{1}$ Eckzähne, $\frac{3}{3}$ Lücken- und $\frac{4}{4}$ ächte Backenzähne, im Ganzen 50 Zähne. Ogilby zählt dagegen nur 42 Zähne, indem er in jeder Kieferhälfte blos 2 Lückenzähne und 3 Backenzähne aufführt. So verschieden diese Angaben klingen, so sind doch beide gleich richtig; die Differenz ist aber dadurch verursacht, daß die beiden erstgenannten Zoologen alte Thiere vor sich hatten, Ogilby dagegen nur ein junges, noch nicht erwachsenes. Ich habe das nämliche Exemplar, das ihm Natterer zur Ansicht verwilligt hatte, zur Vergleichung benützt und dieselbe Anzahl von Zähnen, wie Ogilby an ihm gefunden; allein daß es ein nicht erwachsenes, noch nicht mit allen seinen Zähnen versehenes Thier ist, geht evident

aus seiner geringen Größe hervor, die nicht einmal 9½ Zoll vollständig ausmacht, während ein altes Thier eine Körperlänge von 13″ und eine Schwanzlänge von fast 12″ erreicht. An erwachsenen Exemplaren habe ich, in Uebereinstimmung mit Fr. Cuvier, gleichfalls in jeder Kieferhälfte 3 Lückenzähne und 4 ächte Backenzähne gezählt.

Kommt also gleich der Schwimmbeutler mit den Beutelratten in der Zahl der Zähne überein, so entfernt er sich doch von ihnen durch die eigenthümliche Bildung seiner Füße dermassen, daß wir vollkommen berechtigt sind, ihm den Rang einer Gattung zuzugestehen, die übrigens nur eine einzige Art aufzuweisen hat.

1. Ch. variegatus Ill., der gebänderte Schwimmbeutler; castaneus, maculis magnis nigris, dorso confluentibus ornatus, subtus albus.

Chironectes variegatus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 54; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 157. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 532. tab. 17. fig. 1.

Nachstehende Beschreibung gründet sich lediglich auf die mir vorliegenden Exemplare aus Brasilien; aus Guiana sind mir keine zu Gesicht gekommen.

Der Pelz des Schwimmbeutlers hat 3 Hauptfarben aufzuweisen; seine ganze Unterseite ist schneeweiß, seine Oberseite ist grau mit schwarzen oder vielmehr glänzend dunkel kastanienbraunen Querbinden. Das Graue, welches von einem lichten Tone ist und von weißen, braun zugespitzten Haaren hervorgebracht wird, zieht bis zur Hälfte der Leibesseiten herab, wo es von der weißen Unterseite scharf abschneidet, und färbt auch die Außenseite der Gliedmassen, indem es zugleich durch eine braune Beimischung getrübt wird. Die schwarzbraune Farbe ist folgendermassen vertheilt. Der ganze Schnauzenrücken bis hinter die Augen ist von ihr bedeckt, umfaßt die Augen und zieht als eine Binde jederseits gegen das Ohr und breitet sich hinterwärts bis gegen die Schultern aus. Ein zweiter dunkler Flecken bedeckt die Stirne und den Mittelkopf; sein vorderer bogenförmiger Rand läuft parallel mit dem concaven Hinterrande des ersten Fleckens, und indem er von seiner Mitte aus durch einen Längsstreif mit diesem sich verbindet, entstehen zwei weiße Augenflecken. Bei jüngern Individuen fehlt dieser dunkle Längsstreif und

beide Flecken sind daher durch eine vollständige weißliche Querbinde geschieden.

Auf dem Rücken finden sich 3 große dunkle Querbinden. Die erste bedeckt das Widerrist und reicht beiderseits hinter dem Oberarme bis zur weißen Unterseite herab. Die zweite Binde findet sich auf dem Mittelrücken und erreicht die weiße Unterseite nicht, sondern die graue Grundfarbe tritt über sie vor. Die dritte Binde liegt auf dem Kreuz und erstreckt sich an den Seiten weiter herab als die vorige, ohne jedoch hier den Saum der Grundfarbe zu erreichen. Durch einen Längsstreif auf dem Rückgrath verbindet sich die mittlere Binde rückwärts mit der hintern, vorwärts mit der vordern. In ähnlicher Weise setzt sich die letztgenannte Binde mit dem Scheitelfleck in Verbindung, und die Kreuzbinde mit einem schmalen Fleck, welcher den Steiß und den Anfang der Schwanzwurzel bedeckt und jederseits in einem Streifen an den Hinterbeinen bis zur Ferse hinabzieht, in diesem Verlaufe zugleich die weiße Farbe der Hinterseite von der grauen scheidend. — Vom letztern Fleck setzt sich auf der Oberseite der Schwanzwurzel ein dunkler Längsstreif bis zum Ende des behaarten Theils derselben fort. Der behaarte Theil ist übrigens von einer braungrauen Färbung. Der nackte Theil des Schwanzes ist schwarz; seine Spitze im Leben fleischfarben. Die Länge dieser lichten Spitze ist verschieden.

Die ganze Unterseite des Körpers ist, wie erwähnt, nebst der Innenseite der Gliedmassen glänzend weiß mit lichtem gelblichem Anfluge. Die Iris ist dunkelbraun, die Nase schwarz, der Kieferrand fleischfarbig, die ziemlich großen und nackten Ohren auf der äußern Hälfte schwarz, auf der innern fleischfarbig braun. Die Füsse sind auf der Oberseite hell fleischfarbig braun, die Zehenspitzen und Schwimmhaut röthlich-graubraun, ins Violette ziehend, die Sohlen dunkelbraun. Der Schwanz ist an der Wurzel über 1″ lang vom Rückenpelz überflogen und auf der Oberseite dunkelbraun gefärbt; der nackte Theil ist anfangs schwarz, das Ende dunkel fleischfarben. Der Hodensack ist hängend. Bei einem mit dem Beutel versehenen Weibchen mißt der Körper 13″ 2‴, der Schwanz fast 12″.

Die Schwimmbeutler scheinen im Küstenstriche des östlichen tropischen Südamerikas von Rio Janeiro an bis zur Honduras-Bay verbreitet zu seyn, wo

sie an kleinen Flüssen leben und ihr Futter hauptsächlich in diesen finden mögen. Natterer erlangte 2 Exemplare an Gewässern nicht weit von Rio Janeiro; ein drittes wurde bei Para im Wasser in einer Fischreuße gefangen. Buffon erhielt sein Exemplar aus Cajenne.

IV. Familie.

Edentula. Zahnlümmerer.

Rostrum longissimum, pedes posteriores pollice distincto praediti digitisque secundo et tertio coadunatis, dentes minutissimi paucissimi.

Wenn auch diese Familie nur aus einer einzigen Gattung mit einer einzigen Art besteht, so bietet sie doch so ausgezeichnete eigenthümliche Merkmale dar, daß sie auf eine selbstständige Stellung vollen Anspruch hat.

IX. TARSIPES. Beutelrüßler

Cauda longa, brevissime pilosa, volubilis; pedes 5-dactyli.

Bald nach Publication meiner Monographie der Beutelthiere im 3. Supplementbande des Schreber'schen Werkes, machte uns P. Gervais im Jahre 1842 mit diesem seltsamen Typus unter den Marsupialien bekannt und legte ihm den Namen Tarsipes[1]) bei. Schon im darauf folgenden Jahre gelang es mir, von Dr. Preiß ein Exemplar dieses seltenen Thieres zu acquiriren.

Im äußern Habitus hat der Beutelrüßler viele Aehnlichkeit mit der kleinen Beutelratte oder noch mehr mit den Spitzmäusen. Die Schnauze ist sehr langgestreckt und läuft dünn und spitz aus; die Nasenkuppe ist nackt. Die Ohren sind mittelmäßig, gerundet, nur spärlich und fein behaart, und aus dem Pelze hervorragend. Die Augen sind klein, die Schnurrhaare lang und zahlreich. Die hintern Gliedmassen sind etwas länger als die vordern und sämmtlich mit 5 Zehen versehen; die Sohlen sind

1) Der Name ist aus Tarsius und pes, aber nicht sprachrichtig gebildet; an die Gattung Tarsius erinnert allerdings die Bildung der Hinterfüsse.

nackt. An den Vorderfüßen sind alle 5 Zehen von einander getrennt; die Zehen erweitern sich an ihren Spitzen in einen kleinen Ballen, in welchen der schwache Plattnagel eingebettet ist, so daß er von jenem überragt wird. An den Hinterfüßen bildet die innere Zehe einen entgegensetzbaren Daumen und ist ziemlich lang, aber ohne Nagel. Die zweite und dritte Zehe sind kürzer als die Daumenzehe und dabei ganz mit einander verwachsen, so daß sie nur durch die beiden kleinen Krallen, die spitz, unten ausgehöhlt und fast senkrecht aufgerichtet sind, unterschieden werden können. Die vierte Zehe ist weitaus die längste und die fünfte ist wieder merklich kürzer; beide Zehen sind, wie die der Vorderfüße, mit einem kleinen, vom Ballen überragten Plattnagel bekleidet. Der Pelz ist kurz und rauh. Der Schwanz ist sehr lang, an der Wurzel vom Rückenpelz umkleidet, dann nur mit ganz kurzen spärlichen Härchen auf der geschuppten Haut besetzt, wie ein Rattenschwanz; auf der Unterseite ist er auf eine kurze Strecke an der Spitze nackt. Das Weibchen hat einen Beutel und vier Zitzen.

Ist schon die Fußbildung dieses kleinen Thieres sehr eigenthümlich, so ist dieß noch weit mehr die Zahnbildung, die ganz paradox ist. Die Zähne sind nämlich winzig klein und wenigstens die hintern zeigen gar keine Beständigkeit, weil sie durch Ausfallen leicht verloren gehen, daher auch ihre Zahl von den Beobachtern verschieden angegeben wird. Gervais fand im Oberkiefer zuvörderst ein Paar winzige Schneidezähne; hinter ihnen im ersten Drittel des Zahnrandes jederseits noch kleine warzenförmige Zähnchen, sonst keine. Im Unterkiefer giebt er vorn ein Paar messerförmige, vorwärts gerichtete Zähne an; außerdem gegen das hintere Drittel des Zahnrandes jederseits nur noch ein kleines Zähnchen, sonst keine. Owen bemerkt, daß den beiden untern Schneidezähnen sechs obere entgegen gestellt sind, auf welche ein kleiner Eckzahn und einige kleine Backenzähne folgen. Waterhouse fand an zwei Schädeln folgende Zähne: Schneidezähne $\frac{1:2}{2}$, Eckzähne $\frac{1:1}{1}$, Backenzähne bei dem einen Schädel $\frac{5:5}{5}$, bei dem andern $\frac{5:?}{?}$. Am Schädel des mir vorliegenden Exemplares, der übrigens durch Zusammendrücken gelitten hat, finden sich auf der einen Seite der Oberkinnlade 3, durch schmale Zwischenräume getrennte und ganz seitlich stehende, und (mit Ausnahme des vordersten) höchst kleine obere Schneidezähne.

Nach einer großen Lücke folgt jederseits der weit größere, senkrecht stehende Eckzahn und ohngefähr in der Mitte der Unterkinnlade auf beiden Seiten 2 winzige Backenzähnchen. Alle diese Zähne sind klein, spitz und senkrecht stehend, mit Ausnahme der beiden untern Schneidezähne, welche größer als die übrigen, dabei horizontal vorwärts gestreckt und messerförmig sind mit abgestutzter Spitze. Nächst ihnen kommen an Größe die Eckzähne, die jedoch nur im Oberkiefer sich vorfinden, senkrecht gestellt, gerade und an der Spitze abgerundet sind; die Backenzähne sind blos einfache winzige Zacken. — Dem Gebisse nach bilden die Beutelrüßler unter den Marsupialien ein eben so abnormes Glied wie Proteles unter den Raubthieren.

Von einer nicht minder eigenthümlichen Beschaffenheit als es das Gebiß ist, ist bei den Beutelrüßlern die Bildung des Schädels, und man wird bei seinem Anblick zunächst an die Ameisenfresser und die Echidna erinnert. Seine Knochen sind sehr dünn und durchscheinend, der Hirnkasten ist gewölbt und glatt. Der Unterkiefer besteht aus zwei dünnen, langen, geraden, hinten durch einen Schlitz durchbohrten Aesten, mit einem kleinen halbrunden Gelenkfortsatz; weder Kronenfortsatz noch Winkelfortsatz sind vorhanden. Selbst die zur Einfügung des Unterkiefers dienende Gelenkhöhle ist nur ganz schwach angedeutet.

Im übrigen Skelet findet Waterhouse zunächst Aehnlichkeit mit Petaurus sciureus. An Wirbeln sind vorhanden: 7 Halsw., 13 Rükenw., 5 Lendenw., 3 Kreuzw., und 34 Schwanzwirbel, im Ganzen also 62 Wirbel. Die Beutelknochen sind gerade, klein und schlank. Die Fußbildung gleicht der von Phalangista in allen wesentlichen Stükken.

Von den Weichtheilen, über welche Waterhouse Aufschluß giebt, ist zu bemerken, daß die Zunge lang, dünn, zugespitzt und weit vorstreckbar ist. Der Magen ist klein und einfach, die Gedärme übertreffen die ganze Länge des Thieres ohngefähr um die Hälfte und haben keinen Blinddarm.

Es ist eine schwierige Aufgabe den Beutelrüßlern ihren richtigen Platz im Systeme anzuweisen. Gervais, Waterhouse und Owen haben sie mit den Phalangisten in Verbindung gebracht, welchen sie allerdings in der Bildung der Hinterfüsse, im Mangel der untern Eckzähne und in

der Beſchaffenheit der untern Schneidezähne, die auf zwei beſchränkt und horizontal vorgeſtreckt ſind, ſich anſchließen. Mir dagegen ſcheint die Verwandtſchaft mit den inſektenfreſſenden Raubbeutlern die überwiegende zu ſeyn. Vor Allem giebt ſich dieß ſchon in der zackigen Beſchaffenheit der Backenzähne zu erkennen, was mehr auf eine Modifikation des Gebiſſes der Raubthiere als der Pflanzenfreſſer hinweiſt. Wenn auch, wie zugeſtanden werden muß, die Zahl und Richtung der untern Schneidezähne zunächſt auf letztere hinleitet, ſo iſt doch auch nicht zu überſehen, daß bereits bei den Bandikuts dieſe Zähne, namentlich die mittlern, ſtark vorwärts gerichtet ſind. Ferner entfernt der Mangel eines Blinddarms die Beutelrüßler ganz von den Phalangiſten und bringt ſie dagegen in dieſer Beziehung mit der Familie der Rauhbeutler in Verbindung, bei welchen er ebenfalls fehlt. Was die Verwachſung zweier Zehen an den Hinterfüſſen anbelangt, ſo kommt dieſe auch bei den Bandikuts vor, wie die Daumenbildung und Einrollbarkeit des Schwanzes bei den Beutelratten; die Form des Schädels erinnert an die kleinern Arten von Perameles, ſowie an Myrmecobius, an letzteren endlich noch die beſondere Beſchaffenheit der Zunge. Nach dieſen vielfachen Zügen der Verwandtſchaft halte ich mich für berechtigt, den Beutelrüßler unter die Raubbeutler einzureihen, jedoch ſeiner vielen auffallenden Eigenthümlichkeiten wegen als eine beſondere Familie, die zu den Pflanzenfreſſern, und zwar zunächſt zu den Phalangiſten, hinüber führt. Wie ſchon erwähnt, nimmt der Beutelrüßler unter den Raubbeutlern eine eben ſo abſonderliche Stellung ein, als der Proteles unter den carnivoren Raubthieren.

1. T. rostratus Gerv., der Nulbingar; supra canus, subtus flavidus, dorso striis tribus nigris.

Tarsipes rostratus. Gervais magas. de zool. 1842. tab. 35—37. — Wagn. Archiv für Naturgeſch. 1843. S. 37; Schreb. Säugth. tab. CLIV. B. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 345. tab. 11. fig. 1. (Thier), tab. 19. fig. 6. (Schädel). — Owen odontograph. p. 381. — T. Spenserae. Gould mamm. of Austral. part I. — Gray, ann. of nat. hist. IX. (1842) p. 40; XI. p. 76.

Die Grundfarbe der Rückenpelzes iſt lichtgrau, was je nach den Individuen mehr oder weniger von einem falben Tone überlaufen iſt; die Unterſeite iſt hellgelblich und die Leibesſeiten ſchön roſtig ockerfarben. Die

Haare der Oberseite sind in ihrer untern Hälfte schieferschwarz, die der Unterseite nur am Grunde ins Grauliche ziehend. Bei manchen Exemplaren fällt die Unterseite fast ins Weiße. Ueber die Mitte des Rückens, vom Widerriste an bis zur Schwanzwurzel, verläuft eine schwarze Längsbinde und jederseits in einiger Entfernung eine andere von rostigbrauner, etwas schwarz gewässerter Farbe. Der Kopf ist trüb rostbraun und etwas schwarz gesprenkelt; die zahlreichen langen Schnurrhaare sind schwarz. Die Gliedmassen sind außen trüb rostfarbig, was auf den Füssen lichter wird. Der Schwanz ist, soweit er eine Behaarung ähnlich der des Rückenpelzes hat, von der Färbung des letzteren; im Uebrigen ist er oben dunkel und schmutzig rostig braun, was unten lichter ist.

Nachstehende Ausmessungen habe ich von Waterhouse entlehnt, wobei zu bemerken, daß die der letzten Spalte von einem in Spiritus aufbewahrten Exemplar entnommen sind.

	♂		♀		♀	
Körper	3″	4‴	3″	9‴	3″	0‴
Schwanz	3	6	4	0	3	7
Ohr	0	4	0	4	0	4¼
Von der Nase zum Ohr	1	0	1	2	0	11½
Vorderfuß	0	3¾	0	3¾	0	4
Hinterfuß	0	7¼	0	7⅓	0	7½
Daumen des letztern	0	2¼			0	2¼
Vereinigte 2te und 3te Zehe	0	1⅙			0	1⅙
Vierte Zehe	0	3			0	3
Aeußere Zehe	0	2			0	2

Alle bisher bekannt gewordenen Exemplare kommen von König Georgs-Sund, so daß die Angabe von Gervais, wornach die Umgebungen des Schwanenflusses als ihre Heimath bezeichnet sind, auf einem Irrthum zu beruhen scheint, zumal da mir auch Dr. Preiß bemerklich machte, daß dieses Thier an jenem Flusse ganz unbekannt sey. Nach seinen weiteren Mittheilungen wird es von den Eingebornen Nulbingar genannt, wohnt in Baumhöhlen und nährt sich von Insekten und Früchten.

Grey, Gouverneur in Südaustralien, der 2 lebende Individuen erhielt, theilte an Gray folgende Beobachtungen mit. Das eine starb wahrscheinlich des Hungertodes, weil der Besitzer ihnen anfänglich blos Wurzeln

und Nüße vorlegte, bis er in Erfahrung brachte, daß ſie fleiſchfreſſend wären und von Motten, Fliegen ꝛc. ꝛc. ſich nährten. Das Ueberlebende ergriff die Fliegen mit den Vorderfüßen, riß die Flügel ab, und verzehrte den Körper. Er ſah es niemals trinken. Den Tag über ſchlief gewöhnlich das Thier zu einem Ball eingerollt, zur Nachtzeit war es aber ſehr lebhaft und liebte es auf Baumäſte zu klettern, wo es ſich mit dem Schwanze aufhing und plötzlich auf einen andern ſprang. So lebte es mehrere Monate, bis es entwiſchte.

Aehnliches berichtete Neill [1]) an Waterhouſe. Ein Weibchen, das er lebend erhielt, wurde ſehr zahm und zutraulich, und fieng ſich Fliegen, denen es immer Kopf, Flügel und Füße abriß und nur den Leib verzehrte. Als künſtliches Futter gab Neill eingeweichtes und mit viel Zucker ſehr ſüß gemachtes Brod, das das Thierchen mit der Zunge aufleckte. Im Freien ſieht man es oft ſeine lange Zunge in die honigreichen Blumen ſtecken, um, wie man meint, den Honig aufzulecken. Auch dieſes Individuum war nur zur Nachtzeit thätig und bediente ſich ſeines Greifſchwanzes beim Klettern ganz in derſelben Weiſe wie die Phalangiſten.

Was die Anſicht des ſchwachen Gebiſſes des Beutelrüßlers, das weder zum Ergreifen einer Beute, noch zum Kauen gröberer Subſtanzen tauglich iſt, errathen ließ, beſtätigt demnach die Erfahrung: ſeine Hauptnahrung ſind weiche Inſekten, und vielleicht auch noch ſaftige Früchte. Ob das Thier ſeine Zunge in die Blüthen blos des Honigs wegen ſteckt, möchte ich bezweifeln; wahrſcheinlich ſucht es zunächſt darin die von der Süßigkeit angelockten Inſekten.

B. PHYTOPHAGA. Pflanzenfreſſende Beutler.

Dentes primores validi, inferiores tantum bini longi, procumbentes; canini inferiores parvi aut nulli, molares 4-tuberculati; intestinum coecum plerumque longissimum.

---

1) Als einheimiſche Namen für den Beutelrüßler nennt Neill: Tait und Noolbenger; letzterer offenbar die engliſche Schreibart für den von Preiß angeführten Namen Nulbingar.

V. Familie.

Scandentia. Kletterbeutler.

Artus posteriores anterioribus parum longiores digitisque secundo et tertio coadunatis; dentes primores $\frac{4}{4}$, canini superiores parvi; intestinum coecum longissimum.

a) pedes omnes 5-dactyli.

X. PHALANGISTA. Kuſu.

Pedes posteriores pollice distincto praediti, cauda elongata prehensilis.

Von Celebes und den molukkiſchen Inſeln an bis nach Vandiemensland verbreitet.

†) cauda postice nuda, auriculae breves. — Ceonyx Temm. (Cuscu Lacép).

Bewohner des indiſchen Archipels von Celebes an bis nach Neu-Irland; auf Neuholland ganz fehlend.

a) auriculis tectis, extus intusque pilosis.

1. Ph. ursina Temm., der Bären-Kuſu; Cati feri magnitudine, nigricans, flavido-adspersa, subtus e rufescente flavida, immaculata; auriculis brevissimis.

Phalangista ursina. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 69. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 267. — S. Müll. verhandel. I. p. 33.

Bisher blos aus Celebes bekannt. Bemerkenswerth iſt es, daß an einem Schädel unſerer Sammlung im Unterkiefer zwiſchen dem Schneidezahn und dem an die ächten Backenzähne anſtoßenden Lückenzahn von den hinfälligen Zähnchen auf der rechten Seite 3, auf der linken nur 2 ſich finden.

2. Ph. chrysorrhos Temm., der goldſteißige Kuſu; praecedenti paululum minor, supra cinerea, plus minus nigricans, subtus alba, uropygio caudaque supra aureo-flavis.

Phalangista chrysorrhos. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 70. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 271. — S. Müll. verhandel. I. p. 33.

Bewohnt nach S. Müller Amboina und Ceram.

3. Ph. maculata Geoffr., der gefleckte Kuſu; Cati feri magnitudine, albida, irregulariter nigro-maculata.

Phalangista maculata. Wagn. Schreb. Suppl. III. S. 71. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 274. — S. Müll. verhandel. I. p. 33.

Nach S. Müller auf Amboina, Ceram, Neuguinea und Waygiou einheimiſch.

*Ph. macrura Less., der langſchwänzige Kuſu; Cuniculo minor, cinerascens, brunneo-undulata, subtus auriculisque alba; cauda corpore multum longiore.

Phalangista macrura. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 72. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 277.

Da dieſe angebliche Art nur auf einem einzigen Exemplare beruht, von dem nicht nachgewieſen iſt, ob es erwachſen geweſen und ob ſeine Dimenſionsverhältniſſe vom friſchen oder ausgeſtopften Zuſtande entnommen ſind, ſo könnte hiemit allerdings, wie Waterhouſe vermuthete, nur ein junges Thier von Ph. maculata bezeichnet ſeyn, was um ſo wahrſcheinlicher iſt, da letztere Art ohnedieß auf Waygiou, dem Fundorte von Ph. macrura, vorkommt.

β) auriculis prominulis, intus nudis.

4. Ph. cavifrons Temm., der Kapul; Cuniculi magnitudine, alba; ♀ flavido-brunnea aut brunneo-cana, stria dorsali saturatiore.

Phalangista cavifrons. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 73. — S. Müll. verhandel. I. p. 33. — Ph. orientalis. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 279.

Die Heimath iſt nach S. Müller Amboina und Timor, nach Leſſon auch Neu-Irland.

††) cauda tota pilosa, subtus stria longitudinali calva; auriculae prominentes. — Trichurus (Trichosurus Less.).

Als Erſatz der vorigen Abtheilung auf Neuholland und Vandiemensland.

5. Ph. vulpina Shaw, der Fuchs-Kuſu; Cati feri magnitudine, supra cinerea, subtus pallide lutea; cauda basi cinerea, postice nigra.

Phalangista vulpina. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 74. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 284 (mit Ausſchluß von Ph. fuliginosa und felina) tab. 9. fig. 1. (Thier), tab. 19. fig. 1. (Schädel), tab. 22. fig. 10. (Backenzahn). — Owen cyclop. of anatom. III. p. 262. fig. 87. (Gebiß); odontograph. p. 383. tab. 100. fig. 1. (Gebiß). — Ph. melanura. Wagn. a. a. O. S. 81. — Ph. Cookii. Fr. Cuv.

mammif. III. — Ph. Bougainvillei. Wagn. a. a. O. S. 82. — Phalanger de Bougainville. Cuv. régn. anim. I. p. 183.

Wie die vorstehende Synonymik zeigt, ist es nothwendig geworden mit der Ph. vulpina etliche Nominalarten zu vereinigen. Dagegen bleiben mir noch einige Bedenken, ihr auch die folgende Art zuzuschreiben, wie es Waterhouse gethan, obwohl er allerdings wichtige Gründe hiefür vorgebracht hat.

Die gewöhnliche Färbung, wie sie die übergroße Mehrzahl der Individuen zeigt, ist grau, indem die Haare in ihrem obern Theile theils schwarz, theils grau sind; am dunkelsten ist der Rücken, weil ihm zahlreicher als anderwärts lange schwarze Haare eingemengt sind. Die Unterseite ist licht ockergelb oder gelblichweiß; auf der Brust findet sich häufig ein dunkel rostfarbiger Längsstreif. Die Seiten der Schnautze und die Unterlippe ist schwarz, die Ohren sind, mit Ausnahme der Spitze, auf der Hinterseite reichlich behaart, und zwar am Grunde dunkel, oben und hinten weiß. Die Füße sind schmutziggelblich oder mehr oder weniger dunkelbraun überlaufen. Der Schwanz ist anfangs von der Färbung des Rumpfes, dann aber wird er ganz schwarz. Der Körper mißt 20 bis 21 ", der Schwanz 12 bis 13", die Ohren 1" 10"' bis 2" 1"'.

Der Fuchs-Kusu scheint über ganz Neuholland verbreitet zu seyn; man kennt ihn wenigstens aus Neu-Südwallis, dem westlichen Neuholland und dem nördlichen (Port Essington). Trotz dieser weiten Verbreitung zeigt er doch nur wenige Farbenabänderungen, die hauptsächlich darin bestehen, daß die Oberseite einen hell rostigen Anflug hat, indem die Haare unter der weiß und schwarzen Spitze röthlich sind. — Noch muß ich bemerken, daß bei zwei Schädeln junger Thiere in unserer Sammlung der hinfällige untere Lückenzahn vorhanden ist.

Fr. Cuvier's Phalanger de Cook, den er irriger Weise mit Ph. Cookii identificirte und der von mir deshalb zur Unterscheidung von letzterem einen neuen Namen (Ph. melanura) erhielt, ist nichts weiter als ein etwas mehr als halbwüchsiges Junges von Ph. vulpina. Dasselbe gilt von G. Cuvier's Phalanger de Bougainville.

6. **Ph. felina** Wagn., der Katzen-Kusu; praecedente paululum major, vellere densiore, crispiore, diversissime colorato.

var. α) brunneo aut ferrugineo-rufa, supra nigro-intermixta, auriculis extus nigris.

Phalangista felina. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 76. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 294. — Schinz synops. mammal. I. S. 528. — Ph. fuliginosa Ogilb. Wagn. a. a. O. S. 77. — Waterh. l. c. p. 288. — Gould mamm. of Austral. part 2.

var. β) rufo-cinerea aut dilute cinerea.

Ph. fuliginosa var. Waterh. und Gould a. a. O. — Ph. Cuvieri Gray. Waterh. l. c. p. 293; natural. librar. XI. p. 268.

var. γ) tota albido-lutea.

Ph. fuliginosa var. Waterh. l. c. p. 290.

Waterhouse vereinigt dieſe Art, welche ausſchließlich Vandiemensland bewohnt, mit der neuholländiſchen Ph. vulpina, während Gould auf ſeine zahlreichen Beobachtungen ſich beruft, um die feſtländiſchen Thiere von den Inſelbewohnern ſpecifiſch zu trennen.

Zuvörderſt habe ich zu bemerken, daß jetzt, wo von Waterhouſe und Gould richtigere Beſchreibungen von der Ph. fuliginosa vorliegen als ſie Ogilby gab, die völlige Identität der mit dem Namen Ph. felina und fuliginosa bezeichneten Thiere erwieſen iſt. Dieß iſt die gewöhnliche Färbung, die nur dahin abändert, daß bald der ſchwarze Ton überwiegt, bald das Roth mehr Braun oder Falb oder Grau aufnimmt. Der Körper mißt 21 bis 22″, der Schwanz 13 bis 14″.

An zahlreichen Exemplaren aus Vandiemensland hat Waterhouſe folgende Reihe von Farbenänderungen wahrgenommen. Ein Exemplar war von einem lichtgrauen Tone vollkommen wie bei Ph. vulpina, doch waren die Haare der Leibesſeiten blaß roſtfarbig, aber mit weißem Ringe vor der ſchwarzen Spitze, weshalb die rothe Färbung bei richtiger Lage der Haare wenig ſichtlich war. Bei andern Exemplaren war der rothe Ton lebhafter und an den Seiten ſehr auffallend und ſelbſt am Rücken ſichtlich. Andere hielten die Mitte zwiſchen den tief ſchwärzlichbraunen Individuen und den grauen [1]). Dabei macht Waterhouſe bemerklich, daß

1) Zu den grauen Abänderungen zählt jetzt auch Waterhouſe das Exemplar, auf welches Gray ſeine Phalangista Cuvieri begründet hatte.

obwohl ein rother Anflug an den Leibesseiten bei den Exemplaren von Neu-Südwallis nicht gewöhnlich ist, er doch mitunter vorkommt, und daß bei einigen südaustralischen Individuen die Oberseite einen sehr deutlichen rothgrauen Ton hat. Eine sehr seltne Abänderung zeigte ein Exemplar, das einfarbig gelblichweiß war, wobei jedoch die Wangen und die Unterseite von einem mehr entschiedenen Gelb waren. Ein zweites kleineres Exemplar war ähnlich gefärbt. — Weil nun die fast schwarzen Exemplare von Vandiemensland zugleich mit solchen vorkommen, die eine tief rothbraune, auf dem Rücken mit Schwarz reichlich gemischte Färbung haben, so wie mit solchen von schön rothgrauer oder lichtgrauer oder selbst hellgelber Färbung und weil sie überdieß in Größe und Proportionen übereinstimmen, so schließt daraus Waterhouse, daß sie alle zugleich mit der Ph. vulpina nur eine und dieselbe Species ausmachen.

Anderer Ansicht ist, wie gesagt, Gould. Er beruft sich darauf, was auch Waterhouse zugesteht, daß die insularen Exemplare immer größer sind als die festländischen und daß jene eine große Veränderlichkeit in der Färbung zeigen, die aus dem fast Kohlschwarzen bis ins licht Graue verläuft und bei andern eine Beimischung von einem mehr oder minder lebhaften Roth aufzuweisen hat, während alle festländischen Individuen, die er zu sehen bekam, eine einförmig lichtgraue Färbung haben. Weiter macht Gould bemerklich, daß der Pelz bei den insularen Thieren dichter und krauser ist, und die Bettdecken, welche aus ihren Fellen gefertigt werden, dreimal so theuer sind als die von den festländischen Individuen bereiteten.

Es sind allerdings diese von Gould vorgebrachten Gründe nicht schlagend genug zur Begründung der specifischen Trennung zwischen Ph. felina und vulpina, da wir wissen, daß in manchen Lokalitäten die Individuen zu einer erheblicheren Größe als anderwärts gelangen; ferner daß in kälteren Gegenden, wie unser Eichhörnchen und unser Fuchs unter andern zeigt, der Pelz an Güte gewinnt und zugleich eine größere Reihe von Farbenabänderungen erlangt; indeß einstweilen, bis weitere Nachweise die Frage zur schließlichen Entscheidung bringen, wollen wir Ph. felina (Ph. fuliginosa) provisorisch von Ph. vulpina getrennt halten.

7. Ph. hypoleucus Wagn., der weißbäuchige Kusu; supra fusca, subtus albida, dorso medio caudaque nigris; pedibus albidis, anterioribus nigro-adspersis. — Tab. 22.

var. β) supra cinerea, nigro-induta, cauda apice alba.

Phalangista xanthopus Ogilb. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 77. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 294.

Von Dr. Preiß habe ich ein Exemplar erhalten, das, wie sein Schädel erweist, noch nicht erwachsen ist, und in seinem ganzen Habitus mit Ph. vulpina übereinstimmt, aber in seiner Färbung merklich abweicht. Es ist nämlich die Oberseite rußig braun, an den Seiten etwas gelbweißlich gesprenkelt; eine breite, nach hinten sich bedeutend erweiternde Binde längs der Mitte des Rückens und der ganze Schwanz sind schwarz. Die ganze Unterseite und die Innenseite der Gliedmassen nebst der Vorderseite der Hinterbeine ist weiß, mit schwachem gelblichen Anfluge. Die Füsse sind ebenfalls weißlich; die hintern etwas bräunlich überlaufen, die vordern stark mit Schwarz gemischt. Der Kopf, mit Ausnahme seiner Unterseite, ist dunkel rußbraun, das Kinn ebenfalls von letzterer Farbe; die Ohren, in Form und Behaarung mit denen von Ph. vulpina übereinstimmend, sind auf der Hinterseite dunkelbraun, gegen die Spitze und den hintern Rand weiß. Körper (etwas zu kurz ausgestopft) 10½″, Schwanz 8″, Ohren 1″ 6‴. Der Schädel unterscheidet sich von dem zweier gleichgroßer Individuen der Ph. vulpina nur dadurch, daß die Stirnbeine etwas mehr eingezogen und in der Mitte mehr vertieft sind; unten ist übrigens der kleine und oben die 2 kleinen abnormen Lückenzähne ebenfalls vorhanden. Der nähere Fundort dieses Exemplares ist nicht bezeichnet, ist aber entweder West- oder Südwest-Neuholland, da nur in diesen Gegenden Dr. Preiß seine Sammlungen zusammen gebracht hat.

Diese Ph. hypoleucos unterscheidet sich von der Ph. vulpina nur durch die dunkle Färbung der ganzen Oberseite und ich würde sie unbedenklich zu den Varietäten der letzteren zählen, wenn nicht Gould erklärt hätte, daß alle Individuen, die er von Ph. vulpina gesehen, eine lichtgraue Färbung hätten; auch Waterhouse kennt keine dunkle Abänderung von letzterer. Dagegen könnte wohl Ogilby's Ph. xanthopus als Varietät zu unserer Ph. hypoleucos gehören, denn die kurze

weiße Schwanzſpitze bei dem einzigen von ihr bekannten Exemplare könnte leicht, wie es öfters vorkommt, ein individuelles Farbenſpiel ſeyn. Wie Waterhouſe von jener Ph. xanthopus bemerkt, ſind die gelblichweißen Füſſe bräunlich überlaufen, die Oberſeite iſt dunkelgrau mit ſtarker ſchwarzer Beimiſchung; der Körper mißt 16″, der Schwanz 10″, die Ohren 1″ 8‴.

8. **Ph. canina** Ogilb., der kurzohrige Kuſu; **Ph. vulpinae magnitudine, supra saturate cinerea, nigro albidoque adspersa, subtus flavido-albida; auriculis abbreviatis rotundatis.**

Phalangista canina. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 78. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 78.

Bisher nur nach einem einzigen Exemplar bekannt, das der Ph. vulpina ſehr ähnlich iſt, ſich aber hauptſächlich durch ſeine kurzen abgerundeten Ohren unterſcheidet. Nach Waterhouſe mißt der Körper 22″, der Schwanz 13″ 6‴, die Ohren 1″ 2‴.

†††) cauda aut brevipilosa, subtus stria longitudinali calva, aut maximam partem nuda; auriculae breves rotundatae; pedum anteriorum digiti 2 interni a ceteris sejuncti. — Pseudochirus Ogilb. (Hepoona Gray).

9. **Ph. Cookii** Cuv., der weißſchwänzige Kuſu; **supra brunneo-cinerascens, subtus alba, cauda nigricante albo-terminata, auriculis extus basi albo-villosis.**

Phalangista Cookii. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 78. tab. CLV. B. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 299. tab. 12. fig. 4. (Hinterfuß), tab. 19. fig. 2. (Schädel), tab. 22. fig. 9. (Backenzahn). — Owen odontogr. p. 383. tab. 100. fig. 2. (Gebiß).

Ogilby und Gray hatten aus den Individuen von Neuholland und denen von Vandiemensland 2 Arten gebildet und jene Ph. Cookii Ogilb., Ph. Banksii Gray, dieſe Ph. viverrina Ogilb. und Ph. Cookii Gray benannt. Ich hatte beide Arten zuſammengezogen und Waterhouſe hat jetzt nach einer großen Anzahl von Exemplaren nachgewieſen, daß ich hiemit Recht gehabt habe, indem es feſtländiſche Individuen von gleicher Färbung wie die inſularen, und umgekehrt giebt. Der Körper mißt 14 bis 15″, der Schwanz 12½ bis 14″, die Ohren 11—13‴.

Die Exemplare von Neu-Südwallis ſind gewöhnlich lichtgrau, ſchwach roſtfarbig überlaufen, an den Seiten und Gliedmaſſen roſtig-ockerfarben,

auf der Unterseite weiß oder gelblichweiß. Die Rostfarbe ist bald mehr, bald weniger ausgeprägt; die Jungen sind trüber gefärbt als die Alten. Die Exemplare vom Schwanenfluß sind sehr veränderlich in der Färbung. Manche sind fast schwarz auf der Oberseite und den Füßen, während der Unterleib weiß ist; andere sind lichtgrau, theils mit lichten, theils mit braunen Füßen.

Den größten Kreis von Abänderungen bieten die Exemplare von Vandiemensland dar. Ogilby's Ph. viverrina ist rußgrau, vorn etwas weißlich, hinten bräunlich gesprenkelt, die Unterseite gelblich weiß, die Gliedmassen außen rostbraun, die Füße schwarz. Ein anderes Exemplar ist noch dunkler, der Unterleib grau, die Brust weiß mit einem breiten weißen Fleck, der sich bis zur Mitte des Bauches ausdehnt[1]). Wieder andere gleichen in der Färbung ganz denen von Neu-Südwallis.

10. Ph. canescens Wat., der braunschwänzige Kusu; supra cano-fusca, subtus albida; cauda fusca; unguibus luteis.

Phalanger grisonnant. Hombron et Jacquinot, voy. au Pole Sud, mammif. tab. 16. — Phalangista canescens. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 305.

Die Februarrevolution von 1848 hat ihre schlimmen Folgen auch auf das große Reisewerk von Dumont D'Urville[2]) ausgeübt, indem bis jetzt noch nicht der Text zu dem großen zoologischen Atlas erschienen ist. Unter den Abbildungen findet sich auch die eines Kusu, der als Phalanger grisonnant benannt ist und seinen Merkmalen nach eine eigenthümliche Art ausmacht. Der Abbildung nach ist seine Farbe trüb rostbraun, an den Seiten mit Grau untermischt. Die Unterseite ist schmutzig weißlich. Der Kopf ist an den Seiten lichtbräunlich fahlgelb, längs der Mitte der Oberseite dunkelbraun; die Ohren sind ziemlich kurz. Die Gliedmassen sind graubraun, die Nägel gelb. Der Schwanz ist einförmig trüb rostigbraun. Die Form des Schädels, der Zähne und der Füße

1) Zu dieser Abänderung gehört wohl die von Schinz in seiner Synops. mammal. I. S. 530 aufgestellte Ph. incana. 2) Voyage au Pole Sud et dans l'Océanie sur les Corvettes l'Astrolabe et la Zélée, exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837 — 1840.

ist wie bei Ph. Cookii beschaffen, doch sind an den Vorderfüßen die beiden innern Zehen mehr von den drei andern abgerückt, was auch von dem Hinterdaumen gilt. Zähne sind vorhanden: $\frac{4}{4}$ Schneidezähne, Eckzähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{7}{7}:\frac{7}{7}$. Der knöcherne Gaumen ist nicht durchbrochen. Der Körper mißt nach der Abbildung ohngefähr 8″, der Schwanz wird ziemlich von derselben Länge seyn. Die Heimath ist zur Zeit noch nicht angegeben.

11. Ph. nudicaudata Gould, der nacktschwänzige Kusu; cauda basi villosa, dein tota nuda.

Phalangista (Pseudochirus) nudicaudata. Gould ann. of nat. hist. VI. (1850) p. 139.

Nach Gould's kurzer Beschreibung sind Kopf, Oberseite und Außenseite bräunlichgrau, die Haarspitzen mit seidenartigem Ansehen; die Unterseite und die Innenseite der Beine ist blaß falblich. Beide Farben schneiden an den Leibesseiten scharf voneinander ab, und vermischen sich an den Gliedmassen, dem Steiße und der Schwanzwurzel. Der Schwanz ist an der Basis dicht behaart; auf den übrigen Dreivierteln aber ganz nackt; Hände, Füße und nackter Theil des Schwanzes sind fleischfarbig. Der Pelz ist kurz, aber außerordentlich dicht wie beim Koala, die Ohren sind ungemein kurz und gerundet. Durch den größtentheils nackten Schwanz und den kurzen dichten Pelz unterscheidet sich die neue Art sehr von andern dieser Abtheilung. Gould hat nur ein Weibchen erhalten, das erst zu $\frac{2}{3}$ erwachsen seyn soll; der Körper mißt 12″, der Schwanz 8″. Es stammt vom Kap York, der nördlichsten Spitze Neuhollands.

††††) cauda (basi excepta) pilis brevissimis adpressis vestita, apice subtus nuda, auriculae mediocres fere nudae, dentes molares veri utrinque 3. — Dromicia Gray.

Das Gebiß besteht aus $\frac{4}{4}$ Schneidezähnen, $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$ Eckzähnen, $\frac{4}{4}:\frac{4}{4}$ Lückenzähnen, $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$ ächten Backenzähnen; es ist dieß die einzige Abtheilung, bei welcher die letzteren in so geringer Anzahl vorkommen. Im Leben sind die Ohren gerunzelt und mehr oder weniger hängend.

12. Ph. gliriformis Bell, der Bilch-Kusu; Muscardino paululum major, supra cinerea, rubello-brunneo lavata, subtus flavido-alba; cauda basi valde incrassata.

Phalangista gliriformis. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 82. — Owen odontograph. p. 383. tab. 100. fig. 3. (Schädel). — Ph. nana. Desmar. mamm. p. 268. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 309. — Dromicia gliriformis. Gray, list of the mamm. p. 85. — Gould mamm. of Austral. part 1.

Zeichnet ſich ſehr aus durch den an der Wurzel dick angeſchwollenen Schwanz, der hier zugleich mit einem, dem des Körpers ähnlichen Pelze beſetzt iſt; hinter der Verdickung verſchmälert ſich der Schwanz ſchnell und iſt dann nur noch ſpärlich behaart. Die Färbung iſt veränderlich, indem die Oberſeite bald einförmig grau, bald mit ſchönem falben oder röthlichen Tone überlaufen iſt. An einem großen Exemplar, das Waterhouſe maaß, betrug der Körper etwas über 4″, der Schwanz 3″ 10‴. Letztgenannter Zoolog überzeugte ſich auch, daß das im pariſer Muſeum aufgeſtellte Exemplar von Ph. nana mit der Ph. gliriformis zuſammen gehört. — Die Heimath iſt Vandiemensland.

13. Ph. concinna Gould, der dünnſchwänzige Kuſu; Muscardino minor, supra ferrugineo-brunnea, subtus alba; cauda basi haud incrassata.

Phalangista concinna. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 314. tab. 11. fig. 2. (Thier). — Dromicia concinna. Gould proceed. 1845; mamm. of Austral. part 1.

Iſt viel kleiner als die vorige Art und der Schwanz an der Wurzel nicht verdickt. Die Oberſeite iſt gewöhnlich ſchön roſtbraun, bisweilen aber auch graulich und nur ſchwach roſtfarbig überlaufen. Die Unterſeite iſt weiß, was ſcharf von der obern Farbe abſchneidet; mitunter iſt das Weiß mit Falblich überlaufen. Vor dem Auge findet ſich ein dunkler Fleck, die Füße ſind weiß, der Schwanz iſt mit bräunlichen Härchen beſetzt. Körper 3″ 6‴, Schwanz 2″ 10‴, Ohren 6¾‴. — Heimiſch am Schwanenfluß und im ſüdlichen Neuholland.

14. Ph. Neillii Wat., der Zwerg-Kuſu; praecedente minor, supra cana, subtus alba.

Phalangista Neillii. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 315. tab. 19. fig. 3.

Neill bekam von dieſer, durch Waterhouſe aufgeſtellten neuen Art, ein Männchen, das er über zwei Monate lebend erhielt. Es hatte eine licht azurgraue Färbung, die über dem Rücken, den Vordergliedern

und Schenkeln zum Stahlfarbigen hinneigte; der Unterleib war rein weiß und die Vorderglieder waren auch weiß geſäumt. Vor den Augen findet ſich ein dunkler Fleck. Die Nägel ragen nicht über die Zehenballen vor. Körper 2″ 3‴, Schwanz 2″ 7‴, Ohren 5‴. Von König Georgs-Sund.

XI. PETAURUS. Flugbeutler.

Pedes posteriores pollice distincto praediti, cauda elongata villosa laxa, patagium inter artus expansum.

Weder auf den molukkiſchen Inſeln, noch auf Vandiemensland gefunden.

†) auriculae breves rotundatae extus villosae, cauda undique villosa, patagium tantum ad olecranon productum. — Petaurista Wat.

1. P. taguanoides Geoffr., der große Flugbeutler; **maximus, fusco- aut cano-niger, subtus albidus.**

Petaurus taguanoides. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 86. tab. CXLIV. B. — Waterh. natur. librar. XI. p. 283. tab. 27; nat. hist. of mamm. I. p. 322. tab. 19. fig. 4. (Schädel). — Owen odontogr. p. 385. — P. Peronii. Wagn. a. a. O. S. 87.

Der Körper mißt 20″, der Schwanz 22″, die Ohren 1″ 4‴. Bewohnt Neu-Südwallis. — Waterhouſe zeigte, daß P. Peronii nur ein Junges von dieſer Art iſt [1]).

††) auriculae elongatae nudiusculae, cauda undique villosa, patagium usque ad digitum exteriorem productum — Belideus Waterh.

2. P. flaviventer Desm., der gelbbäuchige Flugbeutler; **cano aut fulvido-fuscus, subtus flavescens; dorso, artubus caudaque apice nigris.**

Petaurus flaviventer. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 89. — Gould mamm. of Austral. part 1. — Owen odontograph. p. 385. tab. 100. fig. 4. (Schädel). — Petaurus australis. Shaw naturalist's misc. tab. 60. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 327. — P. macrurus. Wagn. a. a. O. S. 86.

Die Färbung iſt gewöhnlich graulich, aber ſtark mit Bräunlichgelb

---

1) Die Angabe von Waterhouſe (S. 319), daß bei P. taguanoides $\frac{1}{1}$ funktionirende, eine fortlaufende Reihe bildende Backenzähne jederſeits vorhanden ſind, beruht auf einem Schreibfehler; es ſind ihrer nur $\frac{1}{1}$.

überlaufen. Der Kopf und die Ohren fallen meiſt ins Rußſchwarze; von derſelben Farbe iſt der Mittelrücken, die Flughaut und die vordere Schwanzhälfte; die Gliedmaſſen und der hintere Theil des Schwanzes ſind ſchwarz. Die Unterſeite und der Rand der Flughaut iſt gelb. Bisweilen fällt die Oberſeite mehr ins Bräunlichſchwarze oder ins Falbbraune. Körper 14″, Schwanz 18 bis 19″, Ohren 1″ 9‴. Bewohnt Neu-Südwallis. — Nach Waterhouſe's Vermuthung iſt der P. macrurus (Didelphys macrura Shaw) wohl nur als Junges von dieſer Art zu betrachten.

3. P. sciureus Shaw, der buſchſchwänzige Flugbeutler; supra cinerascens, subtus albus, taenia fusca longitudinali a rostro ad tergum decurrente, cauda crassa villosissima.

Petaurus sciureus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 89. tab. CXLIV. C. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 331. — Belideus sciureus. Gould mamm. of Austral. part 1.

Der Körper mißt 8½ bis 9″, der Schwanz 8½ bis 10″, die Ohren 9½ bis 11‴. Ungemein häufig in ganz Neu-Südwallis; dagegen hat die Angabe ſeines Vorkommens auf der Norfolk-Inſel keine neuere Beſtätigung erlangt.

4. P. breviceps Wat., der kurzköpfige Flugbeutler; praecedente minor, capite breviore, cauda minus incrassata, cylindrica.

Petaurus breviceps. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 90. — Waterh. natur. librar. XI. p. 290. tab. 29; nat. hist. of mamm. I. p. 334. — Gould mamm. of Austral. part 2.

Der Schwanz iſt nur mäßig buſchig und cylindriſch, von Farbe grau, an der Spitze ſchwarz. Die Oberſeite des Körpers iſt ſchön aſchgrau mit einem ſchwärzlichbraunen Längsſtreif, der von der Stirne über die Mittellinie des Rückens verläuft, aber in der Kreuzgegend verſchwindet. Die Unterſeite iſt weiß, graulichweiß oder graufalblich. Die Flughaut iſt oben ſchwarz mit weißem Rande und dieſe weiße Färbung ſetzt ſich am hintern Theil der Vorderglieder bis zur Spitze des kleinen Fingers fort. Körper 6″ 6‴, Schwanz 7″, Ohren 9‴. Bewohnt ebenfalls Neu-Südwallis.

5. P. Ariel Gould, der blaßgraue Flugbeutler; praecedenti simillimus at paululum minor, supra pallidior, subtus flavidus.

Petaurus Ariel. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 336. — Belideus Ariel. Gould proceed. X. p. 11; mamm. of Austral. part 2.

Gould unterſcheidet dieſe Art von P. breviceps dadurch, daß ſie an Größe dem letztern ebenſo nachſteht als dieſer dem P. sciureus, daß der Schwanz vielmehr cylindriſch und kürzer behaart iſt, daß die Oberſeite lichter und zarter falblichgrau und die Unterſeite entweder blaßgelb oder ſchön gelblichfalb iſt. Waterhouſe hält dieſe Differenzen nicht für ausreichend zur ſpecifiſchen Scheidung beider Arten, und ich möchte ſie ebenfalls mehr für eine Lokalvarietät halten, die im nördlichen Neuholland (Port Eſſington), wo ſie bisher allein gefunden wurde, den ſüdöſtlichen P. breviceps vertritt. Ebenſo halte ich es mit Waterhouſe für wahrſcheinlich, daß der von S. Müller als Bewohner von Neuguinea aufgezählte P. sciureus nicht dieſer Art, ſondern P. Ariel zugehört, deſſen Wohnort dem des neuguineiſchen Flugbeutlers zunächſt liegt. Von einem Exemplare des P. Ariel giebt Waterhouſe folgende Maaße an: Körper 6″, Schwanz 7″, Ohren 8‴, von der Naſenſpitze zum Ohr 1″ 3½‴.

†††) auriculae mediocres extus pilosae, cauda depressa disticha, dentes molares veri 3. — Acrobates Desm.

6. P. pygmaeus Shaw, der Zwerg-Flugbeutler; supra cano aut fulvido-brunneus, subtus albus aut flavido-albus.

Petaurus pygmaeus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 91. tab. CXLIV. A. — Waterh. natur. libr. XI. p. 293. tab. 30; nat. hist. of mamm. I. p. 339. tab. 19. fig. 5. (Schädel), fig. 5. a. (Gebiß). — Owen odontogr. p. 386. tab. 100. fig. 5. (Schädel). — Acrobates pygmaeus. Gould mamm. of Austral. part 2.

Ungemein häufig in Neu-Südwallis, wo dieſe kleine nette Art die Höhlen der großen Gummibäume bewohnt, aber wie alle Kletterbeutler nur zur Nachtzeit zum Vorſchein kommt. Der Körper mißt 3″ 6‴, der Schwanz 2″ 10‴, die Ohren 3½‴.

XII. PHASCOLARCTOS. Koala.

Pedes posteriores pollice distincto praediti, cauda nulla.

Zur Zeit, wo ich meine erſte Beſchreibung dieſer Gattung verfaßte, mangelte mir die Vorlage eines ausgeſtopften Individuums, und was ich in der Literatur über dieſelbe vorfand, war ſo wenig klar und beſtimmt, daß ich nicht einmal die Schilderung des äußern Habitus in einigen

Stücken evident feststellen, geschweige denn die Frage, ob man 1 oder 2 Arten zu unterscheiden hätte, in Erledigung bringen konnte. Diese Zweifel sind jetzt beseitigt; nicht nur hat Waterhouse eine genaue Beschreibung des Koalas geliefert, sondern unsere Sammlung besitzt jetzt auch ein erwachsenes Exemplar nebst dem Schädel, und in Berlin habe ich Gelegenheit gehabt 2 andere Individuen zu vergleichen.

Der Körper ist plump und robust. Der Kopf dick, aber mit kurzer stumpfer Schnautze; die Ohren sind mäßig groß und langflockig behaart, die Nasenkuppe kahl. Die Vorder- wie die Hinterfüße sind fünfzehig und alle Zehen (mit Ausnahme des Hinterdaumens) mit langen, hohen, stark zusammengedrückten sichelförmigen Krallen bewaffnet. An den Vorderfüßen sind die erste und zweite Zehe kürzer als die 3 andern und zugleich diesen letztern etwas entgegensetzbar. An den Hinterfüßen ist die innere Zehe lang, sehr breit, nagellos und als ein wahrer Daumen den andern Zehen entgegenstellbar; die beiden darauf folgenden und vereinigten Zehen sind kürzer als die beiden äußern. Der Schwanz ist kaum durch ein Rudiment angedeutet. Der Pelz ist etwas wollig und fühlt sich ziemlich weich an. Das Gebiß des mir vorliegenden Schädels zeigt (in Uebereinstimmung mit den bisher hierüber gegebenen Beschreibungen) $\frac{4}{4}$ Schneidezähne, $\frac{1-1}{0-0}$ Eckzähne, $\frac{1-1}{1-1}$ Lückenzähne und $\frac{4-4}{4-4}$ ächte Backenzähne = 30 Zähne; ihre Beschaffenheit ist schon früher von mir mitgetheilt worden.

Der Schädel ist, wie das Gebiß, im Allgemeinen ähnlich dem der großen Phalangisten, namentlich der Phalangista ursina, aber er unterscheidet sich schon gleich durch die kürzeren und viel breiteren Nasenbeine, ferner sind die Gaumenlöcher beträchtlich kleiner, die Paukenknochen ansehnlich größer, der Unterkiefer höher, dagegen sein Winkelfortsatz nur wenig einwärts gewendet.

Diese Gattung begreift blos eine einzige Art, die gleich den andern Phalangisten Bäume bewohnt; von ihrer Lebensweise hat schon Paterson eine sehr genaue, von uns früher bereits mitgetheilte Schilderung gegeben.

1. Ph. fuscus Desm., der Koala; cano-fuscus, subtus albidus.

Phascolarctos fuscus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 94. — Owen

cyclop. of anat. III. p. 265. fig. 95. (Schädel); odontogr. p. 387. tab. 100. fig. 6. (Gebiß). — Ph. cinereus. Wagn. a. a. O. S. 95. tab. CLV. A. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 259. tab. 9. fig. 2. (Thier), tab. 20. fig. 5. (Schädel). — Schinz synops. mammal. I. S. 537.

Die frühere Unterscheidung in 2 Arten beruhte auf ganz unwesentlichen Farbenabänderungen, weshalb es jetzt, nach genauerer Bekanntwerdung mit diesen Thieren, nothwendig ist sie wieder zu vereinigen.

Die Färbung unseres Exemplares ist rostigbraun mit lichteren Haarspitzen, die auf den Gliedmassen, zumal den untern, sich weiter ausdehnen und ins Weißliche fallen; die Kreuzgegend ist schmutzig gelblichweiß. Die vordere Hälfte der Unterseite des Körpers nebst der Innenseite der Vorderbeine ist weiß; die hintere Hälfte der Unterseite des Leibes ist blaß roströthlich, die Innenseite der Hinterbeine trüb rostroth. Der Kopf ist rostigbraun mit kurzen lichteren Haarspitzen; der Pelzbesatz der Ohren ist auf der Außenseite braun bis ins Schwarze ziehend, auf der Innenseite schmutzig weißlich. Die Füße sind auf der Oberseite von letzterer Farbe, aber ihre Haare sind am Grunde schwarz. — Bei dem einen Exemplare in Berlin ist die Oberseite ziemlich einfarbig rostbräunlich, bei dem andern mit weißlichen Haarspitzen. Die Unterseite und die Innenseite der Beine ist gelblichweiß, auch die Hinterbacken [1]).

Von den nachstehenden Dimensionen ist N. I. nach dem hiesigen, N. II. nach einem der Berliner Exemplare bestimmt, N. III. ist von Waterhouse gemessen.

	I.	II.	III.
Länge des Körpers nach der Rückenkrümmung	26″ 6‴	27″ 0‴	29″ 0‴
— des Ohrs	2 0	2 1	2 0

Der Koala bewohnt nach Gould's Angabe die Gegend von der Moretonbay bis zum Phillip's Hafen in Neu-Südwallis.

b) pedes posteriores 4-dactyli.

---

1) Waterhouse bezeichnet die Färbung als aschgrau, mit Braun etwas überlaufen, indem die Haare unter der weißlichen Spitze braun sind. Der Unterrücken ist schmutzig gelblichweiß; die ganze Unterseite nebst der Innenseite der Hinterbeine bräunlich rostfarben. — Im Ganzen ist also die Farbenänderung des Koala ziemlich beschränkt.

XIII. DENDROLAGUS. Schleppbeutler.

Pedes posteriores pollice nullo praediti, cauda longa villosa laxa.

Die Gattung Dendrolagus ist von Schlegel und S. Müller aufgestellt worden und begreift 2 Arten in sich, die Neuguinea angehören.

Der Kopf ist ziemlich stark, die Schnautze nicht sonderlich verlängert, abgestumpft und nur mit kurzen feinen Härchen besetzt; die Ohren sind ziemlich kurz und stumpf zugespitzt. Die vordern Gliedmassen sind kräftig und nicht viel kürzer als die hintern, jene fünfzehig, diese nur vierzehig, indem ihnen die Daumenzehe ganz abgeht: die Krallen sind kräftig und sichelförmig. Die Füße sind überhaupt, mit Ausnahme des fehlenden Hinterdaumens, nach dem Typus der größeren Arten von Phalangista geformt, nur sind die Hinterfüße etwas mehr gestreckt. Der Beutel der Weibchen ist von der gewöhnlichen Beschaffenheit. Die Behaarung ist lang und starr; der Schwanz lang, stark behaart und schlaff.

Das Gebiß zählt $\frac{4}{4}$ Schneidezähne, $\frac{1-1}{0-0}$ Eckzähne [1]), $\frac{1-1}{1-1}$ Lückenzähne und $\frac{4-4}{4-4}$ ächte Backenzähne = 30 Zähne. Die obern Schneidezähne stehen mit ihren Schneiden ziemlich auf gleicher Linie und der hintere ist etwas kleiner als der mittlere. Die beiden obern Eckzähne sind nur kleine Stümpfchen. Im Ober- wie im Unterkiefer stehen jederseits 5 Backenzähne in einer Reihe, von denen die hinteren 4 die ächten vierhöckerigen Backenzähne sind, der vorderste der Lückenzahn ist; die kleineren abnormen Lückenzähne fehlen ganz. Im Oberkiefer ist der Lückenzahn, als Milchzahn, beinahe so groß als der neben ihm stehende Backenzahn; dagegen ist sein Ersatzzahn fast nochmals so groß als der erste Backenzahn.

Die Wirbelsäule zählt 7 Halsw., 13 Rückenw., 6 Lendenw., 2 Kreuzw.; Schwanzw. sind bei D. ursinus 24 und bei D. 27 vorhanden, doch scheinen die letzten verloren gegangen zu seyn, so daß man für jenen wird 27, für letztern 29—30 annehmen dürfen.

---

1) Schlegel und Müller geben in ihrer Zahnformel auch untere Eckzähne an; da jedoch in ihren Abbildungen keine Spur davon zu sehen ist, auch Owen, der doch den Schädel von Dendrolagus ursinus zur Vergleichung vor sich hatte, dieselben nicht aufführt, so muß jene Angabe auf einem Schreib- oder Druckfehler beruhen.

Sowohl Schlegel und S. Müller, als auch Waterhouse und Owen haben die Schlappbeutler der Familie der Macropoden eingereiht und sie in nächste Verbindung mit den Potoruhs (Hypsiprymnus) gebracht, ja Letzterer hat sie sogar dieser Gattung zugezählt. Mir kommt diese Zusammenstellung sehr befremdlich vor, da sich nur wenige Punkte der Uebereinstimmung, dagegen viele der Verschiedenartigkeit aufzählen lassen, wie Letzteres auch Schlegel und Müller selbst gezeigt und in ihren schönen Abbildungen zur Anschauung gebracht haben.

Die genannten Zoologen berufen sich zur Rechtfertigung der Stellung, die sie den Schlappbeutlern im Systeme angewiesen haben, auf die Uebereinstimmung des Schädelbaues und Gebisses mit dem der Springer und insbesondere der Potoruhs. Was diese beiden Punkte anbelangt, so ist zuvörderst bemerklich zu machen, daß bei der Familie der Kletterer und der Springer Schädel und Gebiß nach einem gemeinsamen Typus construirt sind, der zwar je nach den Gattungen Modificationen erleidet, aber doch nicht von solchem Belange, daß man darnach beide Familien von einander trennen könnte. Es zeigt demnach der Schädel der Schlappbeutler allerdings eine nahe Verwandtschaft mit dem der Springer, aber fast nicht minder mit dem der Phalangisten.

Die obern Schneidezähne kann man wohl in Vergleichung bringen mit denen der Potoruhs, aber der vorderste ist nicht so verlängert wie bei letzteren und der hinterste ist nicht, wie bei diesen, breiter, sondern schmäler als der mittlere; die nächste Verwandtschaft bezüglich dieser Zähne besteht mit Phalangista vulpina. Auch der Eckzahn ist kleiner als bei den Potoruhs. Die Zahl der Zähne und ihre Vertheilung ist bei Dendrolagus allerdings dieselbe wie bei Hypsiprymnus und demnach abweichend von der der großen Arten der Phalangisten; man hat aber hiebei übersehen, daß für den Koala die gleiche Zahnformel wie für den Schlappbeutler gilt. Die einzige Uebereinstimmung im Gebisse, die letzterer nicht mit einem der Kletterer, sondern nur mit den Potoruhs theilt, besteht darin, daß der bleibende Lückenzahn im Ober- wie im Unterkiefer viel größer als irgend einer der ächten Backenzähne ist.

Vergleichen wir nun die Beschaffenheit der Gliedmassen des Schlappbeutlers mit der der Springer, so finden wir zwischen beiden nur die

einzige Uebereinstimmung, daß beiden die Daumenzehe an den Hinterfüßen abgeht; indeß gerade diese Zehe ist es, die sogar in einer und derselben Gattung bei der einen Art vorkommen und bei einer andern fehlen kann und auf die man daher keinen solchen Werth legen darf, um darnach sonst nahe verwandte Formen in zwei Familien zu vertheilen.

Dagegen sind in allen andern Hauptstücken die Gliedmassen des Schlappbeutlers gänzlich von denen der Springer verschieden und in eben diesen Stücken vollkommen mit denen der Kletterer übereinstimmend. Dieß giebt sich schon gleich in der Beschaffenheit der Krallen zu erkennen, welche sämmtlich an den Vorder- wie an den Hinterfüßen von sichelförmiger Gestalt sind, während an letzteren bei den Springern die Nägel der beiden äußern Zehen unten platt und fast hufartig gebildet sind. Dazu kommt nun weiter, daß die vordern Gliedmassen nicht, wie bei letzteren verkürzt, sondern fast von gleicher Länge und Stärke wie die hintern sind, d. h. von denselben Verhältnissen wie bei den Kletterern. Endlich sind die Proportionen des Mittelfußes und der Zehen der Hinterfüße nicht denen der Springer, sondern der Kletterer entsprechend. Mit Ausnahme des Mangels des Hinterdaumens sind demnach die Gliedmassen in allen wesentlichen Stücken von denen der Springer ganz und gar verschieden, in allen diesen aber vollkommen mit denen der Kletterer in Uebereinstimmung. Die Schlappbeutler dürfen daher nicht der Familie der Macropoden zugetheilt werden, sondern gehören der der Kletterer an und vermitteln den Uebergang von diesen zu jener Gruppe.

Der oben geschilderten Beschaffenheit der Gliedmassen gemäß sind die Schlappbeutler nicht zum Laufen und Springen auf dem Boden, sondern zum Klettern auf den Bäumen bestimmt. Sie sind bisher nur auf Neuguinea und zwar zuerst durch S. Müller gefunden worden, wo sie die Gipfel hoher Bäume bewohnen und nach Art der Eichhörnchen klettern. Diejenigen, welche ebengenannter Naturforscher in der Gefangenschaft hielt, zeigten sich sanft und zutraulich und wurden mit Baumblättern Gras, gekochtem Reise und allerlei Früchten gefüttert. Beim Fressen setzten sie sich aufrecht und brachten ihr Futter mit einer der Vorderpfoten zum Munde. Der Schwanz hängt immer abwärts und leistet ihnen nur dann, wie bei vielen langschwänzigen Affen, wesentliche Dienste,

wenn sie über dünne biegsame Zweige hinlaufen oder von dem einen zum andern springen wollen, wobei sie sich seiner wie einer Art Balancierstange bedienen. Nach S. Müllers Beobachtungen sind die Schlappbeutler Tagthiere und weichen in dieser Beziehung von den Kusus ab.

1. D. ursinus Schleg. Müll., der Wangurie; supra fusco-niger, subtus capiteque flavido-brunneus; cauda nigra versus apicem sensim attenuata. — Tab. 23.

Dendrolagus ursinus. Schleg. Müll. verhandel. over de Nederl. overzeesche bezitt. Land-en Volkenk. p. 29; zoolog. I. p. 141. tab. 19. (Thier), tab. 22 fig. 1. (Kopf), tab. 23. fig. 1 — 3 (Schädel), tab. 24. fig. 1 — 3. (Schädel und Knochen der hintern Gliedmassen). — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 134. — Gould Macropod. part 2. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 185. tab. 1. — Hombron et Jacquin. voy. au Pole Sud, mammif. tab. 18.

Die Beschreibung von Schlegel und S. Müller beruht auf den 4 Exemplaren, welche letzterer mitbrachte; Waterhouse hat die seinige nach einem weiblichen Exemplare des brittischen Museums entworfen.

Die Größe ist die des Hasen. Der Pelz ist rauh, glänzend und lang, indem die Haare auf dem Rücken 1½ Zoll messen; die Haare sind alle von einerlei Sorte. Auf dem Vorderkopf und der Unterseite des Körpers sind sie kürzer und weicher. Am Anfang des Rückens findet sich ein Haarwirbel, von dem die Haare nach allen Seiten ausstrahlen, wodurch es geschieht, daß die nach vorn verlaufenden Haare des Hinterhalses mit den nach hinten gerichteten des Kopfes zwischen den Ohren zusammenstoßen und hier einen Querkamm bilden. Die Ohren sind dicht mit langen Haaren besetzt. Der Schwanz ist sehr lang, dicht mit mäßig langen Haaren bekleidet und verdünnt sich allmählig gegen die Spitze. Die Hauptfarbe bezeichnen Schlegel und Müller als ein bräunliches, ins Purpurrothe ziehendes, glänzendes Schwarz; der Kopf, die Unterseite und die Innenseite der Füße sind fahl lichtbraun, mehr oder minder ins Rostfarbige ziehend. Die Haare des obern und untern Randes von der Innenseite der Ohren sind rothbraun und auch die Haare auf der Oberseite der Schwanzwurzel haben einen rostbraunen Ton. Die Iris ist graulichbraun, die Nasenkuppe und die Fußsohlen sind rostigschwarz.

Körper	23″	10″	Mittelkralle des Vorderfußes in gerader Linie	1″	1‴
Schwanz	26	4			
Ohren	1	6	Vorletzte Kralle des Hinterfußes	1	½
Von der Nase zum Auge .	1	11	Letzte Kralle	0	10½

Zur Vergleichung der relativen Verhältnisse der Gliedmassen der beiden Arten von Dendrolagus mit denen von Dorcopsis Brunii wollen wir aus Schlegel's und Müller's Tabelle nachstehende Maaße vorlegen.

	Dendrolagus		Dorcopsis.
	ursinus	inustus	
Oberarmbein	0m,093	0m,088	0m,114
Ellenbogen	103	103	151
Oberschenkelbein	123	123	175
Schienbein	113	126	228
Die 3 Knochen der vordern Mittelzehe ohne Nagelglied	045	049	039
Die 3 Knochen der vorletzten hintern Zehe, ohne Nagelglied	068	077	103

Von Neuguinea, wo diese Thiere von den Papuas im Distrikte Lobo mit dem Namen Wangurie bezeichnet werden.

2. D. inustus Schleg. Müll., der Wakera; supra fuscus, albido-penicillatus, subtus sordide albido-lutescens; cauda cylindrica pallide lutescente.

Dendrolagus inustus. **Schleg. Müll.** verhandel. Land-en Volkenk. p. 29; Zoolog. I. p. 143. tab. 20. (Thier), tab. 22. fig. 2. (Kopf), tab. 23. fig. 4 — 6. (Schädel), tab. 24. fig. 4 — 6. (Schädel und Knochen der hintern Gliedmassen). — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 134. — **Gould** Macropod. part 2. — **Waterh.** nat. hist. of mamm. I. p. 188.

Ebenfalls eine Entdeckung von S. Müller, der auf Neuguinea ein lebendes altes Weibchen von dieser Art erhielt. Nach einem Weibchen des pariser Museums hat Waterhouse seine Beschreibung angefertigt.

Diese Art ist etwas größer als die vorige, ihr Pelz ist etwas weniger rauh, die Schnauze und die Hinterfüße sind gestreckter, der Schwanz länger und cylindrisch, die Ohren kürzer behaart, der Haarwirbel ist nicht so deutlich, aber die hinterwärts gerichteten Haare des Kopfes stoßen mit den vorwärts gerichteten des Hinterhalses zwischen den Ohren ebenfalls zusammen. Die Färbung der Haare ist, nach Schlegel und Müller, von der Wurzel bis über die Mitte schwärzlich und wird an den Spitzen

schmutzig gelblichweiß. Auf den Füßen und vor Allen auf der Unterseite des Körpers gewinnt diese lichte Farbe die Oberhand, während sie auf dem Scheitel ins Bräunliche übergeht. Der Schwanz, dessen Haare an der Wurzel dunkelbraun sind, ist etwas blasser als alle übrigen Theile des Körpers [1]). Die Iris ist braun. Die ganze Länge giebt S. Müller zu 1m., 355 an, wovon der Schwanz 0m., 715 wegnimmt. Bei Waterhouse finden sich folgende Aufzeichnungen.

Körper	27″	0‴	Vorderarm und Hand ohne Nägel	6″	8‴
Schwanz	25	0	Nagel des Mittelfingers . . .	1	6
Ohr	1	6	Tarsus ohne Nägel	4	7
Von der Nase zum Ohr .	4	2	Nagel der Centralzehe	1	1

Die Papuas in dem Distrikt Lobo auf Neuguinea nennen dieses Thier Wakera; nach ihren Angaben hat es gleichen Aufenthalt und Lebensweise wie der Wangurie.

VI. Familie.

Macropoda. Springer.

Artus posteriores anterioribus minutis multo longiores, 4-dactyli, digitis secundo et tertio coadunatis, unguibus 2 exterioribus robustis subungulatis rectis; cauda longa, intestinum coecum longissimum.

Bei Abfassung meiner früheren Monographie der Beutelthiere war ich bei keiner Familie in solcher Verlegenheit als bei dieser, und keine andere war einer Nachhülfe bedürftiger als eben dieselbe [2]). Eine nicht geringe Anzahl Arten waren mit Namen bezeichnet, aber die Beschreibungen der großen Mehrzahl so fragmentarisch und ungenau, daß sie nicht wieder zu

---

1) Nach der Beschreibung von Waterhouse ist die Oberseite braun mit Bräunlichweiß gesprenkelt, indem die bräunlichschwarzen Haare in hellbraune, ins Weiße fallende Spitzen endigen. Die Unterseite ist weiß, indem deren blaßbraune Haare weißliche Spitzen haben. Die Vorderarme und Hinterglieder sind bräunlichweiß, die Füsse dunkelbraun, aber an den hintern Theilen weißlich gesprenkelt. Der Schwanz ist mit theils braunweißen, theils blaßgrauen Haaren besetzt, und im Allgemeinen blasser als der Leib. 2) Hierüber habe ich mich schon früher zu meiner Rechtfertigung ausgesprochen in Wiegm. Archiv. 1846. 2. S. 152.

erkennen waren. Diesem großen Gebrechen hat nun Waterhouse in seiner ausgezeichneten Bearbeitung der Beutelthiere gründlich abgeholfen, indem er die Exemplare, auf welche Ogilby und Gray die neuen Arten begründeten und in höchst dürftigen Notizen zur Publikation brachten, sorgfältig mit einander verglich, das reiche von Gould angesammelte Material hiemit in Verbindung brachte und die pariser Sammlung in Vergleichung zog. Indem er ferner noch die Beschaffenheit des Schädels und Gebisses in genaueste Rücksicht nahm, gelang es ihm das Chaos der Nominalarten zu entwirren und auf das rechte Maaß zurückzuführen. Nächst ihm hat Gould das meiste Verdienst, indem er nicht blos eine reiche Sammlung aus Australien zurückbrachte, sondern noch fortwährend beschäftigt ist, alle Arten in herrlichen Abbildungen vorzulegen [1]). Von den vielen Gattungen, in welche diese Familie zersplittert wurde, können wir mit Waterhouse nur die beiden älteren, Hypsiprymnus und Halmaturus, als solche anerkennen und selbst diese zeigen so manche Uebergänge, daß blos die große Anzahl von Arten ihre Trennung, zur Erleichterung der Erkennung derselben, rechtfertigen kann.

XIV. HYPSIPRYMNUS. Beutelhase.

Dentium primorum superiorum anterior caeteris longior, canini superiores distincti, ungues solidi.

Die eigenthümlichen Merkmale, durch welche sich die Beutelhasen (Potorus) von den Känguruhs unterscheiden, sind folgende. Der vorderste obere Schneidezahn ist beträchtlich länger als die andern, die obern Eckzähne sind immer vorhanden und deutlich, der erste Backenzahn (Lückenzahn) viel größer als die folgenden, schneidend und beiderseits mehrmals gefurcht, die ächten Backenzähne nach hinten an Größe allmählig abnehmend, wovon nur Dorcopsis eine Ausnahme macht. Die Paukenknochen sind sehr groß und aufgeblasen, was, wie Waterhouse bemerklich macht, unter den Känguruhs nur bei Lagorchestes leporoides und con-

1) Lediglich dieser Familie bestimmt ist Gould's Monograph of the Macropodidae. 2 Lieferungen 1841, 1842. — Außerdem kommt sie in Berücksichtigung in seinem Werke: The Mammals of Australia, seit 1845, bis jetzt 4 Hefte.

spicillatus der Fall iſt[1]). Von äußern Merkmalen iſt hervorzuheben, daß die Zehen der Vorderfüſſe in zwei Stücken von denen der Känguruhs abweichen. Es ſind nämlich die 3 Mittelzehen verhältnißmäßig länger und die beiden ſeitlichen kürzer als bei den Känguruhs, ferner ſind die Nägel, welche bei letzteren unten am breiteſten und ausgehöhlt ſind, bei den Beutelhaſen mehr zuſammengedrückt, ſolid und oben am breiteſten. Die Größe dieſer Thiere überſteigt nicht die des Haſen. Bei den meiſten, wenn nicht bei allen Arten der Abtheilung Bettongia iſt der Schwanz etwas rollbar, doch nur inſoweit, daß er fähig iſt, den zum Neſtbau zuſammengerafften Grashaufen zu umfaſſen. Sie finden ſich blos in Neuholland und Vandiemenslaud; nur eine Art gehört Neuguinea an.

†) cauda supra longius pilosa, apice subpenicillata, metatarsi elongati. — Bettongia Gray.

1. H. rufescens Gray, der rothe Beutelhaſe; supra dilute rufescens, albido-interspersus, subtus albidus; auriculis extus nigris, rhinario piloso.

Bettongia rufescens. Gray Loud. mag. 1837. p. 584. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 100. (mit Ausſchluß von H. formosus). — Hypsiprymnus rufescens. Waterh. nat. hist. of mammal. I. p. 196. tab. 10. fig. 1. (Schädel). — Hypsiprymnus melanotis. Ogilb. proceed. VI. (1838) p. 100. — Wagn. a. a. O. S. 100. — Gould Macrop. part 2.

Der Kopf iſt breit, die Naſenkuppe faſt ganz mit kurzen ſammetartigen Haaren beſetzt, ſo daß nur um jedes Naſenloch ein nackter Raum bleibt. Der Pelz iſt lang und locker, mit zahlreichen Stichelhaaren, oben iſt er licht roſtroth, aber reichlich weiß geſprenkelt, unten ſchmutzig weiß. Der ſichtliche Theil der am Grunde grauen Haare iſt hauptſächlich weiß, dann folgt ein roſtrother Ring mit ſchwarzer Spitze; die kürzern Haare ſind in ihrem äußern Theile licht roſtroth. Die Haare der Unterſeite ſind etwas ſchmutzig weiß, am Grunde hellgrau. Der Kopf zeigt nur wenig Roth; die Ohren ſind innen mit weißlichen, außen mit ſchwarzen Haaren beſetzt. Die Vorderfüße mit ihren Nägeln ſind weißlich, die Hinterfüße

1) Ich muß hiebei bemerken, daß ich auch bei Lagorchestes fasciatus und Onychogalea lunata die Wangenknochen ziemlich ſtark entwickelt finde.

ſind mit glänzend braunen Haaren beſetzt. Der Schwanz iſt ziemlich behaart mit ſtarren anliegenden Haaren, die zwar gegen die Spitze merklich länger werden, ohne jedoch hier einen Kamm oder Buſch wie bei H. penicillatus und einigen andern Arten zu bilden; ſeine Farbe iſt ſchmutzigweiß und auf der Oberſeite trüb geſprenkelt. — Der Schädel iſt merkwürdig wegen ſeiner Breite, der Kürze des Geſichtstheils und des Mangels an Oeffnungen in den Gaumenbeinen, während ſie bei den andern Arten ſo weit ausgeſchnitten ſind.

Körper	20″ 0‴	Ohr	1″ 8‴
Schwanz	16 0	Hinterfuß mit Nagel . . .	5 9

Der rothe Beutelhaſe findet ſich ſehr häufig in Neu-Südwallis. Durch ſeine Größe, roſtröthliche Färbung, ſchwarze Behaarung der Außenſeite der Ohren, faſt gänzliche Behaarung der Naſenkuppe, die bei allen andern Arten mehr oder minder kahl iſt, ferner durch den breiten Schädel und den Mangel an Ausſchnitten der Gaumenbeine bildet er eine Art, die mit keiner andern zu verwechſeln iſt. Er bewohnt die nur wenig hohen ſteinigen Kuppen, zumal in den Gegenden, in welchen an Gebüſchen und Gräſern Ueberfluß iſt; ſein Neſt legt er ſich aus Gras an, gewöhnlich unter einem umgefallenen Stamm oder unter Gebüſch. Während des Tages liegt er zuſammengerollt in ſeinem Neſte, oder ruht gelegentlich an einem Lagerplatze aus, aber er nimmt ſeinen Sitz niemals in offenen Flächen. Verfolgt rennt er auf eine kurze Entfernung mit großer Behendigkeit, da er aber immer Schutz in einem liegenden hohlen Stamme ſucht, wird er leicht gefangen. Sein Futter beſteht, gleich dem anderer Arten, aus verſchiedenen Wurzeln und Gräſern.

2. H. Cuniculus Ogilb., der tasmaniſche Beutelhaſe; supra cinereo-brunneus, albido-adspersus, subtus albidus; cauda subtus brunneo-albida, supra brunnescens, versus apicem album sensim nigrescente.

Hypsiprymnus Cuniculus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 101. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 200. tab. 10. fig. 2. — Bettongia Cuniculus. Gould Macropod. part 2. — B. setosa. Gray (nec Ogilb.) Loud. mag. 1837. p. 584.

Bei dieſer, wie bei den folgenden Arten, iſt die Naſenkuppe nackt. Der Pelz iſt mäßig lang, oben graubraun mit weißer Sprenkelung, unten ſchmutzig weiß. Die Haare der Oberſeite ſind am Grunde grau, dann

mit breitem ſchmutzig roſtigweißen Ring und dunkler Spitze. Die Ohren ſind innen mit gelblichen, außen mit lichtbraunen Haaren beſetzt. Die Füße ſind bräunlich weiß. Der Schwanz iſt auf der Unterſeite braunweiß, auf der Oberſeite blaß braun, aber gegen die Spitze, wo die Haare ſich in einen buſchigen Kamm verlängern, braunſchwarz; die äußerſte Spitze iſt weiß, und wo ſie es nicht iſt, ſcheint ſie nur abgebrochen zu ſeyn.

Körper	17″ 6‴	Ohr	1″ 2‴
Schwanz	13 0?	Hinterfuß mit Nagel . .	5 0

Gehört Vandiemensland an.

3. H. Gaimardi Desm., der graubraune Beutelhaſe; supra cano-brunneus, albido-adspersus, subtus albidus, paululum flavido-lavatus; cauda subtus pallidius, supra saturatius ferruginea, versus apicem album sensim nigrescente. — Tab. 24.

Hypsiprymnus Gaimardi. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 207. — Kangurus Gaimardi. Desmar. mamm. p. 542. — H. Whitei. Quoy et Gaimard zool. de l'Uranie I. p. 62. tab. 10. — H. Philippi. Ogilb. proceed. VI. p. 62. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 100. — H. formosus. Ogilb. a. a. O. — Wagn. a. a. O. — H. minor. Cuv. règn. anim. I. p. 185.

Die in der vorſtehenden Synonymik aufgeführten Nominalarten ſind als ſolche durch Waterhouſe nachgewieſen worden. Nach ſeiner Charakteriſtik iſt der Pelz lang und weich. Die allgemeine Färbung iſt graubraun, mit Roſtgelb ſchwach überlaufen; die Unterſeite grauweiß, ſehr wenig mit Gelb überflogen. Auf der Oberſeite ſind die Haare am Grunde dunkelgrau, außen gelblichweiß mit dunkler Spitze; die eingemiſchten längeren Haare ſind an der Spitze ſchwarz und unter ihr weiß geringelt. Die Haare der Unterſeite ſind am Grunde ſehr blaßgrau. Die Ohren ſind außen mit dem Kopfe gleichfarbig behaart, innen mit gelben Haaren beſetzt. Die Ferſe und Seiten der Hinterfüße gelblich roſtfarbig. Der Schwanz iſt oben ſchön roſtfarbig, unten blaſſer. Das Enddrittel iſt oben mit längern ſchwarzbraunen Haaren beſetzt, an der Spitze ſelbſt iſt ein Büſchel weißer Haare, der indeß bisweilen an den Fellen fehlt.

	I.		II.		III.	
Länge des Körpers	13″	6‴	16″	0‴	15″	0‴
— „ Schwanzes . . .	13	0	13	0	13	0
— „ Ohrs	1	0	1	2	1	4
— „ Hinterfußes ohne Kralle	4	1	4	3	4	2

Die Maaße von N. I. sind von dem Exemplar, worauf der H. Whitei (Kangurus Gaimardi) beruht, und N. II. von Ogilby's H. Philippi entnommen; N. III. habe ich nach dem größten unserer 3 Exemplare gemessen.

Die Heimath ist Neu-Südwallis und Süd-Australien; zwei von unsern Exemplaren sind von Dr. Preiß acquirirt worden, vom dritten ist die nähere Heimath nicht bekannt. Sie stimmen nach der Beschaffenheit des Zahnbaues und Schädels und der Färbung mit der Beschreibung von Waterhouse überein. Der Schädel gehört zu den breiteren Formen und unterscheidet sich von dem zunächst verwandten des H. Cuniculus durch breitere und kürzere Nasenbeine. Da indeß dieses letztere Merkmal Schwankungen unterliegt und nach den Beschreibungen H. Cuniculus im Aeußerlichen sich nur durch etwas erheblichere Größe und lichtere Färbung von H. Gaimardi zu unterscheiden scheint, so ist es eine Frage, ob beide wirklich specifisch von einander verschieden sind. Leider hat Waterhouse es übersehen, die trennenden Merkmale scharf hervorzuheben.

4. H. Grayi Gould, der breitzähnige Beutelhase; praecedenti simillimus, at supra dentibus primoribus intermediis latioribus, haud compressis.

Hypsiprymnus Grayi. Gould proceed. VIII. p. 178. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 203. tab. 10. fig. 3. (Schädel). — H. Lesueuri. Quoy et Gaimard voy. de la Coquille.

„Pelz aschgrau und weiß gesprenkelt, oder braun mit rostig weißer Sprenkelung; Unterseite blaß gelb. Schwanz oben rostigbraun, einen dunkelbraunen Ton gegen die Spitze annehmend, welche gewöhnlich 2" lang weiß ist. Die Hinterfüße bräunlich weiß oder sehr blaß rostbraun; Kopf gewöhnlich gelb überlaufen, zumal an den Seiten. Vorderes Paar der Schneidezähne ziemlich breit, nicht zusammengedrückt."

Zu dieser Charakteristik bemerkt noch Waterhouse, daß manche Exemplare dem H. Gaimardi, andere dem H. penicillatus in der Färbung nahe kommen, daß aber schon die breitere Form des vordern Paares der obern Schneidezähne den H. Grayi von den genannten beiden Arten leicht unterscheiden lasse. Die Breite dieser Zähne an der Basis beträgt nämlich bei H. Grayi 3 bis 3 1/2‴, bei H. Gaimardi 2 1/4‴ und

bei H. penicillatus 2½‴. Der Schädel hat die nächſte Verwandſchaft mit dem des H. Gaimardi, aber er iſt bei H. Grayi breiter, die Paukenknochen ſind größer und der Raum zwiſchen den Augenhöhlen iſt ſchmäler.

Körper	18″	0‴	Ohr	1″	0‴
Schwanz	12	0	Hinterfuß	4	8

Bewohnt die weſtlichen und ſüdlichen Diſtrikte von Neuholland.

5. H. penicillatus Gray, der pinſelſchwänzige Beutelhaſe; supra cinereo-brunneus, albido-adspersus, subtus albidus parum flavido-lavatus; cauda brunnea, ferrugineo-albido adsperso, apice nigro-penicillata; capite elongato.

Hypsiprymnus penicillatus. Waterh. natur. libr. XI. p. 183; nat. hist. of mamm. I. p. 212 tab. 9. (Thier), tab. 6. fig. 3. (Schädel). — Bettongia penicillata. Gray mag. 1837 p. 584. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 100. — Gould Macropod. part 1; mamm. of Austral. part 4. — H. murinus. Ogilb. proceed. VI. p. 63. — H. setosus. Waterh. catal. of the mamm. of the zool. soc. p. 65.

var. β) supra flavido-lavatus, pedibus caudaque saturatius coloratis.

Hypsiprymnus Ogilbyi. Waterh. natur. libr. XI p. 185. — Bettongia Ogilbyi. Gould mamm. of. Austral. part 4. — B. Gouldii, Gray list of the mamm. p. 94.

Waterhouſe war anfangs auf die von Gould veranlaßte Abtrennung der im Süden und Weſten vorkommenden Individuen (H. Ogilbyi) von den öſtlichen (H. penicillatus) eingegangen; ſpäter hat er indeß erkannt, daß dieſe Trennung keinen ſichern Grund hat.

Der eigentliche, in Neu-Südwallis vorkommende H. penicillatus [1]) iſt von folgender Färbung. Die Oberſeite iſt aſchbraun, mit weißer und auf dem Rücken mit bräunlichſchwarzer Sprenkelung, die Unterſeite iſt ſchmutzig weiß, etwas gelb überlaufen; die Seiten des Kopfes und Halſes ſind ebenfalls leicht gelblich gewäſſert. Die einzelnen Haare des Rückes ſind an der Wurzel grau, und vor der bräunlichſchwarzen Spitze braunweiß. Die Ohren ſind innen mit gelben, außen hauptſächlich mit braunweißen, aber am Rande mit braungelben Haaren beſetzt. Die Vor-

1) Gray's B. penicillata, Ogilby's H. murinus und Waterhouſe's H. setosus ſind alle drei auf ein und daſſelbe Exemplar begründet.

derfüße sind bräunlichweiß, die Hinterfüße lichtbraun. Der Schwanz ist oben braun und mit rostig Weiß etwas gesprenkelt; das letzte Drittel ist oben mit längern schwarzen Haaren besetzt, welche an der Spitze am längsten sind. Die Unterseite des Schwanzes ist mit steifen anliegenden lichtbräunlichen Haaren bekleidet, die am Ende etwas dunkler werden.

Der H. Ogilbyi unterscheidet sich nur dadurch, daß die Färbung gesättigter ist. Die Oberseite hat einen deutlichen rostgelben Anflug, die Hinterfüße sind tiefer braun, der Schwanz ist oben rostfarbig und im Enddrittel sind die Haare schwarz, oben wie unten. Von diesem H. Ogilbyi habe ich zwei Exemplare von Dr. Preiß erhalten, die wie im Wohnort so auch in der Färbung zu den Angaben von Gould und Waterhouse stimmen. Die Nägel an den Hinterfüßen sind dunkler als bei H. penicillatus, an dem größeren Exemplare sogar dunkelbraun.

Sowohl durch gewisse Schwankungen in der Färbung und noch mehr durch die Identität der Schädelformen hat sich Waterhouse veranlaßt gefunden, den H. penicillatus und H. Ogilbyi in einer Art zu vereinigen, worin ich ihm vollkommen beistimme. Der Schädel ist schmächtiger und gestreckter als bei allen vorhergehenden Arten und insbesondere sind auch die Nasenbeine ziemlich schmal; das vordere Paar der obern Schneidezähne ist stark zusammengedrückt.

Bei dieser Art endigt die Schwanzspitze nicht weiß wie bei den vorhergehenden Beutelhasen, sondern ist schwarz; indeß führt doch Waterhouse ein Exemplar an, dessen Schwanzspitze mit einem kleinen weißen Busche versehen ist.

	I.		II.	
Länge des Körpers	13″	6‴	16″	0‴
— „ Schwanzes	11	3	12	0
— „ Ohres	0	10	1	0
— „ Hinterfußes mit Kralle	4	4	4	3

Die Heimath der hier beschriebenen Beutelhasen ist Neu-Südwallis, sowie der südliche und südwestliche Theil von Neuholland. Von ihnen gilt es, daß beobachtet wurde, wie sie sich ihres Schwanzes zum Ergreifen des Grases, das für ihr Nest bestimmt ist, bedienen. Das Nest legen sie in einer Vertiefung an und füttern es mit Gras aus. Ihr Fut-

ter beſteht in Gräſern und Wurzeln, welch letztere ſie ſich durch Graben verſchaffen.

††) caput latum, abbreviatum, cauda pilis brevibus, adpressis, raris vestita, metatarsi elongati. — Bettongia Auct.

6. H. campestris Gould, der falbe Beutelhaſe; supra pallide ochraceo-flavidus, nigro-adspersus; cauda supra pallida, subtus brunneo-albida.

Hypsiprymnus campestris. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 221 tab. 6 fig. 2 (Schädel). — B. campestris. Gould proceed. XI. (1843) p. 81; mamm. of Austral. part 3.

Eine ſehr ausgezeichnete Art durch ihren kurzen breiten Kopf und die blaſſe gelbe Färbung. Die Haare des Rückens ſind an der Wurzel grau, in der Mitte gelb, dann ſchwärzlich mit langem gelbweißen Ring und ſchwarzer Spitze. Auf der Unterſeite ſind die Haare am Grunde grau und außen gelblich, aber am Hinterbauch fehlt das Graue. Die Oberlippe iſt weiß, die Naſenkuppe nackt und breit; die Krallen der Vorderfüße weiß, die Hinterfüße ſehr lang und roſtig weiß, nach der Abbildung mit ſchwachen Krallen. Der Schwanz iſt mäßig lang und ſchlank, oben und an den Seiten nur ſpärlich mit kurzen blaſſen anliegenden Haaren beſetzt und die Schuppen ſind ſichtlich wie an einem Rattenſchwanze; auf der Unterſeite ſind die Haare dichter, rauher und braunweiß. Die Leibesſeiten und die Außenſeite der Hinterbeine haben einen deutlicheren gelben Anflug als andere Theile. — Der Schädel zeichnet ſich vor dem aller andern Arten aus: er iſt kurz und breit und vor Allem ſind die Naſenbeine an ihrem hintern Ende auffallend breit. Auch der vorderſte obere Schneidezahn iſt breit, dagegen der zweite ungewöhnlich klein, und daſſelbe gilt von dem Eckzahn.

Körper	15″	6‴	Ohr	1″	1‴
Schwanz	13	0	Hinterfuß mit Kralle . .	4	10

Bewohnt die ſteinigen und ſandigen, theilweiſe mit Gebüſch beſetzten Flächen der innern Gegenden des ſüdlichen Neuhollands.

†††) metatarsi breves, cauda squamosa pilis raris brevibus rigidis vestita. — Potorous Desmar. (Hypsiprymnus Gray et Gould.)

7. H. murinus Illig., der rattenſchwänzige Beutelhaſe; supra fuscus, subtus sordide albidus, cauda nigra, capite valde elongato.

Hypsiprymnus murinus [1]). Illig. prodrom. p. 79. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 224. tab. 8. fig. 3. (Schädel). — H. setosus. Ogilb. proceed. I. p. 149. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 99. — H. myosuros. Ogilb. proceed VI. p. 62. — Wagn. a. a. O. S. 99. — H. Peroni. Quoy et Gaim. zool. de l'Uranie p. 64. — Potorous murinus. Desmar. mamm. p. 271. — Macropus minor. Shaw gen. zool. I. part. 2. p. 513. tab. 116. — Poto Roo. White's journ. p. 286.

var. β) major, cauda apice alba.

Hypsiprymnus apicalis. Gould nat. hist. of Austral. part 3.

Durch Vergleichung der Original-Exemplare, auf welche Ogilby's H. setosus und myosuros beruhen, ſo wie durch Zuziehung des Schädels von White's Thiere (identiſch mit Macropus minor Shaw) und einer Abbildung des Schädels von H. Peroni iſt es Waterhouſe gelungen, die confuſe Synonymik dieſer Art ſicher feſtzuſtellen und damit mehrere Nominalarten zu beſeitigen.

Der rattenſchwänzige Beutelhaſe iſt von den vorhergehenden Arten ſehr leicht durch ſeinen ſchmalen Kopf, die kurzen Hinterfüße und den Rattenſchwanz zu unterſcheiden. Der Pelz iſt lang und locker und von einer dunklern Färbung, welche auf der Oberſeite aus der Miſchung von Schwarz und blaß Bräunlichgelb hervorgeht, indem der ſichtliche Theil der längern groben Haare ſchwarz und der der kürzern hauptſächlich blaßgelb iſt; die Unterſeite iſt ſchmutzig gelblichweiß. Alle dieſe Haare ſind am Grunde dunkelgrau. Die Ohren ſind innen ſchmutzigweiß behaart, auf der Außenſeite dem Kopfe gleichfarbig; die Naſenkuppe iſt nackt und der nackte Theil zieht ſich noch eine Strecke auf ihrer Oberſeite fort. Die Füße ſind braun. Der Schwanz iſt mit kurzen, ſteifen, ſchwarzen und nicht ſehr häufigen Haaren beſetzt, welche die ſchuppige Haut nicht ganz verdecken. — Der Schädel iſt ſehr geſtreckt und ſchmächtig, was insbeſondere von den Naſenbeinen gilt.

So ſind die Individuen aus Neu-Südwallis beſchaffen und Wa-

1) Der von mir in Schreb. Supplem. III. S. 101 bearbeitete Artikel: H. murinus muß nach den jetzigen Berichtigungen ganz kaſſirt werden.

terhouſe vereinigt mit ihnen ſpecifiſch die von Vandiemensland [1]). Letztere hat jedoch ſpäterhin Gould unter dem Namen H. apicalis von den erſteren abgeſondert, indem er ſich darauf beruft, daß die Exemplare aus Vandiemensland faſt um ein Drittel größer ſind und die Schwanzſpitze weiß iſt, was er bei Individuen von Neu-Südwallis niemals geſehen habe. Da indeß auch bei manchen andern Beutelthieren es vorkommt, daß die inſularen Individuen größer werden als die feſtländiſchen, da ferner mitunter ſelbſt bei H. penicillatus eine weiße Schwanzſpitze ſich findet, endlich Waterhouſe bei der nach einem Exemplar aus Neu-Südwallis gefertigten Beſchreibung des H. murinus ausdrücklich die Schwanzſpitze weiß nennt, ſo betrachte ich den H. apicalis nur als lokale Abänderung des erſteren.

	Neu-Südwallis.		Vandiemens-land.			
Körper	15″	6‴	13″	6‴	19″	0‴
Schwanz	9	3	9	6	9	10
Ohr	1	1	1	2	1	3
Hinterfuß mit Nagel	3	2	3	2	3	3

Dieſe Art iſt ſowohl in Neu-Südwallis als auf Vandiemensland einheimiſch und faſt allenthalben auf letztgenannter Inſel anzutreffen.

***H. Gilberti Gould, der mausſchwänzige Beutelhaſe; praecedenti simillimus, at rostro paululum latiore.**

Hypsiprymnus Gilbertii. Gould proceed. IX. p. 14; Macropod. part 1. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 229 tab. 8 fig. 1 (Schädel). — H. micropus. Waterh. natur. librar. XI p. 180.

Als charakteriſtiſche Merkmale hebt Waterhouſe folgende hervor: „Pelz lang, locker und ziemlich rauh; Hauptfarbe dunkel graulichbraun, Oberſeite ſchwarz und roſtigweiß oder gelblichweiß geſprenkelt, Unterſeite ſchmutzig weiß; Füße braun; Schädel mit breitem Geſichtstheil, indem die Außenſeite der Oberkiefer ſehr convex iſt.“ Bewohnt König Georgs-Sund.

Waterhouſe geſteht ſelbſt zu, daß ausgeſtopfte Exemplare ſchwer von

---

1) Den Schädel der letzteren hat Waterhouſe auf tab. 8. fig. 2. abgebildet.

H. murinus zu unterscheiden wären, daß aber bei lebenden die Kopfform verschieden sein müsse, der Pelz sey vielleicht rauher und deutlicher gelblich oder rostig weiß. Am Schädel bezeichnet er, außer der schon angeführten Differenz, noch zwei andere: die Backenzähne des H. Gilberti sind kleiner, und der Lückenzahn ist nur wenig länger als der erste Backenzahn, während er bei H. murinus an Länge dem ersten und zweiten Backenzahn zusammen gleichkommt. — Von nachstehenden Ausmessungen ist die erste von Gould, die beiden andern von Waterhouse entlehnt.

	I.		II.		III.	
Körper	15″	9‴	15″	6‴	15″	0‴
Schwanz	6	3	7	0	8	6
Ohr	1	0	1	1		
Hinterfuß mit Nagel	3	0	3	7	3	2

Der H. Gilberti scheint mir nur die westliche Varietät des östlichen H. murinus zu seyn, gleich dem er ohne weiße Färbung der Schwanzspitze ist.

8. H. platyops Gould, der breitwangige Beutelhase; supra cinereo-brunneus, albido-adspersus; cauda supra fusca, subtus brunneo-albida; capite lato, brevi; rhinario apice solo nudo.

Hypsiprymnus platyops. Gould proceed. XII. p. 103; mamm. of Austral. part 3. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 231.

Unterscheidet sich von H. murinus und H. Gilberti schon gleich durch den kurzen und an den Wangen sehr breiten Kopf, sowie dadurch, daß die Nasenkuppe nur an der Spitze (und nicht wie bei jenen auch noch auf der Oberseite) nackt ist. Der Pelz ist lang und weich, oben graubraun mit deutlicher weißer Sprenkelung, unten bräunlichweiß. Die Haare des Rückens sind grau, dann gelblichbraun, dann mit breitem weißen Ring und schwarzer Spitze; die Haare der Unterseite sind am Grunde blaßgrau und außen trüb weiß. Die Füße sind schmutzig weiß, mehr oder weniger mit Braun überlaufen. Die Ohren sind innen weißlich behaart, außen theils braun, theils weiß. Der Schwanz ist mit kurzen, anliegenden, dunkelbraunen, in der Endhälfte fast schwarzen Haaren bekleidet; unten ist er braunweiß. — Der Schädel ist noch nicht

gekannt; die beiden hintern Schneidezähne ſind ſehr klein, ſo daß ſie nur wenig aus dem Zahnfleiſche vorragen; auch der Eckzahn iſt ſehr klein und kaum 1 Linie von den Schneidezähnen entfernt.

Körper	12″	0‴	Ohr	0″	10‴
Schwanz, ohngefähr . . .	7	6	Hinterfuß mit Nagel . .	2	8

Man kennt von dieſer Art bis jetzt nur 2 Exemplare aus Weſt-Auſtralien, das eine aus dem Innern bei Northam, das andere von König Georgs-Sund.

††††) caput longissimum angustum, cauda conica apice nuda, dentes molares spurii maximi, veri inter se aequales, bullae auditoriae mediocres. — Dorcopsis Schleg. Müll.

9. H. Brunii Schreb., der Filander; supra fulvido-brunneus, subtus albidus; vellere brevi.

Halmaturus Brunii. Wagn. Schreb. Supplement. III. S. 119 Tab. C. LIII. — Macropus Brunii. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 180. — Dorcopsis Brunii. Schleg. Muell. verhandel. zoolog. I. p. 131. tab. 21 (Thier), tab. 22 fig. 3. (Kopf), tab. 23 fig. 7, 8 (Schädel), tab. 24 fig. 7—9 (Schädel und Knochen der hintern Gliedmaſſen).

Durch die genaue ausführliche und von ſchönen Abbildungen begleitete Beſchreibung Schlegel's und S. Müller's iſt uns dieſe Art — die erſte, welche aus der Familie der Springer entdeckt wurde — jetzt vollſtändig bekannt geworden. Sie iſt eine Mittelform zwiſchen den Känguruhs und Potoruhs, daher ſie auch von den Zoologen bald zu jenen, bald zu dieſen gezählt wurde; Letzteres geſchah anfänglich auch von Schlegel und Müller, daher ihre Abbildungen noch die Unterſchriften Hypsiprymnus Brunii tragen, bis ſie in dem ſpäter angefertigten Texte für dieſe Art die eigne Gattung Dorcopsis errichteten[1]).

Mit den Känguruhs kommt der Filander überein im äußern Habitus, in der geringern Entwicklung der Paukenknochen und in der gleichförmigen Größe der ächten Backenzähne. In dieſen Stücken weicht er zugleich von den übrigen Arten der Potoruh's ab, dagegen ſchließt er ſich

1) Um Irrungen zu begegnen, iſt hier bemerklich zu machen, daß Desmareſt unter dem Namen Macropus Brunii den M. ualabatus beſchrieben hat.

an dieſe an durch die Form der Schneidezähne, die bei ihm verhältnißmäßig klein ſind, durch das Vorkommen eines deutlichen und ſtändigen Eckzahnes und durch die Größe des vorderſten Backenzahnes, der hier zum Maximum ſeiner Ausbildung gelangt. Eigenthümlich iſt für ihn, außer dem eben bezeichneten Merkmale, der langgeſtreckte und ſehr ſchmale Kopf, die auffallend kurze und ziemlich weiche Behaarung mit einem Haarwirbel hinter den Schultern wie bei Dendrolagus, ferner iſt der kurzbehaarte Schwanz am Ende nackt und ſchuppig, die Vorderglieder ſind verhältnißmäßig länger als bei den andern Springern und alle Nägel ſind gerade, hinten viel höher als vorn und auf der Unterfläche längs des Randes ausgehöhlt. Die Ohren ſind kurz und die Schnautzenkuppe iſt nackt, der Schwanz kürzer als der Rumpf, die beiden Löcher des Gaumenbeins lang und ſchmal. — Die Wirbelſäule zählt 7 Halsw., 13 Rückenw., 6 Lendenw., 2 Kreuzw. und 20—21 Schwanzwirbel.

Die Oberſeite iſt röthlich lichtbraun, was auf dem Unterleib und den Untertheilen der Vorderglieder ins Weißliche übergeht. Die Ohren ſind außen mit kurzen ſchwarzbraunen Haaren beſetzt, ihre Innenſeite iſt röthlichfleiſchfarben, mit wenigen graulichen Härchen. Die Iris iſt ſchön braun. Die Naſe ſchwärzlich, die dünnbehaarte Oberlippe, die Augenlieder und die überall durchſcheinende Haut der Vorderfüße fleiſchfarbig. Der Schwanz iſt ähnlich wie der Körper gefärbt; der nackte Theil deſſelben iſt anfangs rußſchwarz, an der Spitze fleiſchfarben. Die Größe iſt die eines ſtarken Haſen. Das größte Exemplar, das S. Müller erlangte, mißt im Ganzen 1m., 145, wovon der Schwanz 0m., 485 wegnimmt. Waterhouſe gibt folgende Ausmeſſungen.

Körper	29″	3‴	Ohr	1″	10‴
Schwanz	18	3	Vorderarm nebſt Fingern.	7	6
Von der Naſe zum Ohr. .	5	1	Hinterfuß	6	0

Vom Schädel iſt noch zu bemerken, daß ſeine Länge 5″ 5‴, ſeine größte Breite zwiſchen den Jochbögen 2″ 2‴ beträgt. Die Verhältniſſe der Gliedmaſſen ſind bei Dendrolagus ursinus aufgeführt.

Der Filander bewohnt Neu-Guinea, von wo ihn die franzöſiſche Expedition des Aſtrolabe, ſo wie die holländiſche mitbrachte; er hält ſich hier in flachen Gegenden auf.

XV. HALMATURUS. Känguruh.

Dentes primores superiores aequaliter longi, posterior sulcatus; dentes canini nulli aut minimi; ungues anteriores subtus excavati.

Die Zahnformel lautet: Schneidezähne $\frac{6}{4}$, Eckzähne $\frac{0}{0}$ oder $\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{1}{1}$, ächte Backenzähne $\frac{4}{4}$ = 28 oder 30 Zähne. Von besonderer Wichtigkeit zur Unterscheidung der Arten ist der hinterste obere Schneidezahn, der sowohl nach seiner Größe als Furchung mannigfache Abänderungen darbietet.

†) cauda conica.

1. Subgen. Macropus; rhinarium pilosum, dentium primorum superiorum posterior latissimus, bisulcatus; statura maxima.

1. H. giganteus Schreb., das große Känguruh; griseo-brunneus, subtus pallidior; auriculis extus fuscis, rostri apice albido, cauda apice nigra.

Halmaturus giganteus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 108. — Macropus major. Gould Macropod. part 1. — Waterh. nat. hist. of mammal. I. p. 62 tab. 5. fig. 1, 2 (obere Schneidezähne). — Macropus ocydromus. Gould ann. of nat. hist. X. (1842) p. 1. — Waterh. l. c. p. 71. — Macropus melanops. Gould proceed. X. (1842) p. 10. — Waterh. l. c. p. 72.

var. β) e ferrugineo brunneo-flavidus.

Kangurus fuliginosus. Desmar. mammif. p. 273. — Wagn. a. a. O. S. 109. — M. fuliginosus. Gould Macropod. part 2. — Waterh. l. c. p. 73.

Das große Känguruh bewohnt Neu-Südwallis, Süd- und Westaustralien und Vandiemensland. Von einem erwachsenen Männchen giebt Waterhouse die Länge des Körpers zu 63″, die des Schwanzes zu 42″ an. Am Schädel sind die Gaumenbeine nur von einigen kleinen Löchern durchbrochen. Der hinterste obere Schneidezahn ist breiter als bei irgend einer andern Art und zeigt auf der Außenseite 2 Furchen, von denen die größere etwas vor der Mitte des Zahnes und die andere vorwärts von ihr liegt. — Die Färbung und Textur der Behaarung zeigt einige Abänderungen, bisweilen fällt die Farbe ins Bräunlichweiße oder selbst ins Weiße (M. albus Gray spic. zool.). Hinsichtlich des M. ocydromus kann Waterhouse keinen andern Unterschied finden als daß der Pelz kürzer ist, und M. melanops unterscheidet sich blos dadurch, daß die Färbung viel dunkler ist, indem sie stark mit Rußschwarz überlaufen und

die Oberseite des Kopfs fast ganz schwarz ist. Nach eigner Ansicht der beiden im pariser Museum aufgestellten Exemplare von K. fuliginosus erklärt Waterhouse, daß diese Benennung durchaus nicht auf sie paßt, indem sie bräunlichgelb (oder wie Gould sich ausdrückt: rostig gelblichbraun) sind, was an den Seiten lebhafter, auf dem Rücken aber trüb überlaufen ist. Gleich mir sieht deshalb Waterhouse diesen K. fuliginosus nur für eine Farbenabänderung des H. giganteus an.

2. Subgen. Onychogalea Gray; rhinarium pilosum, dentium primorum posterior anterioribus haud latior, unisulcatus; cauda apice unguifera, statura minor gracilis.

2. H. unguifer Gould, das weißschwänzige Känguruh; fulvidus, capite, artubus caudaque maximam partem albis.

Macropus unguifer. Gould proceed. VIII (1840) p. 93; Macropod. part 1. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 75.

Eine schöne zierliche Art mit langen Hinterbeinen und sehr langem Schwanze, an dessen Ende sich, wie bei den beiden folgenden Arten, ein kleiner horniger Auswuchs findet, der einem Fingernagel gleicht, 6‴ lang und 3‴ breit ist. Der vordere obere Schneidezahn ist größer als jeder der beiden folgenden; diese sind unter sich gleich und der letzte hat eine äußere schiefe Falte. Ein sehr kleiner Eckzahn ist vorhanden. Der Pelz ist sehr kurz und oben blaß röthlichockerfarben. Kopf, Gliedmassen und Schwanz größtentheils weiß, Bauch weißlich; über die Schenkel zieht quer auch eine weiße Binde, und von der Mitte des Rückens verläuft hinterwärts ein brauner Streif, der erst auf der Schwanzwurzel erlischt. Der Schwanz ist mit kurzen anliegenden Haaren besetzt, anfangs von der Färbung des Rückens, dann weiß, doch beginnt auf der Oberseite hinter der Mitte eine feine schwarze Linie, die allmählig breiter wird, indem sich zugleich ihre Haare verlängern und am Ende einen langen Pinsel bilden.

Körper	26″	0‴	Ohr	2″	7‴
Schwanz	27	0	Hinterbeine mit Nagel	7	6

Von der Nordwestküste Neuhollands.

3. H. frenatus Gould, das gezäumte Känguruh; supra canus,

subtus albus, taenia albida ab occipite utrinque supra scapulas decurrente; cauda supra cana versus apicem nigra, subtus sordide albida.

Macropus fraenatus. Gould proceed. VIII. (1840) p. 92; Macropod. part 1; mamm. of Austral. part 2. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 77.

Der Pelz ist kurz und weich, im Allgemeinen grau, aber fein mit Schwarz und Weiß gesprenkelt; die Unterseite ist weiß, die Halsseiten sind blaß ockergelb überlaufen. Die Ohren sind außen grau, an der Spitze schwarz gesäumt und innen weißbehaart; auf den Wangen verläuft eine weiße Binde; die Schnautze ist vorwärts der Augen schwärzlich. Vom Hinterhaupte entspringen zwei weiße Binden, deren jede abwärts über die Schulter herabzieht und unterhalb der letztern mit einer Krümmung endigt; der Zwischenraum zwischen diesen beiden Binden ist am Hinterhaupt und Nacken schwarz. Die Beine sind ziemlich licht; die Zehen dunkel. Der Schwanz ist an der Wurzel dem Körper gleichfarbig, aber längs der Oberfläche des Enddrittels und an der Spitze schwarz; an letzterer sind die Haare länger und verbergen einen kleinen hornigen Höcker. Die Unterseite des Schwanzes ist schmutzig gelblich weiß. — Die Färbung ändert insofern, als sie bei manchen Individuen mehr ins Braune zieht. Männchen und Weibchen sind in Größe und Gewicht sehr verschieden; erstere wiegen 10 bis 12 Pfund, letztere nicht über 6 Pfund.

	♂		♀	
Körper	24″	6‴	17″	6‴
Schwanz	19	0	15	0
Ohr	3	6	3	3
Hinterfuß mit Nagel	6	6	5	0

Bewohnt die innern Gegenden von Neu-Südwallis, und zwar niedrige Bergzüge von 100 bis 600 Fuß Höhe, die steril, steinig und mit struppigen Bäumen dicht besetzt sind.

4. H. lunatus Gould, das Sichel-Känguruh; supra canus, subtus albidus; cervice ferruginea, macula semilunari alba pone brachiorum insertionem.

Macropus lunatus. Gould proceed. VIII (1840) p. 93; mamm. of Austral. part. 2. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 79.

Der Pelz ist sehr weich, aschgrau mit dunkler und gelblichweißer

Sprenkelung, die Unterseite schmutzig weiß, der Hinterhals und die Schultern rostig weinroth, die Seiten blasser. In kurzer Entfernung hinter der Basis des Oberarms zieht sich eine weiße halbmondförmige Binde auf jeder Seite herab. Die ziemlich langen spitzen Ohren sind außen kurz behaart, innen mit langen weißen Haaren besetzt. Die Gliedmassen sind braun oder schmutzigweiß. Der Schwanz ist mit kurzen anliegenden grauen Haaren besetzt, die auf der Oberseite etwas länger sind und am Ende einen schwachen, meist schwärzlichen Kamm bilden, der einen ohngefähr ⅛ Zoll langen Nagel verbirgt; das Schwanzende ist auch auf der Unterseite von dunklerer Färbung. Von dem Schädel unsers Exemplares, das wir von Dr. Preiß acquirirten, habe ich bemerklich zu machen, daß die Paukenknochen stark gewölbt sind, der vordere obere Schneidezahn größer als die andern ist, der hintere nur wenig breiter als der mittlere und in der Mitte stark eingekerbt. Von einem Männchen giebt Waterhouse folgende Maaße an.

Körper	19″	0‴	Ohr	2″	7‴
Schwanz	13	3	Hinterfuß	5	0

Bewohnt das Innere von West-Australien, gewissermassen als Repräsentant des H. frenatus, von dem es sich durch weit geringere Größe, etwas lebhaftere Färbung und durch kürzere Erstreckung der weißen halbmondförmigen Binde, die erst unterhalb des Nackens beginnt, unterscheidet.

3. Subgen. **Lagorchestes** Gould; **rhinarium pilosum; dentium primorum posterior anterioribus haud latior, unisulcatus; statura parva leporiformis.**

5. **H. leporoides** Gould, das Hasen-Känguruh; **e nigro, ferrugineo alboque variegatus, subtus albidus; brachio macula nigra notato; cauda pallide brunneo-cana.**

Macropus leporoides. Gould proceed. VIII. (1840) p. 93. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 82. tab. 5 fig. 17 (Schädel), 17 a (Zähne). — **Lagorchestes leporoides.** Gould Macropod. part 1.

Hat in der Größe, so wie in der Textur und Färbung der Haare viele Aehnlichkeit mit unserem Hasen. Der Pelz ist lang und weich, der Kopf ist ziemlich kurz, die Nägel scharf, der Schwanz schlank und mittel-

lang. Die Farbe der Oberseite ist aus schwarz, rostfarbig und rostigweiß gesprenkelt, wobei Letzteres vorwiegt; die Unterseite ist graulichweiß, rostfarbig beflogen, aber zwischen den Hinterbeinen fast reinweiß; die Leibesseiten sind ebenfalls Rostfarbig überlaufen. Die Haare des Rückens sind am Grunde schwarz, dann röthlichbraun, hierauf mit breitem weißen Ringe und schwarzer Spitze. Der Hinterhals, die Schultern und ein breiter Kreis um jedes Auge sind blaß rostfarbig. An der Basis der Vorderglieder findet sich ein schwarzer Fleck, dessen Haare weiß gesprenkelt sind. Auf der Mitte der Schienbeine findet sich auch ein trüber Fleck; die Hinterbeine sind blaß rostfarbig, mit Braun gesprenkelt. Der Schwanz ist mit kurzen anliegenden Haaren besetzt, die theils schwarz, theils weiß sind; unten ist er bräunlich weiß. — In der Färbung giebt es manche Abänderungen, indem einige Exemplare mehr roth haben; die Geschlechter sind jedoch in den Größe kaum verschieden. — Der hinterste obere Schneidezahn ist der kleinste und hat eine deutliche Kerbe; in kurzer Entfernung hinter ihm findet sich ein kleiner dünner Eckzahn.

Körper	19″	6‴	Ohr	2″	2‴
Schwanz	12	0	Hinterfuß	5	7

Bewohnt in großer Anzahl das Innere von Süd-Australien.

6. H. conspicillatus Gould, das Brillen-Känguruh; praecedenti simillimus, at auriculis minoribus maculaque brachiorum nigra nulla.

Lagorchestes conspicillatus. Gould proceed. IX. (1841) p. 82; Macropod. part 2. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 85, 192.

Sehr ähnlich der vorigen Art, aber kleiner, die Ohren beträchtlich kürzer, die rostfarbige Einsäumung der Augen lebhafter, der schwarze Fleck an den Armen fehlt, um die Nasenlöcher findet sich ein kahler Saum und eine kleine nackte Stelle vorn, während bei H. leporoides die ganze Nasenkuppe behaart ist, ferner sind die Vorderhände breiter und stärker. Der hinterste obere Schneidezahn ist bei H. conspicillatus ziemlich breiter als der mittlere und hat eine äußere schiefe Falte; der Eckzahn ist ziemlich deutlich entwickelt.

Körper	18″	6‴	Ohr	1″	3‴
Schwanz	13	9	Hinterfuß	3	6

Auf der Reise des Beagle wurden 2 Exemplare von dieser Art auf der Barrow-Insel, welche ohngefähr 30 englische Meilen von der Nordwestküste Neuhollands entfernt liegt, gefunden. Es waren Männchen und Weibchen, die beide in Größe und Färbung miteinander überein kamen.

7. H. hirsutus Gould, das zottige Känguruh; cano-brunneus, subtus albidus, tergo artubusque ferrugineo-fulvidis.

Lagorchestes hirsutus. Gould proceed. 1844 p. 32; mamm. of Austral. part 2. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 92. tab. 5 fig. 5. (Schneidezähne).

Der Pelz ist lang, oben graubraun, am Hinterrücken und den Gliedmassen stark mit Rostroth überlaufen; sehr lange rostfarbige Haare sind, zumal an den hintern Leibestheilen, dem gewöhnlichen Pelze reichlich beigemengt. Die Unterseite ist rostig weiß. Die Augen sind rostfarbig eingesäumt, die Ohren mäßig lang und an der Spitze abgerundet. Der Schwanz ist mittellang und mit kurzen steifen Haaren besetzt, die kaum die schuppige Haut verdecken; auf der Oberseite sind sie bräunlichschwarz, auf der Unterseite blässer. — Von den beiden vorhergehenden Arten ist diese durch die langen, dem Hinterrücken eingemengten röthlichen Haare leicht zu unterscheiden. — Die obern Schneidezähne nehmen nach hinten an Größe ab; der letzte hat außen eine Furche, und der zweite zeigt auch eine Andeutung davon.

Körper	17″ 0‴	Ohren	1″ 9‴
Schwanz	11 6	Hinterfuß	5 2

Im Innern von West-Australien gefunden, woselbst diesen Thieren von den Eingebornen der Namen Wurup gegeben wird.

8. H. fasciatus Peron, das gebänderte Känguruh; supra albido ferrugineoque variegatus, transversim nigro-fasciatus, pilis longissimis albis intermixtus; subtus sordide albidus.

Halmaturus fasciatus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 123. — Bettongia fasciata. Gould Macropod. part 2. — Lagorchestes albipilis. Gould ann. of nat. hist. X. (1842) p. 2. — Lagorchestes fasciatus. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 87. tab. 4 fig. 2. (Thier), tab. 5. fig. 4. (Schneidezähne). — Gould mamm. of Austral. part 2.

Gould war bei Besichtigung der im pariser Museum aufgestellten Exemplare von dieser Art durch den Umstand getäuscht worden, daß er

die Naſenkuppe abgerieben fand und indem er dieß für die natürliche Beſchaffenheit hielt, theilte er ſie der Gattung Bettongia zu, während er aus andern ihm zugekommenen Exemplaren, deren Naſenkuppe die vollſtändige Behaarung hatte, eine neue Art unter dem Namen Lagorchestes albipilis errichtete. Bald hernach unterſuchte Waterhouſe die nämlichen 3 Exemplare im pariſer Muſeum und fand nicht blos noch einige Spuren der Behaarung auf der Naſenkuppe, ſondern ſah dieſelbe bei einem ganz deutlich vorhanden, ſo daß demnach Bettongia fasciata und Lagorchestes albipilis nur Synonyme von Kangurus fasciatus ſind. Neuerdings hat unſere Sammlung von dieſer Art auch ein Exemplar (ein Männchen) von Dr. Preiß acquirirt, von dem ich die nachſtehende Beſchreibung entworfen habe.

Der Pelz iſt ſehr lang und weich; die Vorderfüſſe ſehr kurz und fein, an den Hinterfüſſen ſind die beiden äußern Nägel von den langen Haaren ganz überdeckt. Die ganze Oberſeite iſt weiß und roſtigbraun geſprenkelt und von unregelmäßigen ſchwarzen Querbinden durchzogen, die am deutlichſten auf dem Hinterrücken auftreten, und gegen das Widerriſt kürzer und minder beſtimmt erſcheinen. Die Haare dieſer Theile ſind alle in ihrer untern Hälfte ſchieferſchwarz, dann weiß, was allmählig ins Roſtfarbige übergeht und mit einer ſchwarzen Spitze endigt; einzelne längere Haare auf dem Rücken ſind ganz ſchwarz. Außerdem ſind der ganzen Ober- und Außenſeite noch eine Menge außerordentlich langer flatternder (2½" lang und darüber) eingemengt, die zwar in ihrem untern Theile auch ſchwarz, in ihrem größern äußern aber weiß ſind, und von denen mitunter die auf dem Rücken in kurze roſtigſchwarze Spitzen enden. Die Unterſeite iſt ſchmutzig weiß, wobei die Haare am Grunde ſchiefergrau ſind. Der Kopf iſt licht roſtigbräunlich und fein ſchwarz geſprenkelt; die Naſenkuppe iſt ganz behaart, mit Ausnahme ihres vorderſten Endes. Die Ohren ſind innen mit längeren weißen Haaren beſetzt; außen mit ſehr kurzen, die ſchwarz und weißlich geſprenkelt ſind. Die Vorderfüſſe ſind ſchmutzig weißlich, die Hinterfüſſe licht roſtbräunlich mit feiner ſchwarzer Sprenkelung, die Zehen ſind dunkelbraun behaart. Der Schwanz iſt mit ſehr kurzen dicht anliegenden, ſchwarz und gelblich geſprenkelten Haaren beſetzt; auf der Oberſeite zieht ſich ein ſchmaler Kamm etwas längerer

und gegen die Spitze allmählig an Länge zunehmender und hier überragender, schwarzer Haare hin; ein Gleiches hat auf der Unterseite statt, nur daß die Haare hier lichtgelblich sind. — Von den obern Schneidezähnen ist der erste der schmälste; der mittlere etwas breiter als der hintere, und der letztere in der Mitte gekerbt; von einem Eckzahn ist keine Spur vorhanden. — Von nachstehenden Maaßen ist N. I von mir gemessen, die beiden folgenden von Waterhouse.

	I.		II.		III.	
Körper	15″	6‴	17″	6‴	17″	0‴
Schwanz	12	0	12	0	12	0
Ohr	1	9	1	6	1	8
Hinterfuß	4	2½	4	3⅓	4	3

Zuerst von Péron und Lesueur auf den Inseln in der Haybay, an der Westküste Neuhollands, dann von Preiß auch auf dem benachbarten Festland aufgefunden, wo sich diese Thiere im dichten Gebüsch aufhalten.

4. Subgen. Halmaturus; rhinarium nudum.

Die nackte Nasenkuppe ist das einzige Merkmal, welches diese große Gruppe von den vorhergehenden Känguruhs unterscheidet, mit welchen sie im Uebrigen übereinkommt.

a) **statura maxima.**

9. H. antilopinus Gould, das Antilopen-Känguruh; supra ferrugineo-rufus, subtus flavido-albidus; vellere brevi adpresso.

Osphranter antilopinus. Gould proceed. IX. (1841) p. 80; Macropod. part 2. — M. antilopinus. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 95. tab. 5. fig. 15. (Schneidezähne).

Von der Größe des H. giganteus, aber der Pelz besteht nur aus kurzen starren Haaren wie bei manchen Antilopen. Die Nasenhöhle des Schädels ist sehr ausgedehnt, und die Schnautzenkuppe daher sehr breit, was Gould Veranlassung gab, auf dieses Merkmal eine neue Gattung Osphranter zu begründen. Die Vorderglieder sind stark und kräftig mit starken Krallen; die hintern Gliedmassen sind verhältnißmäßig kürzer als bei H. giganteus. Der Schädel unterscheidet sich von dem des letzteren hauptsächlich dadurch, daß der Schnautzentheil sich nicht zuspitzt, sondern

vorn so breit als an der Basis ist. Von den obern Schneidezähnen ist der hinterste am breitesten und hat außen zwei Falten, die aber etwas weiter rückwärts als bei H. giganteus angebracht sind. Männchen und Weibchen unterscheiden sich erheblich in der Größe, zum Theil auch in der Textur der Haare und in der Färbung.

Beim Männchen ist der Pelz kurz, die Oberseite ist lebhaft rostroth, die Unterseite sehr blaß rostgelblich oder weißlich, die Zehen schwarz, der Schwanz rostfarbig überlaufen und oben an der Spitze dunkel gefärbt. Höhe ungefähr 4'. — Beim Weibchen ist der Pelz länger, minder steif und minder dicht als beim Männchen anliegend. Die Färbung ist im Allgemeinen braun, auf dem Nacken und den Schultern ins Graue fallend, auf dem Rücken rostfarbig überlaufen und mit Schwarz gesprenkelt. Die Unterseite und die Gliedmassen sind rostig weiß, Vorderfüsse braun, Hinterfüsse an den Zehen schwarz. Höhe ohngefähr 3'.

	♂		♀	
Körper	53″	0‴	39″	0‴
Schwanz	36	0	30	0
Ohr	4	0	4	0
Hinterfuß mit Nagel	13	3	11	6

Beide eben angeführte Exemplare verschaffte sich Gilbert im Port Essington im nördlichen Neuholland. Kapitän Chambers acquirirte aber noch größere, indem er ein Männchen von 170 Pfund Gewicht bekam, das demnach um ⅓ größer seyn mußte als das von Gilbert, dessen Gewicht nur 120 Pfund betrug. Diese Art ist häufig auf der Coburg-Halbinsel, zumal in bergigen Gegenden.

10. H. robustus Gould, das große Felsenkänguruh; nigro-cinereus, brunneo-lavatus, subtus pallidior; ♀ minor, argenteo-cana, subtus alba.

Macropus (Petrogale) robustus. Gould proceed. VIII. (1840) p. 93; Macropod. part 1. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 100. tab. 7.

Die Vorderglieder sind kräftiger, die Hinterfüsse kürzer als bei H. giganteus, die Statur untersetzter; der Pelz ist kurz, rauh, und etwas zottig. Der Schädel hält in seiner Form das Mittel zwischen dem des H. giganteus und dem des H. antilopinus, indem der Schnautzentheil sich

nicht so sehr wie bei jenem verschmälert, aber doch mehr als bei letzterem; die obern Schneidezähne differiren kaum von denen des H. antilopinus. Männchen und Weibchen sind in Größe und Färbung auffallend von einander verschieden.

Das Männchen ist sehr dunkel schiefergrau, etwas mit Bräunlich überlaufen, auf der Unterseite etwas lichter. Der Kopf fällt an den Seiten der Schnautze ins Schwärzliche, und um die Mundwinkel zeigt sich eine weißliche Linie. Die Ohren sind innen weiß, außen braun; die Füsse sind schwarz. Der Schwanz ist oben schwärzlichbraun, unten blasser. — Das Weibchen ist silbergrau, auf dem Rücken mit leichtem purpurbraunen Anflugs, die Unterseite ist weiß, am Kinn findet sich ein schwarzer Fleck. Die Glieder sind lichter als der Leib, aber die Zehen schwarz. Der Schwanz ist schmutzig weiß, auf der Oberseite mit schwachem bräunlichen Tone.

	♂		♀	
Körper	49″	6‴	40″	0‴
Schwanz	34	6	30	0
Ohr	3	7	3	0
Hinterfuß	12	0	10	0

Bewohnt die Gipfel der steilen und felsigen Gebirge im Innern von Neu-Südwallis, von denen es selten an den Abhängen herabsteigt und niemals am Fusse derselben gesehen wird. Es ist ein behendes und kräftiges Gebirgsthier, dessen Jagd schwierig und mitunter auch gefährlich ist, da es sich mit den Zähnen furchtbar vertheidigt.

11. H. laniger Quoy Gaim., das wollige Känguruh; pallide fulvus, subtus flavido-albidus, capite humerisque canis, artubus caudaque albidis; vellere molli sublanuginoso; ♀ minor, pallide cana, postice rufescens.

Halmaturus laniger. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 110. — Macropus laniger. Gould Macropod. part 1. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 104. tab. 5. fig. 3. (Schneidezähne).

Von dieser Art existirte lange Zeit in unsern Sammlungen nur das einzige im pariser Museum aufbewahrte Exemplar, das noch überdieß im schlechten Zustande war, bis Gould 4 Exemplare von verschiedenem Alter und Geschlechte nach England brachte.

Der Pelz ist kurz, ziemlich weich, etwas wollig oder vielmehr baumwollenartig, wobei ihm die längern groben Stichelhaare fehlen. Die Vorderglieder sind viel länger und kräftiger als bei H. giganteus, aber die große hintere Mittelzehe ist kürzer. Der Schädel hat viele Aehnlichkeit mit dem des letzteren, aber der hinterste Schneidezahn, obwohl breiter als der mittlere, erreicht doch lange nicht die Größe von dem des H. giganteus und hat außen nur eine Furche.

Das Männchen ist von schön zimmetrother Farbe, auf der Unterseite gelblichweiß mit graulichem Anfluge. Der Kopf ist an den Seiten licht aschgrau, Kinn und Mundgegend weiß mit einigen kleinen schwarzen Flecken und einem größeren über den Mundwinkeln; die Ohren sind innen weiß, außen grau. Die Gliedmassen und der Schwanz sind gelblichweiß, die Zehen schwärzlich. — Das Weibchen ist viel kleiner, schlanker, mit kürzeren Vorderfüssen, auf der Oberseite blaßgrau mit leichtem röthlichen Tone, in den Weichen und auf den Hüften blaß rostfarbig, die Unterseite rein weiß, längs der Wangen mit deutlichem weißen Streif. — Die Jungen sind auf der Oberseite fast einförmig blaß schiefergrau.

	♂		♀	
Körper	60″	0‴	44″	0‴
Schwanz	38	0	33	0
Ohr	5	0	5	0
Hinterfuß	14	6	12	0

Diese große und schöne Art ist in den innern Theilen des südlichen Neuhollands weit verbreitet und insbesondere am Murrumbidgee, Darling und Namoi gefunden worden. Obwohl sie zuweilen mit dem H. giganteus zugleich vorkommt, so scheint sie doch steinige Höhen und offene Flächen vorzuziehen.

β) statura mediocri, vellere flavido aut fulvido.

12. H. agilis Gould, das flinke Känguruh; brunneo-flavidus, subtus albidus; cauda albida versus apicem nigrescente, vellere brevi rigido adpresso.

Halmaturus agilis. Gould proceed. IX (1842) p. 81; Macropod. part 2. — Hombron et Jacq. voy. au Pole Sud tab. 5. — Waterh. nat. hist. of mamm. I.

p. 108. tab. 5. fig. 13. (Schneidezähne). — H. Binoe. Gould proceed. X. (1842) p. 58.

Wie bei H. antilopinus besteht auch bei H. agilis der Pelz fast blos aus groben Haaren, indem die Wollhaare sehr wenig entwickelt sind, dabei ist der Pelz kurz und dicht anliegend. Die Behaarung erstreckt sich auf der Nasenkuppe weiter vorwärts als bei andern Arten dieser Abtheilung. Der Kopf ist lang und spitz. Die Farbe der Oberseite ist bräunlichgelb, etwas mit Schwarz gesprenkelt, indem die gelblichen und nur am Grunde grauen Haare eine schwarze Spitze haben; die Unterseite ist weiß, mehr oder minder mit Gelb überlaufen. Ueber dem Auge und hinter dem Ohre findet sich beiderseits ein weißer Fleck. Die Ohren sind innen weiß behaart, außen gelblich, aber an der Spitze und dem Vorderrand schwarz. Ein weißlicher Strich verläuft über die Hüften. Die Gliedmassen sind kräftig und bräunlich weiß. Der lange, schmächtige, mit kurzen anliegenden Haaren besetzte Schwanz ist weiß, aber oben an der Wurzel gelb und ein undeutlicher Streif von derselben Farbe verläuft auf der Oberseite, bis sich gegen die Spitze hin die Haare verlängern und dunkelbraun werden. — Der Schädel ist ähnlich dem von H. Bennetti, aber die Gaumenlöcher sind dreimal so lang und die obern Schneidezähne größer; der hintere ist nochmals so breit als der mittlere und hat außen eine Falte.

Körper	36″	0‴	Ohr	2″	7‴
Schwanz	34	6	Hinterfuß	10	3

Ist über den ganzen nördlichen Theil von Neuholland verbreitet, wo es die niedern sumpfigen Distrikte bewohnt. Gould's H. Binoe von Port Essington betrachtet Waterhouse nur als Junges von H. agilis.

13. H. isabellinus Gould, das isabellfarbige Känguruh; fulvidus, subtus albidus, cauda corpore paululum pallidiore.

Osphranter (?) isabellinus. Gould proceed. IX. (1841) p. 81. — M. isabellinus. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 99.

Eine noch sehr unsichere Art, da sie blos auf ein unvollkommenes Fell, das von der Barrow-Insel an der Westküste Neuhollands herstammt, begründet ist. Der Pelz ist ziemlich kurz und weich, oben licht falbroth, wobei die Haare bis zur Basis einfarbig sind, die Unterseite und

Gliedmaſſen ſind weiß, theilweiſe mit Gelb überlaufen. Die Vorderfüſſe und Zehen ſind braun, die Seiten der letztern gelblich. Der Schwanz iſt etwas blaſſer als der Körper und faſt einförmig. Die Größe ſcheint ohngefähr die von H. Bennetti zu ſeyn.

γ) statura mediocri, vellere cinereaceo aut fusco, maniculis nigris.

14. H. Parryi Benn., das Wollaruh; argenteo-cinereus, subtus albus; rostro, auricularum basi exteriore, maniculis caudaque apice nigris.

Halmaturus Parryi. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 112. — Gould Macrop. part 2. — Waterh. natur. librar. XI. p. 206. tab. 18; nat. hist. of mamm. I. p. 113. — Osphranter (?) Parryi. Gould mamm. of Austral. part 4. — Macropus elegans Lamb. Wagn. a. a. O. S. 110.

Das Wollaruh gehört durch ſeine zierlichen Formen und den ſanften Farbenton zu den ſchönſten Arten. Der genauen Beſchreibung von Bennett habe ich nur noch beizufügen, daß die Außenſeite der Ohren an der Baſis mit rußſchwarzen Haaren beſetzt iſt. Der Schädel gleicht ſehr dem des H. Bennetti, aber der Schnautzentheil iſt geſtreckter, in der Mitte weniger zuſammengezogen, mit faſt parallelen Seiten. Die obern Schneidezähne ſtimmen bei beiden faſt ganz überein, der hinterſte hat in der Mitte eine Furche; dagegen iſt der Lückenzahn bedeutend kleiner als bei H. Bennetti. — Nach Waterhouſe mißt der Körper 34″, der Schwanz 31″. Bewohnt das Innere von Neu-Südwallis und hält ſich beſonders in gebirgigen Gegenden auf. Allem Anſcheine nach iſt Lambert's Macropus elegans mit dieſer Art identiſch.

13. H. manicatus Gould, das ſchwarzpfotige Känguruh; cinerascens, albido-adspersus, subtus pedibusque albido-flavescens; maniculis abrupte aterrimis; capite supra fuliginoso-nigra, cauda versus apicem longius pilosa nigra.

Halmaturus manicatus. Gould proceed. 1840 p. 127; Macropod. part 1; mamm. of Austral. part 4. — H. Irma Jourd. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 127. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 117.

Von Gould's Original-Exemplar entwirft Waterhouſe folgende Charakteriſtik. Pelz mäßig, grau (deutlich mit Schwarz und Weiß geſprenkelt), aber mit gelblichem Anfluge, der davon herrührt, daß die Haare unter der Spitze von dieſem Tone ſind. Die Unterſeite iſt blaßgrau, et-

was gelb überlaufen. Die Oberseite des Kopfes und der Schnautze ist nußbraun, fast schwarz am Hinterhaupt und der Hinterseite der Ohren, welche jedoch gelbliche Haare an der Basis hat; innen sind letztere gelb, aber am Rande schwarz gesäumt. Auf den Wangen verläuft eine gelblichweiße Binde, das Kinn hat einen schwarzen Fleck, die Füsse sind gelb mit schwarzen Pfoten. Der Schwanz ist lang, grau, an der Spitze schwarz, mit langen, eine Art Kamm bildenden Haaren, sowohl auf der Ober- als Unterseite der Endhälfte, welche etwas zusammengedrückt ist. — Der vordere Schneidezahn ist sehr breit und gleich groß mit dem hintersten, der in der Mitte eine tiefe Furche hat; der mittlere Zahn ist viel schmäler.

Körper	31″	0‴	Ohr	3″	6‴
Schwanz	27	0	Hinterfuß	8	10

Von einem schönen Exemplare, das mir im Handel zur Ansicht zukam, theile ich nachstehende nähere Beschreibung mit. Der Pelz ist ziemlich weich; die Ohren von mittlerer Länge, außen und innen dicht behaart, die Haare des Schwanzes werden gegen das Ende länger und steifer, so daß sie hier in einen Pinsel überragen. Die Oberseite ist aus Bräunlich, Schwarz und Weiß gesprenkelt, was im Allgemeinen eine bräunlich-aschgraue Färbung mit reichlicher weißer Sprenkelung hervorbringt. Die Haare der Oberseite sind an der Wurzel blaß schiefergrau, dann gelbbräunlich mit weißem Ring vor der dunkelbraunen oder schwarzen Spitze. Die Unterseite ist gelblichweiß, wobei die Haare in ihrer untern Hälfte licht schiefergrau sind. Die Unterseite des Kopfes und die untere Hälfte der Seitentheile desselben ist abgeschnitten lichtgelblich, doch zieht längs der Wangen ein dunklerer Streif von den Ohren zum Mundwinkel. Die Innenseite der Vorderbeine und die Außenseite derselben ist ebenfalls lichtgelb, was auf letzterer gegen die Pfoten zu lebhaft ockergelb wird. — Die Innen- und Vorderseite der Hinterbeine ist anfangs gelblichweiß, wobei das Gelbe im weitern Verlaufe und zumal auf der Außenseite der Füsse die Oberhand gewinnt. Die Pfoten sind glänzend schwarz, was an den vordern von der gelben Farbe scharf abschneidet, dagegen an den hintern durch einen kurzen Uebergang vermittelt wird.

Die Oberseite des Kopfes ist dunkler als der Rücken und schneidet scharf und in einer geraden Linie von den gelben Wangen ab; der Scheitel ist schwarz. Von eben dieser Farbe ist die Haut der Ohren; letztere sind auf der Außenseite und innen an der Spitze mit mehr oder minder dunkelbraunen, innen mit viel längern lichtgelben Haaren besetzt, auch die untere Hälfte der Außenseite ist mit lichtgelblichen Haaren bekleidet. Der Schwanz ist lichtgelblich und schwarz gesprenkelt, Letzteres wird im hintern Drittel so vorherrschend, daß an der Spitze nur zu beiden Seiten ein gelber Streif übrig bleibt, der von der schwarzen Farbe eingefaßt ist. Die Länge des Körpers von diesem Exemplar beträgt 2′ 5½″.

Nach Waterhouse's Bemerkung finden sich im brittischen Museum 2 Exemplare, die durch ihre blassere Färbung, den weißen Fleck am Grunde der hintern Ohrfläche, den weißlichen Schwanzpinsel, und sonst noch, ganz mit Jourdan's H. Irma übereinstimmen, so daß diese Art mit H. manicatus identisch ist.

Nach Gilbert's Angaben ist diese Art in der Schwanenfluß-Kolonie allenthalben verbreitet, wo nur immer sterile, mit Gürteln von zwergartigen Eucalypten bewachsene Districte zu finden sind. Zwischen den Geschlechtern giebt es in der Färbung keine Verschiedenheit, doch sind die Weibchen etwas kleiner.

16. H. Greyi Gray, das weißarmige Känguruh; cano-brunneus, subtus pedibusque albidus; maniculis abrupte aterrimis; rostro supra cinereo, nigro-marginato; cauda canescente apice albida.

Halmaturus Greyi. Gray list of the mamm. p. 90. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 122. — Gould mamm. of Austral. part 4.

Die Färbung ist im Allgemeinen oben blaß aschbraun, schwach mit Gelb überlaufen, unten gelblichweiß. Die Haare der Oberseite sind an der Wurzel grau, in der Mitte rostgelb, dann weiß mit kurzem rostrothen Ring und schwarzer Spitze. Der Kopf ist oben grau, mit schwarzer Nasenkuppe, auf dem Scheitel ist er etwas mit Roth gemischt, die Hinterseite der Ohren und der Nacken sind blaß rostfarbig, erstere mit schwarzer Spitze und innen mit gelben Haaren besetzt. Längs der Kopfseiten verlaufen 3 Längsbinden: die obere ist schwarz und erstreckt sich vom Mundwinkel bis zum Auge, die mittlere ist weißlich, und die untere, nur sehr

unbestimmt angedeutete, ist bräunlich. Die Vorderglieder sind oben weißlich grau, die Vorderarme und der obere Theil der Hände falblichweiß, die Finger schwarz; die Hinterglieder sind ähnlich gefärbt. Der Schwanz ist mit ziemlich langen und nicht anliegenden Haaren besetzt von blaßgrauer, gelb angeflogener Farbe, am Ende werden sie länger und gelblichweiß. Von den obern Schneidezähnen ist der erste der breiteste, und der mittlere der schmälste; letzterer hat eine schwache, der hintere eine deutliche Furche.

Körper	32″	0‴	Ohr	3″	0‴
Schwanz	29	0	Hinterfuß	9	6

Im südlichen Neuholland zwischen dem Albert-See und dem Glenelg-Flusse entdeckt. H. Greyi hat im ganzen Habitus, in der Verkürzung der Vorderglieder und in der Färbung viele Aehnlichkeit mit H. manicatus, unterscheidet sich aber von letzterem dadurch, daß der Hauptton ins Braune fällt, die Oberseite der Schnautze grau ist, der Hinterkopf rostfarbig und daß die hintere Schwanzhälfte nicht blos weiß gefärbt ist, sondern auch keinen Kamm trägt, indem hier der Schwanz ringsum mit langen Haaren besetzt ist.

17. **H. Bennetti** Wat., das rostgraue Känguruh; supra saturate cinereus, subtus griseo-albidus; cervice scapulisque sordide rufescentibus; maniculis nigris; cauda cana, subtus albida aut flavida, apice nigra.

Halmaturus Bennetti. Waterh. proceed. V. p. 103. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 115. — Gould Macropod. part 1. — H. ruficollis var. Bennetti. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 130. tab. 5. fig. 9. (Schneidezähne). — H. fruticus. Ogilb. ann. of nat. hist. I. p. 219. — Wagn. a. a. O. S. 118. — H. ualabatus. Gray Loud. mag. 1837 p. 583. — H. leptonyx. Wagn. a. a. O. S. 116; Wiegm. Archiv 1846. 2 S. 152. — Waterh. l. c. p. 134.

Seit meiner früheren Bearbeitung der Beutelthiere habe ich Gelegenheit gehabt, 2 lebende Individuen von H. Bennetti in einer wandernden Menagerie beobachten zu können und nachdem sie später schnell nacheinander zu Grunde giengen, habe ich sie für die hiesige Sammlung acquirirt; ein drittes Exemplar habe ich erst vor Kurzem hierzu erlangt. Daraus habe ich nun ersehen, daß mein H. leptonyx nur den jüngeren Zustand dieser Art darstellt.

Bei alten Thieren ist der Pelz dunkelgrau, auf dem Rücken mehr oder minder mit Rostbräunlich beflogen, auf dem Hinterkopf, Nacken und Widerrist trüb rostfalblich, aber von blassem Tone. Die Unterseite ist graulichweiß. Die Hände und die Vorderhälfte der Hinterfüße sind schwarz, die obere Hälfte der Hinterseite der Ohren ebenfalls. Der Schwanz ist oben weißlich, mit Schwarz gesprenkelt und an der Spitze schwarz; unten ist er weiß oder schmutzig ockergelblich. Im Uebrigen ist die von mir früher, nach Waterhouse, mitgetheilte Beschreibung zu vergleichen. Von den Zähnen ist zu bemerken, daß der hinterste obere Schneidezahn etwas breiter ist als jeder der beiden vordern und hinter der Mitte eine starke Längsfurche hat.

	♂		♀	
Körper	35″	9‴	30″	3‴
Schwanz	31	6	26	9
Ohr	2	11	2	11
Hinterfuß	9	3	8	2

Lediglich auf Vandiemensland beschränkt, wo es allenthalben verbreitet und unter dem Namen Brush Kangaroo allgemein bekannt ist. Sein Fleisch ist eine sehr beliebte Speise und sein Fell liefert einen wichtigen Handelsartikel, so daß jährlich mehrere Tausende von diesen Thieren erlegt werden, ohne daß jedoch ihre baldige Ausrottung zu fürchten ist, da sie in den dichten und feuchten Waldungen noch immer eine sichere Zufluchtsstätte zur Vermehrung ihrer Art finden.

* H. ruficollis Geoffr., das rothhalsige Känguruh; supra ferrugineo-canus, subtus albidus; cervice scapulisque distincte ferrugineis, maniculis nigris; cauda cano-albida apice nigrescente.

Kangurus ruficollis. Desmar. mamm. p. 112. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 112. — H. ruficollis. Gould Macropod. part. 2 — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 125. — Kangurus rufogriseus. Desmar. mamm. p. 273. — Wagn. a. a. O. S. 111. — H. griseo-rufus. Oppel. Isis 1819 S. 267.

Mit Waterhouse bin ich überzeugt, daß H. ruficollis und H. Bennetti nur Lokalvarietäten von einander sind, wovon erstere dem Festlande, letztere Vandiemensland angehört. Als unterscheidende Merkmale des H. ruficollis sind folgende anzuführen. Der Pelz ist kürzer und

mehr von roſtbrauner Färbung, der Hinterhals nebſt Schultern ſind licht roſtroth, die Oberſeite des hintern Mittelfußes iſt weiß, der Schwanz iſt graulichweiß, an der Spitze ſchwärzlich.

Nach Vergleichung der pariſer Sammlung fand Waterhouſe, daß das daſelbſt als Kangurus rufogriseus aufgeſtellte Exemplar vollkommen mit dem Original-Exemplar von K. ruficollis übereinſtimmt, daß ferner auch die Beſchreibung von Desmareſt ganz zu jenem K. rufogriseus paßt, mit der Ausnahme, daß genannter Zoolog die Maaße viel größer angiebt. Von den nachſtehenden Maaßen beziehen ſich die beiden erſten auf die pariſer Exemplare, die beiden letzten auf ſolche im brittiſchen Muſeum.

	♂		♂		♂		♀	
Körper	39″	9‴	41″	6‴	41″	0‴	35″	6‴
Schwanz	25	0	25	6	31	0	26	6
Ohr	2	5	2	6	3	1	3	0
Hinterfuß	9	1	8	10	10	0	9	6

Das rothhalſige Känguruh bewohnt die Kingsinſel und Neu-Südwallis, wo es ſonſt um Sydney gemein war, jetzt aber durch die anwachſende Bevölkerung in das Innere zurückgedrängt iſt, woſelbſt es jedoch noch immer häufig iſt.

18. H. nemoralis Wagn., das ſchwarzſchwänzige Känguruh; fuscus, tergo rutilo-lavatus, subtus flavidus aut ferrugineus; pedibus, cauda maculaque infra brachiorum basin nigris.

Kangurus ualabatus. Less. et Garnot zool. de la Coquille I. p. 63. tab. 7. — H. nemoralis. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 114. (mit Ausnahme von Gray's H. ualabatus). — H. Lessonii. Gray Loud. mag. I. p. 583. — H. ualabatus. Gould Macroped. part 2. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 136. tab. 5. fig. 12. (Schneidezähne).

Kommt an Größe faſt dem H. ruficollis, mit dem es die gleiche Heimath gemein hat, nahe und unterſcheidet ſich von ihm wie von H. Bennetti durch die dunkle Färbung, den gröbern und etwas glänzenden Pelz, den dunkeln Fleck unter der Einlenkung der Arme, den gelben oder roſtrothen Unterleib und die faſt einfärbig ſchwarze Färbung der Füße und des Schwanzes. Im Uebrigen iſt die von mir früher mitgetheilte Beſchreibung Leſſon's zu vergleichen. Nach Waterhouſe mißt der

Körper 34″, der Schwanz 26″. Dieſe Art bewohnt faſt alle dichten Gebüſche von Neu-Südwallis.

β) statura parva, cervice et interscapullo fulvidis.

19. H. Thetidis Fr. Cuv., das ſtruppige Känguruh; fuscus, subtus albus; nucha et interscapulio ferrugineo-fulvidis; artubus anterioribus brunneo-canis, pedibus posterioribus fuscis; cauda brevipilosa, supra fusca, subtus brunneo-albida.

Halmaturus Thetidis. Fr. Cuv. mammif. fol. III. — Lesson navigation de la Frégate Thetis. II. p. 305. tab. 37. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 124. — Gould Macropod. part 2. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. S. 144. tab. 2. fig. 2. (Schädel und Zähne). — H. nuchalis. Wagn. a. a. O. S. 128. — Macropus Eugenii. Waterh. catal. of the mamm. of the zool. soc. p. 66; natur. librar. XI. p. 232. — Thylogale Eugenii. Gray Loud. mag. I. p. 583.

Die genaue Beſchreibung, welche Waterhouſe ſowohl von den im pariſer Muſeum aufbewahrten 3 Exemplaren von H. Thetidis als auch von der Beſchaffenheit des Schädels und Gebiſſes lieferte, haben mich überzeugt, daß ſeine Verweiſung meines H. nuchalis an H. Thetidis vollkommen begründet iſt. Es charakteriſirt ſich dieſe Art durch folgende Merkmale.

Der Pelz iſt ziemlich lang und weich, oben braun und ſchwarz geſprenkelt, unten weiß; Nacken, Widerriſt und Schultern lebhaft roſtfalb, was ſich als blaſſere Binde auch an den Seiten fortzieht und hier die dunkle Farbe der Oberſeite von der weißen der Unterſeite trennt. Die Ohren ſind innen weißlich, außen ſchwärzlich behaart; der Kopf iſt braun, die Hinterfüße nußbraun, über den Oberſchenkel verläuft eine undeutliche blaſſe Querbinde. Der Schwanz iſt an den Seiten und unten nur mit kurzen, ſchmutzig gelblichweißen Haaren beſetzt, ſo daß die ſchuppige Haut durchſcheint; auf der Oberſeite iſt er ſtärker behaart, anfangs ſchwarz und weißlich melirt, dann einförmig dunkelbraun. Die Haare des Hinterhalſes ſind vorwärts und ſeitwärts, auf den Widerriſt einwärts gerichtet und indem auf letzterem ihre Spitzen zuſammenſtoßen, entſteht ein kleiner Kamm. Männchen und Weibchen unterſcheiden ſich etwas in der Größe, aber nicht in der Färbung.

Körper	26″	8‴	Ohr	2″	3‴
Schwanz	18	9	Hinterfuß	6	6

Gehört Neu-Südwallis an, wo es von den Kolonisten Pademelon genannt wird, buschige Gegenden bewohnt und seines zarten wohlschmeckenden Fleisches halber häufig gejagt wird.

20. H. Dama Gould, das Dama-Känguruh; ferrugineo-fuscus, subtus albus; nucha, interscapulio artubusque anterioribus ferrugineo-fulvidis; cauda grisea.

Halmaturus Dama. Gould proceed. 1844 p. 32. — H. Eugenii. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 140. tab. 5. fig. 8. (Schneidezähne). — Kanguru Eugenii. Desmar. mamm. p. 274. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 127.

var. β) cinereus, leviter ferrugineo-tinctus.

Halmaturus gracilis. Gould proceed. 1844 p. 103.

Da das Exemplar, auf welches Desmarest seinen Kangurus Eugenii begründete, nicht mehr in der pariser Sammlung vorhanden ist, so läßt sich nicht entscheiden, ob es mit H. Dama oder Derbyanus identisch ist, und deshalb halte ich es für gerathen, dasselbe außer Berücksichtigung zu lassen und blos die neueren Benennungen zu gebrauchen.

Die Färbung des Männchens ist rostigbraun, reichlich mit Schwarz gesprenkelt, Hinterhals, Schultern und Vorderglieder hell rostfarbig; Seiten und Hinterbeine rostfarbig überlaufen. Die Unterseite ist weiß, die Brust gelblich. Der Kopf ist grau, am Scheitel und in der Augengegend schwach rostfarbig beflogen, die Nasenkuppe bräunlich, die Ohren außen grau, was gegen die Spitze ins Schwarze übergeht. Die Füße sind rostigweiß, die Zehen etwas mit Braun gesprenkelt, der Schwanz grau. — Das Weibchen ist graulich, nur mit einem schwachen rostigen Tone, Nacken, Schultern und Vorderglieder blaß rostfarbig, mit viel Weiß gesprenkelt, die Unterseite graulichweiß; der Schwanz mit einer schwarzen Zeichnung längs der Oberseite des Endtheiles.

Körper	23″	0‴	Ohr	2″	6‴
Schwanz	15	0	Hinterfuß	6	0

Bewohnt West-Australien und ist sowohl mit H. Thetidis als H. Derbyanus verwandt. Von ersterem unterscheidet es sich durch geringere Größe, rothe Vorderbeine und andere Beschaffenheit der obern Schneidezähne, von denen der hintere in der Mitte die Furche hat; von letzterem

durch den Mangel des schwarzen Nackenfleckes, kleinere Hände, längere Hinterbeine, breitere Ohren und merklich breitere obere Schneidezähne.

Gouldʼs H. gracilis beruht nach der Vergleichung, die Waterhouse mit den Original-Exemplaren vornahm, auf jungen Individuen, die überdieß im Haarwechsel begriffen waren und die langen dunkeln Stichelhaare verloren hatten, so daß die graue Unterwolle frei sichtlich war.

21. H. dorsalis Gray, das rückenstreifige Känguruh; brunneo-canus, subtus albus; nucha, interscapulio brachiisque ferrugineo-fulvidis; stria nigra a nucha ad dorsum medium ducta; maniculis nigris.

Halmaturus dorsalis. Gray Loud. mag. I. p. 583. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 127. — Gould Macropod. part 1. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 152. tab. 5. fig. 14. (Schneidezähne).

Der Pelz ist mäßig lang, etwas rauh, oben bräunlich grau mit leichtem rostigen Anfluge, indem die Haare in der Mitte rostbräunlich sind; die ganze Unterseite ist weiß, wobei die Haare bis zum Grunde einfarbig sind. Der Hinterkopf, Nacken, Schultern und Arme sind licht rostroth; ein gut begrenzter schwarzer Strich verläuft vom Ende des Nackens bis zur Mitte des Rückens. Die Ohren sind innen weiß behaart, außen am Grunde ähnlich dem Kopfe, im obern Theil dunkelbraun; die Schnautze ist oben ziemlich dunkel und von dem Auge zur Oberlippe zieht eine weißliche Binde. Die Hinterfüße sind hinten weißlich, vorn mit schwarzer Sprenkelung, die Zehen der Vorder- und Hinterfüße sind braunschwarz; über die Oberschenkel verläuft eine weißliche Binde. Der Schwanz ist oben mit kurzen grauen Haaren spärlich behaart, so daß die schuppige Haut nicht völlig verdeckt wird, unten ist er mit längern schmutzig gelblichen Haaren dicht besetzt. Das Weibchen ist etwas kleiner als das Männchen, sonst aber demselben gleichfarbig. — Der hinterste Schneidezahn ist der breiteste und hat in der Mitte eine Furche. Gould giebt folgende Maaße an.

	♂		♀	
Körper	30″	0‴	25″	0‴
Schwanz	25	0	21	0
Ohr	3	0	2	9
Hinterfuß	8	0	7	3

Bewohnt in großer Anzahl das Innere von Neu-Südwallis und hält sich besonders in buschreichen Gegenden auf.

22. H. Derbyanus Gray, das nackenstreifige Känguruh; supra e cano, rufo nigroque mixtus, subtus sordide albidus; nucha, interscapulio, artubus caudaque basi ferrugineis; nucha stria media nigra notata.

Halmaturus Derbianus. Gray Loud. mag. I. p. 583. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 128. — Gould Macropod. part 1. — Waterh. natur. libr. XI. p. 234. tab. 21; nat. hist. of mamm. I. p. 154. tab. 5. fig. 6. (Schneidezähne). — Schlegel, Diergaarde te Amsterd. p. VI, 177 tab. 23. (hier fälschlich als H. Bennetti).

var. β) pallidior, minus rufo-tinctus.

Halmaturus Houtmanni. Gould proceed. 1844 p. 31.

Waterhouse giebt von dieser Art folgende Charakteristik. Der Pelz ist lang und mäßig weich, grau mit unbestimmtem rostigen Tone; die Unterseite schmutzig weiß, etwas mit Rostgelblich gewässert. Die Vorder- und Hinterfüße sind blaß rostfarbig, vorn sehr fein schwärzlich gesprenkelt. Der Nacken, das Kreuz, die Schwanzwurzel und die Gliedmassen sind rostroth; vom Hinterhaupt verläuft längs des Hinterhalses ein nicht scharf abgegrenzter Streif. Der Schwanz ist mit kurzen, oben grauen, unten schmutzig weißen Haaren besetzt. — H. Houtmanni unterscheidet sich nach Waterhouse dadurch, daß die Farbe im Allgemeinen etwas weniger lebhaft ist, indem sie nur wenig vom röthlichen Anfluge zeigt, was allerdings kein Merkmal ist, worauf sich eine specifische Differenz begründen ließe.

	H. Derbyanus.		H. Houtmanni.	
Körper	22″	0‴	26″	0‴
Schwanz	17	0	13	0
Ohr	2	6	1	9
Hinterfuß	6	0	5	5

Von Dr. Preiß ist der hiesigen Sammlung ein altes Männchen zugekommen, dessen Roth weit lebhafter ist als es die Abbildung von Gould zeigt. Die Haare des Rückens und der Seiten sind in der untern Hälfte schwarz, dann gelblichweiß mit rostfalbigem Ringe vor der schwarzen Spitze; letztere sind am längsten längs des Rückgraths und hier sind auch die langen ganz schwarzen Stichelhaare am zahlreichsten eingemischt. Nacken, Wider-

riſt, Schultern, Steiß, Schwanzwurzel, Oberarme ſind lebhaft roſtroth, was an den Schenkeln ſchon minder intenſiv iſt und auf der Oberſeite der Vorderarme und der Unterfüße ins licht Falbgelbe übergeht; die Füße ſelbſt ſind ſchwarz geſprenkelt. Längs des Nackens und Widerriſtes verläuft eine ſchwarze Binde, die ſeitlich nicht ſcharf abgegrenzt iſt und hinten ſich allmählig in die dunklere Färbung der Mittellinie des Rückens verliert. Die Ohren ſind, mit Ausnahme der hintern untern Hälfte ſehr ſpärlich behaart; die obere Hälfte derſelben hat nur einzelne ſchwärzliche, der Innenrand längere gelbliche Haare. Die Oberſeite des Kopfes iſt ſchwarzbraun und weiß geſprenkelt, was auf der Stirne einen roſtigen Anflug gewinnt; auf den roſtbräunlichen Seitentheilen zieht ſich eine wenig deutliche weißliche Binde von den Augen zum Munde. Die ganze Unterſeite iſt gelblichweiß; alle Haare ſind am untern Theile licht ſchiefergrau. Der Schwanz iſt, mit Ausnahme ſeines Wurzeltheils, oben und an den Seiten nur höchſt ſpärlich mit kurzen, theils ſchwarzen, theils ſchwarz und gelblich geringelten Haaren verſehen, ſo daß die ſchuppige Haut allenthalben zum Vorſchein kommt; die Unterſeite dagegen iſt mit längeren ockergelblichen Haaren dicht beſetzt. Die Schneidezähne verhalten ſich ganz ſo, wie ſie Waterhouſe abgebildet hat, ſo daß dieſes Exemplar zu H. Derbyanus gehörig iſt.

H. Derbyanus bewohnt die weſtlichen und ſüdweſtlichen Theile Neuhollands, und unterſcheidet ſich von H. dorsalis durch geringere Größe, den kürzeren Streif auf der Oberſeite, die ſchmutzig graulich- oder gelblichweiße Färbung der Unterſeite, die lichtere Färbung der Zehen, und die viel geringere Breite des hintern Backenzahns. Von H. Thetidis unterſcheidet ſich H. Derbyanus durch den Nackenſtreif, die rothe Färbung der Vorderbeine, des Steißes und der Schwanzwurzel und ganz andere Form des hintern Schneidezahns.

23. H. Parma Gould, das weißbrüſtige Känguruh; rufo-fuscus, albido adspersus, subtus ferrugineo-albidus; gutture et pectore pure albis, cervice stria nigra notata, pedibus brunneis.

Halmaturus Parma. Gray list of mamm. p. 91. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 149. tab. 5. fig. 7. (Schneidezähne).

Der Pelz iſt mäßig lang, dunkel röthlichbraun, weiß geſprenkelt und

mit reichlicher ſchwarzer Sprenkelung auf dem Rücken; an den Seiten iſt das Weiß minder deutlich und da das Schwarz faſt fehlt, ſo iſt der Ton blaſſer. Die Unterſeite iſt ſchmutzig weiß mit roſtigem Anfluge, wobei die Haare in der untern Hälfte grau ſind; am Vorderhalſe und der Oberbruſt ſind jedoch die Haare einförmig weiß. Hinterhals, Schultern und Vorderglieder ſind bräunlich roſtfarben; erſterer mit einem ſchwarzen Längsſtrich. Der Kopf iſt aſchgrau mit röthlichen und weißlichen Tönen, die Wangenbinde iſt undeutlich; die Ohren ſind innen faſt kahl, nur mit einigen weißlichen Haaren; außen ſind ſie ähnlich dem Kopfe behaart. Die Füſſe ſind braun, hinten fein lichtbräunlich geſprenkelt. Der Schwanz iſt, mit Ausnahme der Wurzel, oben nur ſehr ſpärlich mit kurzen ſchwarzen Haaren verſehen, welche die Haut nicht verdecken; unten iſt er dichter mit ſchmutzig weißen Haaren beſetzt. — Der erſte und letzte Backenzahn ſind faſt gleichbreit, der mittlere iſt am ſchmälſten, der letzte hat am hintern Drittel eine kleine Einkerbung.

Körper	26″	0‴	Ohr	2″	1‴
Schwanz	19	0	Hinterfuß	6	3

Von Neu-Südwallis. Sowohl mit H. dorsalis als H. derbyanus nahe verwandt, von beiden aber durch die tief röthlichbraune Färbung und die einfarbig weißen Haare der Gurgel und der Bruſt verſchieden, welche letztere wenigſtens bei H. derbyanus in ihrem untern Theile deutlich ſchiefergrau ſind. Wenn nun aber auch bei H. dorsalis dieſe Haare am Grunde nur wenig grau ſind, ſo ſind als weitere Differenzen von dieſem anzuführen, daß bei H. Parma die Hinterfüſſe viel kürzer und die Schneidezähne beträchtlich ſchmäler ſind, denn während ſie bei dieſer Art zuſammen nur 5‴ meſſen, ſind ſie bei H. dorsalis 7¼‴ breit.

ε) statura parva, vellere fusco, auriculis tarsisque abbreviatis, cauda longitudine dimidii corporis.

24. H. Billardieri Desm., das roſtbäuchige Känguruh; nigro-fuscus, flavido-adspersus, subtus anguste flavescens aut rufescens; cauda breviter at dense pilosa, supra fusca, subtus sordide lutescente.

Kangurus Billardieri. Desmar. mamm. p. 542. — Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 128. Gould Macropod. part 1. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 159. tab. 5. fig. 11. (Schneidezähne). — Verreaux compt. rend. XXVI. p.

222. — H. rufiventer Ogilb. Wagn. a. a. O. S. 120. — H. brachytarsus. Wagn. a. a. O. S. 121. — Thylogale Tasmanei. Gray ann. of nat. hist. 1838 p. 108.

Durch ihre dunkle Färbung, den roſtröthlichen oder ockergelblichen Unterleib, durch die Kürze der Ohren, der Hinterfüſſe und des Schwanzes iſt dieſe Art von allen vorhergehenden auffallend verſchieden. Die Länge des Körpers giebt Waterhouſe zu 25″, des Schwanzes zu 14½″ an. Sie iſt beſchränkt auf Vandiemensland und einige Inſeln der Baßſtraſſe, wo ſie ſich in den Waldungen aufhält, iſt ihres vortrefflichen Fleiſches und Felles wegen ſehr geſchätzt, und wird in großer Menge gefangen. Bei den Koloniſten auf Vandiemensland führt dieſe Art den Namen Wallaby, der aber in Neu-Südwallis zur Bezeichnung einer andern Art gebracht wird.

25. H. brachyurus Quoy Gaim., das kurzſchwänzige Känguruh; supra e nigro flavidoque variegatus, subtus flavidus; cauda raripilosa squamosa, nigricante.

Halmaturus brachyurus. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 123. — Waterh. nat. hist of mamm. I. p. 162. tab. fig. 16. (Schädel und Zähne). — Thylogale brevicaudatus. Gray list of mamm. p. 90.

Zu der von mir a. a. O. mitgetheilten Beſchreibung von Quoy und Gaimard füge ich noch einige Bemerkungen bei aus der Schilderung, welche Waterhouſe nach dem von Gould beigebrachten Exemplare entwarf. Der Pelz iſt lang, weich und etwas glänzend. Die Haare des Rückens ſind am Grunde grau, dann breit gelb geringelt mit ſchwarzer Spitze, und da hier zahlreiche längere und ganz ſchwarze Haare eingemengt ſind, zumal längs der Rückenmitte, ſo iſt hier die Färbung am dunkelſten. An den Leibesſeiten ſind die Haare ähnlich gefärbt, aber das Gelb iſt blaſſer, und die Spitzen ſind bräunlich. Die Haare der Unterſeite ſind am Grunde grau, auswärts blaß gelblich. Die Füſſe ſind dunkelbraun. Der Schwanz iſt kurz und ſchlank, ſo daß er an der Baſis nur 1½″ im Umfange mißt; er gleicht einem Rattenſchwanze, indem er nur ſpärlich mit kurzen ſteifen Haaren beſetzt iſt, zwiſchen welchen die ſchwarzen Schuppenringe deutlich ſichtlich ſind. — Der Schädel zeichnet ſich aus durch Kürze des Schnautzentheils und Breite des Hirnſchädels. Der hintere

Schneidezahn ist fast so breit als der vordere und hat eine deutliche Einfurchung. Die Maaße dieses Exemplars sind folgende:

Körper	15″	6‴	Ohr	1″	3‴
Schwanz	7	6	Hinterfuß	3	2

Sowohl das Exemplar von Quoy und Gaimard als das von Gould stammen vom König Georgs-Sund her. Durch die Kürze des Schwanzes und der Ohren ist diese Art mit keiner andern zu verwechseln.

††) cauda cylindrica.

5. Subgen. Petrogale Gray (Heteropus Jourd.); rhinarium nudum, cauda basi haud incrassata, pilis longis, inprimis ad apicem, vestita; dentium primorum posterior anteriore paulum angustior, unisulcatus.

Außer den oben angeführten Merkmalen ist noch zu bemerken, daß die Hinterfüsse zwar kräftig, aber verhältnißmäßig kurz und dabei auf den Sohlen ungemein rauh sind, indem diese mit lauter harten Warzen besetzt sind. Die beiden äußern Nägel an den Hinterzehen sind kurz und ragen bei einigen Arten kaum über die Zehenballen vor. Diese Känguruhs bewohnen nicht die Ebenen, sondern die felsigen Gebirge und können sich ihres Schwanzes nicht zum Aufstemmen auf dem Boden bedienen.

26. H. penicillatus Gray, das pinselschwänzige Felskänguruh; supra saturate fusco-cinereus, purpureo-tinctus; gutture et pectore fascia longitudinali alba ornatis; auriculis extus, macula magna post brachia, pedibus caudaque penicillata nigris.

Halmaturus penicillatus. Wagn. Schreb. III. S. 125. — Petrogale penicillata. Gould Macropod. part 2. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 167. tab. 1. (Thier), tab. 5. fig. 10. (Schneidezähne).

var. β) penicillo caudae albo-terminato.

Heteropus albigularis Jourd. Wagn. a. a. S. 126.

Der Pelz ist ziemlich lang und etwas rauh, dunkel aschbraun mit Purpurschimmer, was am Kreuz und der Schwanzwurzel ins dunkel Rostrothe übergeht; die Leibesseiten rußbraun, hinter den Vorderarmen ins Schwarze verlaufend. Den Vorderhals und die Brust durchzieht eine weiße Längsbinde, der Bauch ist rostig braun oder gelblich. Die Oberseite des Kopfs ist dunkelgrau; unter den Augen verläuft eine weißliche Längsbinde. Die Ohren sind innen gelblich behaart, außen schwarz, was

an der Wurzel ins Graue übergeht, während der Rand und die Spitze gelblich gesäumt sind. Vom Scheitel verläuft ein schmaler schwarzer Streif bis zum Widerrist. Die Füsse sind rostig schwarz; die hintern mit langen Haaren bekleidet. Der Schwanz ist, mit Ausnahme der Wurzel, die dem Rumpfe gleichartig behaart ist, mit langen, groben, am Ende einen Pinsel bildenden, schwarzen Haaren besetzt. Die Geschlechter sind sich in der Größe und Färbung ziemlich gleich. — In der Färbung giebt es mancherlei Abänderungen. Bei Einigen zeigen die Leibesseiten kaum eine Andeutung von der dunkeln Färbung, ausgenommen gegen die Achseln, unmittelbar darüber aber einen weißlichen Fleck. Bisweilen ist nur auf der Brust ein weißer Fleck, der Unterleib ist schmutzig gelblich, die Hinterfüsse und der Schwanz sind bräunlich. Letzterer ist unten gewöhnlich bräunlich, mit Ausnahme der Spitze, und seine Wurzel ist auf der Unterseite häufig licht rostfalb. — Jourdan's Heteropus albigularis, der gleiche Heimath mit der Petrogale penicillata hat, ist ohne Zweifel ebenfalls eine dieser Abänderungen, bei der der Schwanzpinsel ein weißes Ende zeigt. — Von den obern Schneidezähnen sind der vordere und hintere gleichbreit, der mittlere viel schmäler, der hintere im hintern Drittel mit einer Furche.

Körper	28″	6‴	Ohr	2″	9‴
Schwanz, ohne Haare . .	24	0	Hinterfuß	6	10

Der Wohnbezirk dieses Känguruhs sind die gebirgigen, insbesondere höhlenreichen Distrikte des Innern von Neu-Südwallis, wo man es auf den Felsen in zahlreichen Schaaren antrifft. Es ist ungemein scheu und flüchtig, und von großer Gewandtheit im Springen; seiner Nahrung geht es nur zur Nachtzeit nach.

27. H. lateralis Gould, das seitenstreifige Felskänguruh; supra flavido-brunneus, antice canescens, subtus anguste flavescens; lateribus taenia lata fusca alteraque angustiore alba ornatis.

Petrogale lateralis. Gould proceed. 1842; Macropod. part 2. — Macropus lateralis. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 172. — Wagn. Schreb. Supplem. tab. CLIV. A.

Der Pelz ist ziemlich lang und weich. Der Hinterkopf, Nacken und Widerrist sind lichtgraulich, was allmählig in die gelbbräunliche und

schwarz gesprenkelte Färbung der Oberseite übergeht, indem hier die Haare in ihrer untern Hälfte rußbraun sind, hierauf bräunlichgelb, was allmählig in Weiß übergeht, zuletzt mit schwarzer Spitze; außerdem sind dem Rücken viele längere ganz schwarze Haare eingemengt. Die Unterseite ist in einem nicht sehr ausgedehnten Streifen gelblichweiß oder lichtgelblich; ihre Haare sind an ihrem untern Theile ebenfalls rußbraun. Die Oberseite des Kopfs ist düster graubraun; von der Nasenspitze verläuft zum Auge eine schwarze Binde und unterhalb derselben zieht eine weißliche bis zu den Ohren. Letztere sind innen mit einigen gelblichen Haaren versehen; auf der Hinterseite sind sie besser behaart und zwar in der untern Hälfte mit gelblichen (am Grunde dunkelbraunen), in der obern mit schwarzen Haaren besetzt. Ein schwarzer schmaler Längsstreif verläuft von der Mitte des Scheitels bis hinter das Widerrist, wo er sich allmählig verliert. Eine dunkelbraune Binde zieht sich vom Hinterrande des Oberarms an den untern Theil der Leibesseiten breit herab und verläuft auch noch über die Vorder- und Innenseite der Oberschenkel, bis sie unterhalb des Kniees endigt; am dunkelsten ist sie auf dem Oberarme, während sie längs der Seiten (wenigstens bei unserem Exemplare) weißlich gesprenkelt und auf den Schenkeln wieder einfarbig ist. Unmittelbar oberhalb dieser schwarzbraunen Binde verläuft eine schmälere weiße Binde. Die Vorderarme sind innen rostbraun, auf der Vorderseite hellgelblich; die Hände sind falbbraun, was auf den Fingern ins Schwarze übergeht. Die Hinterfüsse sind bräunlich, auf der Oberseite und den Zehen schwarzbraun; die beiden äußern Nägel sind auffallend kurz, so daß sie kaum über die Zehenballen vorragen, und sind dabei von den langen schwarzen Haaren ganz verdeckt. Der dicht, aber in der ersten Hälfte ziemlich kurz behaarte Schwanz ist auf dieser Erstreckung ähnlich dem Körper gefärbt, nämlich oben bräunlichgelb und schwarz gesprenkelt, unten einfarbig schmutzig gelblich; in der hintern Hälfte werden die Haare länger und schwarz und bilden am Ende einen schwarzen Büschel. — Vom Schädel ist zu bemerken, daß die Stirnbeine eine tiefe Aushöhlung zeigen. — Von nachstehenden Maaßangaben habe ich die erste nach dem Exemplare der hiesigen Sammlung bestimmt, die andere von Waterhouse entlehnt.

	I.		II.	
Körper	23″	6‴	24″	0‴
Schwanz	16	3	17	0
Ohr	1	11	1	10
Hinterfuß	5	0	5	3

Bewohnt die felsigen Distrikte im Innern der Schwanenfluß-Kolonie, ist sehr scheu, und sucht sich gewöhnlich erst gegen Abend sein Futter auf den kleinen offenen Grasplätzen.

28. **H. brachyotis Gould, das schwarzfleckige Felskänguruh; cano-fuscus, rutilo-lavatus, subtus flavo-albidus; macula nigra post brachiorum insertionem; auriculis extus fuscis.**

Petrogale brachyotis. Gould proceed. VIII. (1840) p. 128; Macropod. part 1. — M. brachyotis. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 176.

Der Pelz ist kurz und ziemlich dicht anliegend; die Ohren werden von Gould und Waterhouse als kurz angegeben, was aber nicht mit den Maaßen zusammenstimmt, nach denen die Ohren nicht kürzer als bei den andern Arten dieser Abtheilung sind. Die äußern Nägel der Zehen sind sehr kurz und ragen kaum über die Zehenballen vor. Die Farbe der Oberseite ist aschbraun, mit weinröthlichem oder purpur rostfarbigem Anfluge; die Seiten blaß weingrau, die Unterseite schmutzig gelblichweiß. Der Kopf ist blaß braun mit der gewöhnlichen weißen Wangenzeichnung; das Hinterhaupt zeigt eine undeutliche schwarze Linie; die Ohren sind innen blaß behaart, außen dunkel. Unmittelbar hinter der Einlenkung der Vorderglieder findet sich auf dem Leibe ein rostschwarzer Fleck; die Vorderfüsse sind braun. Der Schwanz ist auf der vordern Hälfte ähnlich dem Körper gefärbt; auf der hintern ist er mit steifen schwarzen, ohngefähr 1″ lang überragenden Haaren besetzt.

Körper	21″	0‴	Ohr	1″	11‴
Schwanz	16	0	Hinterfuß	5	0

Diese Art wurde vom Capt. G. Grey in der Hannover-Bay an der nordwestlichen Küste Neuhollands entdeckt und zwei Exemplare (Männchen und Weibchen) nach England eingesendet. Sie hält sich bei Tags auf den höchsten und steilsten Felsen auf und kommt nur Morgens und Abends in die Thäler zur Weide herab. Von den beiden vorhergehenden Arten

unterſcheidet ſie ſich durch den Mangel eines ſchwarzen Bandes an den Seiten, als deſſen Ueberreſt der ſchwarze Fleck hinter dem Oberarme anzuſehen iſt, ferner durch lichtere Färbung, viel kürzere Behaarung, und minder buſchigen Schwanz.

29. H. inornatus Gould, das ungezierte Felskänguruh; flavido-cinereus, subtus albidus; humeris canescentibus; antibrachiis, tarsis auriculisque arenaceo-cinereis.

Petrogale inornata. Gould proceed. X. (1842) p. 5; Mocropod. part 2. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 175.

Nach Gould's Beſchreibung iſt die Hauptfarbe der Oberſeite ſandgrau (sandy grey), über die Schultern graulich und viel lichter an den Seiten; eine undeutliche Linie von lichterem Tone verläuft längs des Geſichts unterhalb des Auges; ein trübrother Fleck findet ſich hinter dem Ellenbogen. Die Unterſeite iſt ſandweiß, was am untern Theil des Bauches ins Rothe zieht; Vorderarme und Tarſen ſandgrau, an den Zehenſpitzen ins Dunkelgraue übergehend. Die Wurzelhälfte des Schwanzes iſt ſandbraun, das Uebrige ſchwarz; die erſtere Farbe erſtreckt ſich längs der Schwanzſeiten bis auf einige Entfernung von der Spitze. Die Ohren ſind ſandgrau, am innern Rande mit einer ſchmalen dunkelbraunen Linie eingefaßt; ein dunkler Fleck am Hinterhaupt zieht in einer dunkeln Linie zur Stirne herab.

Körper	22″ 9‴	Ohren	1″ 10½‴
Schwanz	15 3	Hinterfuß	5 3

Wurde von Bynoe an der nördlichen Küſte Neuhollands entdeckt, und unterſcheidet ſich von den drei vorgehenden Arten durch den Mangel von Abzeichnungen an den Seiten und die lichte Farbe der Hinterſeite der Ohren und der Füſſe.

30. H. concinnus Gould, das zwergige Felskänguruh; omnium minimus, ferrugineo-rufus, albido nigroque adspersus, subtus flavido-albus; cauda versus apicem pilis albidis, nigro-apiculatis vestita.

Petrogale concinna. Gould proceed. 1842. p. 57. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 177.

Man kennt bis jetzt von dieſer Art nur ein einziges Exemplar, das noch nicht vollſtändig erwachſen war, da der letzte Backenzahn nur wenig

über sein Fach vorragte. Seiner Größe nach schließt es sich an die kleineren Beutelhasen an und zeichnet sich überdieß durch seine lebhafte Färbung aus. Der Pelz ist ziemlich lang und weich, lebhaft rostroth, aber auf dem Rücken weiß und röthlichschwarz gesprenkelt; die Unterseite ist gelblichweiß. Die Haare des Rückens sind am Grunde grau, dann lebhaft rostroth, hierauf ein breiter weißer Ring mit dunkel rostbrauner Spitze. Auf der Unterseite sind die gelblichweißen Haare am Grunde grau. Der Kopf ist oben blaß aschfarbig, etwas rostig überlaufen; die Wangen sind rostweiß, mit einem undeutlichen graubraunen Streif vor den Augen; die Ohren sind außen bräunlich, innen mit einigen weißen Haaren. Auf dem Hinterhalse findet sich ein unbestimmter dunkler Mittelstreif. Die Vorderglieder fallen ins Weißliche, die Hinterglieder sind blaß rostfarbig, die Hinterfüsse bräunlichweiß, etwas braun gesprenkelt. Der Schwanz ist an der Wurzel mit Haaren ähnlich denen des Körpers besetzt, dann werden sie allmählig länger, bis sie an der Spitze gegen 1½″ erreichen und sind von bräunlichweißer, schwarz zugespitzter Farbe. — Der vorderste Schneidezahn ist der größte und der hintere hat eine tiefe Furche hinter der Mitte.

Körper	13″ 9‴	Ohr	1″ 3‴
Schwanz	9 9	Hinterfuß	4 0

Wurde von der Expedition des Schiffes Beagle an der Nordwestküste Neuhollands entdeckt.

VII. Familie.

Glirina. Beutelnager.

Dentes primores $\frac{2}{2}$ cestriformes, canini nulli; intestinum coecum breve.

XVI. PHASCOLOMYS. Wombat.

Corpus grave crassum; pedes 5-dactyli unguibus longis fossoriis praediti; caudae loco tuberculum.

Zur bisher einzigen Art dieser Gattung ist seit meiner frühern Beschreibung eine zweite hinzugekommen, von der man jedoch zur Zeit lediglich den Schädel kennt.

1. **Ph. fossor** Geoffr., der gemeine Wombat; **supra griseo-fuscus, subtus sordide albidus.**

Phascolomys fossor. Wagn. Schreb. Supplem. III. S. 213. — Ph. Wombat. Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 246. tab. 3. fig. 1. (Schädel). — Ph. fuscus. Owen, cyclop. of anatom. III. p. 267. fig. 93. (Vorderschädel); odontograph. I. p. 393. tab. 100. fig. 9. (Vorderschädel). — Verreaux compt. rend. XXVI. p. 222.

Zu unserem ersten Exemplare ist seitdem ein zweites, zuleich mit dem Skelet hinzugekommen und in der Färbung mit jenem übereinstimmend. An diesen Skelete, das erst halbwüchsig ist, zähle ich 7 Halswirbel, 15 Rückenw., 4 Lendenw., 8 Kreuzw. und 8 Schwanzwirbel = 42 Wirbel. Zu bemerken ist noch, daß sämmtliche Zähne bleibende Zahnpulpen haben und ächter Wurzeln ermangeln.

Die Heimath ist Neu-Südwallis, das südliche Neuholland, Vandiemensland und einige Inseln der Baßstraße. Der Wombat wird seines Fleisches wegen sehr geschätzt. Wo er niedere Gegenden bewohnt, gräbt er sich selbst Höhlen; auf den Höhen wählt er die Felsenklüfte. Er scheut die Kälte nicht, indem ihn Verreaux auf hohen und während eines Theils des Jahres selbst mit Schnee bedeckten Bergen antraf.

2. **Ph. latifrons** Owen, der breitstirnige Wombat; **ossa frontalia lata, processu post orbitali praedita; dentes primores antice latissimi.**

Phascolomys latifrons. Owen proceed. 1845; ann. of nat. hist. XVII. p. 128. — Waterh. nat. hist. of mamm. I. p. 252.

Owen hat diese Art von der vorhergehenden nach einem Schädel unterschieden, der ihm durch den Gouverneur Grey aus Südaustralien überschickt worden war. Als Hauptdifferenzen sind zu bezeichnen, daß bei dem neuholländischen Ph. latifrons die Schneidezähne auf der Vorderseite am breitesten sind, während sie bei Ph. fossor aus Vandiemensland die größte Breite an der Seite zeigen. Bei dieser Art sind ferner die Nasen- und Stirnbeine breiter als bei jener und die Augenhöhlengegend zeigt eine stark markirte obere Orbitalleiste und einen hintern Orbitalfortsatz, welche beide letzterer fast ganz abgehen. Die Schläfengruben sind nicht, wie bei Ph. fossor, von zwei fast parallelen Leisten begrenzt, sondern setzen sich in einer Wölbung auf der Oberfläche des Schädels fort. Zur Vergleichung folgen nachstehende Maaße.

	Ph. latifrons.		Ph. fossor.	
Ganze Länge des Schädels	6″	3‴	8″	1‴
Größte Breite (hinten an den Jochbögen) . . .	5	0	5	9
Länge der Naſenbeine	2	0	2	11
Hintere Breite derſelben	2	5	2	2
Breite der Stirnbeine in der Augenhöhlengegend .	2	9	2	6
— der obern Schneidezähne	0	9	0	9
— der untern „ „	0	6	0	8

Vergeblich hat ſich Waterhouſe bemüht unter den in den Londner Sammlungen aufgeſtellten Exemplaren eines ausfindig zu machen, das in der Beſchaffenheit ſeiner Schneidezähne mit dem Ph. latifrons übereinkäme. Die Differenzen im äußern Habitus bleiben demnach noch zu ermitteln übrig.

Anhang.

Zusammenstellung der früheren und jetzigen Zählung der Arten der Beutelthiere.

Namen der Gattungen.	Zahl der Arten nach meiner Aufnahme von 1853.	Zahl der Arten nach meiner Aufnahme von 1842.	Zahl der Arten nach Waterhouse.	Neu zugekommene Arten seit meiner ersten Bearbeitung.
Thylacinus	1	1	1	0
Dasyurus	5	4	5	2
Phascologale	15	6	13	9
Myrmecobius	1	1	1	0
Perameles	8	6	9	2
Choeropus	1	1	1	0
Didelphys	33	18	34	15
Chironectes	1	1	1	0
Tarsipes	1	0	1	1
Phalangista	14	13	12	4
Petaurus	6	7	5	1
Phascolarctos	1	2	1	0
Dendrolagus	2	2	2	0
Hypsiprymnus	9	7	9	5
Halmaturus	30	24	30	14
Phascolomys	2	1	2	1
	130	94	127	54

Zur Erläuterung der vorstehenden Tabelle habe ich einige Bemerkungen beizufügen. In meiner ersten Bearbeitung der Beutelthiere sind im Ganzen 94 Arten aufgeführt; diese Summe muß jedoch reducirt werden, weil darunter, wie sich bei genauerer Bekanntwerdung mit dieser Ordnung herausgestellt hat, mehrere Nominalarten mitgezählt sind. Es sind nämlich unter Dasyurus 1, unter Phalangista 3, unter Petaurus 2, unter Phascolarctos 1, unter Hypsiprymnus 3 und unter Halmaturus 8 solcher Nominalarten inbegriffen. Deshalb sind in der obigen Summe von 94 Arten die 18 Nominalarten auszuscheiden, so daß in meiner ersten

Bearbeitung von 1842 eigentlich nur 76 ächte Arten aufgeführt worden ſind. Der Zuwachs in meiner neuen Bearbeitung von 1853 beträgt daher nicht weniger als 54 Arten.

Das Erfreuliche hiebei iſt nicht ſowohl die anſehnliche Vermehrung der Species als vielmehr die ſeitdem erlangte genaue Kenntniß derſelben, ſo daß höchſtens drei oder vier darunter ſeyn mögen, deren Feſtſtellung noch beſſer zu begründen iſt. Die meiſte Bereicherung haben die Beutelratten und die Springer erhalten: erſtere hauptſächlich durch die von mir publicirten Entdeckungen Natterer's, letztere vornämlich durch die von Gould, der zur Bearbeitung ſeiner großen Kupferwerke über die Säugthiere und Vögel Auſtraliens dieſen Welttheil ſelbſt bereiſt hat. Bei meiner erſten Bearbeitung lagen mir weder die von Natterer gemachten Entdeckungen, noch die beiden ausgezeichneten Monographien von Waterhouse[1]) zur Benützung vor; ſelbſt von Gould's Monograph of the Macropodidae kam mir das erſte Heft erſt beim Drucke des letzten Bogens zu. Daher konnte meine frühere Arbeit nicht anders als ſehr mangelhaft ausfallen, und es gereicht mir zur nicht geringen Befriedigung, daß ich jetzt in den Stand geſetzt worden bin, dieſelbe in einer neuen, weſentlich und allſeitig verbeſſerten und mit den zahlreichen neueren Entdeckungen vermehrten Auflage erſcheinen zu laſſen.

---

1) Zuerſt in der Naturalist's Library vol. XI. 1841 und dann in der Natural History of Mammals vol. I. 1846.

IV. Ordnung.

Wiederkäuer. RUMINANTIA.

Nicht sowohl der Zuwachs an neuen Arten, deren Betrag nicht sonderlich groß ist, als vielmehr, und was weit wichtiger ist, eine genauere Kenntniß, die seit meiner früheren Bearbeitung der Wiederkäuer von sehr vielen zweifelhaften oder doch nur unvollständig gekannten Arten erworben wurde, hat ansehnliche Nachträge nothwendig gemacht. Die meisten Zusätze waren in den beiden Gattungen der Hirsche und Antilopen nothwendig, daher ich bei diesen auch alle Arten systematisch aufgezählt habe, um die neuen Zusätze am gehörigen Orte einreihen zu können. Zugleich habe ich mich bemüht, die übergroße Anzahl von Untergattungen oder Gattungen, in welche in neuerer Zeit die Hirsche und Antilopen vertheilt wurden, auf einen geringeren Bestand zu bringen, weil mit der Ueberhäufung derselben die Uebersicht, statt erleichtert, nur erschwert wird. Wo nur immerhin Merkmale, vom Schädel- und Zahnbau entnommen, hülfreiche Dienste leisten konnten, habe ich diese zur Charakteristik der Gruppen beigezogen.

Kurz nach der Publikation meiner früheren Monographie vom Jahre 1844 erschien Carl Sundevall's [1]) methodische Uebersicht der wieder-

1) K. Vetenskaps-Akademiens Handlingar för år 1844; deutsch übersetzt von Hornschuch im Archiv skandinav. Beiträge z. Naturgesch. II. S. 78.

käuenden Thiere, Linne's Pecora, eine ausgezeichnete umfassende, auf reicher Autopsie beruhende und kritisch durchgeführte Arbeit, welche in systematischer Reihe alle Familien, Gattungen und Arten aufzählt und durch genaue Diagnosen charakterisirt.

Die überaus günstige Gelegenheit, welche sich in England für J. E. Gray [1]) darbot, die meisten der hieher gehörigen Thiere nicht blos in ausgestopften, sondern auch in lebenden Exemplaren zu beobachten, hat er ebenfalls benützt, um eine systematische Bearbeitung der ganzen Ordnung zu liefern. Die Kenntniß der Arten hat durch ihn sehr gewonnen, nur können wir mit ihm bezüglich der übergroßen Vervielfältigung der Gattungen nicht einverstanden seyn. Mit Auszeichnung ist hier noch zu nennen, das prachtvolle Kupferwerk: Gleanings from the Menagerie and Aviary at Knowsley Hall (Hoofed Quadrupeds) 1850. Es ist auf Kosten des um Förderung der Naturwissenschaften hochverdienten Earl von Derby herausgegeben und die Zeichnungen sind größtentheils nach Thieren, die er in seinem großen Thiergarten unterhielt, gefertigt.

Die neue Anordnung, welche Owen mit den Hufthieren überhaupt vorgenommen hat, wird bei der Ordnung der Dickhäuter zur Sprache gebracht werden [2]).

---

1) Eine systematische Charakteristik der ganzen Ordnung findet sich von ihm in dem oben angeführten Kupferwerke: Knowsley Menagerie.

2) Als Abhandlungen allgemeineren Inhaltes sind nachstehende in Erwähnung zu bringen.

Hyrtl's Untersuchungen über die Nasal-Wundernetze der Wiederkäuer und Pachydermen (Denkschrift. der kaiserl. Akadem. d. Wissensch. Wien. I. Band.)

Joseph Maclise lieferte in die Cyclopaedia of Anatomy Part. 35 über das Skelet einen sehr interessanten Artikel, in welchem er besonders die Einheit in der Mannigfaltigkeit der Formen nachzuweisen sich bemühte.

Von größter Wichtigkeit ist in demselben Part 37 und 38 (p. 864—935) der von Owen bearbeitete Artikel über die Zähne, in welchem besonders die Erörterung des mikroskopischen Baues und des Zahnwechsels von größter Bedeutung ist. Hieran ist weiters einzureihen, was derselbe Verfasser am Schlusse seiner Abhandlung über die Entwicklung der Backenzähne bei den Warzenschweinen (Philosoph. Transactions. 1850. 2 p. 481) zur Erläuterung seiner Bezeichnung der Zähne beibringt.

I. Familie.

Cervina. Hirschthiere.

1. MOSCHUS. Moschusthier.

In meiner frühern Bearbeitung sind 7 Arten aufgezählt, von denen jedoch die 3 letzten: Moschus fulviventer, Stanleyanus und aquaticus, nicht befriedigend charakterisirt waren. Seitdem ist letzterem Mangel abgeholfen worden und es hat sich dadurch gezeigt, daß M. fulviventer als selbstständige Art nicht zu halten ist, während M. aquaticus eine eigne Untergattung rechtfertigt, und M. Stanleyanus in seinen Artrechten sich bewährt hat. Statt der ausfallenden Nominal-Species M. fulviventer habe ich dagegen jetzt den M. chrysogaster in der Reihe der Arten aufgenommen, so daß dadurch die Gesammtzahl derselben nicht alterirt worden ist.

†) **metatarsus osseus impartitus.**

1. Subgen. Moschus; metatarsi toti pilosi, vellus longum rude, cauda subnulla, folliculus maris umbilicalis moschiferus.

1. M. moschiferus Linn., das ächte Bisamthier; fuscus, subtus pallidior.

Moschus moschiferus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 330. — Sundev. K. Vetensk. Acad. Handl. 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 138. — Eversm. bullet. de Moscou. 1848. p. 197. — Gray, Knowsley Menag. p. 41. — v. Middend. sibir. Reise. Säugth. S. 118. — Horsf. catal. mus. East-Ind. Company p. 179. — M. saturatus. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. of Bengal VIII. p. 203; X. p. 795; XI. p. 285. — M. sibiricus. Gray l. c. p. 41.

Ich habe schon früher erwähnt, daß man nach der Verschiedenheit der Moschusbeutel auch auf spezifische Verschiedenheit der Moschusthiere selbst geschlossen hat. Dieß ist namentlich von Th. Martius geschehen, der die Unterschiede in der Beschaffenheit der Moschusbeutel in genauen

---

Hinsichtlich der geographischen Verbreitung der Wiederkäuer verweise ich auf meine Abh. über die geograph. Verbreitung der Säugthiere in den Abh. der mathem. physikal. Klasse der k. bayr. Akadem. der Wissensch. IV.

Beschreibungen und Abbildungen erläuterte und dabei den sogenannten tibetanischen den ersten Rang zuerkannte. Auch Eversmann forderte zu Vergleichungen des altaischen Bisamthieres mit dem tibetanischen auf, ob nicht dieselben 2 verschiedne Arten bilden möchten, indem der altaische Moschusbeutel hinsichtlich seiner medizinischen Kräfte von ganz anderer Beschaffenheit als der tibetanische wäre, denn während jener fast in Unwerth stünde und zu Zeiten um ½ Silberrubel gekauft wurde, würde letzterer gegen 15 bezahlt.

Hodgson, der in Nepal eine Menge dieser Thiere im freien Zustande und in der Gefangenschaft zu beobachten Gelegenheit hatte, glaubte wirklich Differenzen genug zu finden, um nicht blos die tibetanischen und nepalschen Individuen von den sibirischen zu unterscheiden, sondern unter jenen sogar 3 verschiedne Arten zu erkennen, die er Moschus saturatus, leucogaster und chrysogaster benannte. In dieser Meinung stimmte ihm, nach Ansicht eingesendeter Felle, Gray bei, nur daß er in dem tibetanischen M. saturatus den ächten M. moschiferus sehen wollte, während er den altaischen und sibirischen als M. sibiricus Pall. bezeichnete. Sehen wir einstweilen von M. leucogaster und chrysogaster ab, die gleich nachher zur Sprache kommen werden, so giebt Gray für seine beiden andern Arten folgende Merkmale an: 1) M. sibiricus, aschbraun, unten lichter, Kehle schwarz oder aschfarbig, jederseits mit deutlichem weißen Streifen; 2) M. moschiferus (M. saturatus Hogds.), dunkelbraun, Brust und Unterleib lichter, Kehle und Unterleib mit undeutlichen blassen Querbinden. Hodgson selbst bemerkt, daß es schwer hält den M. saturatus, der hauptsächlich an den tibetanischen Abhängen des Himalaya sich aufhält, von M. moschiferus Linn. zu unterscheiden, außer durch die gröbere Struktur des Moschusbeutels und die geringere Qualität und Quantität seines Inhaltes. Mit Europa sei der Handel mit Moschusbeuteln in Abnahme, dagegen würden noch viele Beutel nach China gesendet und zwar hauptsächlich von M. chrysogaster.

Man sieht, daß die vorstehenden Angaben nicht ausreichend sind, um den tibetanischen Moschus saturatus von dem eigentlichen M. moschiferus specifisch zu trennen, indem die von Gray angegebenen Differenzen zu geringfügig und blos auf eine leichte Wandelbarkeit in der Färbung

gegründet sind, während der Nachweis, daß den Verschiedenheiten in der Form und Qualität der Beutel auch solche in der Form oder doch in der Färbung der Thiere selbst entsprechen, nicht beigebracht ist. Auch in der Form und Qualität der amerikanischen Castorsäcke giebt es erhebliche Abweichungen, ohne daß jedoch wirkliche Differenzen an den Thieren selbst beobachtet worden wären. Ein Gleiches wird für den M. moschiferus gelten.

Noch ist zu erwähnen, daß Hodgson[1]) eine eigenthümliche Drüse in dem Schwanzrudimente des Moschusthieres entdeckt hat.

2. **M. chrysogaster** Hodgs., das gelbbäuchige Bisamthier; cano-fuscus; gastraeo, auriculis, orbitis artubusque intus splendide fulvis.

Moschus chrysogaster. Hodgs. l. c. p. 203. — Wagn. a. a. O. — Gray l. c. p. 42.

---

1) Journ. of the Asiat. soc. X. 2 (1841) p. 795 mit Abbildung. Ich theile hier die Beschreibung von Hodgson mit. Der Schwanz ist etwas mehr als 1″ lang und an seiner Wurzel fast so breit als lang, dreieckig, niedergedrückt und nackt, insbesondere an der Oberfläche, unterhalb welcher, gleich dem benachbarten Afterrande, er theilweise mit weichen Haaren bedeckt ist. An seiner Spitze findet sich ein Bündel von Haaren, die so grob wie die des Körpers sind, und von Außen den allein sichtlichen Theil des Schwanzes ausmachen, weil das Uebrige von den Rumpfhaaren bedeckt ist. Erst wenn man diese aufhebt, sieht man den wirklichen nackten, dicken und fetten Schwanz, um welchen die Haare mit einer klebrigen Flüssigkeit zusammengeklebt sind. Es besteht nämlich der ganze Schwanz, zumal auf seiner Oberseite, aus einer festen, soliden Drüse, ohngefähr $\frac{3}{8}$ bis $\frac{1}{2}$ Zoll dick, welche die erwähnte klebrige Flüssigkeit absondert und sie langsam, aber ohne Intermission, vermittelst zweier Oeffnungen, eine an jeder Schwanzseite, ausfließen läßt. Diese Oeffnungen bestehen aus Längsfalten der Haut, sind schmal elliptisch, ohngefähr $\frac{1}{4}$ Zoll lang und haben dicke, gerundete, aber nicht sehr bewegliche Ränder. Wird die Drüse stark gedrückt, so fließt das Sekret in einem dicken Zustande gleich Vermicellen aus; gewöhnlich aber kommt es in einer flüssigeren, ausgelassenem Honig ähnlichen Beschaffenheit hervor, und wird fest, sobald es an den Rändern der Oeffnungen trocknet. Es hat einen starken, eigenthümlichen, sehr widerwärtigen, durchaus nicht moschusartigen Geruch. Dieses drüsige Organ fand Hodgson bei 3 frischen Exemplaren von M. saturatus, glaubt jedoch es auch an den getrockneten Fellen von M. chrysogaster und leucogaster erkannt zu haben. Leider sagt er nicht, welchen Geschlechtes die untersuchten Exemplare waren.

* **M. leucogaster** Hodgs., das weißbäuchige Bisamthier; saturate fuscus, gastraeo auriculisque intus pure albis.

Moschus leucogaster. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. VIII. p. 203. — Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 331. — Gray Knowsley Menag. p. 41. — Horsf. catal. p. 177.

Nach den von Hodgson an das brittische Museum überschickten Fellen charakterisirte Gray den M. leucogaster als: „dunkelbraun, Kehle, Brust, Unterleib und Innenseite der Ohren rein weiß;" den M. chrysogaster als „graubraun, Ohren, Augenringe, Kehle, Brust, Unterleib und Innenseite der Gliedmassen prächtig gelb." — Wenn wir nun auch mit Gray geneigt sind, den M. chrysogaster für eine selbstständige Art anzuerkennen, so bleibt uns dagegen bezüglich des M. leucogaster das Bedenken, ob er nicht als bloses Farbenspiel des M. saturatus oder M. chrysogaster anzusehen sey. Hinsichtlich des Wohnortes macht Hodgson bemerklich, daß seine 3 Arten häufig in den hohen Gebirgen des Innern von Tibet sich aufhalten, hauptsächlich gegen die chinesische Grenze hin, wo M. chrysogaster fast ausschließlich gefunden wird.

2. **Subgen. Tragulus Gray; metatarsi postice nudi subcallosi; vellus adpressum, haud maculatum.**

3. **M. Stanleyanus** Gray, das fuchsrothe Moschusthier; „rufo-fulvus, pedum statura ut T. Meminnae, nuditas juguli pedumque et pictura juguli ut T. Napu; cauda vix ulla." Sundev.

Moschus Stanleyanus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 337. — Gray Knowsley Menag. p. 43. tab. 33. — Tragulus ecaudatus Temm. Sundev. K. Vetensk. Acad. Handl. 1844; Archiv skand. Beitr. II. S. 139.

Auf Ceylon einheimisch und von der folgenden Art schon durch den ganz rudimentären Schwanz verschieden.

4. **M. Napu** Fr. Cuv., der Napu.

Moschus Napu. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 333. — Sundev. l. c. — M. javanicus. Gray Knowsley Menag. p. 43. tab. 35. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 269.

Der Name M. javanicus darf für diese Art nicht beibehalten oder, wie es Gray gethan, restituirt werden, da sie nach S. Müller auf

Java gar nicht vorkommt, ſondern auf Sumatra und Borneo einheimiſch iſt, außerdem bewohnt ſie noch die malayiſche Halbinſel.

5. M. Kanchil Raffl., der Kanchil.

Moschus Kanchil. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 334. — Tragulus Kanchil. Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 263. — Tr. pygmaeus. Sundev. pecora 1844; Archiv II, S. 139. — Gray Knowsley Menag. p. 43. tab 34. — Moschus fulviventer Gray. Wagn. a. a. O. S. 337.

Kommt innerhalb der ſundaiſchen Inſeln nicht, wie es noch neuerdings Gray und Cantor angeben, auf Sumatra, ſondern lediglich auf Java vor; außerdem zahlreich auf Singapore, Pinang, Lancavy-Inſel und der malayiſchen Halbinſel. Die Färbung und die Vertheilung der Streifen bietet mancherlei Abänderungen dar; eine ſolche iſt Gray's M. fulviventer.

3. Subgen. Meminna Gray; metatarsi postice pilosi (prominentia nuda cornea sub calce excepta); vellus adpressum maculatum, ossa intermaxillaria nasalibus conjuncta.

6. M. Meminna Erxl., die Meminna.

Moschus Meminna. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 332. — Sundev. K. Vetensk. Acad. Handl. 1844; Archiv ſtand. Beitr II. S. 139. — Meminna indica. Gray Knowsley Menag. p. 42. tab. 32.

Bewohnt Vorderindien und Ceylon.

††) metatarsus osseus bipartitus.

4. Subgen. Hyomoschus Gray; metatarsi postice pilosi (area nuda cornea sub calce excepta); vellus adpressum maculatum, ossa intermaxillaria a nasalibus disjuncta.

7. M. aquaticus Ogilb., das afrikaniſche Moſchusthier; fulvofascus; gastraeo, striis maculisque albis. — Tab. 25.

Moschus aquaticus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 338. — Falconer proceed. zool. soc. 1843. — Hyemoschus aquaticus. Gray ann. of nat. hist. XVI. p. 350; Knowsley Menag. II. p. 42. tab. 31.

Dieſe Art erregte ſchon bei ihrer erſten Bekanntwerdung die Aufmerkſamkeit der Zoologen in nicht geringem Maaße, weil ſie in einem Continente gefunden wurde, in welchem man ein Moſchusthier gar nicht erwartet hatte. Noch befremdlicher aber war es, als man die Entdeckung machte, daß bei dieſer Art Mittelhand und Mittelfuß nicht aus einem ein-

zigen Knochen besteht, sondern aus zweien zusammengesetzt ist; ein Fall, der bei allen andern lebenden Wiederkäuern nicht weiter vorkommt als höchstens im Foetalzustande, übrigens in der Ausfurchung des Mittelhand- und Mittelfußknochens der übrigen Wiederkäuer bereits eine Andeutung findet. Das afrikanische Moschusthier ist am nächsten der Meminna verwandt, unterscheidet sich aber äußerlich schon gleich dadurch, daß der weiße Längsstreif an den Seiten bei letzterer Art sich nicht findet. Die Heimath ist Sierra Leone und es wird gesagt, daß dasselbe seine Nahrung im Wasser suchen soll; eine Behauptung, die der Earl of Derby nach den in seiner Menagerie lebenden Individuen nicht bestätigen konnte.

Herr Obermedizinalrath Dr. Jäger hatte die Gefälligkeit, mir von dem Exemplare, das vor Kurzem die Sammlung in Stuttgart erhalten hatte, eine ausführliche Beschreibung zukommen zu lassen, die ich im Nachstehenden mittheile.

Das Fell kam vortrefflich zubereitet, aber nur mit etlichen Skelettheilen von der Vei-Küste von Westafrika. Die Maaße des ausgestopften Thiers dürften von denen des lebenden nicht viel abweichen, indem die Kunstfertigkeit des Präparators Ploucquet auch gerade in dem Zutreffen der Verhältnisse nach Analogie anderer verwandter Thiere sich bewährt zu haben scheint. Die Länge des Kopfes von der Spitze der Schnautze bis zu dem vorderen Augenwinkel beträgt 2 ½″, bis zu der Mitte zwischen den Ohren 5″ 4‴, von da bis zur Schwanzwurzel 1′ 9″, die Länge des (knöchernen) Schwanzes 4″ 3‴; die Länge der Ohren 1″ 5 — 6‴, die größte Breite 1″ ohngefähr. Die Höhe an der Schulter mißt nahezu 12″, die am Kreuze 14″.

Die Hauptfarbe ist röthlichbraun, durch die vielen zwischen die bräunlich-olivenfarbige Grundfarbe gemischten röthlich-lohfarbigen Haare. Die nackte Nase ist schwarz. Der vordere obere Theil des Kopfs bis zu den Augen schwärzlich braun, Scheitel bis zwischen die Ohren schwärzlich kastanienbraun. Diese Farbe zieht sich in einem ovalen Streifen rückwärts um die Basis der Ohren; über demselben und unmittelbar vor den Ohren, sowie über und unter den Augen ist die röthliche Farbe vorherrschend, die äußere hintere Fläche der Ohren ist kastanien- oder schwärzlich-braun; die vordere Fläche größtentheils nackt oder mit kurzen schwärzlichen Haa-

ren besetzt. Der Nacken hat die Farbe des übrigen Körpers, doch mit mehr röthlichbrauner Beimischung; die hintere Grenze des Halses bildet ein schwarzbrauner Querstreif, der bis zum Oberarme reicht und hier mehr ins Röthliche übergeht. Von hier an zieht sich ein rein weißer 5 — 6‴ breiter Streifen bis zur Inguinalgegend in gerader Richtung, von wo er sich, blasser und schmaler werdend, bis zur Aftergegend fortsetzt. Diesem Streifen entlang, jedoch nicht ganz parallel, ziehen sich 3 bis 4 blassere, mehr gelblichweiße Seiten-Streifen von vorne nach rückwärts bis über den Schenkel, so wie nach vornen einer derselben über den Oberarm. Oberhalb des weißen Längsstreifens, etwa 1½″ von dem dunkeln Querband am Ende des Nackens, sind auf der linken Seite 6 weiße Flecken in einen nach oben offenen Halbkreis gestellt, der auf der rechten Seite nur durch 3 einzelne Flecke repräsentirt ist. Sofort ziehen sich von der weißen Seitenlinie, aus 5 — 6 einzelnen weißen Flecken bestehende, etwas nach vornen gerichtete Bänder zu beiden Seiten bis zur Mitte des Rückens, nehmen aber an Zahl und Reinheit der weißen Farbe bis zu dem letzten über der Schwanzwurzel befindlichen Bande ab. Der Schwanz ist mit 1½ bis 2″ langen, auf der oberen Seite röthlichbraunen, auf der unteren Seite weißen Haaren besetzt, die letztere über die Schwanzspitze etwas buschig hervorragen.

An der Unterseite des Körpers entspringt vom Kinn und dem untern Rande des Unterkiefers ein rein weißer 4 — 3‴ breiter Streifen, der bis über die Mitte der Seite des Halses reicht. Von der Mitte des Kinns beginnt sodann mit dem vorigen gemeinschaftlich ein bis zum untern Drittheil des Halses allmählig breiter werdendes weißes Band, von wo aus zu jeder Seite ein 5 — 6‴ breiter Streifen bis zum untersten Theile des Halses sich fortzieht, indeß die Mitte der Bandes, allmählig breiter werdend, links und rechts die innere Seite des Oberarms in einem Bogen überzieht, so daß die ganze Vorderbrust rein weiß ist. Von da an verengert sich die weiße Farbe, so daß sie von der Mitte des Bauchs nur noch als ein schmaler Streif sich bis zu der Schamgegend erstreckt. — An der äußeren Seite der Füsse geht die allgemeine Farbe von den Fußwurzelknochen an in das Schwärzliche über, auf der innern Seite ist an den Vorderfüssen zunächst der Fußwurzel ein blasser weißer Fleck;

an den Hinterfüſſen geht von dieſer Stelle ein weißer Streifen, nach oben breiter werdend, in die weißgrauen längeren Haare der Schamgegend über, iſt jedoch durch ein ſchmales Band von gewöhnlicher Hautfarbe unterbrochen. Die obere Seite der Phalangen aller Füſſe iſt durch einen weißen, der Länge nach beide erſten Phalangen bedeckenden Fleck ausgezeichnet. Die Klauen und Afterklauen ſind ſchwarz; letztere ſpitzig nach unten gerichtet.

II. CERVUS. Hirſch.

Drei monographiſche Bearbeitungen dieſer Gattung ſind ſeit meiner früheren Publikation erſchienen, nämlich die von Sundevall[1]), Gray[2]) und Pucheran[3]).

Sundevall hat aus der Linneiſchen Gattung 5 errichtet: Alces mit 1 Art, Rangifer mit 1, Cervus mit 31, Capreolus mit 2 und Prox mit 6 Arten, im Ganzen alſo 41 Species, welche durch kurze Diagnoſen charakteriſirt werden.

Gray hat aus den Hirſchen 15 Gattungen gebildet, die er in folgende 5 Gruppen vertheilt.

1) Elchhirſche, Alces mit 1 Art.

2) Rennhirſche, Tarandus mit 1 Art.

3) Edelhirſche mit einem Augenſproſſen, breiter, von der Lippe durch eine Haarbinde getrennter Muffel, und einem Haarwulſt auf der Hinterſeite des hintern Mittelfuſſes oberhalb der Mitte des letzteren. Cervus mit 6 Arten, Dama mit einer Art.

4) Ruſahirſche, mit Augenſproſſen, hoher, von dem Lippenrande nicht getrennter Muffel, und einem Haarwulſte oberhalb der Mitte des

---

1) K. Vetenskaps-Academiens Handlingar för år 1844; überſ. im Archiv ſtand. Beitr. II. S. 129 u. f.

2) Zuerſt in der Knowsley Menagerie II. (1850) p. 55; dann in den ann. of nat. hist. sec. ser. IX. (1852) p. 413.

3) D'Orbign. dict. univ. d'hist. nat. III. (1843), Artikel Cerf.; dann ausführlich in den Archives du Muséum VI. (1852) p. 265—492 mit 9 Tafeln.

hinteren Mittelfußes. Panolia mit 1 Art, Rucervus mit 1, Rusa mit 7, Axis mit 1, Hyelaphus mit 1, Cervulus mit 3 Arten.

5) Rehhirsche, ohne Augensprossen, der erste Ast in einiger Entfernung von der Basis abgehend, die Thränenfurche gewöhnlich klein. Capreolus mit 2 Arten, Furcifer mit 2, Blastocerus mit 2, Cariacus mit 4, Coassus mit 5 Arten.

Im Ganzen sind es also 38 Arten, welche Gray hier aufführt, von denen aber mehrere noch nicht hinlänglich sicher gestellt, andere wohl begründete Arten unterdrückt oder confundirt sind, was zum Theil davon herrührt, daß er weder meine, noch Pucheran's Arbeiten zu Rathe gezogen hat; übrigens soll ihm das Verdienst, zur genauern Unterscheidung der Gruppen und Arten schätzbare Beiträge geliefert zu haben, ungeschmälert bleiben.

Die wichtigste Monographie über die Hirsche hat Pucheran vorgelegt, unterstützt von dem umfassenden Material der pariser Sammlung. Nicht die Vermehrung der Arten, die nur einen Zuwachs von zweien erfahren haben, ist es, was dieser Arbeit ihren großen Werth verleiht, sondern das umsichtige gründliche Bestreben, die Arten sicher festzustellen, nach ihren Alters- und Geschlechts-Verschiedenheiten bestimmt auseinander zu setzen und die confuse Synonymik zu entwirren. Ein Hauptverdienst hiebei ist seine gründliche Kenntniß und Würdigung der ausländischen Litteratur. Pucheran bringt die Hirsche in 4 Gattungen: Alces, Tarandus, Cervulus und Cervus; nur letztere Gattung ist Gegenstand seiner Bearbeitung und er zerfällt dieselbe in 2 Sektionen: 1) Hirsche mit schaufelförmigen Geweihen, welche blos durch C. Dama vertreten sind, und 2) Hirsche mit runden Geweihen, wohin alle andern Arten gehören. Diese zweite Sektion bringt er wieder in folgende Abtheilungen.

I. Geweihe (an der Spitze) mit mehr als zwei Aesten.

C. virginianus, leucurus, mexicanus, nemoralis, gymnotis, similis, frontalis, macrotis, Duvaucelii, elaphus, barbarus, canadensis, Wallichii.

II. Geweihe (an der Spitze) blos mit zwei Aesten.

a) oberer Ast vom äußern Rande der Stange abgehend.

C. hippelaphus, Peronii, pseudaxis.

b) oberer Ast vom innern Rande abgehend.

C. axis, porcinus.

c) oberer Ast vom hintern Rande abgehend.

C. equinus, marianus, Kuhlii.

d) oberer Ast innen und etwas auswärts abgehend.

C. Aristotelis.

e) oberer Ast in gleicher vorn-hinterer Richtung mit der Stange liegend.

C. capreolus, paludosus, campestris.

III. Geweihe von der Basis an gegabelt.

C. antisiensis.

IV. Geweihe blos einfache Spieße.

C. rufus, rufinus, nemorivagus.

Anhang: systemat. Stellung noch ungewiß.

C. Pudu, chilensis.

Im Ganzen sind es also 31 Arten, welche Pucheran der von ihm enger begrenzten Gattung Cervus zuweist.

Noch habe ich einiger Beiträge zu gedenken, die nach meiner ersten Bearbeitung der Hirsche erschienen und im Nachfolgenden benützt sind.

S. Müller und Schlegel[1]) haben die ausführlichen Beschreibungen der Hirsche des indischen Archipels nachgeliefert und eine gründliche Auseinandersetzung ihrer Arten gegeben.

Für die peruanischen Hirsche hat dieß J. v. Tschudi in eben so gründlicher Weise gethan. Die in Chile vorkommenden Arten haben Gervais und Gay[3]) erläutert und insbesondere schätzbare Aufklärungen über die halb fabelhaften Arten (Capra Pudu und Equus bisulcus) von Molina gegeben, ohne daß doch damit die Sache zum Abschluß gebracht worden wäre. Ueber die brasilischen Hirsche hatte Burmeister[4]) keine Gelegenheit, neue Beiträge zu ihrer Kenntniß beizubringen. Die nord-

1) Verhandel. over de natuurl. geschied. der Nederland. overzeesche bezitt. Zool. I. 1839—1844.

2) Fauna Peruana. I. 1844—46.

3) Historia fisica y politica de Chile por Claudio Gay. Zoolog. I. 1847.

4) Systemat. Uebers. der Thiere Brasiliens. I. 1854.

amerikaniſchen Hirſche ſind von Audubon und Bachman [1]) beſchrieben und abgebildet worden, wobei beſondere Sorgfalt der Schilderung ihrer Lebensweiſe gewidmet wurde; doch auch ihnen war es nicht möglich, einige ſtrittige Arten feſtzuſtellen, und die höchſt mangelhafte Bekanntſchaft mit der deutſchen Literatur, nebſt der Vernachläſſigung der oſteologiſchen Merkmale, hat der gründlichen Erledigung ihrer Aufgabe weſentliche Nachtheile gebracht.

So iſt denn durch die vorſtehend aufgeführten Arbeiten die ſyſtematiſche Kenntniß der Hirſche in bedeutendem Maaße gefördert worden, obwohl immerhin noch Mängel und Lücken genug übrig geblieben ſind, um künftigen Bearbeitern dieſer intereſſanten Gattung ein weites Feld für ihre Thätigkeit zu belaſſen.

Mit Berückſichtigung der eben erwähnten Arbeiten habe ich nun die Arten der Hirſche in folgender Weiſe gruppirt, wobei ich es, bei der großen Uebereinſtimmung in den äußern Formen und ſelbſt im Schädelbaue, nicht für naturgemäß erachtete, den obern Abtheilungen einen höhern Werth als den von Untergattungen beizulegen.

1. Subgen. **ALCE**; **cornua palmam latam formantia, nasus totus pilosus, antice latissimus.**

C. Alces.

2. Subgen. **RANGIFER**; **cornua apice palmata in sexu utroque, ramo basali antrorsum verso; nasus pilosus; ungulae dilatato-subovales.**

C. Tarandus.

3. Subgen. **DACTYLOCEROS**; **cornua summitate longitudinaliter palmata, basi rotundata; nasus apice nudus.**

C. Dama.

4. Subgen. **ELAPHUS**; **cornua rotundata ramosa; rhinarium sinusque suborbitales distincta.**

a) **cornibus retrorsum et extrorsum curvatis, apice furcato subpalmato antrorsum versis, propugnaculo sursum curvato. — Panolia.**

C. frontalis.

---

1) Quadrupeds of North America in 3 Bänden; hievon exiſtirt eine Ausgabe in Quart und eine andere in Oktav.

b) cornibus erectis multiramosis, ramis 3 antrorsum versis, ramo medio distincto. — Cervus.

C. Elaphus, (barbarus), strongyloceros, Wallichii, Sika.

c) cornibus erectis triramosis, ramis 2 antrorsum versis, ramo medio nullo. — Rusa.

C. Duvaucelii, Aristotelis, equinus, Kuhlii, marianus, hippelaphus.

d) cornibus uti c, at corpore maculato. — Axis.

C. pseudaxis, axis, porcinus.

e) cornibus uti c, ramo superiore directe retrorsum verso. — Blastocerus.

C. paludosus, campestris.

f) cornibus plus minus erectis, apice incurvatis, varie furcatis. — Macrotis.

C. macrotis, Richardsonii (Lewissii).

g) cornibus antrorsum et arcuatim curvatis, propugnaculo proprio, ramis ceteris lateri posteriori insidentibus. — Reduncina.

C. virginianus (similis, leucurus), nemoralis, mexicanus, gymnotis, (savannarum).

5. Subgen. CAREOLUS; cornua brevia apice furcata; sinus suborbitales caudaque subnulla.

C. capreolus.

6. Subgen. FURCIFER; cornua brevia, fere usque ad basin furcata; sinus suborbitales majusculi.

C. antisiensis, *chilensis.

7. Subgen. SUBULO; cornua brevia simplicia.

C. rufus, rufinus, simplicicornis.

8. Subgen. CERVULUS; cornua parva simplicia aut propugnaculo brevissimo instructa, cerasphoriis longis imposita.

C. muntjac, stylocerus, Reevesii.

9. Sedis incertae.

C. Pudu.

Demnach zählt meine jetzige Bearbeitung der Hirſche 34 Arten auf, während die frühere nur 32 kannte, von denen überdieß dermalen mehrere der letzteren als Nominalarten eingezogen werden mußten.

I. Subgen. Alce.

Cornua palmam latam formantia, nasus totus pilosus, antice latissimus.

1. C. Alces Linn., der Elch.

Cervus Alces. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 342. — SUNDEV. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 130. — AUDUB. BACHM. Quadrup. 8. II. p. 179. tab. 76. — V. Middend. ſibir. Reiſe II. 2. S. 121. — C. Alces et lobatus. AGASS. Sillim. journ. 1847 p. 436; ann. of nat. hist. XX. p. 142. — Alces Malchis. GRAY Knowsley Menag. p. 56; ann. of. nat. hist. IX. sec. ser. p. 415.

Agaſſiz hat die Meinung ausgeſprochen, daß der amerikaniſche Elch ſpecifiſch vom europäiſchen verſchieden und daher mit einem eignen Namen als Cervus lobatus zu bezeichnen ſei. Er hat jedoch keinen Nachweis bisher beigebracht und die ſpäteren Schriftſteller auch nicht.

II. Subgen. Rangifer.

Cornua apice palmata in sexu utroque, ramo basali (propugnaculo) antrorsum verso; nasus pilosus; ungulae dilatato-subovales.

2. C. Tarandus LINN., das Rennthier.

Cervus Tarandus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 344. — V. Middend. ſibir. Reiſe II. S. 119. — SCHLEG. de Diergaarde p. 49. mit Abbildung. — C. Tarandus et hastalis. AGASS. Sillim. journ. 1847 p. 436; ann. of nat. hist. XX. p. 142. — Rangifer tarandus. SUNDEV. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 130, 96. — Tarandus rangifer. GRAY Knowsley Menag. p. 57; ann. of nat. hist. XX. p. 416. — Rangifer Caribou. AUDUB. BACHM. Quadrup. 8°. III. p. 111. tab. 126.

Hogguer's Behauptung, daß die caſtrirten Rennthiere die Geweihe nicht abwerfen, hat Sundevall als ganz irrig dargethan. Sie werfen aber dieſelben, gleich den Jungen und Weibchen, viel ſpäter ab als die alten Rennthiere, nämlich erſt im Mai, während letztere die Hörner ſchon vor Weihnachten zu verlieren anfangen. Auch verlieren die Geweihe der caſtrirten Rennthiere niemals den Baſt, ſondern werden mit dieſem zugleich abgeworfen.

Wie vom amerikaniſchen Elennthiere, ſo behauptet auch Agaſſiz vom amerikaniſchen Rennthiere, daß es ſpecifiſch von dem der alten Welt abweiche; er legt dem amerikaniſchen den Namen Cervus hastalis bei. Gründe für dieſe Trennnung hat er nicht angegeben; auch Audubon, dem es wohl angeſtanden hätte, wenn er ſich um deren Beibringung bemüht hätte, geſteht blos, daß ſie ihm unbekannt geblieben ſind.

III. Subgen. Dactyloceros (Platyceros. Dama).

Cornua summitate longitudinaliter palmata, basi rotundata; nasus apice nudus.

3. C. Dama Linn., der Damhirſch.

Cervus Dama. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 347. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 134. — Gervais, ann. des sc. nat. X. (1848) p. 202. — Dama vulgaris. Gray Knowsley Menag. p. 60; ann. of nat. hist. IX. sec. ser. p. 420.

Nach Gervais ſind Damhirſche und Hirſche (C. barbarus) nicht ſelten in den Wäldern von Calle (Algerien).

IV. Subgen. Elaphus.

Cornua rotundata ramosa; rhinarium sinusque suborbitales distincta.

a) cornibus retrorsum et extrorsum curvatis, apice furcato subpalmato antrorsum versis, propugnaculo sursum curvato. — Panolia Gray.

4. C. frontalis Mc. Clell. der Sungnai; C. Elaphi magnitudine, aestate flavido-fuscus, hyeme cano-fuscescens; cauda brevi.

Cervus frontalis. Mc. Clelland, Calcutt. journ. of nat. hist. 1842. p. 401 tab. 3. (Thier), 4 (Geweihe). — Pucher. archiv d. mus. VI. p. 364. tab. 23, fig. 11. (Geweihe); p. 304. — Panolia Edii. Gray Knowsley Menag. p. 6; ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 420. — P. acuticornis et platyceros. Gray catal. mamm. Br. Mus. p. 180. — Panolia acuticornis. Horsf. catal. p. 187. — Cervus lyratus. Schinz syn. mamm. II. p. 395.

Aus dieſer, zur Zeit in unſeren Sammlungen noch ſehr ſeltnen Art hat Gray eine eigne Gattung Panolia errichtet mit folgenden Merkmalen: „Hörner rund, rückwärts und auswärts gekrümmt, mit einem ſtarken vordern Augenſproſſen dicht an der Baſis; das obere Ende einwärts gebogen, am innern oder hintern Rande ziemlich erweitert; Pelz mit ziemlich ſtarren verflachten Haaren, Muffel groß, Schädel mit ſchmalem Geſichtstheil, einer großen, länglichen, tiefen Thränengrube und kurzen, breiten, hinten erweiterten Naſenbeinen; Augenſproſſen öfters an der Baſis mit einem Höcker oder Aſte."

Die Kenntniß dieſer Art verdanken wir Mc. Clelland, nach deſſen Beſchreibung wir ſie hier ſchildern.

An Größe kommt dieſe Art mindeſtens unſerem europäiſchen Hirſche

gleich. Der Pelz ist im Winter sehr dicht, am Halse länger und gröber als an andern Theilen, und bildet in der Nackengegend eine Mähne von 5 — 6″ langen Haaren. Der Schwanz ist kurz und im Sommer deutlich sichtlich, aber wenig behaart; im Winter dagegen dicht behaart und dann nur wie ein kurzer Busch erscheinend. Der gelblichbraune Sommerpelz geht im Winter ins Bräunlichgraue über. Im Sommer herrscht das Bräunlichgraue auf dem Gesicht und Halse, was auf der Oberseite des Rumpfes, der Außenseite der Gliedmassen und auf der Schnautze gelblichbraun wird. Der Unterleib, die Innenseite der Schenkel und der Vorderglieder, die Unterseite des Unterkiefers, die Hüften, der Schwanz und die angrenzende Kreuzgegend sind weiß, im Sommer aber ist letztere nebst dem Schwanze von der Farbe des Rumpfes. Die untern Theile der Gliedmassen und die Haare auf der Innenseite der Ohren sind hellgrau. Beide Geschlechter sind mit wenig entwickelten Eckzähnen versehen.

Die Geweihe sind groß, anfangs rückwärts und schief auswärts gerichtet, dann krümmen sie sich allmählig auf- und auswärts und endigen mit einer vorwärts gekehrten Spitze. Vom obern Drittel geht ein einfacher, kleiner Zinken schief nach innen; bei jungen Exemplaren bildet er mit der Spitze des Geweihs eine Gabel, bei erwachsenen aber ist er von ihr um 6—7″ entfernt. Bei alten Individuen zieht sich eine Leiste von dem Zinken bis zur Spitze mit einigen kleinen unregelmäßigen Knoten und indem sie sich erhebt, bildet sie eine Art unvollständiger Krone. Der Augensprossen geht von der Stange direct vorwärts, krümmt sich aus- und aufwärts und endigt in eine Spitze, welche, wenn man sie sich verlängert denkt, mit der Spitze der Stange zusammenstoßen und so einen vollständigen Kreis bilden würde. Ein kleiner Ast entspringt bisweilen von der Basis der einen oder der andern Stange, am gewöhnlichsten vom Augenzacken.

Länge der Stange nach der Krümmung . . .	3′ 0″
— des Augensprossen	1 8
Entfernung der einen Stangenspitze von der andern	3 0

Pucheran beschreibt 3 solcher Geweihe, die dem pariser Museum gehören. Bei einem Paar derselben geht an beiden Stangen vom Augensprossen noch ein besonderer Ast ab; der obere seitliche Zinken ist an

beiden vorhanden, aber die Spitze des Geweihes bildet an der einen Stange nur eine einfache Gabel, während an der andern der hintere Aſt abermals ſchwach gabelförmig geſpalten iſt. — Uebrigens kommen an den Geweihen mancherlei Abänderungen vor; eine ſolche iſt Gray's P. platyceros, wo die handförmige Ausbreitung der Krone mehr hervortritt. Sein Cervus Smithii, der blos auf einer Handzeichnung des Generals Hardwick beruht, dürfte vielleicht auch hieher gehören.

Dieſer ſtattliche Hirſch gehört Indien an, wo ihn Mc. Clelland im Thale von Moneypore (Munneepore) entdeckte; nach Pucheran kommt er auch in Cochinchina vor. Nach Erſterem fängt er im Juni an ſein Geweih abzuwerfen und das neue erreicht ſeine Ausbildung wieder bis gegen Ende Decembers, doch ſeine Vollendung erlangt es nicht vor Februar oder März. Der Landesname iſt Sungraëë oder Sungnaë.

b) cornibus erectis multiramosis, ramis 3 antrorsum versis, ramo medio distincto. — Cervus Gray.

5. C. Elaphus Linn., der Edelhirſch.

Cervus Elaphus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 348. — Sundev. pecora 1844; Archiv. ſtand. Beitr. II. S. 131. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 418. — Eversm. bullet. de Moscou 1848. p. 197. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 378. — B. Ribbenb. ſibir. Reiſe II. 2. S. 120.

var. β) minor.

Cervus mediterraneus. Blainv. journ. de physiq. XCIV. p. 262. — Cervus corsicanus. Bonap. catal. meth. p. 16; — Gerv. ann. des sc. nat. 3. sér. X. p. 206; Zool. et Paléont. franç. p. 83. — Is. Geoffr. compt. rend. XXIX. p. 779. — Cerf de Corse. Pucher. l. c. p. 382. tab. 27. (Weibchen), tab. 23 fig. 12, 13. (Geweih).

Die in Corſika und Sardinien vorkommenden Hirſche, welche ſich von den feſtländiſchen durch geringere Entwicklung des Körpers und der Geweihe unterſcheiden, werden in neuerer Zeit meiſt als eigne Art angeſehen, während mir es weit wahrſcheinlicher iſt, daß ſie als bloſe locale Varietät zu betrachten ſind.

* C. barbarus Benn., der nordafrikaniſche Hirſch; a C. Elapho corpore indistincte albo-maculato diversus.

Cervus barbarus. Fraser zoolog. typic. mit ſchöner Abbildung. — Gray

Knowsley Menag. p. 59. tab. 37; ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 418. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 488, 384.

Gray charakterisirt diesen Hirschen als „dunkelbraun, undeutlich weiß gefleckt mit einer sehr unbestimmten breiten Rückenlinie und einem hellgelben, über die Schwanzwurzel beträchtlich ausgedehnten Fleck; Hintertheil der Hüften weiß, jederseits mit einem dunklen Streif.“ Sowohl die Abbildung von Fraser als die in der Knowsley Menagerie sind nach lebenden Exemplaren, die aus Tunis in die Menagerie des Earl von Derby geliefert worden waren, gefertigt. Die pariser Menagerie besitzt auch ein Individuum, das aus den Waldungen von Constantine, zwischen Bona und Calle stammt. Die eben citirten beiden Abbildungen stellen einen Achtender dar, indem das Geweih einen Augenzinken, einen mittleren Sprossen und oben eine Gabel aufzuweisen hat. Pucheran, der früher die specifische Absonderung des nordafrikanischen Hirsches von unserem europäischen beanstandete, hat, nachdem er auf die Flecken aufmerksam gemacht worden war, die Erklärung abgegeben, daß jetzt die Selbstständigkeit als Species fast außer Zweifel sey. Meines Bedünkens nach ist ein so geringfügiges Merkmal, wie diese wenigen verwischten Flecken es sind, zur endgültigen Entscheidung noch lange nicht ausreichend. Man muß erst diesen Hirsch nach allen seinen Lebensverhältnissen und den durch das Alter bedingten Formveränderungen seiner Geweihe eben so genau wie unsern europäischen Edelhirsch kennen gelernt haben, bevor man mit Sicherheit ein Urtheil fällen kann.

6. C. strongyloceros Schreb., der Wapiti.

Cervus strongyloceros. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 349. — Sundev. pecora 1844; Archiv skand. Beitr. II. S. 131. — C. canadensis. Gray Knowsley Menag. p. 58 mit Abbild.; ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 417. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 386. — Audub. Bachm. Quadrup. 8. II. p. 83. tab. 62. — Blyth journ. of the Asiat. soc. X. 2. p. 737 fig. 1—6; XXII. p. 592 mit Abbild. des Geweihes.

Audubon muß unsern europäischen Hirsch wenig gekannt haben, wenn er ihn als schwarzbraun mit weißem Ringe um das Auge bezeichnet und den Wapiti um einen Fuß höher seyn läßt.

7. C. Wallichii Cuv., der Barah-Singha.

Cervus Wallichii. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 351. — Sundev.

pecora 1844; Archiv. ſtand. Beitr. II. S. 131. — Gray Knowsley Menag. p. 60; ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 418. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 396. — Horsf. catal. p. 186. — Wagn. in v. Hügel's Kaſchmir IV. 2. S. 576. — Blyth journ. of the Asiat. soc. X. 2. p. 745. fig. 8—9 (Geweih); XXI. p. 341; XXII. p. 592.

Cervus affinis. Mac. Neil proceed. of the zool. soc. 1840. p. 11. — Blyth journ. of the Asiat. soc. X. p. 750. fig. 10 (Geweih). — Gray Knowsley Menag. tab. 38, 39.

Cervus Maral. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. X. p. 721, 914. mit Abbildung des Geweihs. — Gray ann. of nat. hist. IX. p. 419. — C. Elaphus. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. IV. p. 648; X. 2. p. 721.

Schon Gray hatte die Meinung ausgeſprochen, daß der perſiſche Maral identiſch mit C. Wallichii iſt; dagegen trennte er mit Hodgſon den tibetaniſchen C. affinis davon ab, obwohl er für letzteren keinen ſpecifiſchen Unterſchied begründen konnte. Blyth billigte nicht blos die Vereinigung des Marals mit dem C. Wallichii, ſondern fügte ihm auch den C. affinis bei und ſicherlich mit vollem Rechte. Der Barah-Singha (C. Wallichii) findet ſich demnach verbreitet in den Gebirgszügen von Nepal, Kaſchmir (Cervus cashmiriensis Gray), Perſien und wahrſcheinlich auch in dem nördlichen China, vielleicht ſelbſt noch in dem ſüdlichen Sibirien. Ueber die Unterſchiede ſeines Geweihes von denen unſers Edelhirſches und des Wapitis theilte Blyth in neuerer Zeit einige Bemerkungen mit; indeß eine vollſtändige Naturgeſchichte dieſes herrlichen Thieres fehlt noch immer, denn was wir bis jetzt von ihr wiſſen, ſind höchſt dürftige Bruchſtücke.

8. C. Sika Temm., der japaniſche Hirſch.

Cervus Sika. Temm. faun. japon. I. tab. 17.

Nach der Abbildung iſt die Färbung dieſes Hirſches dunkel roſtbraun, ohne weiße Scheibe an den Hinterkeulen. Jede Stange trägt 4 Sproſſen, von denen die dritte ſehr kurz iſt. Temminck betrachtet ihn als eine unſerem Edelhirſche nahe verwandte, jedoch eigenthümliche Art. Seine Beſchreibung iſt uns noch immer nicht zugekommen.

c) cornibus erectis triramosis, ramis 2 antrorsum versis; ramo medio nullo (Rusa Smith).

9. C. Duvaucelii Cuv., der Bahraja.

Cervus Duvaucelii. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 353. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 131. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 375. — Rucervus elaphoides. Hodgs. ann. I. p. 154. — Rucervus Duvaucelii. Gray Knowsley Menag. p. 61; ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 421. — Horsf. catal. p. 186. — Cervus euryceros. Knowsley Menag. tab. 40, 41.

Nunmehr haben wir auch zum Erſtenmale in der Knowsley Menagerie Abbildungen von dieſem ſchönen Hirſch erlangt und fügen hier noch die Charakteriſtik bei, die Gray nach lebenden Individuen entwarf. Geweihe cylindriſch, mit einen vordern Augenſproſſen und an der Spitze wiederholt gegabelt. Muffel groß, hoch und bis zum untern Rande der Oberlippe fortgeführt. Thränengrube deutlich, Ohren breit, gerundet und behaart, Schwanz ziemlich kurz und dick, Hufe ſchmal, zuſammengedrückt. Der Pelz beſteht aus ziemlich weichen anliegenden Haaren, iſt undeutlich gefleckt, ohne eine helle Abzeichnung an der Kruppe. Die Farbe iſt gelblichbraun; der Rücken mit einem undeutlichen dunklen Streif und jederſeits mit einer Reihe weißer Flecken; die Seiten ungefleckt; die Haare ſchwarz mit gelben Spitzen; der Hals mit ziemlich langen Haaren; Kehle, Bruſt und Bauch mit längeren, zerſtreuten graulichweißen Haaren; Schnauzenkuppe und Vordertheil der Beine dunkel, Kinn weiß. Der Pelz iſt im Winter dunkelbraun.

10. C. Aristotelis Cuv., der Samber; supra e nigricante fuscus, infra nigrescens, inguinibus albidis, clunibus postice flavidis; cornibus trifurcis apice furcatis: ramo superiore intus et paululum postice oriente; statura maxima. — Tab. 27.

Cervus Aristotelis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 354. tab. CCXLI. A. fig. 5. (Geweih). — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beiträg. II. S. 131. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 437, 489. tab. 29. (Thier), 24. fig. 9—16. (Geweih). — Rusa Aristotelis. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 421. — Horsf. catal. p. 188. — Cervus Leschenaultii. Wagn. a. a. O. S. 356. — C. unicolor H. Smith. Wagn. a. a. O. S. 360. — Biche de la presqu'ile de Malacca. Fr. Cuv. mamm. I.

Die günſtige Gelegenheit, welche Pucheran hatte, mehrere lebende Individuen geraume Zeit hindurch beobachten zu können, iſt von ihm ſo ſorgfältig benützt worden, daß wir jetzt durch ihn eine ſehr befriedigende

Kenntniß von dieser, bisher nur mangelhaft bekannten Art erlangt haben. Einige Zusätze machen sich daher nothwendig.

Der Samber ist ein Hirsch von ansehnlicher Größe. Sein Pelz ist schwärzlichbraun (im Sommer mit röthlichem Anfluge), mit einem schmalen falben Fleck auf den Hinterkeulen; die Unterseite ist bräunlichschwarz bis zum hintern Drittel, das falbweißlich ist; der Schwanz ist gestreckt, oben von der Farbe des Rückens, unten falblich. Das Männchen ist gemähnt. Die Geweihe sind von mittelmäßiger Größe und zeigen mancherlei Verschiedenheiten; eines der vollständigsten und normalsten verhält sich folgendermassen. Die Stange richtet sich anfangs rückwärts, auswärts und aufwärts, dann nimmt sie eine umgekehrte Richtung an und bildet also eine Krümmung mit innerer Concavität und äußerer Converität. Im obern Drittel gabelt sich die Stange: der äußere Ast verläuft fast in der Richtung derselben, während der innere, der in der Regel minder entwickelt ist, sich davon nach innen und etwas nach hinten wendet, und mit jenem einen stumpfen Winkel bildet. Der Augensprossen kehrt sich nach außen, vorn und oben; die Spitze ist etwas einwärts gerichtet. Die Länge dieses Geweihes beträgt nach der Converität $0^m,675$, bis zur Gabelung 0,59. Von einem Männchen gibt Pucheran folgende Maaße an.

Länge von der Schnautze bis zur Schwanzwurzel .	1^m,	82
— des Schwanzes bis zur Spitze der Haare .	0	26
Vordere Höhe	1	104
Hintere „	1	20

Der Samber ist durch Vorderindien bis Nepal und Sylhet weit verbreitet; nach Gray kommt er auch auf Ceylon vor (C. unicolor H. Smith), doch zeigte ein von daher stammendes Exemplar kürzere und dickere Hörner. Pucheran führt auch noch Malakka an, weil das von Fr. Cuvier abgebildete Weibchen von daher kam; da jedoch Cantor in seinem Verzeichnisse der Säugthiere der malayischen Halbinsel diesen Hirsch nicht aufführt, so wird erwähntes Weibchen wohl erst durch den Handel dahin gebracht worden seyn. Mehrere nach Paris gelieferte Individuen haben sich hier sehr gut forterhalten und sogar fortgepflanzt. Bei den Neugebornen zeigten sich einige Flecken auf der Kreuzgegend, die aber bei etwas älteren fast ganz verschwanden.

Der Cervus Leschenaultii, auf ein einzelnes Geweih begründet, ist nach Pucheran's Vergleichung identisch mit C. Aristotelis und zeigt in seinen Hörnern die vollständige normale Form [1].

11. C. equinus Cuv., der Wasserhirsch; praecedenti simillimus, at ramo superiore a latere posteriore exoriente diversus.

Cervus equinus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 355. tab. CCXLI. A. fig. 6. (Geweih). — Sundev. pecora. 1844; Archiv. stand. Beitr. II. S. 131. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 271. — S. Müll. Schleg. verhandel. zool. I. p. 213. tab. 42. (Thier), 45 fig. 7—11. (Geweihe). — Rusa equinus. Gray Knowsley Menag. p. 62; ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 422. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 436.

Pucheran erklärte in seiner Beschreibung des C. Aristotelis, daß die Unterscheidung dieser Art und des C. hippelaphus und equinus bei den englischen Beobachtern so confus sey, daß er keinen citiren könne. Selbst Cantor stimmt noch der Behauptung von Elliot bei, daß diese 3 Arten wahrscheinlich nur Varietäten einer und derselben Species wären. Aber auch S. Müller und Schlegel, die freilich den C. hippelaphus als eine weit von den beiden andern genannten Hirschen verschiedene Art nachweisen, sind doch der festen Meinung, daß wenigstens C. Aristotelis und

---

1) Zwischen C. Aristotelis und C. equinus schiebt Gray den C. dimorphe ein, den Hodgson (Journ. of the Asiat. soc. of Bengal XII. p. 897 mit Abbild., ann. of nat. hist. XIV. p. 74.) nach einem jungen, im dritten Jahre stehenden Männchen aus den Saal-Waldungen von Morung in folgender Weise charakterisirte. „Hörner mäßig, blaß, glatt, nach dem Typus des Axis, aber stärker in der Mitte der Stange gebogen, divergirender und nur mit einem Augensprossen, der stark vorwärts gerichtet ist. Thränengruben klein oder mäßig vertikal; Interdigital-Löcher; Ohren breit ausgedehnt, Schwanz kurz, hirschartig. Natur und Ansehen das Mittel zwischen den Axis- und Rusahirschen. In der Jugend hell falbroth mit weißen Flecken; im Alter schwärzlich braunroth, Nakken und Unterleib schwärzlich; um die Schnauze ein schwarzer Saum, Kinn weiß, Gliedmassen blaß." — Hodgson bleibt selbst ungewiß, zu welcher Gruppe von Hirschen er seine neue Art stellen soll, wir können deshalb um so weniger uns über sie ein Urtheil bilden, zumal da Gray's Vermuthung, daß die Hörner in Folge der Gefangenschaft mißgestaltet worden seyen, sehr wahrscheinlich ist. Am Besten ist es, solche schlecht begründete Arten vollständig zu ignoriren.

C. equinus nur eine und dieselbe Species ausmachen, jener dem Festlande, dieser den Inseln angehörig. In der That weiß auch Pucheran zwischen C. Aristotelis und C. equinus keine andern Unterschiede anzugeben, als daß bei jenem der obere Ast des Geweihes von der Stange innen und etwas hinterwärts abgeht, während er bei letzterem von der hintern Seite entspringt, ferner daß die Stirngegend zwischen den Rosenstöcken bei C. Aristotelis vorspringend, bei C. equinus flacher als bei andern Hirschen ist. Letzteres Merkmal scheint nach der Abbildung, die in den Verhandelingen vom Schädel des C. cervinus mitgetheilt ist, nicht hinlänglich begründet zu seyn, so daß also nur der von dem obern Aste des Geweihes hergenommene Unterschied übrig bleibt, den wir bis auf Weiteres uns gefallen lassen wollen, um den festländischen C. Aristotelis und den insularen C. equinus auseinander zu halten, wenn auch am Ende nicht als selbstständige Art, doch wenigstens als eine eigenthümliche constante Varietät. Pucheran selbst war nicht im Stande, neue Beiträge zur Kenntniß des C. equinus zu liefern; er klagt vielmehr darüber, daß die holländischen Zoologen von dieser Art und dem C. Kuhlii, welche beide er nebst dem C. mariannus zu einer Gruppe rechnet, keine Beschreibung geliefert hätten, aus welcher man wenigstens ersehen könne, ob der C. Kuhlii, als ein eigener Typus oder nur als eine locale Abänderung des C. equinus anzusehen sey. In dieser Beziehung thut jedoch Pucheran den genannten Zoologen Unrecht, denn S. Müller und Schlegel haben uns beide Arten so ausführlich beschrieben, daß man sie daraus ganz genau kennen lernen kann. Aus ihren Darstellungen soll daher meiner frühern Charakteristik hier noch Einiges beigefügt werden.

Der C. equinus ist der größte unter den Hirschen des indischen Archipels und kommt an Größe fast unserem Edelhirsche gleich; ein sehr altes Männchen hatte von der Schnautze bis zur Schwanzwurzel eine Länge von 1^{m}, 90. Die Geweihe sind nur wenig, höchstens um ein Drittel, länger als der Kopf, kräftig, geperlt, dunkel röthlichbraun mit gelblichen Spitzen. Von der Gabel ist der hintere Zacken gewöhnlich um ein Drittel kürzer als der andere und ziemlich stark quer nach hinten gerichtet; selten kommt er an Länge fast dem letzteren gleich. Wie bei andern Arten giebt es sonst noch mancherlei Abweichungen in der Bildung der Hör-

ner. Kleine Eckzähne sind, wie bei C. Aristotelis, bei beiden Geschlechtern vorhanden. Die Behaarung ist grob, starr und am Halse länger als anderswo. Die Färbung ist schön dunkelbraun, was am Halse ins Schwarzbraune übergeht; sie ist bald heller, bald dunkler, so daß mitunter ein solches Thier aus der Ferne fast schwarz erscheint. Die untere Hälfte der Beine, ihre Innenseite und die ganze Vorderseite der Hinterbeine sind heller, meist bräunlichgelb. Der Hinterbauch, die Oberlippe, die vordere Hälfte der Unterlippe und die langen Haare am Innenrande der Ohren in ihrer untern Hälfte sind weiß; die Hinterseiten der Nase sind mit einem schwarzen Fleck bezeichnet. Die Hinterkeulen sind hinten röthlichbraun, was auch gewöhnlich auf der Unterseite des sonst schwarzen Schwanzes der Fall ist.

Die Heimath ist Sumatra und Borneo, nach Cantor auch die malayische Halbinsel.

12. C. Kuhlii Müll., der bavianische Hirsch; cornibus C. equino simillimus, at statura multo minore, cauda longiore, disco clunium nullo.

Cervus Kuhlii. S. Müll. Schleg. verhandel. Zool. I. p. 212, 223. tab. 44. (Thier), 45 fig. 12—14. (Geweih und Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 357. tab. CCXLI. A. fig. 7. (Horn). — Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 132.

Nachdem jetzt S. Müller und Schlegel die Beschreibung des C. Kuhlii nachgeliefert haben, kann ich meine frühere mangelhafte Charakteristik darnach ergänzen.

Der C. Kuhlii kommt in der Geweihform im Wesentlichen mit dem C. equinus überein, insbesondere auch darin, daß der vordere von den beiden obern Aesten länger ist als der hintere, sonst giebt es aber viele Verschiedenheiten. Eine Hauptsache ist schon, daß der C. Kuhlii auffallend kleiner als der C. equinus ist, indem er nur die Größe eines Rehes erreicht. Die Geweihe sind schlanker, glatter, dunkler und stärker auswärts gekrümmt; der hintere Ast ist verhältnißmäßig kürzer und seine Richtung mehr wagrecht, wodurch sich die beiden Enden der Gabel weiter voneinander entfernen. Der Schädel ist minder lang, doch verhältnißmäßig hinten breiter und vorn schmäler zulaufend; die Grube unter der Thränenhöhle kleiner, mehr gerundet und minder tief, die Eckzähne werden ganz

vermißt. Endlich ist auch die Färbung verschieden, indem die Haare braun und gelblich geringelt sind; Kopf, Hals und Rumpf sind lichter, die Beine dagegen dunkler; der rothbraune Fleck, welcher bei C. equinus den Hintertheil der Keulen einnimmt, fehlt ganz. Der Schwanz ist etwas länger und schmächtiger, oben braun, unten weißlich.

Die Länge eines erwachsenen Thieres von der Schnautze bis zur Schwanzwurzel beträgt 3½ Fuß, die des Schwanzes mit den Haaren 8″ 9‴. Die Hörner sind gewöhnlich um ein Drittel, mitunter auch um die Hälfte länger als der Kopf. Der Pelz ist glänzend dunkelbraun und wegen der bräunlichgelben Ringelung der Haare bräunlichgelb gesprenkelt. Die Beine, Brust, Mittelline des Rückens und der Scheitel sind fast einfarbig braun und gewöhnlich dunkler; dagegen gewinnt auf der Unterseite des Halses und dem größten Theile des Kopfes die braungelbe Farbe die Oberhand, so daß diese Theile viel heller sind als die andern. Der Bauch und die Vorderseite der Hinterbeine in ihrer obern Hälfte sind weiß. Die Haare an der Innenseite der Ohren, die Unterlippe und ein schmaler Rand an der Oberlippe sind weißlich; meist zieht ein schwärzlicher Fleck vom Mundwinkel schief zur Nase.

Man hat diesen Hirsch bisher blos auf den Bavians-Inseln gefunden. Gray confundirt ihn mit C. Peronii, dessen Hörner nach einem ganz andern Typus, nämlich nach denen des C. Hippelaphus gestaltet sind.

13. C. marianus Desm., der marianische Hirsch; magnitudine et cornibus Cervo Kuhlii simillimus, at vellere rudiore unicolore nec non cornibus robustioribus et profundius sulcatis diversus.

Cervus marianus. Wagn. Schreb. Supplem. S. 362. tab. CCXLI. A. fig. 9. (Horn). — Sundev. pecora 1844; Archiv skand. Beitr. II. S. 133. — S. Müll. Schleg. verhandel. zool. I. p. 223.

Zur Kenntniß dieses, dem Typus von C. equinus und C. Kuhlii angehörigen, aber noch sehr unvollständig gekannten Hirsches sind keine neueren Beiträge erfolgt. Seine Artberechtigung ist keineswegs noch gegen alle Zweifel gesichert.

14. C. Hippelaphus Cuv., der lichtbäuchige Russa; supra obscure flavido-brunneus, subtus sordide albicans, pectore vitta longitudinali

nigricante, cornibus longis trifurcis: ramo superiore a latere exteriore exoriente.

Cervus Hippelaphus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. tab. CCL. A. (Thier), CCXLI. A. fig. 8 (Horn). — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 132. — Gray Knowsley Menag. p. 62; ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 422. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 402. tab. 24. fig. 1. (Geweih). — C. Russa. S. Müll. Schleg. verhandel. zool. I. p. 212, 217 tab. 43. (Thier), 45 fig. 1—6. (Geweihe). — Wagn. a. a. O. S. 357.

var. β) minor.

Cervus moluccensis. Wagn. a. a. O. S. 361. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 132. — Gray Knowsley Menag. p. 62. tab. 43. — C. Russa moluccensis. S. Müll. l. c. p. 212, 229 tab. 45 fig. 5. (Geweih).

Cervus timoriensis. Wagn. a. a. O. S. 362. — C. Rusa timoriensis. S. Müll. Schleg. l. c. tab. 45. fig. 6. (Geweih).

Cervus Peronii. Wagn. a. a. O. S. 362. — Sundev. l. c. p. 132. — Gray ann. IX. p. 423 (theilweiſe). — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 409.

Die Geweihe des C. Hippelaphus unterſcheiden ſich von denen des C. equinus und deſſen Verwandten weſentlich dadurch, daß der zweite Aſt nicht, wie bei dieſen, von der Hinterſeite, ſondern von der Außenſeite der Stange entſpringt; zugleich ſind ſie weit ſchlanker und länger, indem ſie faſt doppelt ſo lang als der Kopf ſind. An Größe ſteht der C. Hippelaphus etwas dem C. equinus nach. In der Färbung unterſcheidet er ſich von allen vorhergehenden Arten dieſer Gruppe dadurch, daß der Unterleib ſchmutzig hellgelblich iſt, mit einer dunkelbraunen Längsbinde an der Bruſt und bisweilen mit einem verwiſchten dunklen Fleck in dem mittlern Theil der Bauchgegend. Daß die Gabel des Geweihes manchmal als Abnormität mehrzackig wird, giebt auch die von Pucheran gelieferte Abbildung eines ſolchen Gehörns zu erkennen.

Die Heimath iſt Java und Borneo.

Schon in meiner frühern Bearbeitung hatte ich, nach dem Vorgange von S. Müller und Schlegel, den C. moluccensis und timoriensis als eine etwas kleinere Varietät dem C. Hippelaphus zugewieſen und daran auch noch den damals blos nach dem Geweihe gekannten C. Peronii angeſchloſſen. Die genannten beiden holländiſchen Zoologen haben durch ihre ſpäter erſchienenen Beſchreibungen dieſe Anſicht beſtätigt. Zufolge ihrer Angabe iſt der C. moluccensis blos etwas kleiner als der javani-

ſche Ruſſa und an der Bruſt minder ſchwarz. In Bezug auf den C. timoriensis erklären ſie, daß ſie vergeblich nach einem Unterſcheidungskennzeichen von dem molukkiſchen Hirſch geſucht hätten; lediglich bei einem Männchen hätten ſie einen weißlichen, vom Auge über die Wangen bis an die Halsſeiten verlaufenden Streifen geſehen, den ſie mit Recht als ein zufälliges Merkmal betrachten, da er bei drei andern Weibchen und Jungen nicht zum Vorſchein kam. — Von C. Peronii, der ohnedieß gleiche Heimath mit dem timor'ſchen Hirſche hat, machen genannte Zoologen bemerklich, daß ſie ihn kaum von C. Hippelaphus und noch weniger von C. moluccensis unterſcheiden können.

In der Anſicht, daß C. moluccensis, timoriensis und Peronii zuſammen gehören, ſtimmt Pucheran mit uns überein, nicht aber darin, daß dieſe Hirſche dem C. Hippelaphus als bloſe Lokal-Varietäten zuzutheilen ſeyen, ſondern er bildet aus ihnen eine eigne Art unter dem Namen C. Peronii. Als Unterſchiede dieſer Art von C. Hippelaphus bezeichnet er ihre geringe Größe, die geringere Dimenſion ihrer Geweihe und die größere Ausdehnung der ſchwarzen Farbe an der Bruſt, indem dieſelbe bei C. Peronii faſt ganz ſchwarz iſt. Dagegen iſt zu bemerken, daß Pucheran letzteres Merkmal lediglich von dem durch Fr. Cuvier abgebildeten Cerf de Timor entnommen hat, während die holländiſchen Zoologen dieſes Umſtandes nicht gedenken, von ihrer molukkiſchen Varietät aber gerade das Gegentheil ausſagen. Bei einem ſo ſchwankenden Verhalten in der Färbung der Bruſtgegend können wir dieſen C. Peronii als eine ſelbſtſtändige Art nicht anerkennen.

Dieſe kleinern Varietäten des Ruſſa kommen auf Buru, Pulu-Samao, Puli-Kambing, Amboina und Timor vor [1]).

d) cornibus uti c, at corpore maculato (Axis H. Smith).

15. C. Pseudaxis Grev., der mähnige Axishirſch; fulvescens, albi-

---

1) Ueber die auf den Philippinen häufig vorkommenden Hirſche, welche Eydoux und Gervais (magas. de zool. IX. p. 26) dem C. moluccensis zuweiſen, weiß auch Pucheran keine nähere Auskunft zu ertheilen. Zweifelhaft bleibt mir gleichfalls C. lepidus Sundev. (Pecora 1844, Archiv ſtand. Beitr. II. S. 133), welcher von Sundevall bei den Ruſſa's eingereiht wird und von Java herſtammen ſoll.

do-maculatus; natibus albis nec non partibus caudae lateralibus nigro-marginatis; pilis colli elongatis; cornibus ad modum C. Axis, at ramulo superiore extus nascente.

Cervus Pseudaxis. Grev. voy. de la Bonite, Zool. I. p. 64. tab. 12. — Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 364. — Sundev. pecora 1844; Archiv. ſtand. Beitr. II. S. 133. — Pucher. archiv. d. mus. p. 416, 489 tab. 24. fig. 2—8. (Geweihe).

Die Charakteriſtik dieſer Art beruht immer noch auf dem einzigen Individuum, das von Eydoux und Souleyet mitgebracht und ſechs Jahre in der pariſer Menagerie lebend erhalten wurde. Nachſtehende Mittheilungen ſind ſämmtlich von Pucheran entlehnt.

Geſtalt und Färbung ſind ſehr ähnlich der falben Abänderung des Arishirſches. Ebenſo ſind die Geweihe von derſelben Form wie bei letzterem, nur daß der kleine obere Aſt nicht von innen, ſondern von außen entſpringt, weshalb auch Pucheran den C. Pseudaxis von der Gruppe der Arishirſche trennt und ihn mit der des C. Hippelaphus verbindet. Von Eckzähnen, die dem Axis fehlen, wurden bei C. Pseudaxis wenigſtens die leeren Alveolen wahrgenommen. Der Hals iſt, zumal im Winter, mit langen Haaren bekleidet, die eine Mähne bilden. Der Schwanz iſt oben ſchwarz. Der weiße Fleck der Hinterkeulen und die Seitentheile des Schwanzes ſind wie beim Damhirſch ſchwarz eingefaßt. Die Länge von der Schnautze bis zur Schwanzwurzel beträgt 1m, 48, die des Schwanzes ohne Haare 0, 11. Die weißen Flecke verſchwinden auch im Winter nicht ganz, wie angegeben wurde, ſondern ſie werden nur weniger augenfällig und dunkler.

Ein zweites Exemplar wurde in den letzteren Jahren durch die Expedition des Astrobale und der Zélée von der Inſel Solo mitgebracht, wo dieſe Thiere einheimiſch ſind.

Bei der großen Aehnlichkeit, welche der C. Pseudaxis mit C. Axis zeigt, iſt man bisher der Meinung geweſen, daß er nur eine der vielen Abänderungen des letzteren darſtellen dürfte. Es beſtehen jedoch zu viele Differenzen, als daß man nicht berechtigt wäre, ihn für eine ſelbſtſtändige Art zu erklären. Auch der Umſtand, daß das in der pariſer Menagerie gehaltene Thier mehrmals mit einem Arisweibchen Junge beiderlei Geſchlechtes zeugte und daß die Baſtardweibchen abermals vom Vater be-

fruchtet wurden, spricht noch nicht für die Arteneinheit; diese würde erst dann sich ergeben, wenn die Bastarde im Stande wären, sich untereinander, abgesondert vom elterlichen Stamme, in unbeschränkter Weise fortzupflanzen. Ebenso wenig läßt sich aber aus diesen Erfahrungen, wie beide Geoffroy meinen, ein Beweis entnehmen, daß der Charakter der Species nicht auf das Unvermögen zur Fortpflanzung mit andern Arten sich begründen lasse; denn daß nahe verwandte Arten miteinander sich fruchtbar paaren können, ist ein bekannter Erfahrungssatz, aber solche Junge sind unvermögend durch Paarung unter sich ihren Typus auf weitere Generationen überzutragen [1]).

16. C. Axis Erxl., der Axishirsch.

Cervus Axis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 364. — Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 133. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 421. — Axis maculata. Gray Knowsley Menag. p. 64; ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 424. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 270. — Horsf. catal. p. 188. — Axis major et minor. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. X. p. 914.

var. β) nigricans.

Cervus nudipalpebra Ogilb. Wagn. a. a. O. S. 366.

Gray betrachtet den C. nudipalpebra blos als eine schwärzliche Abänderung des C. Axis. — Charakteristisch für die Geweihe des Axis und Schweinhirsches ist es, daß der zweite oder obere Ast nach innen gewendet ist.

17. C. porcinus Zimm., der Schweinhirsch; crassus, fulvido-fuscus, immaculatus aut albo-maculatus, subtus griseus; stria laterum alba nulla; auriculis abbreviatis rotundatis.

Cervus porcinus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 365. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 426. tab. 28. — Hyelaphus porcinus. Sundev. pecora 1844; Archiv. stand. Beitr. II. S. 134. — Gray Knowsley Menag. p. 64. tab. 42; ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 424. — Horsf. catal. p. 189.

Obwohl der Schweinhirsch viele Uebereinstimmung, insbesondere auch in der Form der Geweihes, mit dem Axis zeigt, so bietet er doch dagegen

1) Vgl. meine Gesch. der Urwelt S. 244.

wieder viele Differenzen dar, die Sundevall sogar bestimmten, aus ihm eine besondere Untergattung Hyelaphus zu errichten. Er ist untersetzter, die Beine sind kürzer, die Gesichtslinie ist convex, die Ohren, anstatt lang und spitz, sind kurz und abgerundet, das Gehörn ist gewöhnlich klein, mit kurzen Enden, bisweilen indeß doch auch so groß als das des Axis. Der Rumpf ist entweder einfarbig oder weiß gefleckt; der weiße Seitenstreif, der letzteren auszeichnet, fehlt jedoch immer.

Gefleckt sind die von Buffon (copirt auf Schreber's tab. CCLI) und in der Knowsley Menagerie abgebildeten Thiere; ungefleckt die von Pennant und Pucheran abgebildeten Individuen. Nach Gray's Angabe rührt dieser Unterschied davon her, daß beide Geschlechter im Sommer röthlichbraun sind mit zahlreichen weißen Flecken, daß dagegen im Winter der ganze Pelz schwärzlichbraun wird und die Flecken verschwinden. Er sagt nicht, ob diese Angabe auf den Erfahrungen beruht, die man, seitdem diese Thiere in mehreren englischen Gärten gehalten werden und dort sich fortgepflanzt haben, anzustellen Gelegenheit hatte; indeß läßt sich dieß erwarten. In Paris dagegen, wo von einem Paare ungefleckter Schweinhirsche im Laufe der Zeit 38 Geburten vorkamen, hat Pucheran keinen Fall aufgeführt, daß diese ungefleckten Schweinhirsche jemals im Sommer einen gefleckten Pelz gezeigt hätten; im Gegentheil unterscheidet er selbige vom Axis durch ihre einförmige Färbung. Er betrachtet deshalb das von Buffon abgebildete Thier als eine gefleckte Varietät des C. porcinus. Aus diesen Thatsachen scheint es hervorzugehen, daß es Schweinhirsche giebt, die zu allen Jahreszeiten eine einförmige Färbung haben, während andere im Sommer mit weißen Flecken geziert sind.

e) cornibus erectis triramosis, ramo medio nullo, ramo superiore directe retrorsum verso (Blastocerus).

Von den Rusas unterscheidet sich diese Gruppe, daß der obere oder zweite Zacken direkt rückwärts gerichtet ist und daher in gleicher Fläche mit den andern Zacken liegt. An der Innenseite des Fersengelenkes findet sich ein kleiner Haarpinsel, aber keiner am Mittelfuße. Südamerika angehörig.

18. C. paludosus Desm., der Sumpfhirsch.

Cervus paludosus. Wagn. Schreb. Supplem. IV, S. 367. tab. CCXLI. A. fig. 11. (Gehörn). — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 452. — Blastocerus paludosus. Sundev. pecora. 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 135. — Gray Knowsley Menag. p. 68; ann. of. nat. hist. sec. ser. IX. p. 427.

Ueber den durch H. Smith zu C. paludosus geſtellten, aber nicht dazu gehörigen Hirſch, den ich proviſoriſch als C. comosus bezeichnete, iſt ſeitdem keine weitere Aufklärung erlangt worden.

19. C. campestris Fr. Cuv., der Pampashirſch.

Cervus campestris. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 369. tab. CCXLI. A. fig. 12. (Gehörn). — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 136. — Gervais, voy. de D'Orbign. mamm. p. 28. tab. 20. fig. 2. (monſtröſes Gehörn). — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 459. — Burmeiſt. ſyſt. Ueberſicht der Thiere Braſil. I. S. 314. — Blastocerus campestris. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 428.

Von Pucheran ſehr ausführlich beſchrieben.

f) cornibus plus minus erectis, apice incurvatis, varie furcatis (Macrotis).

Eine Mittelgruppe, welche die vorhergehende (Blastocerus) mit der folgenden (Reduncina) in Verbindung bringt. Nordamerikaniſch.

20. C. macrotis Say, der langöhrige Hirſch; aestate brunneo-fulvus, hyeme brunneo-canus; cauda abbreviata apice nigra; auriculis magnis, cornibus dichotomo-ramosis; ungulis anterioribus latis cordatis.

Cervus macrotis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 371. (mit Ausſchluß von Richardſon) tab. CCXLI. B. fig. 1, 2. (Gehörn). — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 135. — Peale, United States expl. Expedit. 41, p. 43 (Abbild. des Vorderfußes). — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 369. — Audub. Bachm. Quadrup. 8. II. p. 206. tab. 78. — Cariacus macrotis. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 430.

Von der vorhergehenden und nachfolgenden Gruppe iſt der C. macrotis ſchon durch die breiten, abgeplatteten und unten ausgehöhlten Hufe ſcharf unterſchieden. In meiner früheren Zuſammenſtellung der Synonymik iſt das Citat von Richardſon zu ſtreichen, indem derſelbe dieſe und die nächſtfolgende Art confundirte.

Von einem, am 1. Auguſt erlegten Männchen (dem nämlichen, das auch Say zur Beſchreibung diente) mit noch nicht vollſtändig erwachſenen

Hörnern giebt Peale folgende Beschreibung. Größer als C. virginianus (d. h. C. leucurus), und mehr das Ansehen von C. canadensis zeigend, ohne die schwarzen Flecke am Unterkiefer, welche immer bei C. Lewisii und virginianus sichtlich sind. Hörner größer und mehr ausgebreitet, aber die Spitzen in derselben Weise vorwärts gewendet. Schnautze gebogner und die Thränengrube größer; Hufe abgerundet, auf der Unterfläche concav. Schwanz oben blaß rostfarbig, unten ohne Haare, an der Spitze mit schwarzem Pinsel. Hauptfärbung blaß rostfarbig, auf dem Rücken am dunkelsten, unten lichter; Kinn, Brust, Innenseite der Schenkel und Bauch schmutzig weiß; Iris dunkelbraun; Ohren groß, fast nackt, außen dunkelfarbig, innen mit zerstreuten weißen Haaren besetzt. Von Peale's Maaßangaben sind nachstehende bemerklich zu machen.

Ganze Länge	5′ 7″		Hörner nach der Krümmung . .	1′	4½″
Schwanz	0 7½		Ohren	0	10
Schwarzer Pinsel . . .	0 5½		Vorderhuf	0	1,6
Schulterhöhe	3 0		— längs der untern Com-		
Umfang an der Brust . .	3 3		missur	0	2½
Thränengrube	0 1		— breit	0	2

Nach seinen Beobachtungen, wie nach eingezognen Erkundigungen hält Peale den C. macrotis auf das Felsgebirge beschränkt, wo er auf der Ostseite sehr häufig ist. Durch den Prinzen von Wied wissen wir indeß, daß dieser Hirsch viel weiter ostwärts sich ausbreitet. Nach Peale bezeichnen die Anglo-Amerikaner der Felsgebirge den C. macrotis mit dem Namen Mule Deer; dagegen macht jedoch der Prinz von Wied bemerklich, daß in den von ihm bis zu den Fällen des Missuri bereisten Gegenden dieser Hirsch nicht Mule Deer, sondern immer Blacktailed Deer genannt wird und daß alle indianischen Völker ihn in ihrer Sprache eben so bezeichnen.

21. C. Richardsonii Aud. Bachm., der zweigablige Hirsch; praecedenti similis, at minor; ungulis angustis, cornibus bis furcatis, plerumque propugnaculo privatis.

Cervus Richardsonii. Aud. Bachm. quadrup. 8° III. p. 27. tab. 106. — Cervus Lewisii. Peale, U. St. expl. expedit. VIII. mamm. p. 39, 43. (Abbildung des Vorderfusses). — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 429. — Cervus macrotis var. β) columbiana. Richards. (nec Say) faun. bor. americ. I. p. 257.

tab. 20. — Blacktailed Fallow Deer. Lewis and Clarke trav. to the Pacific Ocean III. p. 26, 225.

Lewis und Clarke [1]) hatten ſchon im Jahre 1807 auf einen eigenthümlichen, weſtwärts der Felsgebirge vorkommenden Hirſch aufmerkſam gemacht, den ſie als black-tailed fallow deer oder blacktailed deer der Anglo-Amerikaner in Oregon bezeichneten und als beſondere Art von dem common deer oder white-tailed deer (C. leucurus) der dortigen Eingewanderten unterſchieden. Richardſon wollte in jenem Hirſche den Cervus macrotis Say erkennen und fügte ihn dieſem als var. columbiana bei. Audubon und Bachman zeigten aber, daß eine ſolche Vereinigung nicht zuläſſig ſey und trennten dieſe columbiſche Varietät vom C. macrotis ab und legten ihr den Species-Namen Cervus Richardsonii bei [2]); zugleich machten ſie aufmerkſam, daß das im Muſeum der Londoner zoologiſchen Geſellſchaft aufgeſtellte Exemplar von C. Richardsonii irrig als C. macrotis etikettirt ſey.

Ihren C. Richardsonii charakteriſiren Audubon und Bachman wie folgt. Ohren mäßig, ſchmäler als bei C. macrotis, Größe geringer als von C. macrotis, Hufe ſchmäler und ſchärfer, kein heller Fleck an den Hinterkeulen; Farbe oben röthlichbraun, unten weiß; Hörner cylindriſch, zweimal gegabelt: die erſte Gabelung iſt 10″ von der Baſis entfernt, ungefähr um 5 — 6″ höher als bei C. macrotis.

---

1) Ihre Beſchreibung iſt folgende: „Das black-tailed fallow deer iſt dieſer Küſte eigenthümlich und eine beſondere Art, welche gleichmäßig die Eigenſchaften des mule deer (C. macrotis) und des common deer (C. virginianus s. leucurus) an ſich trägt. Die Ohren ſind länger als die des letzteren, die Augenhöhlen vorſpringender, die Beine kürzer, der Leib dicker und größer. Der Schwanz iſt ſo lang als der des common deer; auf ſeiner Unterſeite ſind die Haare weiß, und an den Seiten und der Spitze pechſchwarz. Die Keulen gleichen in Form und Färbung denen des mule deer, welchem es auch im Ganzen ähnlich iſt. Es rennt nicht im vollen Laufe, ſondern ſpringt wie letzteres mit jedem Fuße zugleich vom Boden. Im Allgemeinen kann geſagt werden, daß es größer als das common deer, aber kleiner als das mule deer iſt.“

2) Sie machen hiebei bemerklich, daß ſie anfangs auch beide Arten confundirt hätten, und daß in ihrer Beſchreibung der Geweihe des C. macrotis ein Theil auf den C. Richardsonii ſich beziehe.

Körper	8′	4″	Schulterhöhe	2′	6″
Schwanzwirbel . . .	0	6	Hörnerweite zwischen den obern Zinken .	1	8
Schwanz mit Haaren	0	9	— zwischen dem hintern Paar von Spitzen	1	3

Mit diesem C. Richardsonii, dessen Art-Berechtigung mir völlig erwiesen zu seyn scheint, wird wohl der C. Lewisii von Peale[1]) identisch seyn, wenigstens bezieht Letzterer die vorhin angeführte Beschreibung von Lewis und Clarke ebenfalls auf seine Art, und so weit seine spärlichen Notizen reichen, paßt sie sowohl zu selbiger als zu der von C. Richardsonii. Die Hörner vergleicht Peale mit denen des C. leucurus, bezeichnet sie aber als schlanker und gewöhnlich ohne Augensprossen[2]). Die Färbung im Oktober nennt er gelblichbraun, die Unterseite und die Innenseite der Beine gelblichweiß; eine dunkle Binde faßt die Nase und den Unterkiefer ein, längs der Mitte der Brust verläuft eine schwarze Linie. Ein frisch erlegtes Exemplar hatte eine Körperlänge von 5′ 3″, Schulterhöhe 3′ 2″, Ohren 10″. — An einem andern Exemplare waren die Vorhufe 2½″ lang, und 1⅘″ breit.

Nach Peale's Bemerkung trägt dieser Hirsch seinen Schwanz im Laufe niemals aufrecht, und von hinten gesehen zeigt er zwei schmale weiße Haarstreifen, anstatt des großen weißen und aufgehobenen Schwanzes des C. leucurus. Seinen Beobachtungen zufolge würde die Nordgrenze der Verbreitung des C. Lewisii, der Columbia-Fluß bilden, während er südwärts des Umpqua-Flusses die Gegend bis zur gänzlichen Ausschließung des C. leucurus behauptet; in Kalifornien ist er in Menge. Nach den Angaben von Audubon kommt sein C. Richardsonii in den westlichen

---

1) Gray citirt zu C. Lewisii tab. 44, 45 in der Knowsley Menagerie, die aber eine ganz andere Form von Hörnern als der C. Richardsonii zeigen und ohne Zweifel, wie es ihre Unterschrift auch angiebt, eine der mannigfachen Abänderungen des C. virginianus darstellen.

2) Weiterhin macht Peale bemerklich, daß die meisten, in den bergigen Gegenden des südlichen Theils von Oregon erlegten Männchen einen Augensprossen an der innern Seite der Hörner hatten, der aufwärts und rückwärts gerichtet war, während die kalifornischen selten einen solchen zeigten. In Audubon's Abbildung ist nur ein Rudiment eines solchen untern Zackens zu sehen.

Theilen des nordamerikaniſchen Kontinents von Kalifornien bis gegen die ruſſiſchen Beſitzungen vor.

g) cornibus antrorsum et arcuatim curvatis, propugnaculo proprio, ramis ceteris lateri posteriori insidentibus (Reduncina nob. s. Mazama Smith).

Eine ſehr natürliche Gruppe, deren Arten in Nord- und Mittelamerika einheimiſch, aber noch nicht durchgängig ganz ſicher voneinander unterſchieden ſind.

22. C. virginianus Gmel., der virginiſche Hirſch; aestate fulvus, hyeme canescens, subtus albus; cauda elongata, supra dorso concolore, ante apicem nigra, subtus apiceque alba; cornibus valde procurvatis, subcomplanatis, propugnaculo a latere anteriore oriente.

Cervus virginianus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 373. tab. CCXLI. B. fig. 3—6 (Geweih). — Sundev. pecora 1844; Archiv ſkand. Beitr. II. S. 134. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 305. — Cariacus virginianus. Gray Knowsley Menag. p. 66; ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 428. (zum Theil). — Audub. Bachm. Quadrup. 8. II. p. 220. tab. 81; III. p. 168. tab. 136.

Ohne nähere Vergleichung hat Gray mit dem C. virginianus den C. leucurus, mexicanus, nemoralis und gymnotis als bloſe Abänderungen vereinigt, ſo daß Pucheran's Bemühungen, dieſe Arten vom C. virginianus abzuſcheiden, um ſo dankenswerther aufzunehmen ſind.

* C. similis Puch., der falbgraue Hirſch; C. virginiano simillimus, at vellere semper fulvido-canescente.

Cervus similis. Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 357, 362. tab. 26.

Von Pucheran nach einem männlichen Exemplare aufgeſtellt, von dem er folgende Beſchreibung giebt. Es kommt mit dem C. virginianus in der Größe, Verlängerung des Schwanzes, Färbung der untern Parthieen und den Flecken am Kopfe überein; durch letzteres Merkmal unterſcheidet ſich gleich dieſer Hirſch von C. mexicanus. Auch das Geweih iſt wie bei C. virginianus, und wenn es weniger groß iſt, ſo rührt dieß von ſeinem noch nicht erwachſenen Zuſtande her. Der einzige Unterſchied beſteht darin, daß genannter Hirſch auch im Sommer dieſelbe dunkle Färbung ſeines Pelzes zeigt, welche der C. virginianus nur im Winter in ſeinen dunkleren Abänderungen aufzuweiſen hat. Auch der Schwanz fällt auf der Oberſeite mehr ins Gelbliche als bei dem C. virginianus, wäh-

rend er bei dieſem ganz mit der Farbe des Rückens übereinkommt. Die röthliche Gurgelgegend des C. similis erinnert allein an den Sommerpelz des C. virginianus. Die Länge von der Schnautze bis zur Schwanzwurzel beträgt in gerader Linie 1m, 24, die des Schwanzes mit Haaren 0, 34, ohne Haare 0, 28. Heimath unbekannt. — Ein Weibchen, welches Pucheran einige Jahre in der pariſer Menagerie lebend beobachten konnte, zählt er gleichfalls zu dieſer Art, weil im Sommer wie im Winter ſein Pelz dieſelbe Färbung zeigte und zwar die des Winterfelles vom virginiſchen Hirſche. Auch in dem Weibchen der hieſigen Sammlung, welches ich dem C. leucurus zugeſchrieben habe, meint Pucheran ſeinen C. similis zu erkennen, worüber ich mir kein Urtheil geſtatten will.

Bei der höchſt geringen Differenz, die zwiſchen dieſem C. similis und virginianus beſteht und bei der gänzlichen Unbekanntſchaft mit ſeinen Heimathsverhältniſſen, wird es gerathen ſeyn, mit der Anerkennung ſeiner ſpecifiſchen Selbſtſtändigkeit noch ſo lange zu warten, bis weitere Aufſchlüſſe über ihn zur Vorlage kommen werden.

** C. leucurus Dougl., der langſchwänzige Hirſch; C. virginiano simillimus, at paululum minor, cauda longiore; vellere hyemali ab aestivali diverso.

Cervus leucurus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 375. (theilweiſe), tab. CCXLI. B. fig. 9. (Geweih). — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 322. — Audub. Bachm. Quadrup. p. 77. tab. 118. — C. virginianus. Peale, Wilk. U. St. expl. exped. mamm. p. 38.

Ueber dieſe, noch wenig bekannte und nichts weniger als ſicher geſtellte und dem C. virginianus höchſt nahe verwandte Art haben weder Audubon noch Pucheran neue Aufſchlüſſe gebracht; ſie wurde von erſterem ſo wenig als von dem Prinzen von Wied auf ihren Reiſen beobachtet.

Ich hatte in meiner frühern Bearbeitung mit dieſem C. leucurus den Mazame von Fr. Cuvier vereinigen zu dürfen gemeint, was jedoch Pucheran für unſtatthaft erklärt, und nach der genauen Beſchreibung, die er von letzterem lieferte, muß ich ihm hierin beiſtimmen. Eben ſo wenig hat er, wie vorhin angeführt, es gebilligt, daß ich ein in hieſiger Sammlung aufgeſtelltes Exemplar dem C. leucurus zugezählt habe, und

allerdings iſt mir ſelbſt ſpäterhin dieſe Vereinigung problematiſch geworden; jedenfalls bedarf es einer genauern Kenntniß von letztgenannter Art, um hierüber ein beſtimmtes Urtheil abzugeben.

So beruht denn die Selbſtſtändigkeit des C. leucurus immer nur noch auf den wenigen Angaben von Douglas und Richardſon, welche einer Vervollſtändigung dringlich bedürftig ſind. Peale, der in Oregon eine Menge dieſer Thiere lebend und friſch erlegt zu ſehen bekam, hätte dieſe wohl beibringen können, wenn er nicht ohne Weiteres den C. leucurus für identiſch mit dem C. virginianus genommen hätte. Wenn dieß am Ende auch der Fall ſeyn dürfte, ſo hätte doch Peale, als beſtallter Zoolog der Expedition, den Nachweis hiefür darlegen ſollen. Ueber die geographiſche Verbreitung dieſes C. leucurus bemerkt er, daß er an der Küſte des ſtillen Meeres bis zum 50° n. Br. und vielleicht noch weiter nordwärts geht, daß er aber am Umpqua-Fluße unter dem 43° von C. Lewisii erſetzt wird; in Oregon iſt er in großer Anzahl. Die Anglo-Amerikaner nennen dieſen Hirſch common Deer oder white-tailed Deer im Gegenſatz zum black-tailed Deer (C. Lewisii), weil er nämlich im Laufe oder alarmirt den Schwanz in die Höhe hebt und deſſen weiße Unterſeite dadurch ganz ſichtlich wird, was bei letzterem nicht der Fall iſt. Gedachte Eigenſchaft des C. leucurus ſchreibt aber Peale auch dem eigentlichen C. virginianus zu.

23. C. nemoralis H. Smith, der kurzhörnige Hirſch; C. virginiano similis, at minor, cauda breviore, extus fere tota fulvida, cornibus brevioribus, propugnaculo fere a latere exteriore oriente, velleris colore hyemali ab aestivali haud diverso.

Cariacou. Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 336, 363. — Buff. Daubent. hist. nat. XII. p. 347. tab. 44. — Mazame (C. campestris). Fr. Cuv. mamm. IV. livr. 65.

var. β) cauda breviore.

Cervus nemoralis. H. Smith. Griff anim. kingd. IV. p. 137. mit fig.; V. n. 798. — Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 383. (theilw.).

Vorſtehende Synonymik iſt nach Pucheran angeordnet und von meiner früheren abweichend, indem er den Cerf des paletuviers Cuv. davon ausſcheidet, dagegen mit dem Cariacou von Buffon und Daubenton

den Mazame von Fr. Cuvier, den ich eher zu C. leucurus passend erachtete, zusammenstellt. Diese beiden Thiere sind es, auf welche Pucheran die Species Cariacou begründet; vom C. nemoralis H. Smith, den er so wenig als ich aus Selbstanschauung kennt, macht er bemerklich, daß er sich von jenem in einer merklichen Weise nur durch den noch kürzeren Schwanz unterscheide, was er für keinen Grund zur specifischen Trennung ansieht.

Als Art charakterisirt Pucheran den Cariacou folgendermassen. „Größe unter der des virginischen Hirsches, Schwanz kürzer, Pelz gelblichbraunfalb, mit weißer Unterseite. Schwanz mittellang, oben fast ganz gelblich, schwärzlich vor der weißen Spitze, unten ganz weiß. Geweihe von geringer Größe, vorwärts gekrümmt, mit einem Augensprossen, der fast auf der Vorderseite der Stange abgeht, und zwei Enden auf der Convexität."

Von Fr. Cuvier's Mazame gibt Pucheran folgende Messungen an.

Länge, direkte, von der Schnautze bis zur Schwanzwurzel . .	1m,	025
— des Schwanzes	0	225
— der Ohren auf der Innenseite	0	130
Entfernung, direkte, von der Basis des Geweihs bis zur Spitze	0	170

Farbenänderungen nach den Jahreszeiten hat bei diesem Männchen nicht stattgefunden, was ein weiterer Unterschied von C. virginianus ist. Seine Heimath ist so wenig als die des Buffon'schen Thieres sicher bekannt, wahrscheinlich wird sie aber das mittlere Amerika seyn. — Auch diese Art gehört noch zu denjenigen, die einer bessern Begründung bedürfen.

24. C. mexicanus Gmel., der mexikanische Hirsch; cano-fuscus, albo-adspersus, subtus albus, rostro apice haud maculato; cauda mediocri, supra flavido-fusca, subtus apiceque albida; cornibus mediocribus subcomplanatis.

Cervus mexicanus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 378. tab. CCXLI. B. fig. 7, 8. (Geweih). — Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 135. — Pucheran. archiv. d. mus. VI. p. 326, 382.

Es ist schon vorhin angeführt worden, daß Gray mit dem C. virginianus verschiedne andere gut begründete Arten confundirt, darunter auch den C. mexicanus. Was er in der Knowsley Menagerie auf Tab. 45 und 46 als Texian Deer, Mazama mexicana, bezeichnet, ist ein von dem C. mexicanus, wie Lichtenstein, Pucheran und ich ihn definiren,

ganz verſchiednes Thier. Der C. mexicanus ſcheint unzweifelhaft eine ſelbſtſtändige Art auszumachen.

25. C. gymnotis Wiegm., der kahlöhrige Hirſch; C. Capreoli magnitudine, canus, fulvido-adspersus; abdomine primum flavido-albo, dein pure albo; cornibus brevibus complanatis, propugnaculo interno; velleris colore hyemali ab aestivali haud diverso.

Cervus gymnotis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 380. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 135. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 345, 363, 487. tab. 23. fig. 2—10 (Geweih), tab. 25. (Thier). — ? Cerf des paletuviers ou C. blanc. Cuv. rech. IV. p. 36. — Wagn. a. a. O. S. 383.

Zu dieſer Art zählt Pucheran ein Männchen, das längere Zeit in der pariſer Menagerie lebend erhalten wurde und von dem er eine ausführliche Beſchreibung liefert; es ſoll aus Columbien oder der Terra firma abſtammen. Mit dem C. gymnotis findet er aber auch in größter Uebereinſtimmung die beiden aus Cajenne eingeſchickten Exemplare, die Cuvier als Cerf des paletuviers ou C. blanc bekannt machte; auch dieſe werden von Pucheran ſehr ſorgfältig beſchrieben. Ueber die Vereinigung dieſer 3 Exemplare mit C. gymnotis bleibt ihm nur das eine Bedenken, ob auch die eigenthümliche Färbung des Unterleibs von jenen gleichmäßig bei letzterem gefunden wird. Bei jenen genannten 3 Exemplaren zieht ſich nämlich die roſtigfalbe Färbung des Vorderhalſes bis zur vordern Hälfte des Unterleibs fort. Hier bildet ſie eine ſehr ſchmale mittlere Linie, die, indem ſie weiß wird, mit einer zweiten falben, von der rechten zur linken Seite verlaufenden Querlinie zuſammenſtößt. Der ganze, zur Rechten und Linken dieſer Linie ſich ausbreitende Raum iſt weiß mit falber Wäſſerung, aber hinter der falben Querlinie iſt der rechtſeitige Raum, in welchem die Hoden und der Penis liegen, mit ganz weißen Haaren beſetzt. Daſſelbe iſt der Fall auf der Innenſeite der Hinterkeulen. Da Wiegmann dieſer Binden in ſeiner Beſchreibung nicht gedacht hat, ſo forderte Pucheran auf, die Berliner Exemplare auf dieſen Punkt hin zu unterſuchen. Herr Prof. Peters hat auf mein Anſuchen die Gefälligkeit gehabt, dieß zu thun und mir hierüber folgende Aufſchlüſſe ertheilt.

Das Berliner Muſeum beſitzt 2 Exemplare von Cervus gymnotis, wovon das eine ein Männchen, das andere ein Weibchen iſt. Bei dem

Männchen ist die Brust von ähnlicher Färbung wie der Unterhals: gelbbraun, in der Mitte etwas dunkler, der eigentliche Unterleib ist bis zu den großen Haarwirbeln, welche die Hinterbauchgegend nebst den Weichen scharf quer abschneiden, ebenso gelbbraun, nur heller und glänzender, und zwar rein gelbbraun längs der Mitte und an der genannten Querlinie, mit mehr Weiß zu jeder Seite dieses Perpendikels, ohne jedoch, wie Pucheran angibt, ein scharfes Rechteck jederseits zu bilden. Diese Färbung rührt davon her, wie auch Pucheran anführt, daß die Haare an diesen Stellen zum größten Theil weiß und nur an der Spitze braungelb gefärbt sind. Der Theil hinter der durch die Haarwirbel ausgezeichneten Querlinie ist nebst der Innenseite der Schenkel rein weiß. So scheint mir kein Zweifel über die Identität unserer und der pariser Art zu seyn.

Doch scheint es fraglich, ob diese Zeichnung wirklich so charakteristisch für diese Art ist, als es Pucheran behauptet. Denn bei dem Weibchen verhält sich selbige etwas anders. Die Brust ist im Ganzen etwas glänzender gelb als bei dem Männchen, aber der hintere Theil der Brust ist nur an den Seiten und längs der Mitte braungelb gefärbt. Zu beiden Seiten des Mitteltheiles der Brust befindet sich eine breite weiße Binde, welche durch den braungelben Mittelstreif bis etwa zum Ende des ersten Viertels des Unterleibs von einander getrennt bleiben und dann, da hier der braungelbe Mittelstreif aufhört, zusammenfließen, so daß nun der ganze übrige Theil des Unterleibs, auch die Querlinie, weiß erscheint. Wird man deßhalb das Weibchen als Art von dem Männchen trennen?

So weit Hr. Prof. Peters. Ich kann ihm nur beipflichten, daß man so kleine Farbenabweichungen nicht zu specifischen Abscheidungen benützen darf und sehe demnach die pariser Exemplare für derselben Art als die Berliner angehörig an[1]).

---

1) Zur Gruppe Reduncina gehören noch zwei Hirsche, die weitere Vergleichungen erfordern, bevor man sich über sie bestimmt aussprechen kann, nämlich der C. savannarum und C. punctulatus. Cervus savannarum ist von Cabanis und Rich. Schomburgk (Reisen in Britisch-Guiana III. S. 785) aufgestellt worden. „Hat Aehnlichkeit mit dem C. virginianus und C. mangivorus Schrank (C. gymnotis Wiegm.) Besonders

V. Subgen. Capreolus.

Cornua brevia apice furcata; sinus suborbitales et cauda subnulla.

26. C. Capreolus Linn., das Reh.

Cervus Capreolus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 385. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 450, 490. — B. Nibbend. ſibir. Reiſe. Säugth. S. 118. tab. 12. fig. 4. (Gehörn). — Capreolus europaeus. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 137. — Capreolus Capraea. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 426.

var. β) major, cornibus basi valde granulatis.

Cervus pygargus Pall. Wagn. a. a. O. — Brandt bullet. de l'Académ. de Petersb. III. p. 280; Tchichatcheff voy., anim. vertebr. p. 37. — Bonap. catal. dei mammif. europ. 1845. — Schinz Monogr. der Hirſche S. 21. tab. 25. — Capreolus pygargus. Sundev. l. c. — Gray l. c.; ann. of nat. hist. V. p. 224.

Bekanntlich hatte Pallas, der zuerſt den C. pygargus als eigenthümliche Art von C. Capreolus abſonderte, ſpäterhin denſelben wieder mit letzterem vereinigt. Hiemit ſind jedoch Sundevall, Brandt, Bonaparte, Schinz und Gray, nach Selbſtanſicht von Exemplaren des C. pygargus, nicht einverſtanden, ſondern haben ihn wieder in ſei-

---

kommt er dem C. virginianus in der Form und Bildung des Geweihes ſehr nahe, unterſcheidet ſich aber von dieſem durch viel geringere Größe und ſomit auch durch ſchwächeres, weniger entwickeltes Geweih. Von C. mangivorus, den er in der Größe weniger auffallend überragt und dem er in der Färbung und Zeichnung ſehr ähnlich ſieht, unterſcheidet er ſich durch ſtärkeres, in der Form dem des C. virginianus annäherndes Geweih und durch behaarte, nicht nackte Ohren. Ein fernerer Unterſchied in der dunklen Zeichnung am Kopfe iſt der, daß an der Unterlippe nur an jeder Seite ein dunkelbrauner Fleck iſt, und daß dieſe Flecke nach unten nicht zuſammenſtoßen. Ganze Länge etwa 5′, Schwanz 3″ 4‴, mit der Behaarung etwa 5½ Zoll.* Nur über die große Savanne verbreitet, wo man dieſen Hirſch vereinzelt, höchſtens in Rudeln von 3 bis 4 Stück begegnet, übrigens gemein, ſo daß Schomburgk's Jäger wenigſtens 200 Stück erlegten.

Der Cervus punctulatus iſt von Gray (a. a. O. S. 430) auf ein Weibchen im zoologiſchen Garten, das aus Kalifornien abſtammen ſoll, begründet. Es iſt viel kleiner als der C. Lewisii und dunkler als der C. virginianus und differirt durch die dunkeln Haare mit einem deutlichen, faſt endſtändigen gelben Ringe.

ner Artberechtigung restituirt. Am detaillirtesten hat Brandt die Differenzen hervorgehoben, und ist zu dem Schlusse gekommen, daß im Allgemeinen der C. pygargus als ein Reh von größerer Gestalt betrachtet werden könne, mit dem Kopf und den Hörnern eines gewöhnlichen Hirsches (!), dem er sich übrigens einigermassen durch die Form des Schwanzes, welche etwas voluminöser als beim gewöhnlichen Rehe sey, annähere. Mit dieser Ansicht ist jedoch v. Middendorff nicht einverstanden, der im Wesentlichen folgende Erklärung abgiebt. Der ganze Unterschied beschränke sich auf etwas knorrigere und kräftigere Spieße: das sibirische Reh habe Spieße von derselben Bildung wie das europäische und keine Geweihe. Ferner sey die Angabe, daß das sibirische Reh größer von Wuchs sey als das europäische, nur im Durchschnitt richtig, denn Rehe von 70 Pf. wie das von Pallas gewogene sibirische kämen, nach Bechstein und Andern, sogar in Westeuropa vor, überdieß sey das europäisch russische schon größer als das rheinländische und die kaukasischen Rehe vermittelten den Uebergang zu den sibirischen.

Ich schließe mich der durch v. Middendorf gegebenen Erklärung an, um so mehr, da man bei uns in solchen Sammlungen[1]), die aus älterer Zeit her Rehgehörne aufbewahren, nicht selten solche antrifft, welche durch außerordentliche Entwickelung den größten sibirischen gleichkommen[2]). Daß dem Rehe, den gewöhnlichen Angaben entgegen, nicht immer die Eckzähne ganz abgehen, hat Hensel[3]) dargethan. Die Entwicklungsgeschichte des

1) Die werthvollste Sammlung an Geweihen von unsern einheimischen Arten aus der Gattung des Hirsches ist wohl die des Herrn Grafen von Arco-Zinneberg in München.

2) Man kennt nur eine Art von Rehen. Gray wollte ihr neuerdings (ann. of nat. hist. V. p. 224; Archiv f. Naturgesch. XVII. 2. S. 28) eine zweite beifügen: Capreolus leucotis, nach einem Weibchen von der Magellanstraße; er hat indeß bald nachher diese Vereinigung wieder aufgegeben und die neue Art zum Gemul gestellt, dem sie auch wirklich angehört.

3) Archiv für Naturgesch. 1853. S. 23.

Rehes iſt nunmehr durch die genauen Unterſuchungen von Biſchoff[1]) zur klaren Einſicht gebracht worden[2]).

VI. Subgen. Furcifer Wagn.

Cornua brevia, fere usque ad basin furcatim fissa; sinus suborbitales majusculi.

27. C. antisiensis D'Orb., die Taruga; fuscus, albido-puncturatus,

---

1) Entwicklungsgeſchichte des Rehes. Gießen 1854. Zufolge der hier gegebenen verläſſigen Aufklärungen iſt der Hergang in der Verzögerung der Entwicklung des Eies anders als es Ziegler dargeſtellt hatte. Von den Reſultaten, zu welchen Biſchoff gelangte, wollen wir nur nachſtehende hier in Erwähnung bringen. 1) Die Brunſt, Begattung und Befruchtung der Rehe erfolgt Ende Juli und im Auguſt; nur zu dieſer Zeit hat die Geis reife Eier und der Bock reifen Samen, im Dezember findet ſich Beides nicht. 2) Zur Zeit der Brunſt und meiſt gleich nach der Begattung verläßt das Ei den Eierſtock und tritt in den Eileiter, woſelbſt es dem Samen begegnet und befruchtet wird. 3) Das Ei geht in kurzer Zeit, längſtens in einigen Tagen, durch den Eileiter hindurch, macht hier, ohne Eiweiß zu erhalten, den Furchungsprozeß durch, und gelangt noch in ſeiner urſprünglichen Größe, kaum $\frac{1}{12}$ Linie groß, in den Uterus. 4) Nachdem hier die Theilung des Dotters wieder gänzlich verſchwunden, und die Dottermaſſe ſich wieder gleichförmig in der Dotterhaut vertheilt hat, verweilt jetzt das Ei, ohne ſich irgend wie zu verändern, $4\frac{1}{2}$ Monate, bis nach Mitte Dezember, in demſelben ganz unentwickelten Zuſtande im Uterus, wird daher ſtets überſehen, und iſt ſelbſt für den Kenner ſehr ſchwer zu entdecken. Auch an dem Uterus ereignet ſich während dieſer Zeit gar keine Veränderung, und ſo begründet ſich der Glaube, das Thier ſei nicht trächtig. 5) Allein plötzlich nach Mitte Dezember fängt das Ei mit derſelben Schnelligkeit des Fortgangs der Entwicklung, wie bei allen übrigen Säugthieren und namentlich Wiederkäuern, an ſich zu entwickeln, ſo zwar, daß in Zeit von 21 bis 25 Tagen alle Theile des Eies und alle Organe des Embryo ſo weit gebildet ſind, daß ſie fortan bis zur Geburt nur noch eine Vergrößerung erfahren. 6) Die Geburt erfolgt 40 Wochen nach der Begattung und Befruchtung.

2) Obwohl es jetzt, nachdem die Entwicklungsgeſchichte des Rehes nach allen ihren phyſiologiſchen Momenten genau gekannt iſt, faſt überflüſſig iſt, noch auf einzelne Beobachtungen über die wahre Brunſtzeit der Rehe zurückzukommen, ſo mag doch hier auf einen ſolchen ganz verbürgten Fall, wo die Befruchtung einer Geis nur im Auguſt hatte erfolgen können, aufmerkſam gemacht werden (Korreſpondenzblatt des zoologiſch-mineral. Vereins in Regensburg 1849 S. 34).

subtus obscrior, inguinibus artuumque latere interiore albis; vellere rudi, cauda brevi.

Cervus antisiensis. D'Orbign. nouv. ann. d. mus. III. p. 94; voy. dans l'Amér. merid. mammif. p. 28. tab. 20 fig. 1. — Pucher. dict. univ. d'hist. nat. III, p. 328; archiv d. mus. VI. p. 467, 490. — Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 384. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 136. — Tſchud. Faun. peruan. I. S. 241. tab. 18. — Furcifer antisiensis. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 427.

Nachdem jetzt die ausführliche Beſchreibung von J. v. Tſchudi vorliegt und Pucheran die ſeinige nach den 2 Exemplaren des pariſer Muſeums vervollſtändigt hat, habe ich hier noch einige Nachträge beizubringen. Das Weibchen hat kein Geweih und die Jungen ſind ungefleckt. Die Ohren ſind innen weiß, außen braungrau, an der Baſis mit einem herzförmigen ſilbergrauen Fleck. Der Bauch iſt viel dunkler als der Rücken. Der Schwanz iſt ſehr kurz, und an der Innenſeite der Tarſen findet ſich ein pinſelförmiger Haarbüſchel. Eckzähne ſind bei beiden Geſchlechtern vorhanden. Pucheran giebt folgende Ausmeſſungen an.

Länge, gerade, von der Schnauze bis zur Schwanzwurzel		1m,	04
— des Schwanzes mit den Haaren		0	19
— des Kopfes bis zum Roſenſtock		0	185
— der Ohren vorn gemeſſen		0	12
Höhe an der Schulter		0	74
Länge des Geweihs bis zur Spitze des vordern Gabelaſtes, längs der Convexität gemeſſen	rechts	0	165
	links	0	15
Länge des Geweihs bis zur Spitze des hintern Gabelaſtes	rechts	0	175
	links	0	185
Abſtand zwiſchen den Gabelſpitzen	rechts	0	135
	links	0	11

Nach v. Tſchudi beträgt die ganze Länge des Thiers 3′ 11″ bis 4′ 3″, der Ohren 5″ 6‴, die Schulterhöhe 2′ 2″ bis 2′ 4″.

Der Andeshirſch (Taruga) iſt ein Bewohner der Hochgebirge. D'Orbigny hat ihn auf den öſtlichen Cordilleren von Bolivia, namentlich um la Paz, Cochabamba und Chuquiſaca, und zwar nie unter 4000 Metres Meereshöhe entdeckt. Tſchudi hat ihn in Peru aufgefunden, wo er den Mittelſtrich, beſonders die Oſtabdachung der Küſtencordilleren bewohnt;

zwiſchen 14 bis 16,000′ über dem Meere iſt ſein Hauptverbreitungsbezirk, doch geht er auch zuweilen bis zu 11,000′ herunter, hauptſächlich um zu trinken. Neuerdings iſt der Andeshirſch auch aus der Republik Ecuador bekannt geworden, wo er in der Umgebung des Chimboraſſo, Pichincha, Cotopaxi und Cuyambe vorkommt.

Wie uns v. Tſchudi berichtet, hält ſich die Taruga (Taruſch) an den ſteilen Felsabhängen der Hochebenen auf und ſchläft am Tage im Gerölle oder zwiſchen großen Steinblöcken und weidet am Abend ſpät und des Morgens vor Sonnenaufgang die ſpärlichen Kräuter und Mooſe an den Bergabhängen ab. Die Rudel werden von einem alten Männchen angeführt, welches ſich gewöhnlich durch hellere Farbe und bedeutendere Größe auszeichnet. Die verſchiednen Farbenabänderungen ſind hauptſächlich durch das Reiben an Steinen und die Sprödigkeit der leicht brechlichen Haare bedingt; je nachdem vorzüglich helle oder dunkle Ringe am Ende der gebrochenen Haare hervorſtehen, erſcheint auch der Pelz heller oder dunkler. Das Fell eines alten Männchens, das der erwähnte Reiſende mitbrachte, ſtimmte auffallend in der Färbung mit dem Cuguar überein. Das Geweihe wird einmal im Jahre abgeworfen und das neue iſt längere Zeit mit Haut überzogen.

* **C. chilensis Gay Gerv., der Guamul; C. antisiensi simillimus, at obscurior.**

Cervus chilensis. Gay et Gerv. ann. des sc. nat. 1846 p. 91; hist. de Chile, mamm. p. 159. tab. 10. fig. 1. (Schädel), 11. (Thier). — Pucher. archiv d. mus. VI. p. 484. — Capreolus leucotis. Gray ann. of. nat. hist. sec. ser. V. p. 224; proceed. of the zool. soc. 1849 p. 64. tab. 12. — Furcifer Huamel Gray ann. IX. p. 427. — Cervequus andicus. Less. catal. des mamm. p. 173. — Equus bisulcus. Molin. hist. Chil. p. 364.

Unter dem Namen Guemul, Huemul, Equus bisulcus, führte Molina ein chiliſches Thier auf, das, wie ſchon der lateiniſche Name errathen läßt, die Verwunderung der Zoologen in nicht geringem Grade erregte. Gay hat nun neuerdings in Chile ein Thier aufgefunden, das dort den Namen Guamul führt und in dem er alſo wohl mit Recht die gleiche Art mit der von Molina angegebenen erkennen will, nur daß ſie nicht zu den Pferden, und gar zu den mit geſpaltenen Hufen, ſondern

zu den Hirschen gehört. Von Gay und Gervais, sowie von Pucheran wird dieser Guamul folgendermassen geschildert.

Die Behaarung ist sehr reichlich und minder trocken und brüchig als bei C. antisiensis. Der Pelz ist ganz dunkelbraun und falb gesprenkelt; die Sprenkelung ist dunkler längs der Rückenmitte, und auf der Oberseite des Halses und der Gliedmassen; an den Seiten ist sie heller. Jedes Haar ist an der Basis graulich, dann braun, mit einem falben Ringe vor der schwarzen Spitze. Hinter jedem Nasenloch findet sich ein schwarzer Fleck, die Spitze des Unterkiefers ist weiß. Die Unterseite des Halses ist wie die Leibesseiten gefärbt. Die Ohren sind innen weiß behaart. Die Brust- und Bauchgegend ist schwärzlichbraun, zumal hinterwärts; die Weichen nebst der Oberhälfte der Innenseite der Schenkel sind weiß mit gelblichem Anfluge. Der Schwanz ist oben schwärzlich, unten und an der Spitze weiß.

Vorstehende Beschreibung ist nach einem jungen, von Gay nach Paris mitgebrachten Männchen gefertigt, das noch kein Geweih trug und dessen Stirnzapfen nicht mehr als bei dem gleichfalls von Gay abgebildeten jungen Männchen von C. Pudu entwickelt waren. Die Länge des gedachten Individuums beträgt in gerader Linie 1_m, 0, des Schwanzes mit Haaren 0, 18, der Ohren 0, 14 und die Schulterhöhe 0, 68. Nach den Angaben, die Gay in Chile erhielt, sind die Hörner klein und gegabelt. — Dieser Hirsch ist in Chile einheimisch, wo er die schroffsten Höhen der Cordilleren bewohnt, von der Provinz Colchagua bis zu der von Conception.

Gay und Gervais verkennen selbst nicht die nahen Beziehungen ihres C. chilensis zu C. antisiensis, wollen aber gleichwohl beide dadurch specifisch scheiden, daß bei letzterem die Töne durchgängig lichter und blasser sind, die Unterseite keineswegs schwärzlich ist und der Schwanz weniger Schwarz hat. Bedenkt man indeß, daß die Beschreibung der genannten Zoologen nur auf einem einzigen Exemplare beruht, überdieß noch auf einem nicht einmal vollständig erwachsenen und daher wohl noch nicht rein ausgefärbten, so verlieren die angegebenen, an sich schon sehr unbedeutenden Differenzen allen Werth. In allen andern Punkten findet man, zumal wenn man die Vergleichung mit der von Tschudi gegebenen Beschrei-

bung des C. antisiensis vornimmt, völlige Uebereinstimmung zwischen diesem und dem C. chilensis, so daß kein Zweifel über ihre specifische Identität obwalten kann. Diese erhält durch die Gleichförmigkeit des Aufenthaltsortes, nämlich die höchsten zugänglichen Höhen der Cordilleren, eine weitere Bestätigung.

Dem Gesagten gemäß hat der Andeshirsch (C. antisiensis s. chilensis) eine weite Verbreitung, indem er die ganze südamerikanische Cordillerenkette von der Provinz Ecuador an bis nach Patagonien bewohnt und gleich dem Guanako bis gegen die Magellansstraße hinab steigt.

VII. Subgen. Subulo H. Smith (Coassus Gray).

Cornua brevia simplicia, sinus suborbitales parvi.

Kleine südamerikanische Arten, deren Geweihe für die ganze Lebenszeit einfache Spieße verbleiben [1]).

28. C. rufus Ill., der rothe Spießhirsch.

Cervus rufus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 388. — Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 136. — Tschud. Faun. peruan. I. S. 239. — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 471, 490. — Burmeist. Uebers. der Thiere Brasil. I. S. 316. — Coassus rufus. Gray Knowsley Menag. p. 69. tab. 47; ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 432.

In meiner früheren Beschreibung hatte ich, nach dem Vorgange von Cuvier und H. Smith, die Vermuthung aufgeworfen, ob nicht unter dieser Art 2 zu unterscheiden wären, wovon ich die eine größere C. dolichurus benannte und der andern kleineren den Namen C. rufus ließ. Pucheran hat sich an die Beantwortung dieser Frage gemacht und gezeigt, daß in den, von mir angeführten Differenzen keine andere übrig bleibe als die in der Größe. Er vermuthet, daß letztere vielleicht von der Verschiedenheit des Aufenthaltsortes herrühren könnte und fordert deshalb künftige Reisende auf, über diesen Punkt Aufschlüsse beizubringen.

---

1) Eckzähne, die bisher nur bei der großen Varietät von C. rufus bekannt waren, bei der kleineren aber so wie bei C. nemorivagus ganz vermißt wurden, sind nunmehr auch bei letzteren beiden in einigen Fällen von Pucheran aufgefunden.

Tschudi hat diesen Hirsch, der über das ganze flache Südamerika von Paraguay bis nach Guiana verbreitet ist, auch in den peruanischen Urwäldern aufgefunden, wo er jedoch die Höhe von 2500′ nicht übersteigt und schon bei 2000′ selten wird.

29. C. rufinus Pucher., der schwarzfüßige Spießhirsch; C. rufo simillimus, at minor, rostro pedibusque nigricantibus.

Cervus rufinus. Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 491. tab. 30.

Von Pucheran neuerdings nach 2 Exemplaren beiderlei Geschlechts aufgestellt. An Größe steht dieser Spießhirsch der kleineren Abänderung des C. rufus nach. Wie bei diesem sind die Kopfseiten, die Ober- und Unterseite des Halses, der Rücken und die Seiten ziemlich lebhaft braunroth, wobei die Haare nur an der Spitze roth, im übrigen Theil weiß sind. Die Kehle, Brust- und Bauchgegend sind von einem schmutzigeren Roth, was in den Weichen mehr verbleicht. Die Gliedmassen sind anfangs gleichfarbig mit den Seiten, nehmen aber gegen die Gelenkung einen schwärzlichen Ton an, der die hintern Füße ganz färbt, auf den vordern aber nur die äußere Seite, während die untere dem Bauche gleichfarbig ist. Die Schnautze ist schwarz. Das Ende des Unterkiefers zeigt einen weißlichen Fleck; ein ähnlicher findet sich am Oberkiefer unter den Nasenlöchern. Die Spieße sind weiß, stark hinterwärts geneigt und fast in ihrer ganzen Erstreckung glatt. Der Schwanz ist oben dem Rücken gleichfarbig, unten weiß.

Das Männchen zeigt nachstehende Dimensionen.

Länge, gerade, des Körpers	0m,	65
— der Spieße	0	062
Schulterhöhe	0	435

Vom Weibchen giebt Pucheran die Schwanzlänge zu 10 Centim. an.

Als Unterschiede dieser neuen Art von C. rufus bezeichnet er 1) ihre geringere Größe; 2) die rothe Farbe der Kehle, die bei C. rufus weiß ist; 3) die braunrothe Farbe des Vorderhalses, welche bei C. rufus braun ist und bei manchen Individuen schwärzlich wird; 4) die schwärzliche Farbe der Füße und der Schnautze.

Diese Art ist einheimisch in der Provinz Ecuador, wo Bourcier

die beiden Exemplare, welche jetzt das pariser Museum besitzt, im Thale von Loa, am Westabhange der Cordilleren von Pichincha, erlegte. Die Art ist ziemlich selten und lebt in den kleinen Waldungen der Hochthäler der Gebirge, deren Erhebung nicht unter 12,000' beträgt.

Die Abscheidung des C. rufinus von C. rufus scheint mir nicht blos durch Abweichungen in der Größe und Färbung, sondern noch vielmehr durch die Verschiedenheit des Wohnortes gerechtfertigt zu seyn; jener ein Bewohner der kalten Alpenregion, dieser ein Bewohner der heißen Tiefländer [1]).

30. C. simplicicornis Ill., der braune Spießhirsch.

Cervus simplicicornis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 390. — Sundev. pecora 1844; Archiv skand. Beitr. II. S. 136. — Burmeist. Uebers. der Thiere Brasil. I. S. 317. — C. nemorivagus. Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 478. — Coassus nemorivagus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 431.

β) var. major, obscurior, pilis unicoloribus apice albidis.

Cervus nemorivagus. Tschud. faun. peruan. I. S. 240.

Wird nicht blos in den heißen Tiefländern Südamerikas ostwärts der Anden angetroffen, sondern v. Tschudi zählt auch zu dieser Art diejenigen Spießhirsche, welche er häufig in den Hochgebirgen Peru's zu sehen bekam und von den Indianern Lliuchu genannt werden [2]). Hier

---

1) Noch hat Gray (ann. of nat. hist. IX. p. 482) 2 Arten rother Spießhirsche, Coassus superciliaris und C. auritus von ihm benannt, aufgestellt, die bei der kurzen Charakteristik, die er von ihnen gegeben, sich nicht sicher deuten lassen, weshalb Pucheran sich auch begnügte, lediglich ihre Namen aufzuführen, ohne weitere Bemerkungen. Der C. superciliaris ist in der Knowsley Menagerie tab. 48 in beiden Geschlechten abgebildet, dort aber von Gray als C. rufus bezeichnet, von dem er auch weiter nichts als eine der mancherlei Farbenabänderungen seyn wird. Als Heimath giebt er Para an. — Seine andere Art, nach einem Weibchen aufgestellt, das aus Brasilien herstammen soll, benennt Gray Coassus auritus. — Lund's Cervus nanus ist mir gleichfalls unbekannt.

2) Nach Tschudi's Beschreibung des Lliuchu ist „der ganze obere Theil des Körpers braun, mit einer kaum bemerkbaren weißlichen Sprenkelung, indem die einzelnen Haare, die ihrer ganzen Länge nach braun sind, nach der Spitze zu viel heller, sogar ganz weiß werden. Der Kopf, besonders das Gesicht um die Augen, ist etwas dunkler; der Lippensaum und die Kehle sind schmutzigweiß, die Außenseite der Ohren ist

kommen sie von der Küstenregion, in der sie häufig sind, durch alle Regionen des Westabhanges der Küstencordillere bis zu 16,000' vor, übersteigen deren Kamm, verbreiten sich auch über den Mittelstrich, wo sie oft mit der Taruga zugleich gesehen werden und treten sogar am Ostabhange der Binnencordillere bis zur Cejarregion auf. Hier aber verschwinden sie plötzlich und werden in Peru in den niedrigen östlichen Regionen nicht mehr gefunden, was um so auffallender ist, da sie im Flachlande Brasiliens häufig vorkommen. Letzterer Umstand sowohl als die etwas beträchtlichere Größe des peruanischen Spießhirsches, ferner seine dunklere Färbung, die ungeringelten, blos an der Spitze helleren Haare, und die falbe Färbung des Unterleibs und der Innenseite der Gliedmassen, während letztere bei dem brasilischen C. simplicicornis nebst dem Hinterbauche weiß sind, läßt wohl mit Recht vermuthen, daß hier ein ähnliches Verhältniß wie zwischen C. rufinus und rufus stattfindet, nämlich daß der Uiuchu der peruanischen Cordilleren sich von dem Guasubira (C. simplicicornis) des brasilischen Tieflandes als besondere Art oder constante Varietät unterscheidet, die wir einstweilen mit dem Namen des berühmten Reisenden als Cervus Tschudii bezeichnen wollen.

VIII. Subgen. Cervulus Blainv. (Stylocerus H. Smith, Prox Og.)

Cornua parva simplicia aut propugnaculo brevissimo instructa, cerasphoriis longis imposita; dentes laniarii in utroque sexu, marium exserti; sinus suborbitales elongati; cutis frontis longitudinaliter diplicata.

Die Vorderhufe sind dreieckig und zum Theil vereinigt, die Afterhufe

---

dunkelbraun, der Rand und die spärliche Behaarung der Innenseite sind weiß; die Brust und der Unterleib sind weiß; diese Farbe erstreckt sich auch über die ganze innere Seite der Gliedmassen, nur ist sie an den Hinterfüssen etwas dunkler. Die untere Seite des Schwanzes ist weiß, die obere von der Rückenfarbe. Das Geweih besteht aus kurzen, einfachen, glatten, scharfen Spießen. Der Pelz ist lang und ziemlich weich." Der Körper mißt 4' 2", der Schwanz ohne Haare 3" 8"', mit Haaren 4" 4"', die Ohren 4", die Schulterhöhe 2' 4". Die Jungen sind weiß gefleckt. — Tschudi macht selbst bemerklich, daß seine Beschreibung etwas von der der brasilischen Thiere abweiche, auch schienen die peruanischen etwas größer zu seyn: er meint jedoch, daß die Unterschiede zu unbedeutend seyen, um für mehr als klimatische Abweichung Werth zu haben.

klein und quer; der Schwanz iſt verlängert und flockig; die Jungen ſind ungefleckt. Südaſien angehörig [1]).

31. C. Muntjac. Zimm., der malayiſche Mintjak; saturate fulvido-fuscus.

Cervus Muntjac. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 395. — S. Müll. Schleg. verhandel. I. p. 44, 225. — Prox Muntjac. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 137. — Cervulus vaginalis. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 425. — Horsf. catal. p. 189. — Styloceros Muntjak. Cant. journ. of the Asiat. soc. XV. p. 269.

S. Müller und Schlegel machen auf den Umſtand aufmerkſam, daß ſowohl in der Länge der Roſenſtöcke und der Krümmung der Hörner, als auch in der Färbung mancherlei Verſchiedenheiten bei dieſen Thieren vorkommen, durch welche man ſich nicht verleiten laſſen dürfe, darauf ſpecifiſche Sonderungen zu begründen. So iſt z. B. die Färbung gewöhnlich dunkel röthlichbraun, geht aber auch nicht ſelten ins Gelblichbraune über und man findet ſelbſt ſehr blaſſe Exemplare von ganz fahlbrauner Farbe. Dieſe Abänderungen hängen aber nicht von der Verſchiedenheit der Wohnplätze ab, und können deshalb nur als individuell oder zufällig betrachtet werden.

Der malayiſche Mintjak kommt auf Sumatra, Java, Borneo und Banka vor und iſt wahrſcheinlich identiſch mit dem auf der malayiſchen Halbinſel einheimiſchen. Von den Malayen wird er Kiedjang (Kiedang, Kidhang), von den Sundaneſen auf Java auch Mintjak genannt, woraus durch Verſtümmelung Muntjak gemacht wurde.

32. C. styloceros Wagn., der indiſche Mintjak; fulvus.

Cervus stylocerus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 392. — Cervulus moschatus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 425. — Horsf. catal. p. 190. — C. Ratwa Hodgs. Wagn. a. a. O. S. 393. — C. albipes.

1) Die ſichere Feſtſtellung der Arten iſt noch nicht erfolgt. Während ich 4 Arten annahm, führt Sundevall 6, Gray nur 3 auf, und S. Müller und Schlegel ſind geneigt blos eine einzige anzuerkennen. Pucheran hat dieſe Gruppe ganz übergangen.

Wagn. a. a. O. S. 394. — C. melas Ogilb. — Prox ratwa, albipes, stylocerus, melas. SUNDEV. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 138.

Es iſt ſchon vorhin angeführt worden, daß S. Müller und Schlegel die Mintjaks des indiſchen Feſtlandes mit denen des indiſchen Archipels zu einer Art verbunden haben, was auch von Cantor geſchehen iſt. Derſelben Anſicht war früherhin ebenfalls Gray [1]), obwohl ihm Exemplare von verſchiedenen Gegenden Indiens zur Vergleichung vorlagen, insbeſondere auch von Hodgſon's Ratwa, und er ſonſt zur Zerſplitterung der Arten ſehr geneigt iſt. Späterhin hat er allerdings die des Feſtlandes und des Archipels als 2 Arten hingeſtellt, wobei er aber ſämmtliche indiſche unter einer Species zuſammenfaßte und überhaupt ſeinen Cervulus vaginalis des Archipels von dem C. moschatus des Feſtlandes nicht anders unterſchieden hat, als daß er dunkler als letzterer gefärbt iſt. Daß dieſes Merkmal jedoch kein ſtandhaftes iſt, geht theils aus der vorhin erwähnten Erklärung von S. Müller und Schlegel bezüglich der Farbenabänderungen der Mintjaks des indiſchen Archipels, theils aus der von Ogilby über die Mintjaks des indiſchen Feſtlandes abgegebenen Bemerkung hervor, indem letzterer unter dieſen licht ſandfalbe, dunkler braune und ſogar ganz ſchwarze unterſcheidet. Wenn alſo Gray keine ſtandhafteren Unterſcheidungsmerkmale als die von der Färbung entlehnten wird beibringen können, ſo muß die Trennung der beiden Arten voneinander wieder aufgehoben werden. Auch Horsfield iſt geneigt beide zu vereinigen.

33. C. Reevesii Og., der chineſiſche Mintjak.

Cervus Reevesii. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 397. — Cervulus Reevesii. GRAY ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 426.

Der ganze Beitrag, der zur Kenntniß dieſes höchſt unvollſtändig gekannten Mintjaks ſeit der erſten Bekanntmachung hinzu gekommen iſt, beſteht in den wenigen Worten von Gray: „graulich braun, Haare blaſſer geringelt.“ Dabei bemerkt er, daß der Earl von Derby dieſe 3 Ar-

1) List of the specim. of mammal. in the Brit. Mus. 1843 p. 173 als Muntjacus vaginalis; ferner unter demſelben Namen im Catal. of mammal. of Nepal and Tibet present. by B. H. Hodgson. 1846 p. 31.

ten in ſeiner Menagerie beſitzt, daß ſie ſich aber miteinander fortpflanzen und es deshalb unmöglich geworden ſey, die Baſtarde von den urſprünglichen Arten zu unterſcheiden. Auch für dieſen C. Reevesii iſt der Nachweis über ſeine Anſprüche auf Artenrechte erſt noch beizubringen.

IX. Sedis incertae.

34. C. Pudu Molin., der Pudu; parvus, supra fuscus, fulvido-punctulatus; auriculis brevibus artuumque latere interiore ferrugineis; cauda brevissima floccosa; vellere rudi copioso. — Tab. 26.

Cervus Pudu. Gerv. ann. des sc. nat. 1846 p. 87; Gay, hist. de Chile, Zool. I. p. 158. tab. 9. (Thier), tab. 10. fig. 2. (Schädel). — Pucher. archiv. d. mus. VI. p. 482. — Cervus humilis Benn. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 397. — Sundev. pecora 1844; Archiv. ſtand. Beitr. II. S. 136. — Fraser zoolog. typica tab. 14. — Coassus Pudu. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. IX. p. 433. — Capra Pudu Molin.

Obwohl man jetzt von dieſer Art Exemplare in den Sammlungen von London, Paris, Frankfurt, München und anderwärts beſitzt, auch gar kein Zweifel darüber beſteht, daß ſie wirklich eine höchſt eigenthümliche ausgezeichnete Species bildet[1]), ſo weiß man doch nicht, welcher Gruppe unter den Hirſchen ſie zuzuweiſen iſt, da ſonderbarer Weiſe das erwachſene Männchen und mithin auch die Form ſeines Gehörns, worauf die Untergattungen begründet ſind, uns bisher unbekannt geblieben iſt.

In der Schilderung der äußern Formen ſtimmen die verſchiedenen Beſchreibungen vollkommen überein; dieß gilt im Allgemeinen auch von der Färbung, doch giebt es in dieſer Beziehung einige Abweichungen, die ſich indeſſen leicht aus der Verſchiedenheit des Winter- und Sommerpelzes ableiten laſſen. Ich werde zuerſt dievon Pucheran gegebene Beſchreibung mittheilen, von ihm nach 2 Exemplaren entworfen, die Gay aus Chile mitbrachte und auf welchen ebenfalls die von letzterem und Gervais gelieferte Darſtel-

1) Sundevall, und auf ſeine Autorität auch Gray, meint, daß dieſer C. humilis mit meinem C. rufus identiſch ſein könne; allein dieß ſind zwei total verſchiedene Arten.

lung beruht. Alsdann werde ich von dem hiesigen Exemplare die Beschreibung liefern.

Der Pelz ist, wie Pucheran sagt, rauh, trocken und brüchig, obwohl die einzelnen Haare ziemlich fein sind. Die Färbung ist braun, fein lichtfalb gesprenkelt auf den Seiten und dem Halse; auf den letzten zwei Dritteln des Rückens, dem Kreuze und dem größern Theile der Außenseite der Gliedmassen wird sie röthlicher. In der ganzen Erstreckung der Läufe ist die röthliche Farbe die vorherrschende, obwohl hinterwärts dunkler als vorn. Der Raum zwischen den Ohren und Augen ist ebenfalls röthlich; die Haare sind daselbst aufgerichtet und gesträubt wie bei manchen Antilopen. Der Schnautzenrücken und die Kopfseiten sind wie der Rumpf braun und gesprenkelt. Die Ohren sind außen mit ziemlich langen röthlichen Haaren besetzt; an ihrer Basis sind sie falb, was sich in einem lichteren Fleck am äußern Grunde der Ohren verliert; die Innenseite hat viel blassere Haare. Jedes Haar hat einen falben Ring vor seiner schwarzen Spitze; die Basis ist weißlichgrau und zwischen dieser und dem falben Ring findet sich noch ein brauner. Ueberall, wo die Färbung des Pelzes mehr röthlich ist, hat der vorletzte Ring diese Farbe. — Von falber Farbe ist der Rand der Oberlippe, die Kehle, Unterseite des Halses, alle untern Gegenden und das Innere der Gliedmassen. Dieser Ton ist lebhafter roth längs der Lippen und auf der Brust, weißlicher in den Weichen. Die Innenseite der Schenkel und der Schwanzstummel ist röthlich.

Vom zweiten größeren Exemplare hebt Pucheran hervor, daß die röthlichen Töne fast ganz verwischt, und die dunkeln und brauneren vorherrschend sind. Der Schwanz ist röthlich, vor der Spitze schwarz. Beide Exemplare sind ungehörnt.

Das Exemplar der hiesigen Sammlung, ebenfalls ein ungehörntes und noch nicht ganz erwachsenes, ist von folgender Beschaffenheit.

Die Ohren sind ziemlich kurz, hinten und am Rande dicht, innen spärlich behaart; die Thränengrube mittelgroß; der Schwanz ein kurzer langhaariger Stummel, der durch die langen Haare der Hinterkeulen größtentheils verdeckt wird; die Hufe sind lang, schmal und spitzig. Der Pelz ist sehr dicht und reichlich, mit ziemlich langen anliegenden brüchigen, leicht

ausfallenden Haaren; auf der obern Hälfte der Hinterseite des Mittelfußes bilden sie eine Art Bürste. Die Farbe ist im Allgemeinen dunkelbraun mit feiner lichtfarbiger Sprenkelung, auf dem Kopfe am dunkelsten, am Halse ins Grauliche fallend, am Vorderhalse mit überwiegender fahlgelber Sprenkelung. Die Lippen, die Hinterseite und der Rand der Ohren, der Unterleib und die Innenseite der Gliedmassen ist von einem Falb, das bald mehr ins Gelbe, bald mehr ins Rothe zieht.

Im Einzelnen verhält sich die Farbenvertheilung folgendermassen. Der Rücken und die Seiten sind glänzend dunkelbraun mit lichtfalber Sprenkelung. Die Haare sind am Grunde bis zu ⅓ oder der Hälfte ihrer Länge lichtgrau, dann dunkelbraun mit kurzem falben Ringe vor der schwarzen Endspitze. Am Hintertheil des Rumpfes sind diese falben Ringe lebhafter, am vordern blasser gefärbt, was noch mehr im Nacken und an den Halsseiten der Fall ist, weshalb diese, indem zugleich der braune Ton lichter wird, einen graulichen Schimmer zeigen. Am ganzen Vorderhalse wird eine fahlgelbe Sprenkelung überwiegend. Der Schnautzenrücken ist fast ganz schwarz, auf der Stirne und an den zwei Haarwulsten, die auf derselben vorstehen, sind die Haare bereits lebhaft rostroth gesprenkelt. Die Hinterseite und der Rand der Ohren ist dicht mit längeren rostigfalben Haaren besetzt. Die Außenseite der Gliedmassen ist dunkelbraun und falb gesprenkelt; abwärts nimmt das Falb immer mehr Roth auf und verdrängt zugleich allmählig das Braun, so daß die ganze Innen- und Hinterseite lebhaft rostroth wird. Rostfalb ist die Ober- und Unterlippe nebst der Kinngegend, was hinter derselben allmählig erbleicht und auf der Kehle fahlgelb mit brauner Sprenkelung erscheint. In der untern Hälfte der Leibesseiten verliert sich fast die falbe Melirung und ein licht graulichbrauner Ton ist vorherrschend, nur die Mittellinie des Bauches hat einen röthlichen Anflug; dagegen ist die Gegend zwischen den Vorder- und Hinterbeinen lebhaft rostroth, an letzteren zum Theil ins licht Falbe übergehend. Der kurze, aber langhaarige Schwanzstummel ist rostigfalb, oben mit schwarzer Sprenkelung. — Die Länge dieses Exemplares beträgt in gerader Linie ohngefähr 2′, der Schwanz mit Haaren 2″, die Ohren 2″ 2‴, die Schulterhöhe 1′.

Der Schädel, den ich aus dem Felle des eben beschriebenen Exem-

plares heraus genommen habe, trägt ganz und gar den Hirschtypus an sich und stimmt in allen Beziehungen, auch hinsichtlich des Alterstandes, mit dem von Gay abgebildeten überein. Der letzte Backenzahn ist eben im Durchbruche begriffen; das ganze Gehörn besteht nur noch in zwei kurzen, stumpfen, etwas rückwärts gewendeten Stirnzapfen, die kaum 2‴ über das Schädeldach vorragen und 13‴ weit auseinander gerückt sind. Diese Merkmale zeigen uns ein junges, noch nicht vollständig erwachsenes Männchen an. Kleine vorwärts gerichtete Eckzähne sind im Oberkiefer vorhanden; die Backenzähne sind verhältnißmäßig groß und zeigen keine Säulchen zwischen ihren Pfeilern. Die sogenannte Thränengrube ist oval und sehr tief. Die Länge dieses Schädels von der Hinterhauptsleiste bis zum Vorderrande der Zwischenkiefer beträgt 4″ 6‴.

Nach Molina's Angaben bewohnt der Pudu in Chile die Cordilleren, von denen er im Winter herab in die Ebenen der südlichen Provinzen kommt und dann seines schmackhaften Fleisches willen in Menge erlegt wird. Gay bestätigt diese Angaben; um so auffallender ist es, daß er über die Gehörnbildung dieser Art nichts weiter als die Notiz von Molina wiederholen kann, der nämlich angiebt, daß die Männchen mit sehr kleinen, runden, divergirenden Hörnern versehen sind. Genauere Angaben über die Form der Hörner sind demnach erst noch zu erwarten[1]).

III. CAMELOPARDALIS. Giraffe.

1. C. Giraffa Linn., die Giraffe.

Camelopardalis Giraffa. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 400. — Joly et Lavocat, mém. de la soc. d'hist. nat. de Strasb. III. 3. p. 1—124 mit 17 Tafeln. — Sebastian, tijdschr. voor natuurl. geschied. XII. p. 185. mit 1 Tafel. — Spencer Cobbold, ann. of. nat. hist. sec. ser. XIII. p. 484.

Neuere Beiträge zur Anatomie der Giraffe sind von Joly und Lavocat, sowie von Sebastian und Spencer Cobbold geliefert worden.

---

1) Zu den ganz unsichern und daher keine weitere Berücksichtigung verdienenden Arten gehören die von Gay und Gervais (ann. des sc. nat. 1846 p. 93) lediglich nach Geweihen aufgestellten C. spinosus von Cayenne und C. Goudotii aus Neugranada.

II. Familie.

Cavicornia. Hohlhörner.

IV. ANTILOPE. Antilope.

Wie bei den Hirschen hat diese Gattung seit meiner früheren Bearbeitung gerade nicht eine besonders große Anzahl neuer Arten erhalten, desto mehr aber hat sie seitdem an genauerer Kenntniß vieler problematischer Species und an einer festeren systematischen Gruppirung ihrer zahlreichen Formen gewonnen. Auch hier haben wir wieder zunächst der systematischen Arbeiten von Sundevall [1]) und Gray [2]) zu gedenken, denen sich Turner [3]) mit einer kurzen Charakteristik der Gruppen nach ihren Schädelformen angeschlossen hat. Auch Temminck [4]) hat eine systematische Uebersicht über die Antilopen vorgelegt, ohne jedoch den von ihm aufgestellten Gattungen Diagnosen beizufügen. Alle diese haben nach dem Vorgange früherer Systematiker die alte Gattung Antilope in mehrere Gattungen aufgelöst, jedoch dabei verschiedene Principien verfolgt, wornach die Zahl, Begrenzung und Gruppirung der Gattungen bei ihnen sehr verschiedenartig ausgefallen ist [5]).

---

1) K. Vetenskaps-Academiens Handlingar för år 1844 p. 121. f. f.; deutsch im Archiv skand. Beitr. II. S. 140.

2) Annals of nat. hist. sec. ser. VIII. (1851) p. 129, 211.

3) L. c. p. 409.

4) Esquisses sur la côte de Guiné. 1853. p. 189.

5) J. R. Forster's Monographie der Antilopen ist leider erst 60 Jahre nach ihrer Abfassung der Oeffentlichkeit übergeben worden, zugleich mit andern seiner zoologischen Arbeiten, die durch Lichtenstein zu Tage gefördert wurden unter dem Titel: Descriptiones animalium, quae in itinere ad maris australis terras per annos 1772—1774 suscepto collegit, observavit et delineavit J. R. Forster; curante H. Lichtenstein. Berol. 1844 p. 371. Wenn gleich diese Arbeit nach so langer Verborgenheit den größten Theil ihres Werthes verloren hat, so gewährt sie doch nicht blos ein historisches Interesse, sondern bietet auch jetzt noch schätzbare beachtenswerthe Beiträge dar. Im Ganzen sind 19 Arten aufgeführt, wovon jedoch das Gnu zu Bos gezählt wird. Lichtenstein hat sich um diese Ausgabe noch das große Verdienst erworben, Forster's veraltete Nomenclatur mit der neuen in Uebereinstimmung gebracht zu haben.

Sundevall hat die von ihm angenommenen Gattungen in folgender Weiſe gruppirt.

I. Sylvicaprina; labrum pilosum, sulcatum; ungulae parvae acutae, minus compressae, solea impressa, postice non prominula; ung. spuriae planatae, plerumque parvae vel nullae.

a) ungulae parvae, digito non multo crassiores.

Tetraceras 1 sp., Tragelaphus 4, Sylvicapra (Cephalolophus) 10, Neotragus 1, Nesotragus 1, Nanotragus 1, Calotragus 4 sp.

b) ungulae metatarso crassiores.

Cervicapra (Redunca) 7, Strepsiceros 1, Hippotragus (Aegoceros) 3 sp.

II. Bovina; labrum latum, haud sulcatum; ungulae magnae, convexae, altitudine latiores, digitis multo crassiores; ung. spuriae magnae transversae.

a) rhinarium magnum.

Portax 1, Damalis (D. oreas) 1, Anoa 1 sp., Bos.

b) labrum totum pilosum, rhinarium nullum vel parvum.

Ovibos, Catoblepas 2, Oryx 4 sp.

III. Antilopina; labrum sulcatum, molle, pilosum; ungulae majusculae, compressae, solea postice prominula; ung. spuriae transversae, parvae nullaeve.

Bubalis 6, Antilope 12, Dicranocerus 1 sp.

IV. Caprina; labrum sulcatum; ungulae altae compressae; ung. spuriae magnae, globoso-tumidae.

Ovis, Capra (hieher Antilope montana), Rupicapra 1, Hemitragus, Nemorhedus 4, Oreotragus 1.

Gray hat ſeiner Synopsis of the species of Antelopes and Strepsiceres folgendes Schema zu Grunde gelegt.

I. Flur-Antilopen (A. of the fields); Naſe ſich zuſpitzend, Naſenlöcher innen kahl, vorn dicht aneinander, hinten divergirend.

a) Eigentliche Antilopen, mäßig groß, leicht gebaut, kleinhufig, ſchlankbeinig; Schwanz kurz oder mäßig, mit längeren Haaren bis zur Wurzel beſetzt; Hörner leierförmig oder coniſch.

†) Hörner leierförmig (ſelten cylindriſch, ſubſpiral), an der Baſis ſtark geringelt; Naſe ſchafsartig ohne nackte Muffel, Leiſtengruben tief; Thränenfurchen gewöhnlich gut entwickelt.

Saiga 1, Kemas 1, Gazella 8, Procapra 2, Tragops 1, Antidorcas 1, Aepyceros 1, Antilope 1 sp.

††) Hörner klein, ſchlank, gerade, coniſch, mehr oder weniger divergirend und oft an der Spitze vorwärts gebogen; Muffel gewöhnlich groß und feucht.

Tetracerus 2, Calotragus 2, Scopophorus 1, Oreotragus 1, Nesotragus 1, Neotragus 1, Cephalophus 16, Nanotragus 1, Eleotragus (Redunca) 3 sp.

b) Hirſch-Antilopen; groß, ſchwerfällig, ſtarkbeinig, großhufig; Schwanz verlängert, an der Baſis mit kurzen Haaren, am Ende buſchig (öfters einen zuſammengedrückten Streifen bildend); Hörner leierförmig oder coniſch.

Adenota 2, Aegocerus 2, Oryx 3, Addax 1 sp.

c) Ziegen-Antilopen; ſchwerleibig, ſtarkbeinig und großhufig, Schwanz ſehr kurz, flach, bis zur Baſis behaart; Hörner coniſch und zurückgekrümmt.

Capricornis 3, Nemorhedus 1, Mazama 1, Rupicapra 1, Antilocapra 1 sp.

II. Sandwüſten-Antilopen (A. of the sandy-deserts); Naſe breit, Naſenlöcher innen mit Borſten beſetzt, bedeckelt, weit auseinander gerückt; Beine kräftig, Schwanz lang, Hufe groß.

d) Pferd-Antilopen; Naſe ſehr breit, weich, ſchwammig und borſtig.

Catoblepas 2 sp.

e) Kuh-Antilopen; Naſe mäßig breit, mit mäßiger oder kleiner nackter, feuchter Muffel.

Boselaphus 2, Damalis 5 sp.

III. Drehhörner (Strepsiceres); die einzigen Hohlhörner mit weißen Streifen und Flecken. Naſenlöcher genähert; Hörner gewöhnlich von der Baſis an rückwärts geneigt, Euter klein mit 4 Zitzen; Schädel etwas hirſchartig, mit ziemlich kleiner Naſenöffnung, keiner Suborbital-Grube und einer nur kleinen Suborbital-Fiſſur.

a) Afrikaniſche Drehhörner; Hörner maſſiv, Thränengruben rudimentär, Gliedmaſſen faſt gleichlang.

Strepsiceros 1, Oreas 2, Tragelaphus 5 sp.

b) Aſiatiſche Drehhörner; Hörner kurz, coniſch; Thränengruben lang; Schultern viel höher als das Kreuz.

Portax 1 sp.

Turner behält im Wesentlichen das Schema von Gray, reducirt aber dessen Gattungen und beschränkt sich darauf, letztere nach der Beschaffenheit des Schädels und (in mehr untergeordneter Bedeutung) der Hörner zu charakterisiren.

Temminck hat zur Zeit nur den Rahmen von seinem Schema zur Vorlage gebracht, indem er blos die Namen der Gattungen und der jeder von ihnen angehörigen Arten angiebt, und sie sämmtlich unter 2 Familien vertheilt, von denen die erste diejenigen Antilopen begreift, deren Weibchen ungehörnt sind, und die andere, deren Weibchen mit Hörnern oder Büscheln versehen sind. Er macht dabei bemerklich, daß er sich bei Feststellung seiner Gattungen nicht von einzelnen Merkmalen, sondern von dem Eindruck der Gesammtformen habe leiten lassen.

Mit Benützung der eben angeführten Arbeiten meiner vier Vorgänger habe ich meine frühere Anordnung der Antilopen nunmehr in folgender Weise festgestellt.

I. A. nasutae. Wulstnasige Antilopen.

Nasus tumidus: aut ventricosus aut sacculis lateralibus auctus; cornua sublyrata, cranium apertura nasali magna notatum.

Colus 1, Pantholops 1 sp.

II. A. gazellinae. Gazellen-Antilopen.

Nasus simplex, versus apicem attenuatus, cornua lyrata aut conica, annulata; cauda brevis aut mediocris, plerumque tota longius pilosa; ungulae parvae; statura gracilis, parva aut mediocris.

a) nasus ovinus rhinario parvo aut nullo; cornua elongata lyrata.

Antilope 16 sp.

b) rhinarium distinctum, rarissime nullum; cornua recta, conica, apice saepius introrsum versa, parva, rarius elongata.

Tetracerus 1, Calotragus 7, Nanotragus 3, Cephalolophus 17, Redunca 8 sp.

III. A. orycinae. Oryx-Antilopen.

Nasus ovinus rhinario nullo aut angusto; cornua longa, gracilia, recta,

aut simpliciter curvata, aut sublyrata, haud carinata; cauda elongata apice penicillata; ungulae spuriae majusculae; statura magna robusta.

Hippotragus (Aegocerus, Oryx, Addax) 6 sp.

IV. A. strepsicerinae. Schrauben-Antilopen.

Nasus cervinus aut bovinus rhinario plus minus distincto; cornua valida tortuosa, carinata; cauda apice penicillata; statura magna aut mediocris.

Taurotragus (Oreas, Anoa) 3, Tragelaphus (cum Strepsicerote) 6 sp.

V. A. alcinae. Elk-Antilopen.

Nasus latus, totus spongiosus hirsutus, aut rhinario nudo distincto instructus, nares distantes; dorsum devexum: interscapulium prymna altius et validius; ungulae magnae; statura magna robusta.

Bubalis (Boselaphus, Damalis) 7, Catoblepas 2, Portax 1 sp.

VI. A. budorcinae. Biſon-Antilopen.

Nasus ovinus; cornua a basi erecta, postea lunatim extrorsum retrorsumque torta, deinde horizontaliter retrorsum porrecta; statura bovina magna, cauda caprina.

Budorcas 1 sp.

VII. A. caprinae. Ziegen-Antilopen.

Habitus caprinus, cornua brevia, conica, simpliciter recurva, rugosa; cauda brevis villosa; ungulae spuriae globoso-tumidae.

Capricornis 4, Haplocerus 1, Rupicapra 1 sp.

VIII. A. furciferes. Reh-Antilopen.

Habitus cervinus, cornua furcata.

Dicranocerus 1 sp.

Dieſem Schema liegt mein früheres zu Grunde, jedoch mit erheblichen Modificationen. Ich habe nunmehr die Untergattungen oder Gattungen, wie man ſie nennen will, in 7 Gruppen zuſammengeſtellt, die mehr mit denen von Gray als von Sundevall zuſammenfallen. Dieß rührt davon her, daß während letzterer ſeine 4 Gruppen lediglich auf die Beſchaffenheit der Oberlippe und Hufe begründete, ich und Gray dagegen

die von den Hufen hergenommenen Differenzen mehr in den Hintergrund stellten und dafür, neben den von der Beschaffenheit der Oberlippe, oder dem wesentlichsten Theil der Nasenkuppe, abstrahirten Charakteren, auch noch auf die Beschaffenheit der Hörner, des Schwanzes und des Habitus überhaupt ein besonderes Gewicht gelegt haben. Was eine solche Methode an Consequenz verliert, gewinnt sie andererseits wieder dadurch, daß es ihr möglich ist, natürlichere Gruppen zu formiren. Wenn es schon bei den Hirschen nicht gelingen will, natürliche Unterabtheilungen aus ihnen zu bilden, ohne dabei die Hörner, obwohl sie (mit Ausnahme des Rennthiers) allen Weibchen fehlen, in den Vordergrund zu bringen, so darf man sie bei den Antilopen um so weniger außer Acht lassen, da bei der größern Hälfte der Arten die Weibchen ebenfalls mit Hörnern bewaffnet, folglich die von letzteren hergenommenen Merkmale auf beide Geschlechter anwendbar sind. Dagegen kann ich Temminck nicht beistimmen, wenn er auf das Vorhandenseyn oder den Mangel der Hörner ein solches Gewicht legt, daß er lediglich darnach die Antilopen in zwei Familien scheidet. Man kann in solcher einseitigen Weise zu keiner durchgreifenden Aufstellung naturgemäßer Gruppen gelangen, und muß selbst eine so gut unter sich verbundene Untergruppe, wie die der eigentlichen Antilopen (Gazellen) ist, auseinander reißen, um sie in zwei Familien zu vertheilen.

Bei der großen Anzahl von Arten, welche unter dem Namen der Antilopen vereinigt sind, genügt es nicht blos, größere Gruppen unter ihnen zu bezeichnen, sondern diese wollen weiter in Unterabtheilungen zerlegt werden. Sundevall, Gray und Temminck gestehen, nach dem Vorgange früherer Systematiker, denselben den Namen von Gattungen zu, und erheben demnach die alte Gattung Antilope Pall. zum Range einer Familie. Es ist dieß allerdings eine Ansicht, für die sich erhebliche Argumente aufbringen lassen; gleichwohl bin ich ihr auch dießmal nicht beigetreten, und zwar aus dem Grunde, weil es sich denn doch nicht läugnen läßt, daß selbst die vom eigentlichen Antilopen-Typus, als welchen ich die Gazellen betrachte, am weitesten abweichenden Formen noch immer Anknüpfungspunkte genug mit dem typischen Stamme darbieten, um nicht dadurch ihre Belassung bei den Antilopen rechtfertigen zu können. Deshalb habe ich den Unterabtheilungen der Gruppen nicht den Werth von

Gattungen, sondern nur von Untergattungen eingeräumt, und behalte sie alle in der einzigen Gattung Antilope, in dem Umfange, welchen Pallas derselben bestimmt hat.

Hieraus geht weiter hervor, daß ich der Einreihung einiger dieser Untergattungen unter zwei andere Gattungen, nämlich die der Ziegen und Rinder, nicht beipflichten kann. Ueber die Ausdehnung, bis zu welcher solche Ausscheidungen vorgenommen werden dürfen, sind übrigens die genannten Systematiker selbst nicht in Uebereinstimmung. Während nämlich Sundevall, nach dem Beispiele früherer Vorgänger, die Antilopen-Gattungen Portax, Damalis (A. Oreas), Anoa, Catoblepas und Oryx bei den Rindern und die sämmtlichen Ziegen-Antilopen bei den Ziegen einreiht, behält dagegen Gray alle diese bei seiner Familie der Antilopen und schließt nur Anoa davon aus, indem er letztere mit den Rindern verbindet. Mit ihm ist Temminck einverstanden, geht aber noch um einen Schritt weiter, indem er auch die Anoa wieder zurückholt, um sie von Neuem bei den Antilopen unterzubringen, bei denen er sie nicht einmal als besondere Gattung hinstellt, sondern sie seiner Gattung Oreas einverleibt. Nach diesen beiden Vorgängern werde ich mich um so weniger zu rechtfertigen haben, wenn ich der Gattung der Antilopen auch dießmal wieder denselben Umfang wie in meiner früheren Arbeit belasse.

Was die Zahl der Arten anbelangt, so zählt Sundevall unter den Antilopen, im älteren ausgedehnten Sinne genommen, 67 auf, die er in 22 Gattungen bringt. Gray zählt bereits 80 Arten, die er unter 35 Gattungen vertheilt. Bei Temminck steigert sich die Anzahl der Arten auf 91, für die er jedoch nur 16 Gattungen nöthig findet. Meine vorliegende Bearbeitung der Antilopen hat die Zahl der Arten auf 87 gebracht, und die der Gattungen auf 19. Durchschnittlich enthält also bei Sundevall eine Gattung 3, bei Gray etwas über 2, bei Temminck fast 6, bei mir fast 5 Arten. Gray hat die meisten Gattungen aufgestellt, die deshalb auch die ärmsten an Arten sind. Von seinen 35 Gattungen sind nicht weniger als die Hälfte (18) auf nur je eine Art und weitere neun auf nur je 2 Species beschränkt.

Eine solche Vervielfältigung der Gattungen, wie es von Gray geschehen, läßt sich schon von vorn herein als Ausschreitung bezeichnen und

eine nähere Prüfung kann dieß auch leicht nachweisen. Es hat überdieß eine solche unnöthige Zersplitterung der Gattungen den wesentlichen Nachtheil, daß sie der Uebersichtlichkeit hemmend in den Weg tritt, und dem Gedächtnisse eine unnütze Bürde auflegt. Die 19 Gattungen oder Untergattungen, die ich hier annehme, halte ich für vollständig ausreichend, um alle bisher bekannten Arten ohne Zwang in sie einreihen zu können.

Bei der Charakteristik der Gattungen habe ich dießmal noch mehr als früher Gewicht auf die Beschaffenheit des Schädels und Gebisses gelegt, weil ich in diesen die festesten Anhalspunkte erkenne. In dieser Beziehung hat Turner, von dem reichen Material der englischen Sammlungen begünstigt, einen schätzbaren Beitrag zur gesicherten Feststellung der Untergattungen oder Gattungen, wie man sie nennen will, geliefert, ohne jedoch hiemit dem Bedürfnisse der Therologen und Palaeontologen vollständig genügt zu haben. Eine umfassende Arbeit über den Schädel und Zahnbau der Antilopen, mit Beifügung der nothwendigen Abbildungen, bleibt noch ein Desideratum [1]). Auf wichtige Verhältnisse in der innern Beschaffenheit der Hornzapfen hat neuerdings G. Vrolik [2]) die Aufmerksamkeit gelenkt.

---

1) Auf die Leistengruben und Klauendrüsen habe ich dießmal bei der Charakteristik der Gruppen und Untergattungen keine Rücksicht genommen, da sie in dieser Beziehung nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Sehr werthvolle Bemerkungen über den Bau der Weichen- oder Leistendrüsen hat Brandt in den Bullet. phys. mathém. de St. Pétersb. X. n. 5. geliefert.

2) Verhandel. d. K. Akademie van Wetenschapp. Amsterd. I. (1854) p. 1. — Die Angaben über die Struktur der von den äußern Hornscheiden umgebenen Stirnzapfen sind bisher weder genau noch übereinstimmend gewesen, daher Vrolik sie an einigen Beispielen zu erläutern sucht. Bei der Antilope Gnu finden sich an der Basis der Zapfen, in unmittelbarer Verbindung mit den Stirnhöhlen, sehr geräumige, in Fächer abgetheilte Höhlen, die sich jedoch in dem übrigen Kerne nicht weiter fortsetzen. Ein ähnliches Verhalten zeigt sich auch bei A. Canna. Dagegen sieht man bei A. Oreas und A. Tragulus, die beide keine Stirnhöhlen besitzen, auch keine Spur von Höhlen an der Basis der Hörnerzapfen; letztere zeigen nur die gewöhnliche Beschaffenheit, die man bei allen langen Knochen antrifft. Das Knochengewebe scheidet sich in Zellen von mehr oder minderer Größe und Lockerheit, die allein zur Aufnahme des fast flüssigen Fettes dienen.

I. Antilopae nasutae. Wulſtnaſige Antilopen.

Nasus tumidus: aut ventricosus aut sacculis lateralibus auctus; cornua solis in maribus, sublyrata; cranium apertura nasali magna notatum.

1. Subgen. Colus Wagn. (Saiga Gray).

Nasus cartilagineus ventricosus; ossa nasi brevissima acuminata.

Von allen andern Antilopen durch die höchſt eigenthümliche Schädelbildung weit verſchieden. Am knöchernen Schädel zeigt ſich eine außerordentlich lange Naſenhöhle, die nur hinten von den überaus kurzen, an ihrem hintern Ende ſehr breiten, vorn zugeſpitzen Naſenbeinen ein wenig überdeckt wird. Die Zwiſchenkiefer ſind ſehr kurz und durch einen weiten Zwiſchenraum von den Naſenbeinen getrennt. Die Backenzähne haben keine Zwiſchenſäulchen und der vorderſte verſchwindet im höhern Alter.

1. A. Saiga Pall., die Saiga.

Antilope Saiga. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 420. — A. tatarica. Forst. descript. anim. p. 390. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 266. — Saiga tatarica. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 130.

Die Thränengrube iſt ſehr klein.

2. Subgen. Pantholops Hodgs. (Kemas H. Smith).

Nasus utrinque sacculo dilatato auctus.

2. A. Hodgsonii Ab., der Tſchiru.

Antilope Hodgsonii. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 420. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 266. — Kemas Hodgsonii. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 130. — Horsf. catal. p. 166. — Hodgs. journ. of the Asiat. soc. XVI. 2. p. 696.

Keine Thränengrube.

Brolik äußert nun die ſehr wahrſcheinliche Vermuthung, daß in den Hornzapfen nur dann Höhlungen auftreten, wenn Stirnhöhlen vorhanden ſind und daß, wenn dieſe fehlen, auch jene vermißt werden. Er reiht hieran die Frage, ob nicht überhaupt alle Antilopen, deren Hörner weit rückwärts geſtellt ſind, ſowohl der Stirn- als der Zapfenhöhlen entbehren. Zur Beſtätigung führt er eine Mittheilung von Schlegel an, wornach ſolches bei A. mergens, saltiana, Maxwelli, pygmaea, dorsalis, spinigera und Pluto der Fall iſt; ich kann noch die A. natalensis hinzufügen, alſo ſämmtlich Antilopen, deren Hörner mehr hinterwärts geſtellt ſind.

II. Antilopae gazellinae. Gazellen-Antilopen.

Nasus simplex versus apicem attenuatus; cornua lyrata aut conica, annulata; cauda brevis aut mediocris, plerumque tota longius pilosa; ungulae parvae; statura gracilis, parva aut mediocris.

§. Nasus ovinus rhinario parvo aut nullo; cornua elongata lyrata.

3. Subgen. Antilope.

Cornua lyrata annulata, aut in utroque sexu aut solis in maribus.

Der Schädel zeigt ein ſtark entwickeltes Hinterhaupt; die Naſenbeine ſind länger und nach vorn breiter und die Naſengrube kürzer als bei den wulſtnaſigen Antilopen. Die Zwiſchenkiefer reichen bis gegen die Naſenbeine; die Stirnzapfen ſtehen gerade über den Augenhöhlen, die Paukenknochen ſind blaſig aufgetrieben. Vor den Augenhöhlen findet ſich gewöhnlich eine Grube und eine Suborbital-Fiſſur; die Backenzähne haben keine acceſſoriſchen Säulchen. — Aſiatiſch und afrikaniſch.

a) cornua in utroque sexu, sinus lacrymales distincti. — Gazella Blainv.

3. A. Dorcas Licht., die gemeine Gazelle; fulvida, vitta laterali fere obsoleta, scopis carpi pallidis, naso immaculato.

Antilope Dorcas. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 405. (zum Theil). — Forst. descript. animal. p. 386. — Lichtenſt. Darſtell. tab. 5. — A. dorcas var. α) A. Isidis. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 263, 316. — Gazella Isabella. Gray ann. of nat. hist. XVIII. p. 214; sec. ser. VIII. p. 131.

Nordafrika und das peträiſche Arabien.

4. A. arabica Ehr., die ſchwarznaſige Gazelle; priori simillima, at colore obscuriore maculaque nasali nigra diversa.

Antilope arabica. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 407. (mit Ausſchluß von A. Bennetti). — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 193. — A. dorcas var. δ) A. arabica. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beiträg. II. S. 264. — Gazella Dorcas. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 131.

var. β) supra cinerascens.

Gazella vera. Knowsley Menag. tab. 3. — Kevel gris. Fr. Cuv. Mammif. III.

Arabien [1]).

1) Die A. Cuvieri Og. (Fraser zool. typ. tab. 17) von Mogadore (Marokko)

5. A. laevipes Sund., die glattfüßige Gazelle; fulvida, vitta laterali nigra distincta; scopis carpi nullis.

Antilope laevipes. Sundev. pecora 1844; Archiv. ſtand. Beitr. II. S. 262, 316. — Gazella rufifrons. Gray ann. of nat. hist. XVIII. p. 214; sec. ser. VIII. p. 133; Knowsley Menag. tab. 4. — A. Corina u. Kevel. Goldf. bei Schreb. V. S. 1193. tab. CCLXX, CCLXXI. — Kevel et Corine. Fr. Cuv. mammif. I, II.

var. β) macula supra nasum nigricante.

Sundev. l. c.

Die glattfüßige Gazelle unterſcheidet ſich von den beiden vorhergehenden Arten, ſo wie von den nachfolgenden der Gruppe a, durch den Mangel der Kniebüſchel. Der Naſenrücken iſt gewöhnlich einförmig falb, wie dieß bei den von Fr. Cuvier und in der Knowsley Menagerie abgebildeten Thieren der Fall iſt, oder es findet ſich auf ſelbigem ein ſchwärzlicher Fleck. Die Heimath iſt Senegambien, nach Sundevall auch der Sennaar.

6. A. subgutturosa Güld., der Dſchairan.

Antilope subgutturosa. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 406. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 265. — Gazella subgutturosa. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 132.

7. A. Dama Licht., die Addra.

Antilope Dama. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 408. — Sundev. pecora 1844; Archiv. ſtand. Beitr. II. S. 262 (zum Theil). — Gazella ruficollis. Gray ann. of. nat. hist. sec. ser. VIII. p. 133.

Nordöſtliches Afrika.

8. A. Mhorr Benn., die weißſteißige Gazelle.

Antilope Mhorr. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 410. — Gazella Mhorr. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 132.

var. β) Nangueur.

Gazella Dama. Gray l. c.

---

bietet weder nach der Beſchreibung noch nach der Abbildung einen Unterſchied von der A. arabica dar.

Sundevall betrachtet die A. Mhorr und Nangueur nur als die occidentale Varietät von A. Dama Licht.

9. A. Soemmerringii Rüpp., die Arab-Gazelle.

Antilope Soemmerringii. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 415. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 262. — Gazella Soemmerringii. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 132.

Sennaar und längs der abyſſiniſchen Küſte[1]).

b) uti a, at sinubus lacrymalibus subnullis. — Tragops Hodgs. et Gray.

10. A. Bennetti Syk., der Kalſipi; fulvido-castanea, subtus alba, vitta laterali obsoleta, macula nasali, stria ab oculis ad oris angulum ducta scopisque nigricantibus.

Antilope Bennetti. Sykes zool. proceed. I. (1830—31) p. 104. — Fras. zool. typic. tab. 16. — A. Dorcas var. e. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 265. — Tragops Bennetti. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. XVI. 2. p. 695. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 134. — Gazella Bennetti. Horsf. catal. p. 166.

Die A. Bennetti kommt in der Form der Hörner und in der Färbung des Pelzes mit den eigentlichen Gazellen ſo ſehr überein, daß ich ſie mit der A. arabica vereinigte, Sundevall ſie als var. e der A. Dorcas unterordnete. Der Hauptgrund zur Trennung liegt darin, daß nach Hodgſon gar keine Thränengruben vorhanden ſind, oder wie Sykes ſich ausdrückt, ſo kleine, daß ſie gewöhnlich nicht ſichtbar ſind, doch kann im Schrecken das Thier ihre Ränder bewegen. Wenn wir nun gleich

1) Zwiſchen A. Dama und Soemmerringii reiht Temminck noch eine A. hamata ein, über die er jedoch nichts weiter ſagt, als daß von ihr H. Smith in der Beſchreibung ſeiner A. mytilopes (identiſch mit A. addax) eine ſehr gute Abbildung des Schädels mit den Hörnern gegeben hat. Dieſe Abbildung findet ſich in Griff. anim. kingd. IV. p. 210 unter der Bezeichnung Gaz. mytilopes. Die leierförmigen Hörner ſind bis weit gegen die Spitzen geringelt und letztere ſind hakenförmig nach Außen gekrümmt. Aus dieſer Hörnerform ſcheint allerdings auf eine beſondere Art geſchloſſen werden zu dürfen, die man jedoch genauer kennen muß, bevor man ſie in das Syſtem einreihen kann.

auf dieſen Umſtand, ſo wie auf einen andern, daß ſie Vorderindien angehört, ſo viel Gewicht legen, um dieſe A. Bennetti als eigenthümliche Art von A. Dorcas und A. arabica zu ſcheiden, ſo iſt doch, bei ihrer ſonſtigen genauen Verwandtſchaft mit letzteren, eine generiſche Abſcheidung in gar keiner Weiſe zu rechtfertigen.

11. A. Hazenna Jacq., die Hazenna; splendide fulva, subtus alba, vitta laterali nulla, macula nasali nigra nulla, scopis fuscis.

Antilope Hazenna. Jacquem. voy. zool. p. 74. tab. 6.

Man kennt bis jetzt von dieſer Art nur ein Weibchen, das eine Zeitlang in der pariſer Menagerie lebte. Die Hörner ſind ſchwarz, etwas leierförmig, dünne und undeutlich geringelt. Vor den Augen findet ſich ein ſchmaler nackter Fleck, aber keine Thränenfurche. Die Oberſeite iſt ſchön falb, ins Goldglänzende ziehend, was an den Seiten blaſſer wird; die untern Theile ſind rein weiß. Die Oberſeite des Kopfes iſt braunroth, die Unterſeite weißlich; an den Kopfſeiten verläuft gegen die Naſengegend ein falbröthlicher Streif und darüber ein weißer. Der kurze Schwanz iſt anfangs rothbraun, dann ſchwarzbraun. Die Kniebüſchel ſind braun oder rothbraun. Die Größe iſt die der A. Dorcas. Heimath die mittleren und nördlichen Theile Vorderindiens, wo Jacquemont dieſe Art entdeckte.

Die A. Hazenna iſt allerdings der A. Bennetti ſehr nahe verwandt, ſo daß ſie auch Gray und Sundevall nicht von letzterer trennen; ſie unterſcheidet ſich jedoch durch die lichtere Färbung und den Mangel eines ſchwarzen Naſenflecks und des ſchwarzen Streifes zwiſchen Auge und Mund. Sie könnte demnach wohl eine eigenthümliche Art ausmachen.

12. A. leucotis Licht. Pet., die weißöhrige Gazelle; badia, dorso fuscescens; subtus auriculisque alba; scopis metacarpi nullis.

Antilope leucotis. Peters Berlin. Monatsberichte 1853. S. 164. — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 193.

Peters gibt über dieſe neue Art folgende Mittheilungen.

Antilope leucotis; magnitudine A. pygargae; badia, in dorso fuscescens; rostri apice, labiis, ingluvie, gula, stria lata a rostri latere ad oculum ducta, regione ophthalmica, temporali, auriculari, auriculis, digitis, latere artuum interno,

uropygio gastraeoque albis. Sinus lacrymales nulli (?). Rhinarium angustum nudum, nares approximati nudi. Cornua a basi inde divergentia, lyrata, annulata, apicibus procurvis. Ungulae duplo longiores quam altiores; ungulae spuriae majusculae. Scopis metacarpi nullis.

In der Färbung mit A. Mhorr Bennett. verwandt, mit dem Unterſchiede, daß die dunkle Färbung des Rückens wie bei Bubalis albifrons Harr. bis auf den Schwanz herabgeht. Der Form nach ſteht ſie der A. rufifrons Gray, (Antilope laevipes Sundev.) am nächſten, von der ſie indeß hinreichend durch Größe und Färbung verſchieden iſt. Das zoologiſche Muſeum zu Berlin hat dieſe Antilope aus der Werne'ſchen Sammlung durch Profeſſor Lepſius erhalten. Das Vaterland derſelben iſt Sennâr (Sobah).

c) uti a, at sinubus lacrymalibus parvis, tergo plicis cutaneis tecto. — Antidorcas Sund.

13. A. Euchore Forst., der Springbock.

Antilope Euchore. Wagn. Schreb. Supplem. IV S. 414. — Antidorcas Euchore. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 267. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 134. — A. Dorcas var. pygargus (postea A. Euchore). Forst. descript. animal. p. 388.

Mit der Errichtung einer beſondern Gattung für dieſe Art kann ich nicht einverſtanden ſeyn, da den beiden angeführten Merkmalen, ſo wenig als dem Mangel von Kniebüſcheln, eine höhere Bedeutung beigelegt werden kann.

d) cornibus in utroque sexu, longis, annulatis, parallelis, paulalum retrorsum curvatis. — Leptoceros Wagn.

14. A. leptoceros Fr. Cuv., die langhörnige Gazelle.

Antilope leucotis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 422. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 265.

Mit Ausnahme der Form der Hörner iſt dieſe Art den eigentlichen Gazellen ſo ähnlich, daß Sundevall es für wahrſcheinlich findet, daß ſie zu den Varietäten der A. Dorcas gehören möge und Gray ſie nicht einmal als eigne Art aufſtellt, ſondern nur unter den Abänderungen ſeiner A. Dorcas aufführt.

e) cornua solis in maribus. — Antilope Blainv. Temm.

†) sinubus lacrymalibus scopisque carpi nullis. — Procapra Hodgs. et Aepyceros Sund.

15. A. gutturosa Pall., die Kropf-Antilope.

Antilope gutturosa. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 416. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 266. — Procapra gutturosa. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 134.

Mongolei, Mandſchurei, Tibet.

16. A. picticaudata Hodgs., die Ragoa; supra sordide fulvido-brunnea, subtus rufino-albida.

Procapra picticaudata. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. XV. p. 334. tab. 2; XVI. 2. p. 696. — Blyth l. c. XVI. 1. p. 365; 2. p. 725. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 134. — Horsf. catal. p. 169.

Eine durch Hodgſon entdeckte und von ihm folgendermaſſen beſchriebene Art. Die Geſtalt iſt zierlich und fein; der Schwanz iſt ein bloſer Stummel, unten nackt, an den Seiten und der Spitze behaart; Kniebüſchel fehlen. Die Hörner kommen nur den Männchen zu, ſind leierförmig, mit vorwärts, aber nicht einwärts gebogenen Spitzen, bis gegen das Ende geringelt und ſchwarz. Thränenfurchen und Inguinalgruben fehlen; das Euter hat 2 Zitzen. Die Behaarung iſt von mittlerer Länge und Feinheit; auf der Oberſeite im Sommer ſchmutzig braun, mit lichtröthlichen Haarſpitzen, im Winter graulichſchieferfarben mit lichtfalbem Anfluge; die einzelnen Haare ſind an ihrem untern Theile ſchieferblau. Die ganze Unterſeite, die Innenſeite der Ohren, der größte Theil der Gliedmaſſen und eine Scheibe um den ſchwarzen Schwanz herum ſind röthlich weiß. Nachſtehende Maaße beziehen ſich auf ein altes Männchen.

Körper	3′	7″	Kopf bis zu den Hörnern	0′	6″
Schulterhöhe . .	2	0	Hörner, nach der Krümmung	1	1
Ohren	0	5	— in gerader Richtung	0	11

Die Ragoa oder Goa bewohnt die mittleren und öſtlichen, von Schluchten und niedrigen Hügelzügen unterbrochenen Ebenen Tibets, hält ſich nicht heerdenweiſe zuſammen, ſondern wird nur vereinzelt oder in kleinen Familien geſehen. Sie iſt der A. gutturosa nahe verwandt, ſo daß

deßhalb Blyth anfänglich sie für identisch mit derselben erklärte, bis er später ihre Artberechtigung anerkannte.

17. A. melampus Licht., der Pallah.

Antilope melampus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 417. — Turner ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 412. — Delegorgue voy. dans l'Afrique tab. 3. — Aepyceros melampus. Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 267. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 134.

Südafrika. Ist zwar durch die Form der Hörner, den Mangel der Afterhufe, sowie am Schädel durch den Mangel einer Suborbital-Fissur und Grube, ausgezeichnet, gleichwohl verlohnen diese Merkmale es nicht, für die A. melampus eine besondere Gattung zu errichten.

††) sinubus lacrymalibus magnis, scopis parvis. — Cervicapra Gray (Antilope H. Smith).

18. A. cervicapra Pall., die Hirsch-Gazelle.

Antilope cervicapra. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 416. — Forst. descript. animal. p. 379. — Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 266. — A. bezoartica. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 135. — Horsf. catal. p. 167.

Vorderindien [1]).

§§. Rhinarium distinctum, rarissime nullum; cornua recta, conica, apice saepius antrorsum versa, parva, rarius elongata.

4. Subgen. Tetracerus Leach.

Cornua in maribus solis quatuor, rhinarium sinusque lacrymales majuscula, vertex laevis.

Der Schädel kommt im Ganzen mit dem von Cephalolophus überein, nur daß die Nasenbeine hinten nicht erweitert sind. — Vorderindien.

---

1) Temminck stellt zu seiner Gattung Antilope, welche die in beiden Geschlechtern gehörnten Gazellen begreift, auch noch die A. Kob (Adenota aequitoen), welche ich zweifelhaft bei Redunca untergebracht habe, vielleicht aber richtiger hieher gehört. Da mir diese Art nicht zu Gesicht gekommen ist, kann ich auch über diesen Punkt nicht entscheiden.

19. A. quadricornis Blainv., der Tſchikara; supra fulva; cornibus anterioribus distinctis conicis.

Antilope quadricornis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 439. — Tetraceras quadricornis. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 439. — Gray ann. of nat hist. sec. ser. VIII. p. 135. — Horsf. catal. p. 167. — ♀ Cervus labipes (Biche des Mariannes). Fr. Cuv. mammif. IV. — Wagn. a. a. O. S. 363.

var β) supra brunnea, cornibus anterioribus rudimentariis tuberculosis.

Antilope subquadricornis. Elliot Madras journ. 35. tab. 4. fig. 2. — Gray l. c. p. 135. — Hodgson, journ. of the Asiat. soc. XVII. p. 560.

Sowohl Gray als Temminck betrachten Elliot's A. subquadricornis als eine eigenthümliche Art, während Hodgſon, der doch ſonſt es ſehr liebt, die Arten zu zerſpalten, ſie nicht von der A. quadricornis getrennt wiſſen will, indem er ſich von letzterer ſelbſt überzeugte, daß ihre Hörner öfters in einem rudimentären Zuſtande verbleiben.

Der Cervus labipes Fr. Cuv., deſſen Stellung unter den Hirſchen nicht zu ermitteln war, iſt nunmehr durch Sundevall als das Weibchen von A. quadricornis nachgewieſen worden. Damit ſind alle früheren Bedenklichkeiten gelöſt.

5. Subgen. Calotragus Sund.

Cornua solis in maribus, auriculis breviora, recta aut apice levissime inclinata; rhinarium distinctum; sinus lacrymales arcuati, transversim positi.

Afrikaniſch.

a) rhinario lato; ungulis spuriis nullis aut parvis, scopis carpi nullis. — Calotragus Gray (Tragulus H. Smith).

20. A. Tragulus Forst., die Stein-Antilope; ungulis spuriis nullis.

Antilope Tragulus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 436. — Peters Moſſamb. Säugth. S. 187. — Calotragus Tragulus. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 144. tab. 1. fig. 5. (Fuß). — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 136. — A. Tragulus var. rupestris. Forst. descript. anim. p. 376.

var. β).

A. rufescens. Wagn. a. a. O.

Südafrika.

21. A. melanotis Forst., der Greisbock; ungulis spuriis parvis.

Antilope melanotis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 438. — Peters Mossamb. Säugth. S. 187. — Calotragus melanotis. Sundev. pecora 1844; Archiv skand. Beitr. II. S. 144. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 136. — A. Tragulus var. melanotis. Forst. descript. anim. p. 375.

Südafrika.

b) rhinario angustiore, ungulis spuriis scopisque carpi distinctis. — Scopophorus Gray.

22. A. scoparia Schreb., die Büschel-Antilope.

Antilope scoparia. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 429. — Calotragus scoparius. Sundev. pecora 1844; Archiv skand. Beitr. II. S. 144. tab. 1. fig. 6. (Fuß). — Scopophorus Ourebi. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 136.

Südafrika.

23. A. hastata Pet., die Dutsa; A. scopariae simillima, at auriculis longioribus, ungulis haud compressis caudaque subtus alba diversa.

Antilope hastata. Peters Reise nach Mossambiq. Säugth. S. 188. tab. 40 (Thier), tab. 41, 42. fig. 2. (Schädel).

Eine Entdeckung von Peters. Diese Antilope ist etwas kleiner als die A. scoparia, mit der sie in nächster Verwandtschaft steht. Die Thränengruben sind bogenförmig gekrümmt; unter dem Ohr findet sich ein nackter Fleck von 20 Mm. Durchmesser. Die Nasenkuppe zwischen den Nasenlöchern ist nackt, der äußere Rand derselben behaart; der Schwanz ist sehr kurz und dick. Die Haarbüschel des Vorderfußes sind über ein Drittel des Laufes ausgedehnt. Die Hufe sind niedrig und spitz, aber nicht zusammengedrückt; die Afterhufe mittelgroß. Die Leistengruben sind tief. Das Weibchen hat vier Zitzen. Die Hörner steigen parallel aufwärts und biegen sich mit ihren Spitzen unmerklich nach vorn; ihre Grundhälfte ist etwas zusammengedrückt und trägt 7 bis 8 gekrümmte Ringe, die Endhälfte ist glatt. — Die Oberseite ist gelbbraun, fein schwarz gesprenkelt, indem die einzelnen Haare kurze schwarze Spitzen haben, an den Seitentheilen wird diese Farbe allmählich etwas bläßer. Ein Streif über und vor den Augen, die Innenseite der Ohren, Lippen, Kinn, Kehle, der Unterleib, das Gesäß und die Innenseite der Gliedmassen sind weiß. Die Mitte der Stirne und der äußere Ohrenrand sind dunkel-

braun; der Schwanz oben schwarzbraun, unten weiß; Hufe und Hörner schwarz.

Körper . . .	1m, 06	Ohren	0 13
Schwanz . .	0 08	Hörner	0 10
Kopf	0 19	Abstand an den Spitzen	0 04

Bewohnt die gebüschreichen Ebenen bei Sena und Chupanga in Mossambique, unter 17° Breite und 30 bis 60 Meilen von der Küste. — Obgleich diese Art der A. scoparia sehr nahe steht, so ist sie doch durch die längeren Ohren, die viel beträchtlichere Größe des nakten Flecks unter letzteren, die weiße Unterseite des Schwanzes, die nicht zusammengedrückte Form der Hufe und durch die Richtung der Hörner, eben so sehr von ihr verschieden, wie durch ihre bedeutendere Größe von A. montana.

24. A. montana Rüpp., die Gebari.

Antilope montana. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 431. — Calotragus montanus. Sundev. pecora 1844; Archiv skand. Beitr. II. S. 144. — Scopophorus montanus. Gray Knowsley Menag. tab. 5; ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 137.

Abyssinien.

c) ungulis altis, antice rotundatis, postice compressis; pilis rigidis, fragilibus, densis. — Oreotragus Sund.

25. A. Oreotragus Forst., der kapsche Klippspringer; supra subtusque olivacea, nigro-punctulata; auricularum margine supra nigro-, infra albido-limbata.

Antilope Oreotragus. Wagn. Schreb. Supplem. IV, S. 436. — Forst. descript. animal. p. 382. — Peters Mossamb. Säugth. S. 192. — A. (Calotragus) saltatrix. Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 191. — Oreotragus saltatrix. Sundev. pecora. 1844; Archiv skand. Beitr. II. S. 283. tab. 2. fig. 15. (Fuß) — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 137.

Südafrika und Mossambique; im letzteren Lande erhielt Peters 2 Exemplare aus dem Caruehra-Gebirge, von denen er sagt, daß sie vollkommen mit den kap'schen übereinstimmen.

26. A. saltatrixoides Rüpp., der abyssinische Klippspringer;

supra cana nigro-punctulata, subtus albida; auriculorum margine tota nigro-limbata.

Antilope saltatrixoides. Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 191.

Temminck beschränkte sich lediglich auf die Bemerkung, daß diese in Abyssinien einheimische Art von der des Kaps eben so sehr und mehr differire als Bubalis pygarga von B. albifrons. Peters dagegen erwähnt bei Anführung der A. Orotragus, daß er an den abyssinischen Exemplaren, welche ihm Herr Temminck zeigte, keine Unterschiede herauszufinden gewußt hätte. Da die hiesige Sammlung nur Exemplare vom Kap, aber keine aus Abyssinien besitzt, ich demnach außer Stande mich befand, diese differenten Ansichten auszugleichen, so wandte ich mich an meinen hochverehrten Freund, Herrn Dr. Rüppell selbst, der die Gefälligkeit hatte, über diesen controversen Punkt mir nachfolgende ausführliche Aufschlüsse zu ertheilen.

„Auf die Anfrage der specifischen Selbstständigkeit des in Abyssinien von mir eingesammelten Klippspringers bemerke ich vor Allem, daß dieselbe auf gleiche Ansichten begründet ist, wornach ich meine Antilope Decula von der A. sylvatica und scripta getrennt habe, oder meine A. Bohor von A. Nagor und isabellina, oder meine A. Defassa von A. ellipsiprymna und A. Sing-Sing, oder meine A. Madoqua von A. mergens und A. grimmia u. s. w. Bei allen diesen Thieren, die 3 parallele Gruppen im südlichen, östlichen und westlichen afrikanischen Kontinente bilden, beruht die specifische Trennung auf einem nicht sehr auffallenden Unterschiede in der Färbung, während die Schädel der verwandten Arten identisch geformt sind, und man könnte daher diese Arten füglich als constante Rassen bezeichnen. Bei andern afrikanischen Species von Antilopen kennt man ähnliche Arten oder Rassen nur in Nordost- und Südafrika, so z. B. A. Beisa und A. Oryx, oder A. Caama und A. Bubalis; oder die ähnlichen Arten finden sich in Ost- und West-Afrika, wie A. Mhorr und A. Dama. Mehrere Arten scheinen entschieden identisch im ganzen afrikanischen Kontinent verbreitet, und als solche betrachte ich A. strepsiceros.

Die Klippspringer-Arten, welche in Südafrika und Abyssinien leben, kommen nach meiner genauen Vergleichung der in unserem Museum be-

findlichen Exemplare, wovon das Vaterland eines jeden authentisch gekannt ist, in Körpergröße, Hörner- und Hufbildung und in der eigenthümlichen Spiralwindung und Verflachung der Haare ganz mit einander überein; nur der Ton der Färbung ist abweichend und zwar in folgender Weise.

Bei dem kapschen Klippspringer (Calotragus oreotragus) ist die Grundfarbe des ganzen Körpers, mit Einschluß der Bauchseite braungelb, schwarz gesprenkelt; alle Haare nach ihrer Basis zu weißlich, mit Ausnahme derjenigen der obern Hälfte des Kopfes und der untern Hälfte der Füße, wo die Haare an der Basis rauchgrau sind. Jedes Haar hat die Endspitze und einen 3‴ breiten Ring unfern derselben schwarz. Längs des Kopfprofils von der Nasenspitze bis zur Wurzel der Hörner ist die Färbung dunkelbraun; Scheitel, Hinterhaupt, untere Gegend und Außenseite der Ohren licht kastanienbraun; Seiten des Kopfs röthlich isabell gesprenkelt[1]). Kinn und Vorderseite des Oberhalses einfarbig isabellgelb; der obere Rand der Ohren schwarz, der untere röthlichweiß gesäumt; die Innenseite der Schenkel verwaschen isabellgelb.

Bei dem abyssinischen Klippspringer (Calotragus saltatrixoides) ist die Grundfarbe des ganzen Thieres grau und schwarz gesprenkelt, die Außenseite der Ohren rehgrau, der ganze freie Rand der Ohren schwarz gesäumt. Der ganze Bauch, die Innenseite der Schenkel und die der Vorderfüße ist weißlich; um die Hufe herum ist die Behaarung zollbreit schwärzlich. Die Seiten des Kopfs sind grau, isabell gesprenkelt; Kinn und oberer Theil des Vorderhalses sind einfarbig grauweiß."

6. Subgen. Nanotragus.

Cornua Calotragorum, sinus lacrymales nec non ungulae spuriae parva aut nulla, statura minima.

Unter diesem Namen vereinige ich die 3 von Sundevall und

---

1) Ich habe hiebei zu bemerken, daß bei dem völlig ausgefärbten erwachsenen Exemplare der hiesigen Sammlung auch die Oberseite des Kopfes und die Außenseite der Ohren in ähnlicher Weise wie der Rücken gesprenkelt ist, nur daß bei jenen die schwarze Farbe mehr überwiegt.

Gray recipirten Gattungen Nanotragus, Neotragus und Nesotragus, von denen jede nur eine einzige Art enthält, die überdieß unter sich einander so nahe verwandt sind, daß ihre generische Trennung nicht zu billigen ist. Wie bei Colotragus, dem sie am nächsten sich anschließen, sind nur die Männchen mit Hörnern versehen. — Sie gehören Afrika an.

a) rhinario nullo, sinubus lacrymalibus ungulisque spuriis parvis. — Neotragus H. Smith (Madoqua Ogilb.).

27. A. Hemprichiana Ehr., die Windspiel-Antilope.

Antilope Hemprichiana. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 455. — Neotragus Hemprichianus. Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 143. — N. Saltianus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 138.

Abyssinien.

b) rhinario magno, ungulis spuriis nullis. — Nesotragus et Nanotragus Auct.

28. A. moschata Düb., die Moschus-Antilope; griseo-rufescens, subtus alba, sinubus lacrymalibus profundis arcuatis.

Nesotragus moschatus. M. v. Düben Vet. Ac. Oefversigt 1846 p. 221. — Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 314. — Peters Mossamb. Säugth. S. 189. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 137. — Calotragus moschatus. Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 209.

Mit dieser Art und Gattung machte uns M. v. Düben bekannt nach Exemplaren von einer der benachbarten Inseln von Zanzibar; Peters hat sie aber in Mossambique sowohl in der Nähe der Küste als im Innern des Landes bei Tette gefunden. Die Größe übersteigt nur wenig die der A. spinigera. Die Hörner des Männchens sind beinahe von der Länge des Kopfes, fast gerade, kräftig, vielringelig mit langer glatter Spitze, unter sich parallel und in der Richtung der Gesichtslinie hinterwärts gekehrt. Die Ohren sind von halber Kopflänge; der Scheitel ist ohne Schopf.

Von einem erwachsenen Weibchen giebt Temminck folgende Beschreibung. Der Pelz ist von derselben Beschaffenheit wie bei der A. spinigera; er ist zweifarbig, grau am Grunde und lichtroth an der Spitze. Der Rücken, Scheitel, Nacken, die obere Parthie der Seiten und die Schenkel sind lebhaft braunroth, an der feinen Spitze der Haare schwach

braun überlaufen; die untere Parthie der Seiten, die Wangen, Halsseiten und Füsse sind licht isabell; Kehle, Brust, Mittellinie des Bauchs und Innenseite der obern Hälfte der Gliedmassen sind rein weiß. Der Schwanz ist von mittelmäßiger Länge, lang behaart und am Ende mit einer großen Quaste versehen; oben ist er schwärzlichbraun, unten weiß. Auf dem Nasenrücken verläuft eine schwärzliche Binde, die nicht über den vordern Augenrand hinausreicht. Die Ohren sind außen mit kurzen schwärzlichbraunen Haaren besetzt und ihre innere Basis ist weiß bordirt. Nachstehende Maaße sind von diesem Weibchen genommen.

Körper . . .	19″ 0‴	Schwanzquaste . .	1″ 3‴
Schwanz ohngefähr	3 0	Schulterhöhe . .	11 8

Da diese A. moschata mit der A. spinigera alle wesentlichen Merkmale, mit Ausnahme der bei letzterer fehlenden Thränengrube, gemein hat, so dürfen beide naturgemäß auch nicht in zwei verschiedene Gattungen gesondert werden.

29. A. spinigera Temm., die Pfriemen-Antilope; branneo-fulva, subtus alba; sinubus lacrymalibus nullis.

Antilope spinigera. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 457. — Nanotragus spiniger. Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 143, 297. — N. regius. Gray Knowsley Menag. p. 12. — N. perpusillus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 143. — Calotragus spiniger. Temm. esq. cur la côte de Guiné p. 201.

Obwohl bereits Bosmann im Jahre 1703 diesen kleinsten unter allen Wiederkäuern erwähnt und insbesondere bemerklich gemacht hatte, daß man seine zierlichen Füsse zu Tabackstopfern gebrauche; obwohl dann auch Seba und Buffon, wenngleich in Vermengung mit andern Arten, Abbildungen von ihm gegeben haben, so ist man doch zu einer richtigen Kenntniß dieser Species erst durch Sundevall und vornämlich durch Temminck gelangt.

Die Gestalt ist sehr zierlich. Thränengruben und Afterhufe sind nicht vorhanden, der Scheitel ist glatt. Die Hörner sind braun, klein, sehr dünn, hinterwärts gerichtet, pfriemenförmig mit scharfer, schwarzer Spitze; sie gleichen vollkommen den Dornen der Akazien und sind meist nicht über 9‴ lang. Die Ohren sind klein und

überschreiten kaum ein Viertel der Kopflänge. Der Schwanz ist ziemlich kurz und in einen Pinsel geendigt. Das Weibchen ist ungehörnt.

Die Behaarung ist ziemlich lang, reichlich, glatt, glänzend und auf der Oberseite zweifarbig, weiß am Grunde, und dunkelroth mit schwacher brauner Ringelung an der Spitze. Alle obern Parthieen und die obere Hälfte der Außenseite der Schenkel ist falbroth, braun geringelt; der Mittelttheil der Leibesseiten und die untere Hälfte der Schenkel ist lichtfalb mit weißlichem Anfluge, was dadurch entsteht, daß die Haare an der Basis rein weiß und bloß an der Spitze roth sind. Die Füsse, das Kreuz, die Brust, der Vorderhals und die Wangen sind rein rothfalb; das Kinn, die Kehle, die Vorderbrust und der Unterleib sind rein weiß. Der Vordertheil der Schenkel und die Innenseite der Vorderbeine, wie auch die Gegend gegen die Hufe ist ebenfalls rein weiß. Scheitel, Nacken und Ohren sind schwärzlich; letztere haben einen kleinen weißen Fleck an ihrer äußern Basis, innen sind sie nackt und weiß bordirt. Der Schwanz ist oben rothfalb, unten weiß. So ist das alte Männchen gefärbt.

Die Weibchen haben eine minder gesättigte Farbe, gewöhnlich mehr ins Röthliche fallend. Die jährigen Jungen sind fast durchgängig von einer einförmigen rothen Färbung und ermangeln der Mitteltöne der Alten; in diesem Alter sind sie 8 — 9″ lang.

Ganze Länge . .	16″ 6‴	Hörner	1″ 1‴
Schulterhöhe . . .	9 6	Von der Schnauze bis	
Ohren	1 5	zum vordern Augenrande	2 6

Die Pfriemen-Antilope bewohnt die Waldungen an der Küste von Guinea, so z. B. gegen das Aschanti-Land. Sie lebt vereinzelt oder paarweise, verläßt selten das dichte Gebüsche und ist ungemein flink und behende.

7. Subgen. Cephalolophus H. Smith (Sylvicapra Og.)

Cornua parva, recta, infra rugosa, saepissime in utroque sexu; rhinarium magnum; sulcus longitudinalis calvus inter orbitas naresque; pili verticis tophum constituentes.

Eine sehr ausgezeichnete naturgemäße Gruppe, die daher bei allen Systematikern in gleicher Begrenzung geblieben ist. Die Hörner sind weit

hinter den Augenhöhlen angesetzt, bei den Weibchen sehr kurz und wahrscheinlich bei allen vorhanden. Auch der Schädel ist sehr eigenthümlich. Der Schnautzentheil ist stark zusammengedrückt, vor der Augenhöhle durch eine weite Grube ausgehöhlt, ohne Suborbital-Furche. Die Nasenbeine sind hinten erweitert, vorn zugespitzt. Kniebüschel fehlen, sie werden zwar von der A. quadriscopa angegeben, aber dieß ist ein sehr problematisches Thier, dessen systematische Stellung noch ganz ungewiß ist. Alle Arten sind afrikanisch.

a) auriculis acuminatis.

30. A. mergens Blainv., der Ducker.

Antilope mergens. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 447. — Sylvicapra mergens. Sundev. pecora; Archiv stand. Beitr. II. S. 142. — A. grimmia. Pallas u. Goldf. bei Schreb. V. S. 1230. — Forst. descript. anim. p. 384. — Cephalophus Grimmia. Gray Knowsley Menag. tab. 1, 2; ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 138.

Südafrika. Variirt in der Färbung nicht blos nach der Jahreszeit, sondern auch nach lokalen oder individuellen Verhältnissen [1]).

31. A. ocularis Pet., der Brillenducker; praecedenti simillima, at pallide brunneo-flavescens, annulo orbitali maculaque malari albis.

Antilope ocularis. Peters Mossamb. Säugth. S. 186. tab. 39. (Thier), tab. 41, 42. fig. 1. (Schädel). — Cephalophus mergens light variety. Gray Knowsley Menag. tab. 1, 2.

Peters giebt von dieser Art, die er entdeckte, folgende Beschreibung. Die Hörner des Männchens sind fast halb so lang als der Kopf, gerade, an den Spitzen fünfmal so weit von einander abstehend als an der Basis, am Grunde mit 6 bis 7 Ringen, zwischen welchen Längsstreifen stehen,

---

1) Die A. grimmia muß, wie Temminck zeigte, ganz kassirt werden. Das von Bosmaer abgebildete Thier, auf welches Pallas seine A. grimmia begründete, stammte wahrscheinlich nicht von Guinea, sondern vom Kap her, und gehört zu den lichteren Varietäten der A. mergens, welche mit dem Namen A. Burchellii bezeichnet wurden. Das von Grimm beschriebene Weibchen wird ebenfalls nichts anderes als A. mergens seyn. Die A. grimmia von H. Smith und Fr. Cuvier ist identisch mit A. rufilatus. Buffon's Grimme, von der er Schädel und Hörner abbilden ließ, gehört zu A. Maxwelli.

im obern Ende glatt. Zwei nackte tiefe Leiſtengruben und 4 Zitzen. Die Farbe iſt blaß bräunlichgelb mit ſchwarzer Sprenkelung, indem die Haare am Grunde grau, dann bräunlichgelb und an der Spitze ſchwarz ſind. Kinn, Kehle, Bruſt, Bauch, Innenſeite der Vorderbeine bis zu den Zehen und die der hintern Gliedmaſſen bis zur Fußwurzel, die Innenſeite der Ohren, ein Ring um die Augen und ein Wangenfleck hinter und unter denſelben ſind weiß. Ein Streif von der Naſe bis zur glänzend braunrothen Stirn, die Mitte des Stirnbüſchels, die Vorderſeite der Vorderfüße und Hinterfüße ſind ſchwarzbraun. Der Schwanz iſt oben anfangs dem Rücken gleichfarbig, dann ſchwarz und braun gemengt, an den Seiten und an der Spitze weiß.

Körper . . .	1m,	10	Ohren	0m,	12
Schulterhöhe .	0	58	Schwanz mit Haaren	0	18
Kopf	0	18	Hörner	0	09

Peters hat dieſe Art nicht ſelten in den ebenen Gegenden von Moſſambique gefunden. Im Vergleich mit A. mergens findet er ſeine neue Art etwas kleiner und ſchlanker; die Färbung hat er conſtant bei Männchen und Weibchen zu jeder Jahreszeit geſehen, niemals hat er Uebergänge zu dem graubraunen Colorit der A. mergens wahrgenommen. Dagegen iſt in der Knowsley Menagerie ein Männchen und überdieß deſſen Kopf in Lebensgröße unter dem Namen einer helleren Varietät der A. mergens abgebildet, welches in der Färbung ſehr mit der A. ocularis übereinſtimmt, jedoch dadurch ſich unterſcheidet, daß der weiße Wangenfleck fehlt und die Spitze des Unterkiefers dunkel iſt. Wahrſcheinlich wird dieſe Varietät bei der A. ocularis unterzubringen ſeyn.

32. **A. Campbelliae** Gray, der graue Ducker; ab A. mergente colore obscuriore, distincte variegato nec non abdomine albidiore diversa.

Cephalophus Campbelliae. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 139. — Peters Moſſamb. Säugthiere S. 186.

Gray hat gleich nach dem C. mergens eine neue Art von ihm als C. Campbelliae aufgeführt, mit folgenden Merkmalen: „grau und ſchwarz geſprenkelt, unten weiß; Wangen, Nacken und Bruſt gelblich: Stirne gelb, mit einem ſchwarzen Strich an der Naſe, an der Stirne

ſich erweiternd und in einen Büſchel hinter den Hörnern endigend; Füße und Vorderſeite der Vorderbeine röthlichſchwarz; Pelz weich, Haare grau, mit ſchwarzem Ring und Spitze; Ohren lang ſpitz." Wie Gray hervorhebt, ſo kann man dieſe Art von der A. mergens dadurch unterſcheiden, daß ſie viel dunkler und deutlich geſprenkelt und die Unterſeite viel weißer iſt. Er fügt weiter bei, daß die Heimath Südafrika iſt, daß ein Exemplar von Sundevall als A. mergens var. Burchellii und ein anderes von Campbell unter dem Namen Philantomba eingeſandt worden ſey; zugleich verweiſt er auf Knowsley Menag. tab. 2 Fig. 3. — Dagegen iſt Einiges zu erinnern. Zunächſt paßt keine der auf Tab. 2 und 1 vorfindlichen Abbildungen auf Gray's Beſchreibung. Dann kann aber auch Campbell's Philatomba nicht dazu gehören, weil dieſe nicht Südafrika, ſondern Sierra Leone bewohnt und deshalb eine ſpezifiſche Identität zweier, im Wohnorte ſo weit getrennter Thiere nicht anzunehmen iſt. Auch Temminck (esq. p. 194) wirft die Frage auf, was dieſe A. Campbelliae ſeyn ſoll. Ich würde ſehr geneigt ſeyn, der Meinung von Sundevall beizupflichten, wenn nicht auch Peters dieſe Art, von der er allerdings nur ein ganz junges Männchen unter 17° ſ. Breite fand, als eine eigenthümliche anerkannt hätte. Weitere Unterſuchungen ſind zu einer ſichern Entſcheidung abzuwarten.

33. A. altifrons Pet., die hochſtirnige Antilope; **supra splendide fulva, nigro-undulata, subtus alba; linea faciali convexa, foveis inguinalibus nullis, pilis annulatis.**

Antilope altifrons. Peters Moſſamb. Säugth. S. 184. tab. 37. (Thier), 38 (Schädel).

Ebenfalls von Peters endeckt. Dieſe Art iſt etwas kleiner als A. mergens und ſehr ausgezeichnet durch die hohe convexe Stirne, worin ſie ſich der A. Madoqua nähert. Die Hörner des Männchens ſind kurz, zuſammengedrückt, mit der Spitze etwas einwärts gekrümmt, an der Baſis faltig, dann mit 2 bis 3, hinten mit 4 bis 5 gebogenen Ringeln. Die Ohren ſind zugeſpitzt, die Afterklauen mittelgroß, von Leiſtengruben iſt keine Spur vorhanden. Das Weibchen hat 4 Zitzen. — Der Rücken iſt glänzend bräunlichgelb oder goldgelb, von unregelmäßigen ſchwarzbraunen Wellen- oder Zikzaklinien unterbrochen. An den Leibesſeiten und

der Außenseite der Gliedmassen wird die Färbung allmählich blasser und geht auf den untern Theil der letztern ins Isabellgelbe über.

Von der nackten schwarzen Nasenkuppe zieht eine schwarzbraune Binde zur Stirne hin, welche gold- oder rothgelb ist. Die Haare des Stirnbüschels sind schwarz mit braungelbem Ring vor der Spitze, einige ganz schwarz. Die Gegend über den Augen, an der Seite der Schnautzenspitze und ein Fleck hinter und unter den Augen sind weißlich; die Ohren innen mit langen weißen, außen mit kurzen, schwarz und braun geringelten Haaren besetzt. Die Unterlippe hat jederseits einen schwärzlichgrauen Fleck. Das Unterkinn, die Kehle, der Unterleib und die Innenseite der Gliedmassen bis auf die Hand und Fußwurzel, welche gleich der Außenseite gelb sind, sind weiß, ein Vorderstreif, der bis zum Vorderarm hinaufzieht, ist schwarzbraun. Der Schwanz ist oben anfangs dem Rücken gleichfarbig, dann schwarz, an den Seiten weiß, unten nackt und fleischfarbig. Die einzelnen Haare der Oberseite sind geringelt, ihre untere Hälfte ist blaulichgrau, dann folgt ein schwarzer, hierauf ein braungelber Ring und zuletzt die schwarze Spitze.

Körper . . .	0m, 84	Kopf	0 16
Schulterhöhe .	0 50	Ohren	0 12

Von einem alten Thiere mißt der Schädel 0,18, die Hörner 0,043.

Peters entdeckte diese Art in den gebüschreichen Ebenen von Mossambique. Sie nähert sich durch die Ringelung der Haare und die allgemeine Zeichnung am meisten der A. Campbelliae, doch unterscheidet sich letztere durch die Farbe, die grau wie bei A. Eleotragus erscheint, durch die Weichheit der Behaarung und durch das Vorhandenseyn von Leistengruben. In der Gestalt nähert sich die A altifrons der A. coronata, aber letztere unterscheidet sich durch ungeringelte Haare, schwarze Färbung des Rückens und durch die unter dem Auge hingehende nackte Linie.

34. A. coronata Gray, die rothstirnige Schopfantilope; supra brunneo-flavida, subtus albida; dorso medio nigro- punctulato, vertice rufo-fusco.

Cephalophus coronatus. Gray ann. of nat. hist. X. p. 266; sec. ser.

VIII. p. 140; Knowsley Menag. p. 10. tab. 6. fig 1, 2. — Sundev. pecora; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 143.

Blaß gelblichbraun, Mitte des Rückens und Vordertheil der Vorderbeine durch einzelne ſchwarze Haare geſcheckt; Stirne rothbraun, Schopf ebenſo, hinten ſchwärzlichbraun; Füße und Streif auf der Naſe ſchwärzlich; Innenſeite der Ohren, Kinn, Kehle, Unterleib und Innenſeite der Gliedmaſſen weißlich. Hörner kurz, coniſch; Ohren ſpitz, ohngefähr halb ſo lang als der Kopf. Bewohnt Weſtafrika; Gambia, Macarthy's Inſel. — Dieß iſt Alles, was uns Gray über dieſe Antilope ſagt, die allerdings als eigenthümliche Art erſcheint.

35. A. Madoqua Rüpp., die Madoqua; supra fulvida, nigro-punctulata; linea faciali convexa, foveis inguinalibus distinctis.

Antilope Madoqua. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 449. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 142. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 140.

Abyſſinien. Von A. coronata durch dunklere Färbung und rauhere dichter anliegende Behaarung verſchieden; von A. mergens durch etwas geringere Größe, kürzere Hörner und Ohren und die convere Geſichtslinie.

b) auriculis apice rotundatis, stria supraciliari nulla.

36. A. sylvicultrix Afz., die weißrückige Schopfantilope; Cervo Capreolo paululum major, fusca, plaga dorsali elongata fulvido-albida.

Antilope sylvicultrix. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 446. — Sylvicapra sylvicultrix. Sundev. pecora; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 143. — Cephalolophus sylvicultrix. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 140, Knowsley Menag. tab. 8. fig. 1. (als C. punctulatus). — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 233.

Eine noch immer ſehr ſeltene Art, die ſich ſowohl durch ihre Größe, als durch den langen falbweißlichen, vorn zugeſpitzten, hinten erweiterten Fleck auf dem Rücken auszeichnet. Bewohnt Sierra Leone.

37. A. Pluto Temm., die ſchwarze Schopfantilope; fuliginoso-nigra, subtus dilutior.

Cephalolophus Pluto. Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 214. — C. niger. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 141; Knowsley Menag. tab. 7. fig. 2.

Unter dem Namen Cephalolophus niger, mit welchem Temminck im Leydner Museum diese Art bezeichnet hatte, wurde sie zuerst von Gray publicirt; ersterer änderte später diese Bezeichnung in C. Pluto um.

Die Hörner des alten Männchens sind gerade, am Grunde runzelig, zugespitzt und glatt. Von den Schultern bis zum After, so wie auf den Schenkeln sind die Haare lang, nicht reichlich und von einem vollkommenen und glänzenden Schwarz. An den Seiten, am Bauch und an der Brust sind sie weniger lang und aschfarbig schwarz; die Weichen und die Innenseite der Schenkel sind nackt; die Füße sind schwarz oder schwärzlich, ohne sonstiges Abzeichen. Die Hüften, der Hals und die Wangen sind mit kurzen, sehr spärlichen, schwärzlichgrauen Haaren besetzt. Die starren Haare des Schnautzenrückens sind schwarz; auf der Stirne werden sie länger, zumal gegen das Hinterhaupt, und sind brennendroth. Die Ohren sind abgerundet und fast nackt; außen sind ihre Haare schwarz und roth, innen weiß. Der mittellange Schwanz ist oben schwarz, an der Spitze und unten weiß. — Das Weibchen trägt kurze, (nur 1″ lange) stumpfe, im großen Schopf versteckte Hörner. Die Färbung ist wie beim Männchen, nur ist das Schwarze minder rein, mit Schwärzlichgrau überlaufen. Die Jungen haben noch schmutzigere Farben und der Schopf besteht aus schmutzig röthlichen und schwarzen Haaren.

Körper	2′	8—9″	Von der Schnauze zum Auge .	4″	4‴
Schulterhöhe	1	6½	Schwanz	6	6
Hörner	0	3½	Schwanzquaste	1	7

Bewohnt in einer großen Ausdehnung die Küste von Guinea, zumal in den Waldungen an der Grenze des Aschanti-Landes.

38. A. Ogilbyi Wat., die schwarzrückige Schopfantilope; fulva, subtus albida; fascia lata atra ab interscapulio usque ad basin caudae ducta.

Antilope Ogilbyi. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 446. — Sylvicapra Ogilbyi. Sundev. pecora 1844; Archiv skand. Beitr. II. S. 143. — Cephalolophus Ogilbyi. Gray Knowsley Menag. tab. 8. fig. 2; ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 140. — Fraser zool. typic. tab. 19. — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 217.

Meiner frühern Beschreibung [1]) füge ich noch einige Zusätze bei. Die Behaarung ist wie bei A. Pluto auf den hintern Theilen lang, auf den vordern sehr kurz und spärlich. Die glänzend schwarze breite Binde erstreckt sich von den Schultern bis zur Kruppe, wo sie in einer Spitze endigt. Das Weibchen hat kürzere und stumpfere Hörner und die Färbung ist blasser. Alte Thiere zeigen folgende Maaße.

Körper . . .	31″ 0‴	Schulterhöhe	17″ 2‴
Schwanz . .	4 7	Von der Nasenspitze zum	
Schwanzpinsel .	1 2	vordern Augenrande .	4 6

Häufig auf der Insel Fernando Po; seltener auf dem Festlande, wo man sie vereinzelt im Lande der Aschanti trifft.

39. A. dorsalis Gray, die schwarzbindige Schopfantilope; supra splendide fulva; fascia atra a rostro usque ad caudae apicem ducta.

Cephalolophus dorsalis. Gray ann. of nat. hist. X. p. 165; sec. ser. VIII. p. 141; Knowsley Menag. tab. 7. fig. 1. — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 221.

Nach Temminck's Beschreibung ist die Behaarung gleich lang. Die Hörner sind bei beiden Geschlechtern spitz, glatt und an der Basis schwach gerunzelt. Der Schopf ist kurz, und roth und schwarz gefärbt. Die Oberseite des Körpers, der Schenkel, Vorderglieder und die Halsseiten sind lebhaft und glänzend rothfalb. Eine glänzend schwarze Binde entspringt auf dem Nasenrücken und zieht sich längs der Mittellinie des Körpers, wo sie sich in der Rückgrathgegend ausbreitet, bis zum Ende des Schwanzes, auf dem sie sich wieder verengert. Die Seiten des Schnautzenrückens sind rostfalb. Die Lippen, ein Theil der Innenseite der Ohren, die Kehle, das Obertheil der Innenseite der Gliedmassen und der Weichen sind mit spärlichen weißen Haaren besetzt [2]), der Mitteltheil des Bauches ist braun. Die Füsse sind purpurbraun, ohne sonstiges Abzeichen. Der oben schwarze,

1) Zu berichtigen ist daselbst die Größenangabe, indem A. Ogilbyi nur halb so groß als A. sylvicultrix wird.

2) Sowohl die Beschreibung Gray's als auch die Abbildung in der Knowsley Menag. giebt einen großen weißen Fleck über den Augen an, den Temminck nicht erwähnt.

unten und an der Spitze weiße Schwanz iſt in einen dünnen, ſpitzen Pinſel geendigt. — Das Weibchen unterſcheidet ſich in der Färbung faſt gar nicht vom Männchen; ſeine Hörner ſind ſchlank, ſpitz und 2″ lang.

Körper	25—27″ 0‴	Von der Schnautze zum Auge . .	3″ 4‴
Schulterhöhe . . .	15 6	Schwanz	3 0
Hörner	3 0	Schwanzpinſel	1 6

Bewohnt die Waldungen von Sierra Leone und dem Aſchanti-Lande.

40. A. rufilatus Gray, die flockige Schopfantilope; supra fusco-fulva, fascia nigello-cinera a cervice ad caudae basin ducta; cauda apice dense floccosa.

Cephalolophus rufilatus. Gray ann. of nat. hist. XVIII. p. 166; sec. ser. VIII. p. 141; Knowsley Menag. tab. 9. (doppelt: einmal zwei Köpfe in Lebensgröße, dann verkleinert 2 ganze Figuren). — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 221. — Antilope grimmia. H. Smith. Griff. anim. kingd. IV. p. 266; V. n. 851. — Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 451 (mit Ausſchluß v. Goldf.).

var. β) pallidior.

A. grimmia. Fr. Cuv. mammif. II. livr. 27. — Wagn. a. a. O. S. 451 (mit Ausſchluß von Goldf. u. Pall.)

Sehr ähnlich der A. dorsalis und Ogilbyi, aber kleiner und ſchlanker, und leicht von beiden dadurch zu unterſcheiden, daß die Rückenbinde nicht kohlſchwarz, ſondern graulichbraun mit purpurfarbigem Anfluge iſt und daß der Schwanz nicht wie bei dieſen in einen Pinſel, ſondern in eine Quaſte geendigt iſt.

Die Hörner ſind kurz, coniſch, an der Baſis ſchwach geringelt, an der Spitze etwas vorwärts gebogen. Die Behaarung iſt reichlich und dicht. Die Rückenbinde entſpringt am Nacken, wird längs des Rückgrathes breiter, und bedeckt die ganze Kruppe, ſowie die Schwanzwurzel; dieſe Binde iſt ſchwärzlichgrau mit lichtem Purpurtone. Die Seitentheile und Schenkel ſind braunroth, der Hals, die Wangen und die Augenbraunen ſind roth. Der Schnautzenrücken, die Stirne, das Hinterhaupt und ſein langer Schopf ſind ſchwarz; die vier Gliedmaſſen von ihrer Einfügung am Leibe an purpurgrau, ohne Abzeichen. Der Rand der Lippen, die Kehle und Innenſeite der Gliedmaſſen ſind mit ſpärlichen weißen Haaren beſetzt;

die Ohren sind schwarz, innen weiß. Der Schwanz ist oben und an der Quaste schwärzlich; seine Basis ist unten röthlich. — Am Weibchen ist die Färbung blasser: seine Hörner sind vom Schopf verdeckt, stumpf und nur 6 bis 7 Linien lang.

Körper	23″ 0‴	Von der Schnauze zum Auge	2″ 10‴
Schulterhöhe . .	12 6	Schwanz	3 0
Hörner	2 0	Schwanzquaste	1 6

Längs der Küste von Guinea (Aschanti-Land) sehr selten, häufiger in den Waldungen von Sierra Leone.

Sowohl Gray als Temminck erwähnen eine blassere Abänderung, die vollkommen mit der von Fr. Cuvier a. a. O. abgebildeten und fälschlich als A. grimmia benannten Antilope übereinstimmt. Wenn diese Färbung nicht blos das Jugendkleid, sondern auch das der Erwachsenen bezeichnen sollte, so wäre Temminck, — zumal da diese Exemplare nicht von Guinea, sondern vom Senegal kommen, — nicht abgeneigt, darin eine eigne Art anzuerkennen, für die er den Namen C. pallidus vorschlägt.

41. A. natalensis A. Smith, die natalsche Schopfantilope; rufo-fulva, subtus pallidior, stria dorsali nulla.

Antilope natalensis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 453. — Delegorgue voy. dans l'Afrique tab. 1. (Kopf). — Sylvicapra natalensis. Sundev. pecora 1844; Archiv. skand. Beitr. II. S. 142. — Cephalophus natalensis. Gray ann. of nat. hist. soc. ser. VIII. p. 141.

Meine frühere Beschreibung will ich nach einem alten Männchen der hiesigen Sammlung vervollständigen. Die Hörner sind länger als der Schopf, ziemlich gerade, an der Basis stark, mit 3 bis 4 unregelmäßigen Ringen, im größten Theil ihrer Länge gefurcht und in eine glatte dünne Spitze auslaufend. Die Behaarung der ganzen Ober- und Außenseite ist glänzend und einförmig fuchsroth, was auf der Unterseite und der Innenseite der Beine etwas lichter wird und an der spärlicher behaarten Oberseite des Halses ins Grauliche übergeht, während dessen Seitentheile blos einen blaß röthlichen Anflug haben. Hinter der schwarzen Nasenkuppe ist der Schnautzenrücken anfangs rußigbraun, was allmählig mehr Roth aufnimmt und auf der Stirne und dem Schopfe feurig rostroth wird; letzterer ist mit schwarz gemischt. Die Kopfseiten sind blaß falblich, die Ränder

der Lippen, der Unterkiefer, mit Ausnahme seiner trübgefärbten Spitze, und die Mitte der obern Kehlgegend fällt ins schmutzig Weißliche. Die Ohren sind mit kurzen, außen schmutzig rostbraunen, innen weißlichen Haaren besetzt. Die fast nackten Weichen haben einzelne längere gelblichweiße Haare; der Hodensack ist dicht mit weißlichen Haaren besetzt. Die Hörner sind schwarz; die Hufe bräunlichschwarz. Der dünne Schwanz endigt in einen Pinsel; oben ist er anfänglich von der Rückenfarbe, die gegen das Ende ins Schwärzliche fällt, unten ist er schmutzig weißlich. — Das Weibchen ist ebenfalls gehörnt. Das beschriebene Exemplar zeigt folgende Größenverhältnisse.

Körper nach der Krümmung .	30″ 6‴	Hörner	2″ 8‴
Schulterhöhe	16 6	Schwanz ohne Pinsel . .	3 6
Von der Nase zum Auge . .	2 5	„ mit „ . . .	5 9

Um Port Natal.

c) auriculis rotundatis, stria supraciliari pallida.

42. A. Maxwelli H. Smith, der Guevi; supra fuliginoso-fuscescens, subtus albida; pedibus supra ungulas macula pallida notatis. — Tab. 30.

Cephalophus Maxwelli. H. Smith, Griff. IV. p. 267; V. n. 852. — Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 454. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 142; Knowsley Menag. tab. 12. — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 223. — C. Philantomba. H. Smith, Griff. V. N. 855. — Ogilb. proceed. IV. p. 121. — Wagn. a. a. O. S. 455. — A. Frederici. Laurill. dict. univ. d'hist. nat. I. p. 622. — Wagn. a. a. O. S. 454. — Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 142. — A. pygmaea. Fr. Cuv. mamm. III.

Die große Confuſion, die bisher in der Synonymik dieſer Art beſtand, iſt nunmehr durch Temminck befriedigend gelöſt worden, und die Acquiſition eines alten Männchens für die hieſige Sammlung hat mich von der Richtigkeit ſeiner Angaben überzeugt.

Die Hörner ſind kurz, aber ſehr robuſt, im größern Theil ihrer Länge und hauptſächlich auf der innern Seite mit ſtarken Querleiſten belegt und dazwiſchen längsgefurcht; ihre Spitzen ſind glatt und etwas vor- und einwärts gebogen. Die Afterklauen ſind ſehr klein. Die Behaarung iſt anliegend und auf der ganzen Oberſeite rußig falblichbraun, was an den Leibesſeiten heller wird. Die einzelnen Haare der Oberſeite ſind am

Grunde graulich, dann licht falbbräunlich, längs des Rückgraths mit kürzerer oder längerer schwarzer Spitze, weshalb hier die falbbräunliche Färbung schwarz melirt ist. Die ganze Unterseite des Körpers nebst der Innenseite der obern Hälfte der Gliedmassen ist graulichweiß oder rein weiß. Die Oberseite des Kopfs ist rußig dunkelbraun, am Schopf ins Schwarze übergehend. Von der Mitte des Schnautzenrückens an verläuft zu beiden Seiten ein breiter, lichtgelblicher Streif oberhalb der Augen hinweg bis gegen die Wurzel der Hörner. Die Ohren sind außen mit schmutzig rostbraunen, innen mit weißen Haaren besetzt. Die Füsse sind auf der Innenseite bräunlichweiß, auf der äußern Seite und unterwärts rings um die Klauen herum trüb rußbraun; auf letzterer Parthie findet sich an jedem Fuße, außen wie innen, ein blasser Fleck. Der Schwanz ist lang behaart, oben schwarzbraun, unten und an der Spitze weiß. — Das Weibchen unterscheidet sich nur durch weit kürzere Hörner. Die Jungen haben einen dunkleren Pelz und an einigen Parthieen sind die Haare röthlich zugespitzt. — Nachstehende Maaße sind von dem hiesigen Exemplare entnommen.

Körper nach der Krümmung	24″ 0‴	Vom Auge zur Nasenkuppe	3″ 0‴
Schulterhöhe	12 6	Ohren	2 3
Schwanz mit Haaren . .	4 0	Hörner	1 10

In den Waldungen von Guinea und Senegambien.

43. A. melanorheus Gray, der schwarzkruppige Guevi; praecedenti similis, at minor tergoque nigro.

Cephalophus melanorheus. Gray ann. of nat. hist. XVIII. p. 167; sec. ser. VIII. 143; Knowsley Menag. tab. 10.

Graubraun, Kehle und Seiten blasser, Hinterrücken und Oberseite des Schwanzes schwarz. Kinn, Brust, Unterleib, Vorder- und Hinterrand des Schenkels und Unterseite des Schwanzes weiß. Ueber den Augen ein schmaler weißlicher Streif; Füsse dem Rücken gleichfarbig. Pelz weich, blaß grau, mit eingemengten ziemlich starren, schwarzen Haaren. Bewohnt Fernando Po. Diese Art ist ähnlich wie die A. Maxwelli gefärbt, aber kleiner und hat den weichen, mit schwarzen Haaren untermengten Pelz der A. pygmaea; wird aber leicht an der schwarzen Färbung des Hinterrückens erkannt.

44. A. pygmaea Fall., der kapſche Guevi.

Antilope pygmaea. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 452. — Peters Moſſamb. Säugth. S. 184. — A. minuta. Forst. descript. animal. p. 383. — Sylvicapra pygmaea. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 142, 313. — Cephalophus monticola. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 142.

Im ſüdlichen Afrika und von Peters auch an der Küſte von Moſſambique aufgefunden. Gray, der es liebt, veraltete Namen hervorzuſuchen, hat dieſer Art den Thunberg'ſchen Namen A. monticola reſtituirt, was um ſo mehr zu mißbilligen iſt, da Thunberg unter dieſer Bezeichnung die ächte ſüdafrikaniſche A. pygmaea mit einem nordweſtlichen Guevi zuſammenſtellte.

45*. A. punctulata Gray, der geſprenkelte Guevi; saturate fulvo-fusca, subtus alba; pedibus pallidioribus.

Cephalophus punctulatus. Gray ann. of nat. hist. XVIII. p. 167; sec. ser. VIII. p. 143. tab. 11. fig. 1; Knowsley Menag. tab. 11. fig. 1.

„Dunkel falbbraun, Seiten und Gliedmaſſen merklich blaſſer; ein ſchmaler Streif über die Augen und Innenſeite der Ohren blaßbraun. Kinn, Kehle, Bruſt, Bauch, Vordertheil der Schenkel und Unterſeite des Schwanzes weiß. Die Haare an der Baſis mit brauner Spitze und faſt endſtändigem gelben Ringe. Scheitel und Oberſeite des Schwanzes dunkler, Füſſe blaß, geſprenkelt." — Von den andern Guevis verſchieden durch die falbe Färbung, welche durch den gelben Ring vor der Spitze der Haare hervorgebracht wird. Dieſe Art beruht blos auf einem jungen, von Sierra Leone herſtammenden Exemplare und gehört daher zu den Arten, die erſt noch einer weiteren Sicherſtellung bedürfen. Ob am Ende nicht ein Junges von A. Maxwelli?

46*. A. Whitfieldii Gray, der weißfüßige Guevi; supra griseo-flavescens, subtus cano-albida.

Cephalophus Whitfieldii. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 143; Knowsley Menag. tab. 11. fig. 2.

„Gelblich aſchfarben; Schultern, Außenſeite der Gliedmaſſen und Hinterrücken merklich dunkler; Ohren und Stirne blaß gelblichbraun. Ein

Streif über den Augen. Wangen, Bruſt, Bauch, Innenſeite der Gliedmaſſen und ein Ring um die Füße oberhalb der Hufe aſchfarbig weiß. Haare aſchgrau, die des Rückens am Ende braun mit gelber Spitze." — Kleiner als der C. punctulatus und viel blaſſer und gelber. Dieſe Art, die auf einem ganz jungen, von Gambia gebrachten Exemplare beruht, iſt noch unſicherer als die vorige.

d) sedis incertae, scopis carporum et tarsorum.

* A. quadriscopa H. Smith.

Antilope quadriscopa. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 447.

Dieſe Art beruht lediglich auf der von H. Smith gegebenen Abbildung und Beſchreibung und exiſtirt in keiner Sammlung. Obwohl genannter Naturforſcher ſie ſelbſt ſeiner Gattung Cephalophus zugewieſen hat, ſo iſt doch das Vorhandenſeyn von Büſcheln an der Fußgelenkung etwas von den andern Arten genannter Gattung ſo Abweichendes, daß man gerechtes Bedenken tragen muß, ſie ſelbiger ohne Weiteres als eine erprobte Species einzureihen.

8. Subgen. Redunca H. Smith (Cervicapra Blainv. et Sund.).

Cornua solis in maribus, reclinata, apice procurva, inferne annulata; sinus suborbitales nulli; rhinarium distinctum; statura mediocris aut magna.

Ich vereinige hier die 3 Gattungen Gray's: Eleotragus, Adenota und Cobus, wie ich es ſchon früher gethan habe und wie es auch neuerdings Turner vorgenommen hat. Nach Anſicht der Schädel von Antilope redunca, isabellina, capreolus und arundinacea gibt Letzterer folgende Charakteriſtik. Naſenöffnung ziemlich lang, die Naſenfortſätze des Zwiſchenkiefers lang, doch nicht immer die Naſenbeine erreichend; eine große Suborbital-Furche, aber keine Grube; die Paukenknochen groß und angeſchwollen; der erſte ächte Backenzahn in jedem Kiefer mit einem deutlich entwickelten ſupplementären Lobus und einer mehr oder minder deutlichen Spur davon an den hintern. — Alle Arten ſind afrikaniſch.

a) statura mediocri, cauda tota villosa. — Eleotragus Gray.

47. A. Capreolus Licht., die Reh-Antilope; gracilior, capite compresso, naso tumido, cornibus gracilibus vix divergentibus, vellere lanato.

Antilope Capreolus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 428 [1]). — Cervicapra Capreolus. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 145. — Eleotragus Capreolus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 144; Knowsley Menag. tab. 12.

Südafrika. Temminck ſtellt dieſe Art zu Calotragus, wahrſcheinlich weil ein kleiner Schlitz am vordern Augenwinkel vorhanden iſt.

48. A. Eleotragus Schreb., die Riet-Antilope; robustior, capite latiusculo, cornibus crassioribus divergentibus, vellere supra pallide canofulvescente.

Antilope Eleotragus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 426. — Eleotragus arundinaceus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 144.

var. α) minor.

Cervicapra Eleotragus. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 145.

var. β) major.

A. isabellina Afz. Peters Moſſamb. Säugth. S. 189. — Cervicapra isabellina. Sundev. a. a. O. S. 146.

Sundevall bemühte ſich die Unterſchiede zwiſchen A. Eleotragus und isabellina genauer auseinander zu ſetzen; Gray jedoch konnte nach Unterſuchung von 4 Männchen und 5 Weibchen aus verſchiedenen Theilen Südafrikas keine ſtandhaften Unterſchiede ermitteln und hat ſie deshalb wie ich unter einer Species zuſammengeſtellt.

49. A. redunca Pall., der Nagor; cornua et caput praecedentis, at cauda minus floccosa, vellere fulvido.

Antilope redunca. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 426. — Cervicapra redunca. Sundev. pecora 1844; Archiv. ſtand. Beitr. II. S. 146. — — Eleotragus reduncus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 145; Knowsley Menag. tab. 13. — Oureby. Fr. Cuv. mamm. III.

Nordweſt-Afrika.

Nach den ältern Angaben von Adanſon und Buffon ſoll der Nagor, wie ſie dieſe Art nennen, ganz falb gefärbt ſeyn und kein Weiß auf dem

---

1) In Schreber's Supplem. a. a. O. gehört die Anmerkung 7) zu Ende der Beſchreibung der A. Capreolus auf S. 428.

Unterleib wie die Gazellen haben. Damit ſtimmen aber die in neuerer Zeit aus Senegambien gebrachten Exemplare nicht überein, indem bei ihnen die ganze Unterſeite des Körpers und des Schwanzes, die Innenſeite der Gliedmaſſen und ein Fleck unter den Ohren und über den Augen weiß iſt. Bis zu weiteren Aufklärungen werden wir vor der Hand dieſe A. reduncа im Sinne von Gray nehmen müſſen. Die Oberſeite iſt bräunlichfalb, was an den Seiten viel lichter wird; der Vordertheil der Beine iſt bisweilen ſchwärzlich.

50. A. Bohor Rüpp., der Bohor; A. reduncae simillima, at paululum major et pallidior.

Antilope Bohor. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 425. — Cervicapra Bohor. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 147.

Abyſſinien. — Sundevall unterſcheidet beide nahe verwandte Arten folgendermaſſen. A. reduncа: dorsum anticum pluries vorticosum, stria carpi nigra. 2) A. Bohor: vortex nullus dorsi cervicisque, stria carpi nulla. — Dagegen macht Gray bemerklich, daß die Exemplare von A. Bohor im Frankfurter Muſeum mehr Schwarz an der Mittelhand und dem Mittelfuß haben als das daſelbſt aufgeſtellte Individuum von A. reduncа; ferner daß die Exemplare von Gambia auf dem Rücken keinen Haarwirbel haben. Er ſchließt daraus, daß A. reduncа und Bohor zu vereinigen ſind; jedenfalls ſind ſie als ſehr nahe verwandte, einander gegenſeitig vertretende Arten oder vielleicht auch nur als lokale Varietäten zu betrachten.

b) statura major, cauda elongata tota aut apice solo villosa, collo haud jubato. — Adenota Gray.

51. A. Kob Gray, der Kob; pallide brunneo-fulvida, subtus alba; cornibus sublyratis, juniorum valde recurvis, cauda villosa.

var. α) sinubus lacrymalibus loco fasciculus pilorum, cauda tota villosa. — Tab. 29.

Antilope Koba et Kob. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 434, 435. — Antilope annulipes. Gray ann. of nat. hist. X. p. 267. — Adenota Kob. Gray l. c. sec. ser. VIII. p. 211; Knowsley Menag. tab. 14.

var. β) sinubus lacrymalibus brevibus, cauda tenui apice solo villosa.

Antilope Kob. Fraser zool. typ. tab. 20. — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 199. — Aequetoon — Damalis. Knowsley Menag. tab. 15.

Die Verwirrung, welche in der Synonymik der mit dem Namen Kob und Koba bezeichneten Antilopen bisher bestand, ist nur erst theilweise gelöst; einstweilen wird es gerathen seyn, diese Art so aufzufassen, wie sie Gray nach lebenden und ausgestopften Exemplaren bestimmt hat.

Gray giebt folgende Charakteristik. Die Muffel ist mäßig, herzförmig, hirschartig; die Nase zwischen dem Rücken der Nasenlöcher behaart. Die Hörner sind stark, etwas leierförmig, geringelt, in der Jugend stark zurückgekrümmt. An der Stelle der Thränenfurche findet sich ein Haarbüschel. Die Haare der Rückenlinie sind zurückgekrümmt, mit einem Wirbel an den Schultern und Lenden. Der Schwanz ist länglich und behaart. Die Farbe ist blaß gelblichbraun; der Augenkreis, Lippen, Kinn, Brust, Bauch, Innenseite der Vorderbeine und Schenkel, und eine Binde über den Hufen weiß. Ein langer schwarzer Streif auf der Vorderseite der Vorderglieder, ein kurzer oberhalb des weißen Ringes auf den hintern, die Fesseln und die Spitze der Ohren und des Schwanzes sind schwarz. Die Kehle ist gelblich. Das Weibchen ist ähnlich gefärbt, aber ungehörnt.

Mit dieser A. Kob, wie sie in der Knowsley Menagerie auf Tab. 14 abgebildet ist, stellt Gray ein anderes, auf Tab. 15 dieses Kupferwerkes dargestelltes Thier zusammen, das allerdings in allen Stücken mit jener übereinzukommen scheint, nur daß kein Büschel vor den Augen sich findet, dafür eine kurze Thränengrube, und der Schwanz blos am Ende mit längern, einen Pinsel bildenden Haaren besetzt ist. Mit dieser Abbildung kommt die von Fraser überein, die wahrscheinlich nach demselben Individuum gefertigt ist. Dazu paßt wieder die von Temminck gegebene Beschreibung eines erwachsenen Männchens in der leidner Sammlung. Er bemerkt, daß wenig ausgedehnte Thränengruben vorhanden und die Haare des Rückens vorwärts gekrümmt sind. Als Körperlänge giebt er 3′ 8″ an, Schwanz 8″ und der Pinsel 2″ 6‴, Hörner 11″ 6‴, Schulterhöhe 2′ 8″. Zu diesen Exemplaren wird auch wohl H. Smith's A. adenota gehören [Schreb. Supplem. IV S. 418] mit langer offener Thränenfurche. — Es muß nun Gray überlassen werden, über die zwischen der Var. α und β vorliegenden Differenzen eine Entscheidung herbeizuführen; jedenfalls stimme ich mit Temminck darin überein, daß die

Var. β nicht bei Adenota (Redunca), ſondern den eigentlichen Antilopen (Subgen. Gazella) einzureihen iſt.

Dieſe Art bewohnt Senegambien; von den Joloffen wird ſie Aequitoon, von den Mandingos Kob genannt. Wie Gray bemerklich macht, geht das Wachsthum der Hörner in der Art vor ſich, daß mit der Verdikkung der Baſis die obern Ringe in großen Flocken abfallen, ſo daß das glatte Ende immer länger wird, während die Zahl der Ringe faſt in allen Altersſtufen die gleiche bleibt.

52. A. Lechè Gray, der ungemähnte Waſſerbock; brunnea, subtus alba, artubus antice nigro-fuscis, cauda apice solo villosa, cornubus elongatis apice recurvis.

Adenota Lechè. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 212. — Kobus Lechè. Gray Knowsley Menag. p. 213.

Nach einem, vom Kapitän Frank Vardon in Südafrika an den Ufern des Zonga-Flußes unter 22° Breite erlegten Exemplare hat Gray folgende Notizen mitgetheilt. Dieſes Thier iſt faſt ſo groß als der Waſſerbock; ſeine Hörner ſind ebenfalls denen des letzteren ſehr ähnlich: lang, an der Spitze zurückgekrümmt. Die Haare ſind kurz und anliegend, auch am Halſe, ſo daß kein Anſchein einer Mähne beſteht. Am Widerriſt und obern Theil des Nackens findet ſich ein kleiner Haarwirbel. Der Schwanz iſt dünne und bildet am Ende einen Pinſel. Die Farbe iſt blaßbraun; die Augenringe, Bruſt und Unterleib ſind weiß; der Vordertheil der Beine iſt dunkelbraun. Vom Waſſerbock unterſcheidet ſich dieſe Art durch den ungemähnten Hals, die blaſſere Färbung und den Mangel eines weißen Abzeichens an den Hinterkeulen. — Läßt dieſe Beſchreibung gleich noch viel zu wünſchen übrig, ſo giebt ſie doch eine eigenthümliche, vom Kob wie vom Waſſerbock verſchiedne Art zu erkennen.

c) statura major, cauda apice penicillata, vellere rudi, collo jubato. — Kobus H. Smith.

53. A. ellipsiprymna Ogilb., der Waſſerbock; flavido-brunnea, fascia alba elliptica circa caudae basin ducta, cornibus apice convergentibus.

Antilope ellipsiprymna. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 432. — Peters Moſſamb. Säugth. S. 189. — Cervicapra ellipsiprymnos. Sundev.

pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 147. — Kobus ellipsiprymnus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 213.

Südafrika; von Peters auch einzeln in Sena, Tette, Quellimane und Boror gefunden.

54. A. Defassa Rüpp., die Defaſſa; supra rufescens, cornibus apice divergentibus.

var. α) abyssinica.

Antilope Defassa. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 423. — Cervicapra Defassa. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 147.

var. β) senegalensis.

Cobus Sing-Sing. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 213. — A. unctuosa Laur. Wagn. a. a. O. S. 434. — Sundev. a. a. O. S. 147.

Gray betrachtet die dem nordöſtlichen Afrika (Kordofan und Abyſſinien) angehörige Defaſſa für identiſch mit dem ſenegambiſchen Sing-Sing, wie er von den Negern genannt wird, doch ſind genauere Vergleichungen noch vorzunehmen.

III. Antilopae orycinae. Oryx-Antilopen.

Nasus ovinus rhinario nullo aut angusto; cornua longa, gracilia, recta, aut simpliciter curvata, aut sublyrata, annulata, haud carinata; cauda elongata apice penicillata; ungulae spuriae majusculae; statura magna robusta.

Afrika angehörig.

9. Subgen. Hippotragus.

Cornua in utroque sexu; sinus lacrymales nulli, collum jubatum; dentes molares veri columella aucti.

Große ſtattliche Thiere, deren Schädel nur eine kleine Suborbital-Fiſſur, aber keine Grube zeigt; die ächten Backenzähne haben zwiſchen den Pfeilern kleine acceſſoriſche Säulchen. Die Naſenkuppe iſt größtentheils behaart.

a) cornua simpliciter curvata, annulata, cervice juba compressa recurva instructo. — Hippotragus Sund. (Aegoceros Desm.).

55. A. equina Geoffr., die Pferd-Antilope; griseo-fulvescens, fasciculo anteoculari dependente albo, juba cervicali et jugulari.

Antilope equina. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 482. — Hippotra-

gus equinus. SUNDEV. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 148, 314. — Aegocerus equinus. GRAY ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 215.

var. β); minor, glaucescente griseus, fasciculo anteoculari brevi fusca, juba jugulari nulla.

Antilope leucophaea Pall. Wagn., Sundev. und Gray a. a. O. — A. glauca. FORST. descript. animal. p. 391.

Südafrika. Nach drei in den Sammlungen zu Stockholm, Upſala und Paris aufgeſtellten Exemplaren der A. leucophaea unterſcheidet Sundevall dieſe von A. equina durch die in der obenſtehenden Diagnoſe angegebenen Merkmale, denen er noch beifügt, daß bei jener auch die Hufe kleiner ſind. Anfänglich ſonderte Sundevall die A. leucophaea als eigene Art ab; ſpäter erklärte er, daß man wenigſtens zwiſchen einer größeren und kleineren Varietät diſtinguiren müſſe. Dieſe A. leucophaea wurde früher in der Kapkolonie gefunden, ſcheint aber gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ausgerottet worden zu ſeyn.

56. A. nigra HARR., die ſchwarze Antilope.

Antilope nigra. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 484. — Peters Moſſamb. Säugth. S. 190. — Hippotragus niger. SUNDEV. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 148. — Aegocerus niger. GRAY ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 216.

Von Peters neuerdings auch in den gebirgigen Gegenden von Chibima, weſtlich von Tette, und in waldigen Ebenen bei Sena aufgefunden.

b) cornua longissima, recta aut breviter curvata; cervice jubato, naso subcervino, ungulis spuriis magnis. — Oryx Blainv.

†) cornibus rectis.

57. A. Oryx PALL., die Zaum-Antilope.

Antilope Oryx. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 476. — Oryx capensis. SUNDEV. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 157, 316. — A. Gazella. FORST. descript. animal. p. 380. — Oryx Gazella. GRAY ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 216; Knowsley Menag. tab. 16. fig. 2 (jung).

Südafrika.

58. A. Beisa RÜPP., die Beiſa.

Antilope Beisa. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 477. — Oryx Beisa. SUNDEV. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 157. — GRAY ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 216.

Abyſſinien.

††) cornibus curvatis.

59. A. ensicornis Ehr., die Säbel-Antilope.

Antilope ensicornis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 479. — Oryx leucoryx. Sundev. pecora 1844; Archiv ſkand. Beitr. II. S. 157. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 217; Knowsley Menag. tab. 16. fig. 1. (jung), tab. 17. (alt).

var. α) asiatica?

Antilope leucoryx Pall. Wagn. a. a. O.

var. β) nubica.

Antilope ensicornis Ehr. Wagn. a. a. O.

var. γ) senegalensis.

Antilope Gazella Pall. Wagn. a. a. O.

Die Varietät α, welche auch in neueſter Zeit nicht wieder geſehen wurde, wird wohl identiſch mit der Var. β ſeyn. Was dieſe und die Var. γ anbelangt, ſo erklärt Gray, daß er zwiſchen nubiſchen und ſenegalſchen Individuen keine Differenz habe entdecken können. Da Gray eher zur Trennung als zur Vereinigung der Arten hinneigt, ſo wird man es bei ſeinem Ausſpruche bewenden laſſen dürfen.

c) cornibus longis lyratis, naso ovino, ungulis dilatatis. — Addax.

60. A. Addax Licht., die Mendes-Antilope.

Antilope Addax. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 486. — Oryx Addax. Sundev. pecora 1844; Archiv ſkand. Beitr. II. S. 157. — Addax nasomaculatus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 217; Knowsley Menag. tab. 18.

Nordöſtliches Afrika.

Der Schädel iſt im Allgemeinen ähnlich dem von Oryx, doch minder langſtreckig. Vom dem der Gazellen weicht er entſchieden ab durch geringere Entwicklung der Parthie hinter und durch größere Länge der Parthie vor den Hörnerzapfen; ferner dadurch, daß die Augenhöhlen nicht, wie bei letzteren, einen vorſpringenden Ring bilden, die Gegend vor denſelben nicht vertieft, ſondern flach und die ganze Stirngegend weit breiter und geebneter iſt [1]).

1) In den Abhandl. der bayr. Akadem. V. S. 370 habe ich ſchon vor geraumer

IV. Antilopae strepsicerinae. Schrauben-Antilopen.

Nasus cervinus aut bovinus rhinario plus minus distincto; cornua valida tortuosa, carinata; cauda apice penicillata; dorsum fere æquale; statura magna aut mediocris.

Mit Ausnahme einer Art afrikaniſch.

10. Subgen. Taurotragus Wagn.

Cornua in utroque sexu, valida, recta, carinata; sinus lacrymales nulli, rhinarium infra nares angustatum; dentes molares veri columella aucti; statura valida bovina.

Eine Mittelform, welche die Gruppe der Oryx-Antilopen mit Strepsiceros in Verbindung bringt, und der ich auch die Anoa depressicornis einreihe [1]).

Zeit nachgewieſen, daß bei der A. Addax nicht nur die obern, ſondern auch die untern ächten Backenzähne das für die Rindergattung charakteriſtiſche Säulchen aufzuweiſen haben. Schon deshalb und wegen Verſchiedenheiten im Schädelbaue iſt es nicht zu billigen, wenn die A. Addax der Gruppe der Gazellen zugewieſen wird.

1) Temminck war der erſte, welcher die Antilope Oreas und A. depressicornis in einer Gattung (Oreas) vereinigte, der er auch noch die Gattung A. Oryx mit ihren Verwandten beifügte. Gewöhnlich werden dieſe 3 typiſchen Arten weit auseinander gerückt und insbeſondere die A. depressicornis in die Gattung der Rinder eingereiht. Allerdings ſpricht für letztere Zuſammenſtellung der Totalhabitus, aber nicht die Form der Hörner, die bei A. depressicornis antilopenartig gebildet ſind. Daß auch Turner dieſe Vereinigung mit den Rindern gebilligt hat, kommt wohl nur davon her, daß er zwar bei der A. depressicornis die Säulchen zwiſchen den Pfeilern der ächten Backenzähne beobachtete, aber nicht bei A. Oreas. Zu dieſem Ueberſehen ſcheint er dadurch verleitet worden zu ſeyn, daß er von der A. Oreas blos einen Schädel ohne Unterkiefer vor ſich hatte. Wie ich nämlich ſchon früher (in den Abh. der bayr. Akadem. a. a. O.) gezeigt habe, ſo entbehren bei dieſer Art die obern Backenzähne allerdings der acceſſoriſchen Säulchen, dagegen ſind ſie an den untern ganz in derſelben Entwicklung und Form wie beim Elennthiere (Cervus Alces) vorhanden. Dadurch ſchließt ſich nun die A. Oreas ſowohl an A. depressicornis als auch an A. Oryx näher an, und wenn ich letztere nicht mit jenen beiden, wie es Temminck gethan, zu einer Gruppe verbunden habe, ſo geſchah es hauptſächlich, weil der Habitus und die Form der Hörner dagegen ſpricht. — Zu meiner frühern Charakteriſtik des Schädels der A. Oreas will ich nur noch beifügen, daß die Gegend vor der Augenhöhle nicht vertieft iſt und keine Suborbital-Fiſſur ſich findet.

a) cornibus glabris subulatis, basi carinato-contortis. — Oreas Desm. (Boselaphus H. Smith, Damalis Sund.).

61. A. Oreas Pall., die Elenn-Antilope; pallide brunnea aut grisea, subtus albida.

Antilope Oreas. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 465. — Damalis Oreas. Sundev. pecora 1844; Archiv ſkand. Beitr. II. S. 150. — Oreas Canna. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 225; Knowsley Menag. p. 27, 29. tab. 26, 27. — A. Oryx. Forst. descript. animal. p. 379.

Südafrika. Lord Derby erhielt für ſeine Menagerie 3 lebende Individuen: zwei Männchen und ein Weibchen, die ſich daſelbſt fortpflanzten. Er macht dabei bemerklich, daß es unter den Männchen zwei Varietäten giebt: eine hochbeinige und eine kurzbeinige.

62. A. Derbiana Gray, die geſtreifte Elenn-Antilope; fulvido-brunnea, subtus alba, collo pectoreque nigris, lateribus albo-striatis. — Tab. 28.

Boselaphus Derbianus. Gray ann. of nat. hist. XX. p. 286. — Oreas Derbianus. Gray l. c. sec. ser. VIII. p. 226; Knowsley Menag. tab. 25.

Eine höchſt ausgezeichnete Art aus Senegambien vom Caſaman-Fluße. Sie unterſcheidet ſich von der kapiſchen A. Oreas dadurch, daß ſie blaß bräunlichfalb gefärbt iſt, der Hals, die Vordertheile der Unterſeite, ein großer Fleck an der Vorder- und Hinterſeite des obern Theils der Vorderglieder, ſo wie die Rückenlinie ſchwarz; ferner verlaufen über die Leibesſeiten 14 bis 15 ſchmale, etwas wellenförmige, ſenkrechte weiße Streifen, und der untere Theil des Halſes iſt vor der Schulter von einem weißen Halskragen umgeben, der ſich nach oben verſchmälert. Der Bauch, der vordere und hintere Rand des Obertheils der Gliedmaſſen und die Unterſeite des Schwanzes iſt weiß. — Beim Weibchen iſt der Hals ſchwärzlichbraun.

b) cornibus latis, depresso-trigonis, rugosis, apice raptim attenuatis, teretibus. — Anoa H. Smith.

63. A. depressicornis H. Smith, der Sapi-Utan.

Antilope depressicornis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 466. — Anoa depressicornis. Sundev. pecora 1844; Archiv ſkand. Beitr. II. S. 150. Gray Knowsley Menag. p. 47. tab. 30. — Oreas depressicornis (platyce-

ros). Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 192. — Bubalus depressicornis. Turn. ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 422.

Celebes. Ist unter allen Antilopenarten diejenige, die den nächsten Uebergang zu den Rindern bildet, so daß sie auch Gray und Turner unmittelbar bei den Büffeln einreiht, wobei letzterer bemerklich macht, daß nach seiner Untersuchung des Schädels keine Berechtigung gegeben sey, diese Art als besondere Gattung aufzustellen. Wie schon erwähnt, ist es die Form der Hörner, die mich bestimmt, sie nicht den Rindern, sondern den Antilopen zuzuweisen, wie dieß allerdings auch Temminck gethan hat. Ganz gesichert wird aber diese Sellung erst dann erscheinen, wenn die Beschaffenheit des Schädels genauer als bisher gekannt seyn wird.

11. Subgen. Tragelaphus Blainv.

Cornua solis in maribus, infra spiraliter contorta, carinata, reclinata; sinus lacrymales nulli, dentes molares columella accessoria privati; statura magna aut mediocris; (vellus striis aut maculis albis ornatum).

Ich belasse diese Untergattung in der Ausdehnung, wie ich sie früher genommen habe, da alle Arten in der Form des Schädels und in der Richtung, Drehung und Kielung der Hörner mit einander übereinstimmen. Am Schädel ist die Nasenöffnung von mäßiger Größe, eine kleine Suborbital-Fissur ist vorhanden, aber keine Grube, die Paukenknochen sind aufgetrieben, und die Backenzähne mit kleinen accessorischen Säulchen versehen.

a) naso piloso, area angusta intra nares striaque maxillari exceptis; statura magna ponderosa. — Strepsiceros H. Smith.

64. A. strepsiceros Pall., der Kudu.

Antilope strepsiceros. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 445. — Forst. descript. animal. p. 377. — Peters Mossamb. Säugth. S. 190. — Strepsiceros capensis. Harris portr. tab. 20. — A. Smith illustr. mamm. tab. 42, 43. — Strepsiceros excelsus. Sundev. pecora 1844; Archiv skand. Beitr. II. S. 147. — Strepsiceros Kudu. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 225 Knowsley Menag. tab. 24. fig. 2 (jung). — Horsf. catal. p. 170.

Südwärts der Sahara durch das ganze übrige Afrika verbreitet; von Peters nahe der Küste Zanzibar, Mossambique und Quellimane, sowie im Innern des Landes gefunden.

b) naso bovino rhinario distincto; statura mediocri, artubus elongatis gracilibus, ungulis minutis. — Tragelaphus Sund.

†) fascia alba ante oculos, cornibus magnis.

65. A. euryceros Ogilb., die Tromme; capite brunneo; fascia anteoculari, maculis genuum duabus, mento labioque superiore antice albis; cornibus elongatis crassis torsis, apice vix antrorsum versis; gutture pilis longis vestito.

Antilope euryceros Og. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 445. — Tragelaphus euryceros. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 226; Knowsley Menag. tab. 23. fig. 1. (Kopf mit Hörnern). — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 190.

Bisher nur nach einem, aus Senegambien gebrachten Kopf mit den Hörnern beschrieben. Das Museum in Leiden besitzt ein Exemplar, doch macht von diesem Temminck nichts weiter bemerklich als daß das Thier von den Mandingos Tromme genannt werde. Wahrscheinlich wird der Pelz wie bei A. Angasii weiß gestreift seyn.

66. A. Angasii Gray, der Inyala; nigra (♂), aut fulva (♀), striis lateralibus verticalibus albis; cornibus elongatis gracilioribus, apice distincte antrorsum versis.

Tragelaphus Angasii. Angas, proceed. of the zool. soc. 1848 p. 89. tab. 4. (Männchen), 5 (Weibchen und Junges); ann. of nat. hist. sec. ser. III. p. 310. — Gray ann. VIII. p. 226.

Gleichfalls eine sehr stattliche Antilope, die von G. F. Angas entdeckt und von ihm nach frischen Exemplaren gut beschrieben wurde. Sie bildet mit der vorigen ein Mittelglied zwischen dem Kudu und den nachfolgenden Arten.

Das Männchen ist robust und stark behaart; die Gliedmassen schlank, die Hufe zugespitzt. Die Hörner sind gewunden (einen Umgang machend) und etwas leierförmig, sehr ähnlich denen des Buschbocks (A. sylvatica), aber viel mehr spiral; von der Basis bis zur Mitte ihrer Länge sind sie stark gerunzelt und bräunlichschwarz, dann werden sie strohfarbig und laufen in eine glatte, merklich vorwärts gewendete, scharfe Spitze aus. Der Hals ist mit langen Haaren bedeckt, die besonders lang auf seiner Unterseite herabhängen und in ähnlicher Weise sich längs des Unterleibs und an der Vorderseite fast bis gegen die Fußwurzel herabziehen. Die Ober-

seite des Halses und der ganze Rücken ist mit einer kurzen Mähne besetzt. Der Pelz ist graulichschwarz mit purpurbraunem und ockerfarbigem Anfluge. Längs der Leibesseiten ziehen 4 bis 5 senkrechte weiße Streifen herab. Die Mähne ist längs des Halses schwarz und längs des Rückens weiß. Die Stirne ist lebhaft rostfalb, der Schnautzenrücken schwarz, vor den Augen zwei weiße Flecken, die eine Pfeilspitze auf schwarzem Grunde bilden. Drei Flecken an den Wangen, ein Fleck jederseits der Oberlippe, Kinn und Unterkiefer sind gleichfalls weiß. Die Ohren sind außen rostfalb und schwarz gesprenkelt, und innen mit weißen Haaren besetzt. An den langen Haaren des Unterhalses und Bauches, ferner an der Vorderseite der Schenkel zeigt sich ein weißer Fleck; auf der schwarzen Außenseite der Vorderarme finden sich 3 weiße Flecke. Die Läufe sind rostfarben, über den Hufen schwarz mit weißem Fleck auf der Vorderseite. Der Schwanz ist langhaarig, oben schwarz, unten und an der Spitze weiß.

Das Weibchen ist kleiner und ungehörnt. Seine Färbung ist lebhaft rostfalb ins Orange ziehend, was am Unterleib und an den untern Theilen sehr blaß wird; die Innenseite der Schenkel ist weiß. Eine kurze schwarze Mähne erstreckt sich vom Hinterhaupte an längs des Nackens und Rückens bis zum Schwanze. Die weißen Flecken an verschiednen Stellen des Körpers sind so ziemlich dieselben wie bei dem Männchen, nur sind die weißen Streifen an den Leibesseiten deutlicher und zahlreicher, indem sie sich auf 12 bis 13 belaufen. Der Nasenrücken ist schwarz; der Schwanz ist oben roth und unten weiß, mit Schwarz gesprenkelt. — Die Jungen gleichen den Weibchen, sind aber blasser und haben an den Seiten mehr weiße Flecken.

	Männchen		Weibchen	
Ganze Länge	7′	6″	6′	0″
Schulterhöhe	3	4	2	9
Länge der Ohren	0	8	0	6½
„ des Schwanzes	1	8	1	3
„ der Hörner	1	10		

Bewohnt die niederen, mit Mimosa-Gebüsch besetzten Hügelzüge an den nördlichen Küsten der St. Lucia-Bay im Lande der Zulu unter 28° Breite, und findet sich in kleinen Heerden von 8 bis 10 Stück.

fff) fascia ante oculos nulla, cornibus brevissimis.

67. A. scripta Pall, die geſchirrte Antilope.

Antilope scripta. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 442. — Tragelaphus scriptus. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 141. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 227; Knowsley Menag. tab. 28. — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 197. — A. leucophaea. Forst. descript. animal. p. 386.

Senegambien und das Aſchantiland. Hat ſich in der Menagerie zu Knowsley fortgepflanzt.

68. A. Decula Rüpp., die Dekula.

Antilope Decula. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 442. — Tragelaphus Decula. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 141. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 227.

Abyſſinien.

69. A. sylvatica Sparrm., die Buſchantilope.

Antilope sylvatica. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 441. — Peters Moſſamb. Säugth. S. 183. — Tragelaphus sylvaticus. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 141. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 227.

Südafrika [1]).

V. Antilope alcinae. Elk-Antilopen.

Nasus latus, totus spongiosus hirsutus, aut rhinario nudo distincto

1) Die Antilope Doria Ogilb. (A. Zebra Gray), die ich noch im Supplem. IV. S. 444 als höchſt dubiöſe Art bei dieſer Gruppe aufführte, muß ganz aus dem Verzeichniß der Antilopen weggelaſſen werden. Lediglich nach zwei Fellen ohne Kopf und Füſſe beſtimmt, iſt ſie von Gray anfangs für einen Cephalolophus, ſpäter für eine Damalis gehalten worden; Ogilby wollte in ihr einen Tragelaphus (Calliope) und Whitfield gar eine Viverra erkennen. So wenig aber die vorhandenen Reſte ausreichend ſind, um nur die Gattung zu errathen, ſo hat es doch Fraſer in ſeiner Zool. typic. tab. 18 gewagt, eine Abbildung des Thieres zu geben, in der freilich aus löblicher Vorſicht der Kopf abgewendet, und überdieß nebſt den Füßen reichlich vom Schilf bedeckt wird. Das Geſagte wird ausreichen, um meine Auslaſſung dieſer angeblichen Antilopen-Species zu rechtfertigen.

instructus, nares distantes; dorsum devexum: interscapulium prymna altius et validius; ungulae magnae; statura magna robusta.

Die normalen Gattungen (Bubalis und Catoblepas) Afrika zuſtändig, die abnorme (Portax) Indien. Durch den abſchüſſigen Rücken mit ſtark entwickeltem Vordertheil und weit ſchwächerem und niedrigerem Hintertheil iſt dieſe Gruppe gut charakteriſirt.

12. Subgen. Bubalis Licht. Og.

Cornua in utroque sexu, sublyrata, dupliciter flexa, infra rugosa; rhinarium parvum, sinus lacrymales exigui, caput longum angustum. — Acronotus H. Smith, Alcelaphus Turn.

Durch die angegebenen Merkmale eine ſehr ſcharf abgegrenzte Gruppe. Der Schädel iſt langgeſtreckt und dabei ſehr ſchmal; beide Merkmale haben auch die Naſenbeine aufzuweiſen. Die Zwiſchenkiefer ſtoßen mit letzteren zuſammen, verlaufen faſt in gleicher Breite und ſind vorn breit abgerundet. Die Gegend vor den Augenhöhlen iſt bei A. Bubalis und Caama tiefer, bei A. albifrons ſeichter ausgehöhlt; eine Suborbital-Fiſſur fehlt ganz. Die Backenzähne haben keine acceſſoriſchen Säulchen.

a) cornibus basi crassis approximatis, versus apicem longum raptim curvatis; rhinario mediocri. — Boselaphus Gray.

70. A. Bubalis Cuv., die Kuh-Antilope; fulvescens fere unicolor.

Antilope Bubalis. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 469. — Bubalis mauretanica. Sundev. pecora 1844; Archiv ſkand. Beitr. II. S. 159. — Boselaphus Bubalis. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 221, Knowsley Menag. tab. 20 fig. 1 (jung).

Weſtliches Nordafrika.

71. A. Caama Cuv., die Kaama; fulva; superficie rostri, plaga ante et post cornua artuumque latere exteriore nigris; cornibus validis inaequaliter rugosis, basi erectis, dein infractis et postice flexis.

Antilope Caama. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 469. — Bubalis Caama. Sundev. pecora 1844; Archiv ſkand. Beitr. II. S. 159. — Boselaphus Caama. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 222; Knowsley Menag. tab. 20. fig. 2 (jung). — Horsf. catal. p. 169. — A. Bubalis. Forst. descript. animal. p. 380.

Südafrika.

72. A. **Lichtensteinii** Prr., die breithörnige Kuh-Antilope; fulvescens, supra ephippio splendide cinnamomeo tecta; rostri apice vittaque artuum antica nigris; cornibus basi depressis latis, extrorsum et retrorsum versis, dein sursum et introrsum curvatis denique infractis et retrorsum flexis.

Antilope (Bubalis) Lichtensteinii. Peters Mossamb. Säugth. S. 190. tab. 53 (Schädel), 54 (Thier).

Eine der merkwürdigsten unter den zahlreichen Entdeckungen, welche Peters in Mossambique machte. Diese Art ist zwar den beiden vorhergehenden nahe verwandt, gleichwohl durch Färbung und Hörnerform auffallend verschieden.

Die Größe ist die der Kaama, aber der Kopf ist noch länger. Der Körper ist wie bei dieser abschüssig mit bucklig erhöhtem Widerrist. Die Hörner stehn viel weiter auseinander als bei der Kaama, sind an der Basis sehr platt, doppelt so breit als hoch, und biegen sich zuerst horizontal nach außen und hinten, krümmen sich darauf nach oben und innen, und zuletzt plötzlich rechtwinklig nach hinten; nach dieser letzten Krümmung verlaufen sie entweder parallel oder gehn divergirend auseinander. Sie sind fast glatt, nur am Grunde mit einigen schwachen Ringen und an der innern Seite der letzten Krümmung mit 3 bis 4 halbringförmigen Wülsten versehen. Die Ohren sind zugespitzt. Die Thränengrube am vordern Theil des Auges ist klein, punktförmig und freiliegend. Der äußere Rand der Nasenlöcher ist behaart. Die Beine sind schlank, die Klauen etwas zugespitzt. Der Schwanz ist oben anfangs kurz behaart, nach dem Ende hin mit langen Haaren besetzt, unten nackt. Leistengruben fehlen. Das Weibchen hat 2 Zitzen.

Die Oberseite des Körpers von den Hörnern bis zur Schwanzwurzel ist glänzend zimmetbraun, sattelförmig abgegrenzt von der röthlichgelben, nach unten ins Isabellgelbe übergehenden Färbung des übrigen Körpers. Die Stirne und der Nasenrücken sind den Leibesseiten gleichfarbig, nur gesättigter. Die Schnauzenspitze, Ober- und Unterlippe und eine Binde, die von den Hufen an der Vorderseite der Beine bis zum Unterarm und Schienbein hinauf steigt, sind schwarz. Die Ohren sind außen zimmetbraun, innen weiß behaart. Der Unterleib ist etwas blasser als die Leibesseiten,

nur die Gegend zwiſchen den Gliedmaſſen iſt weiß. Der Schwanz iſt oben anfangs mit gelbbraunen, von der Mitte an bis zum Ende mit längeren ſchwarzen Haaren bekleidet. Die Augen ſind ſchwärzlich rothbraun, Hörner und Hufe glänzend ſchwarz.

Das Weibchen iſt wie das Männchen gefärbt; das ganz junge Thier hat aber ſtatt des braunen Rückenſattels nur eine über das Rückgrath ſich hinziehende ſchwarze Binde.

Körper . . .	2m, 050	Ohren	0m, 215
Schulterhöhe .	1 260	Schwanz ohne Haare	0 490
Kopf	0 510		

Von den Hörnern gelten folgende Maaße:

Breite an der Baſis . .	0m, 104	Abſtand bei der erſten Krümmung	0m, 210
Höhe „ „ „ . .	0 052	„ „ „ zweiten „	0 100
Abſtand von einander an der Baſis	0 040	Länge der geraden Endſpitzen .	0 100

Von Peters einzeln bei Sena, in Inhacuera und Boror gefunden, ſoll aber nach den Eingebornen zuweilen in Heerden von vielen Hunderten in den grasreichen Ebenen erſcheinen. Der einheimiſche Name iſt in Tette Gondo, in Sena und Boror Gondongo; bei den Portugieſen Vacca de mata (wilde Kuh).

b) cornibus gracilioribus, subcylindricis. — Damalis Gray.

†) cornibus a basi divergentibus.

73. A. lunata H. Smith, der Saſſabey; glauco-fulva, stria a vertice ad nasum decurrente artubusque supra fascia longitudinali nigricantibus.

Antilope lunata. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 471. — Bubalis lunata. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 159. — Damalis lunata. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 222.

Südafrika. Die Hörner ſind kürzer als der Kopf, im größten Theile ihrer Länge geringelt, verdünnen ſich allmählich, ſind von der Baſis weit von einander abgerückt und ganz rückwärts gerichtet. Sie gehen gleich von der Wurzel an weit auseinander und wenden ſich zuletzt wieder etwas einwärts.

††) cornibus basi fere parallelis.

74. A. senegalensis H. Smith, der Korrigum; praecedenti simillima, at cano-rufescens, cornibus majoribus, minus curvatis, basi fere parallelis, dein divergentibus.

Antilope senegalensis. H. Smith, Griff. anim. kingd. V. tab. 199 fig. 3. — Damalis senegalensis. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 222; Knowsley Menag. tab. 23. — Bubalis lunata. Sundev. V. Akad. Handl. Stockh. 1842. p. 201, 243. — Bubalis Koba. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 159.

Ungemein ähnlich der A. lunata, aber doch von ihr ſcharf unterſcheidbar. Die Hörner ſind anfangs einander faſt parallel, dann divergirend und mit den Spitzen wieder genähert; ſie zählen gegen 18 Ringe. Die Färbung iſt graufalblich, was unten ins Weißliche übergeht. Ein vom Hinterhaupt zur Naſe verlaufender Streif, ein kleiner Fleck hinter den Augen, ein Strich über jedem Mundwinkel, eine breite Binde auf der oberen Hälfte der Außenſeite der Gliedmaſſen und der Schwanzpinſel ſind ſchwarz.

Körper	6′	0″	Ohren	6″	9‴
Schulterhöhe	4	0	Hörner	18	0
Kopf bis zu den Hörnern	1	2	Abſtand ihrer Spitzen	6	5

Sowohl am Senegal als in Sennaar gefunden, und iſt alſo der nördliche Repräſentant der ſüdlichen A. lunata. Sundevall hält dieſe Art für identiſch mit Buffon's Koba (nicht zu verwechſeln mit A. Koba Erxl.), allein Gray wird wohl eher Recht haben, wenn er in letzterer die A. pygarga vermuthet. — Die Jungen von A. senegalensis ſind einförmig blaßbraun, ohne dunkle Abzeichnungen.

75. A. pygarga Pall., der Buntbock; purpureo-rufa, plaga nasali uropygioque albis.

Antilope pygarga. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 412. — Bubalis pygarga. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 160. — Damalis pygarga. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 223; Knowsley Menag. tab. 20. fig. 2. (jung), tab. 22. fig. 2, 3. (alt).

Südafrika [1]).

1) Sowohl nach dem äußern Habitus als dem Schädelbaue kommt die A. pygarga

76. A. albifrons Haa., der Bläß-bock; praecedenti simillima, at dorso toto usque ad caudae basin concolore, purpureo-rufo.

Antilope albifrons. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 413. — Bubalis albifrons. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 160, 315. — Damalis albifrons. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 224; Knowsley Menag. tab. 22. fig. 1. (halbwüchſig).

13. Subgen. Catoblepas Gray.

Cornua in utroque sexu, valida, ad latera inflexa, incurva; nasus latissimus, antice spongiosus, hirsutus; sinus lacrymalis loco tuber glandulosum; cauda elongata.

Der Schädel iſt dem von Bubalis durch ſeine lange ſchmale Form ähnlich, ſo wie dadurch, daß das Schädeldach nach vorn flach abfällt; mit dem der A. Caama überdieß noch dadurch, daß die Hornzapfen mit ihrer Baſis über das Hinterhaupt hinausragen. Er unterſcheidet ſich aber auffallend dadurch, daß während bei Bubalis der Schnautzentheil an Länge weit den hintern Theil übertrifft, bei dem Gnu dagegen beide Parthieen faſt gleichlang ſind, und daß nicht, wie bei Bubalis, die Zwiſchenkiefer zugeſpitzt, ſondern am Ende erweitert und gerade abgeſtutzt ſind. Die Suborbital-Fiſſur und acceſſoriſchen Säulchen an den Backenzähnen fehlen dem Gnu gleichfalls; die Schneidezähne ſind faſt gleichbreit.

77. A. Gnu Zimm., das Gnu; unicolor umbrino-fusca, naso fasciculo pilorum retroversis instructo; pectore jubato.

Antilope Gnu. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 473. — Schleg. de Diergaarde p. 169. — Catoblepas Gnu. Sundev. pecora 1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 156. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 220; Knowsley Menag. tab. 19. fig. 1. (jung). — C. taurina H. Smith (nec A. Smith). — Bos Poëphagus et connochaetes. Forst. descript. animal. p. 40, 392.

Südafrika. Die A. taurina Burch. et H. Smith iſt eine Varietät, bei welcher die Mähne und der Schwanz ſchwarz iſt.

78. A. Gorgon H. Smith, der Kokun; flavido-cinerea, irregulariter striata; naso pilis antrorsum versis tecto; pectore haud jubato.

---

und albifrons vollſtändig mit den andern Arten von Bubalis überein, und beide dürfen deshalb nicht, wie ich es früher irrthümlich gethan, den Gazellen eingereiht werden.

Supplem. IV. S. 474. — Peters
s taurina. Sundev. pecora 1844;
Gorgon. Gray ann. of nat. hist. sec-
fig. 2. (jung).

ax H. Smith.

exannulata, in utroque sexu; si-
distinctum, artus elongati, ungulae

wohl durch den allgemeinen Habi-
Schädels. Letzterer ist langstreckig
zwar ist der Schnautzentheil ver-
as, aber kürzer als bei Bubalis.
liegt indeß in der Richtung der
amlich bei jenen beiden Gattungen
nach vorn, hinter ihnen steil nach
Winkel bildet, steigt dagegen bei
en nur allmählich in die Höhe und
gleicher Richtung fort, zuletzt blos
abwärts. In dieser Beziehung
er noch die weitere Uebereinstim-
der Stirngegend besteht. Letztere
den Hornzapfen etwas gewölbt, in
ch ausgehöhlt, überdieß durch Gru-
nacht. Die beiden Hornzapfen sind
ormig, kurz, auswärts und etwas
ch vorwärts gerichtet [1]). Die

ausgeſchweift, ohne eigentliche Suborbital-Fiſſur. Die Naſenbeine ſind mittellang, ſchmal, hinten und vorn zugeſpitzt; die Naſenlöcher kürzer als jene. Die Thränenbeine ſtoßen nicht mit den Naſenbeinen zuſammen, ſondern zwiſchen beiden, dem Stirn- und Oberkieferbeine bleibt eine kleine Lücke. Der Vorderrand des Zwiſchenkiefers iſt nicht, wie beim Gnu, breit abgeſtutzt, ſondern zugerundet wie bei Bubalis, doch nicht ſo kräftig ausgebildet wie bei letzterer. Die Paukenknochen ſind blaſig, aber an der Außenſeite platt. Die zwei Höcker auf dem Grundtheile des Hinterhauptbeines ſind deutlich entwickelt. Der Winkel des Unterkiefers iſt ziemlich vorſpringend. Die mittlern Schneidezähne ſind breiter als die äußern, und den Backenzähnen gehen die acceſſoriſchen Säulchen ganz ab [1]).

Bei den großen Eigenthümlichkeiten, die ſich bei Portax in der Bildung des Schädels und der Hörner vorfinden, will dieſe Form eigentlich nicht recht in eine der andern Gruppen hineinpaſſen. Will man nicht eine beſondere aus ihr errichten, wozu ich nicht gerne ſchreite, weil dieſelbe nur mit einer einzigen Art vertreten wäre, ſo läßt ſie ſich noch am erſten mit Bubalis und Catoblepas zuſammmenbringen, indem ſie gleichfalls von anſehnlicher Größe und ebenſo der Vordertheil des Rückens höher und kräftiger iſt als die Kreuzgegend [2]).

79. A. picta Pall., der Nylgau.

Antilope picta. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 467. — A. leucopus.

---

1) Sowohl Gray als Turner ſchreiben der Antilope picta ſolche Säulchen zu, aber mit Unrecht, denn am Skelete der hieſigen Sammlung, welches von demſelben Individuum als das ausgeſtopfte Fell herrührt, iſt auch nicht eine Spur derſelben vorhanden.

2) Ueber die Suborbitaldrüſe des Nylgaus hat Turner (ann. of nat. hist. ser. XI. p. 467.) nach Unterſuchung eines friſchen Leichnams einige Bemerkungen mitgetheilt. Aeußerlich ſieht man eine kleine Grube unmittelbar vor der Augenhöhle und vor ihr eine kleine Längsfalte der Haut, in deren Mitte ein kleines rundes Loch iſt, durch welches eine gelbliche Sekretion aus einer gerade darunter liegenden Drüſe ausſchwitzt. Die Drüſe ſelbſt iſt kaum größer als eine Haſelnuß, und liegt auf der Oberfläche des Knochens ohne eine vorfindliche Grube, iſt aber feſt angeheftet an einer glatten Linie, die auf demſelben verläuft.

Forsr. descript. animal. p. 377. — Portax Tragocamelus. Sundev. pecora 1844; Archiv. ſtand. Beitr. II. S. 149, 315. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 228; Knowsley Menag. tab. 29. — Horsr. catal. p. 170.

Oſtindien.

VI. Antilopae budorcinae. Biſon-Antilopen.

Cornua in utroque sexu valida, a basi sursum, postea lunatim extrorsum et retrorsum versa, apice horizontaliter retrorsum porrecta; ungulae magnae, habitus bovinus, statura magna. Monticolae.

Hieher nur eine einzige Gattung mit einer einzigen Art, welche als Alpenthier den öſtlichen Himalaya bewohnt und durch die Form ihrer Hörner die Ziegen-Antilopen mit den Elk-Antilopen in nähere Verbindung bringt.

15. Subgen. Budorcas Hodgs. Takin.

Nasus ovinus, cauda caprina; nec sinus lacrymales, nec fossae inguinales, nec pori interdigitales.

Eine der merkwürdigſten unter den zahlreichen Entdeckungen, mit welchen Hodgſon den Katalog der Säugthiere bereicherte, zugleich von ihm ſehr ausführlich und genau nach einem ausreichenden Material beſchrieben. Die äußern Formen dieſes, erſt vor etlichen Jahren entdeckten Thieres ſind ſo ungewöhnlich, aus Charakteren von Antilopen und Rindern, zum Theil auch von Schafen und Ziegen zuſammengeſetzt, daß man auf den erſten Anblick in Verlegenheit kommt, einen ſchicklichen Platz für dieſes abſonderliche Thier unter den Hohlhörnern ausfindig zu machen. Wirklich iſt ihm auch bisher ſeine Stelle im Syſteme ſehr verſchiedenartig zugewieſen worden. Hodgſon betrachtete den Takin als eine neue Gattung von Gray's Rinder-Antilopen (Bovine Antilopes); Gray dagegen, der, mit Ausnahme der Anoas, alle Antilopen in einer Gruppe beiſammen behält, verwies ihn unter die Rinder; Turner endlich brachte ihn in die Nähe der Ziegen-Antilopen, und zwar zunächſt zur Gattung Nemorhedus, deren Arten er als Schafs- Antilopen von den eigentlichen Ziegen- Antilopen abſondert. Meines Bedünkens könnten die Anſichten von Turner und Hodgſon vereinigt werden.

Turner hat zunächſt nur den Schädelbau berückſichtigt und darauf auf-

merksam gemacht, daß derselbe nicht, wie Hodgson vermuthete, gewisse Aehnlichkeiten mit dem des Gnus und des Bisamochsen hätte, sondern daß er nahe verwandt mit dem von Nemorhedus wäre, nur daß keine Suborbital-Depression vorhanden sey und daß die Leiste für den Ansatz des Kaumuskels nicht bis vor die Augenhöhle zu reichen schiene. Dieser Erklärung muß ich vollkommen beipflichten; man darf nur die beiden Abbildungen, welche Hodgson vom Schädel des Takins giebt (eine im Profil, die andere in der Ansicht von oben), mit den Schädeln der genannten Thiere vergleichen, um sich zu überzeugen, daß weder mit dem des Gnu's noch des Bisamochsens eine nähere Verwandtschaft stattfindet, sondern lediglich mit dem von Nemorhedus.

Diese Aehnlichkeit, nebst der des Schwanzes, zugestanden, bleibt aber noch Vieles, was sich einer unmittelbaren Vereinigung des Takins mit den Schaf- und Ziegen-Antilopen widersetzt. Dieß ist schon, um nur ein Paar Hauptstücke hervorzuheben, die ganz eigenthümliche Form der Hörner, welche ihn von letzteren eben so sehr entfernt als sie ihn dem Gnu annähert, und dann der schwerfällige rinderartige Habitus, weshalb eben Hodgson seine neue Gattung unter den Rinder-Antilopen einreihen wollte, zu denen sie eben so wenig als zu den Ziegen-Antilopen paßt, wenn man nicht deren gut begründete Charaktere abschwächen will. Eine natürliche Anordnung soll aber auf alle Hauptmerkmale Rücksicht nehmen, und so scheint es mir am zweckmäßigsten, aus dem Takin eine besondere Gruppe zu bilden, durch welche die Elk-Antilopen in Verbindung mit den Ziegen-Antilopen gebracht werden, wobei jedoch zu bemerken ist, daß er nach der Mehrzahl seiner Merkmale den letzteren viel näher steht als den ersteren.

80. A. taxicolor Hodgs., der Takin; tota nigra aut dorso flavidocano. — Tab. 32.

Budorcas taxicolor. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. 1850. p. 65. tab. 1 (Thier), tab. 2, 3 (Schädel). — Gray Knowsley Menag. p. 50. — Turner, ann. of nat. hist. ser. VIII. p. 418.

Das Material, auf welches Hodgson seine Charakteristik des Takins begründete, besteht aus 3 Fellen erwachsener Männchen und Weibchen, einem männlichen Schädel und etlichen Schädel-Fragmenten, die ihm vom

Major Jenkin gegeben worden waren; außerdem kamen ihm noch mündliche Mittheilungen zu statten.

Der Takin ist ein ziemlich großes Thier, ohngefähr von der Größe eines Yak-Weibchens, von untersetztem massigen Körperbau, kurzen robusten Beinen, kurzem gedrungenen Halse und großem Kopfe, so daß er im ganzen Habitus an die rinderartigen Formen erinnert. Wenn er auch in mehreren Beziehungen, namentlich in der Färbung, dem kurzen Schwanze, der rauhen anliegenden Behaarung und den kräftigen Formen dem Thar sich annähert, so hat doch der letztere viel mehr Antilopenartiges, der Takin dagegen mehr Rinderartiges. Der Kopf ist schwerfällig, hoch und besonders auffallend durch seine convexe Gesichtslinie, mit stark ausgeprägter Ramsnase. Nach vorn spitzt sich die Schnautze allmählich zu und die Oberlippe ist behaart; nur ein breiter Rand um die Nasenlöcher ist nackt und feucht. Die Ohren sind kurz, schmal und zugespitzt. Der Hals ist kurz und dick, der Leib untersetzt, die Schultern hoch, das Kreuz aber nicht abschüssig. Die Gliedmassen sind kurz, stark und endigen sich mit breiten Hufen; die Afterklauen sind stark entwickelt und stumpf kegelförmig. Der kurze, niedergedrückte, dreieckige Schwanz ist ganz wie der der Ziegen gestaltet. Die Haut ist außerordentlich dick und einförmig mit starren, geraden und anliegenden Haaren besetzt, die von gleicher mäßiger Länge sind, mit Ausnahme einer längern mähnenartigen Behaarung, die vom Unterkiefer an längs des Unterhalses und der Brust herabhängt, während die Nackenmähne fehlt. Am Kopfe finden sich sonst keine Haarbüschel; eben so fehlen Thränen-, Leisten- und Klauengruben. Das Weibchen hat 4, in ein Euter gestellte Zitzen.

Die Hörner sind bei beiden Geschlechtern vorhanden und stehn gleich über den Augenhöhlen. Sie sind an der Wurzel sehr stark und berühren sich fast mit ihren innern Rändern. Anfänglich richten sie sich auf eine ganz kurze Strecke senkrecht in die Höhe, dann winden sie sich horizontal auswärts und drehen sich hierauf mit Beibehaltung der horizontalen Linie in einem Halbmonde rückwärts; von da an verlaufen sie weiter hinterwärts fast parallel mit einander in derselben wagrechten Richtung, mit nur ganz schwachem Aufsteigen, in gerader Erstreckung bis zu ihrer Spitze. An ihrer Wurzel sind die Hörner sehr stark, ohne doch bauchig angeschwol-

len zu seyn, und verschmächtigen sich allmählig gegen ihr stumpfes Ende; anfangs sind sie etwas zusammengedrückt und kantig, im Fortlaufe werden sie nach und nach gerundet. Der Durchschnitt an der Basis ist dreieckig-oval, wobei der breitere und gerundete Kiel schief vor- und auswärts gedreht ist. In ihrer Wurzelhälfte sind die Hörner mit zahlreichen, gedrängt stehenden Ringen versehen, welche alle parallel einander rund um sie herumgehen und bei Jungen deutlicher sind als bei Alten, wo sie durch das Reiben der Hörner mehr oder weniger undeutlich werden; in ihrer Endhälfte sind sie ganz glatt. Bei den Weibchen sind die Hörner etwas kleiner, und gegen ihre Spitzen einander zugewendet.

Der ganze Leib des Takin hat sowohl oben als seitlich eine gelblichgraue oder Dachsfarbe; der ganze Kopf und Hals, der größte Theil des Unterleibs, ein Saum längs des Rückgraths, die ganzen Beine und der Schwanz sind schwarz. Die Dachsfarbe rührt davon her, daß, soweit die lichte Färbung reicht, die Haare in den beiden untern Dritteln strohfarbig, im obern schwarz sind. Die Ausdehnung der lichteren Farbe auf dem Leibe ist veränderlich, indem bisweilen das ganze Thier einförmig schwarz ist. Die Weibchen sind ähnlich gefärbt, aber etwas kleiner und ihre Mähne minder entwickelt. Die Hörner, Hufe und der nackte Rand der Nasenlöcher sind kohlschwarz [1]).

Der Schädel des Takin ist hauptsächlich ausgezeichnet durch seine Höhe und durch seine stark convexe Profillinie, deren Krümmung vom Hinterhaupte an bis zur Spitze der Nasenbeine nur einmal im Raume zwischen den Hörnern unterbrochen wird, indem hier die Stirnbeine etwas steiler abfallen und zugleich verflacht sind. Die Nasenbeine sind kurz, zugespitzt und sowohl nach der Länge als Breite convex, so daß sie schnabelartig hervorragen; die Nasenöffnung ist ziemlich lang. Der Schnauzentheil verschmälert sich allmählig und endigt mit einem abgerundeten

1) An einem gut gefertigten und colorirten Holzmodell vom Takin, einem Kunstwerk eines einheimischen Häuptlings, war an der Stirne ein weißer halbmondförmiger Fleck angegeben und die Strohfarbe blos auf den Rücken beschränkt, indem die Seiten sowohl als der übrige Theil des Rumpfes und die Beine schwarz waren.

Rande. Wie schon erwähnt ist im Uebrigen der Schädel des Takin dem von Nemorhedus sehr ähnlich.

	Männchen.		Weibchen.	
Länge von der Schnauze bis zum After	6′	6″	6′	0″
— des Kopfs bis zum hintern Stirbeinrande [1])	1	6	1	4
— der Ohren	0	5½	0	5
— der Schwanzrübe	0	3	0	2¾
— des Schwanzes mit Haaren	0	8	0	6
Höhe an der Schulter	3	6	3	0
Länge der Hörner nach der Krümmung	1	8	1	2½
Umfang derselben an der Basis	1	0	0	9½
Abstand derselben an der Basis	0	3	0	½
— „ „ „ Spitze	1	0	0	6½
Länge des Vorderhufs längs der Sohle	0	4½	0	4
Breite „ „ „ „ „	0	3½	0	3
Höhe, schief, bis zum Ende der Zehe	0	3	0	3

Schädel des Männchens.

Länge von dem Scheitelbeine bis zum Zwischenkiefer-rande, gerade	1′	6½″
Größte Höhe	1	5½
Länge der Nasenbeine	0	6½
Größte Breite der Stirnbeine zwischen den Augenhöhlen	0	7½
Länge des Unterkiefers	1	1½
— der untern Backenzahnreihe	0	5½

Der Takin bewohnt den östlichen Theil des Himalaya oder den, welcher an Yunan, Sechuen und Kham angrenzt, von wo er wahrscheinlich auch auf die benachbarten Gebirge von China und Tibet übergeht. Er findet sich daselbst in der Alpen- und mittlern Region, kommt aber nicht in die untere herab. Gewöhnlich sieht man ihn heerdenweise in großer Anzahl und er wird seiner Wildheit und Kühnheit wegen sehr gefürchtet. Von den Mischmis wird er Takin, von den Khamtis Kin genannt.

Nachschrift. Während ich eben mit der Revision meines Manuskripts beschäftigt war, um es dem Drucke zu übergeben, erhielt ich von Herrn

1) Die ganze Länge des Kopfes ist an einem andern Orte zu 20″ angegeben.

Dr. Rüppell die Benachrichtigung, daß ihm unter andern neuen, höchst werthvollen Acquisitionen auch ein Paar Hörner von Budorcas taxicolor zugekommen seyen, deren Benützung zu meiner Arbeit er mir gern gestatten wolle, wenn ich es wünschte. Das freundliche Anerbieten meines hochgeehrten Freundes wurde natürlich von mir dankbarlichst angenommen und somit bin ich denn in den Stand gesetzt worden, Hodgson's Angaben über die Beschaffenheit der Hörner von einer der seltensten und ausgezeichnetesten Arten unter den Antilopen durch Selbstansicht prüfen zu können.

Die erwähnten Hörner, von denen ich auf Tab. 32 eine Abbildung vorlege, rühren offenbar von einem erwachsenen alten Thiere her, sind ganz vollständig und sitzen auf ihren Stirnzapfen, mit denen zugleich noch ein Theil der Schädeldecke in Verbindung gelassen ist, nämlich derjenige Theil der Schale, welcher von den Nasen- und Stirnbeinen gebildet wird; alles Andere war bereits abgesägt.

Die Beschreibung, welche Hodgson von den Hörnern lieferte, erweist sich nach meiner Vergleichung als exakt. Es sind dieß Hörner, welche sehr an die des Gnu's erinnern, nur daß sie mit ihren Spitzen nicht vorwärts, sondern hinterwärts gerichtet sind. Sie steigen zuerst auf eine kurze Strecke aufwärts, und indem sie sich zugleich abwärts senken, drehen sie sich in einem sanften Bogen nach hinten und behalten nun diese Richtung bei, wobei sie nur gegen die Spitzen ein wenig aufsteigen, und zugleich mit diesen etwas einwärts sich biegen. An ihrer Wurzel sind die schief aufgesetzten Hörner von der inner-vordern und von der äußern-hintern Seite zusammengedrückt und zwar am stärksten nach hinten, so daß dadurch an dieser Stelle eine Kante entsteht und der Durchschnitt ein langgezogenes, vorn stark erweitertes und hinten zugeschärftes Oval darstellt. Indem die erwähnte stumpfe Kante mit dem Horne aufsteigt, gelangt sie nach oben und, immermehr sich abrundend, setzt sie sich vor- und abwärts fort, um sich zuletzt ganz zu verlieren, denn das gerade, nach hinten gerichtete Ende ist im Umfange drehrundlich. So weit die Doppelkrümmung und die Zusammendrückung eines jeden Hornes reicht, sind die Seitentheile mit unregelmäßigen Querwulsten besetzt, die von eben so unregelmäßigen Längsrippen und Längsfurchen durchkreuzt werden. Die

stumpfe Kante allein ist glatt, wahrscheinlich aber dieß erst in Folge des Abreibens geworden. Auch die beiden Flächen, welche die Hörner einander gegenseitig sich zuwenden, sind so abgewetzt, daß die Querrunzeln geglättet, die Längsfalten fast ganz verschwunden und nur unregelmäßige Gruben übrig geblieben sind. Das hintere gerundete Ende der Hörner ist ganz glatt, mit Ausnahme höchst feiner, etwas vorspringender Längslinien. An der Wurzel sind die Hörner nur auf eine ganz geringe Distanz von einander getrennt.

Vom Schädel ist, wie erwähnt, nichts übrig geblieben als ein Theil der obern Decke, so weit er von den Stirn- und Nasenbeinen gebildet wird. Die Stirnzapfen, welche von den Hornscheiden überzogen sind, entspringen vom hintern Rande der Augenhöhlen; von der hintern Fläche der Zapfen sind die Stirnbeine gerade abwärts gebogen, um sich mit den Scheitelbeinen zu verbinden, die in gleicher Richtung beginnen, doch bereits etwas hinterwärts sich wenden. Vor den Hörnern senken sich die Stirnbeine etwas abwärts und sind der Quere nach flach ausgehöhlt. Die Nasenbeine, zwischen welche sich die Stirnbeine in einen Zwickel hineinschieben, erheben sich aus der Senkung der letzteren und bilden der Länge nach einen mäßigen Bogen, der nur gegen die Spitze sich plötzlich abwärts krümmt wie ein Schnabel. Noch auffallender ist aber die starke bauchige Wölbung, mit welcher die Nasenbeine zu beiden Seiten dachig abfallen. Nach vorn endigen sie nicht, wie es die Zeichnung von Hodgson angiebt, mit einem Ausschnitt, sondern beide Nasenbeine bilden zusammen eine gemeinsame stumpfe Spitze. Bemerkenswerth ist auch noch die außerordentliche Dicke und Solidität der Schädeldecke. Nachstehende Maaße von vorliegendem Exemplare will ich zur Vergleichung mit denen von Hodgson beifügen.

Länge der Hörner nach der Krümmung der Kante	21‴	0‴‴
Umfang „ „ an der Wurzel	11	0
Abstand „ „ an den Spitzen	11	8
— „ „ an der Wurzel	0	5
Länge von der Spitze der Nasenbeine bis zum hintern Ende der Stirnbeine	11	1
Länge der Nasenbeine längs ihrer Naht	5	7
— „ „ „ „ Seitentheile . .	6	3
	58	

Die Maaße der hier beſchriebenen Hörner ſind demnach ſo groß, oder eher noch etwas größer, als die, welche Hodgſon von ſeinem männlichen Individuum angegeben hat. Was die beiden Abbildungen, die letzterer von den Hörnern lieferte, anbelangt, ſo iſt die eine, welche die Vorderanſicht angiebt, ziemlich gut gerathen, die andere aber von der Seitenanſicht iſt mißlungen, weshalb ich auf meiner Abbildung des Takins die Hörner nach dem mir zur Zeit vorliegenden Exemplare habe zeichnen und den übrigen Schädel nach Hodgſon ergänzen laſſen.

VII. Antilopae caprinae. Ziegen-Antilopen.

Cornua in utroque sexu, brevia, conica, simpliciter recurva, rugosa; pili rudes aut lanuginosi; habitus et modus vivendi caprina. Monticolae.

Trotz ihrer Aehnlichkeit mit den Ziegen, kann ich doch die Einreihung der Ziegen-Antilopen unter letztere nicht billigen, denn die eigenthümlichen Merkmale, welche den Ziegen zukommen: Mangel der Thränengruben und Klauendrüſen, eine ſchmale Spalte zwiſchen Thränen-, Stirn- und Naſenbein, gekielte Hörner, und ein gewöhnlich gebartetes Kinn, fehlen den genannten Antilopen entweder insgeſammt oder doch größtentheils. Dagegen bieten ſich von ihnen aus viele Anknüpfungspunkte an die übrigen Untergattungen der Antilopen dar, ſo daß man ſie auch bei denſelben belaſſen muß. In ihrer geographiſchen Verbreitung zeigen ſie die Eigenthümlichkeit, daß keine von ihnen im Hauptſitze der Antilopen, d. h. in Afrika, vorkommt. Die Backenzähne haben keine acceſſoriſchen Säulchen.

16. Subgen. Capricornis Og. (Nemorhedus H. Smith).

Cornua reclinata, rhinarium parvum aut nullum, fossae interdigitales distinctae.

Der Schädel (wenigſtens bei A. Thar, sumatrensis und Goral) zeigt keine Suborbital-Fiſſur; die Naſenbeine, ähnlich denen des Schafes, ſind ziemlich kurz und breit, und verbinden ſich mit den Kieferbeinen nur durch Einſchiebung einer unvollſtändigen Oſſifikation oder bleiben von ihnen ganz getrennt; die Paukenknochen ſind klein. — Sämmtlich aſiatiſch.

a) sinubus lacrymalibus distinctis, rhinario angusto. — Capricornis Gray.

…supra nigra, subtus pedibusque

…pplem. IV. S. 460. — Nemorhe-
…chiv ſtand. Beitr. II. S. 282. — Ca-
…l. sec. ser. VIII. p. 218. — Horsf.

…mbing-Utan; tota atra, cervice

…hreb. Supplem. IV. S. 458. — Ne-
…1844; Archiv ſtand. Beitr. II. S. 282.
— Capricornis sumatrensis.

…malayiſchen Halbinſel ſogar nicht

…subnuda, rhinario distincto. — Ca-

…he Antilope; fusca aut fusco-al-
…elongatis.

…v. I. tab. 18 (Thier), 19 (Schädel). —
…Nemorhedus crispus. Sundev.
— Capricornis? crispa. Gray

…noch nicht zugekommen iſt, ſo
…II nach den Leidner Exemplaren
…räuſelt, lang; braun, Füße und
…rauner, Weibchen braunweißlich.
…ſtimmter Bart, ſondern der Kopf
…ube findet ſich ein kleiner, faſt
…ten, braun…

dem vorhin erwähnten Fleck an dieser Stelle im Zusammenhange stehen wird. Die Thränen-, Stirn- und Nasenbeine schließen aneinander an.

Japan.

c) sinubus lacrymalibus rhinarioque nullis. — Nemorhedus Gray.

84. A. Goral Hardw., der Goral; fusca, subtus anguste flavida, ingluvie gulaque albis.

Antilope Goral. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 458; Freih. v. Hügel's Kaschmir IV. S. 578. — Nemorhedus Goral. Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beiträge II. S. 282. — Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 218. — Hodgs. catal. p. 168. — A. Duvaucelii. H. Smith (fide Gray).

Nepal.

17. Subgen. Haplocerus H. Smith (Mazama Raf., Gray).

Cornua subrecumbentia, teretia, nasus pilosus rhinario nullo, fossae interdigitales parvae, sinus lacrymales nulli.

Nordamerikanisch. Die Beschaffenheit des Schädels ist noch nicht erörtert.

85. A. lanigera H. Smith, die Woll-Antilope; alba, vellere longo molli.

Antilope lanigera. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 462. — Capra montana. Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 279. — Mazama americana. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 219. — Capra americana. Audub. Bachm. quadrup. 8. p. 128. tab. 128.

Nordamerika.

18. Subgen. Rupicapra H. Smith.

Cornua verticalia, recta, apice uncinata; aperturae duae glandulares pone cornua.

Europäisch, angeblich auch im Kaukasus.

86. A. Rupicapra Linn., die Gemse.

Antilope Rupicapra. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 463. — Forst. descript. animal. p. 391. — Schinz Monogr. der Säugth. tab. 52. — Rupicapra rupicapra. Sundev. pecora 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 279. — Rupicapra Tragus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 219.

var. β) minor, gracilior, clarius colorata, cornibus magis approximatis.

Antilope pyrenaica. Schinz a. a. O. tab. 53.

Temminck führt in seinem Verzeichnisse die A. pyrenaica als gesonderte Art von der A. rupicapra auf; Gray dagegen erklärt, daß er nach Vergleichung von Exemplaren aus der Schweiz, den Pyrenäen und Griechenland (Pindarus), nicht ein einziges Merkmal hätte ausfindig machen können, um sie zu trennen. Die Differenzen, die ich zwischen unsern Gemsen und den pyrenäischen wahrgenommen habe, sind mir gleichfalls nicht in der Bedeutung erschienen, daß sie mir eine specifische Sonderung als nothwendig hätten erscheinen lassen.

VIII. Antilopae furciferes. Reh-Antilopen.

Habitus cervinus, cornua erecta furcata in sexo utroque.

Mittelform zwischen den Gazellen und den Ziegen-Antilopen, mit jenen im Habitus, in der Form des Kopfes und der Füße, sowie in der Lebensweise, mit diesen in der Stellung, zum Theil auch in der Form der Hörner, so wie in der Stirnbreite einstimmend. — Nordamerikanisch.

19. Subgen. Dicranocerus H. Smith.

Nasus ovinus, cauda brevis; nec rhinarium, nec sinus lacrymales, nec ungulae spuriae.

Der Schädel zeigt eine längliche Suborbital-Fissur, aber in dieser Gegend keine Vertiefung; die Augenhöhlen springen etwas über die Gesichtslinie hervor und über ihnen stehen die Hörner. Die Nasenbeine sind hinten am breitesten, die Paukenknochen mäßig und zusammengedrückt. Die Backenzähne haben keine accessorischen Zacken und die Schneidezähne sind ziemlich gleichförmig.

87. Antilope furcifer H. Smith, die Kabri.

Antilope furcifer. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 403. — Dicranocerus furcifer. Sundev. pecora. 1844; Archiv stand. Beitr. II. S. 268. — Turner ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 419. — Mazama americana. Gray ann. l. c. p. 219. — Antilocapra montana. Audub. Bachm. quadrup. 8. II. p. 193. tab. 77.

Nach einer brieflichen Mittheilung Sr. Durchlaucht, des Herrn Prinzen Maximilian von Wied kommt auch an den Hörnern der Weibchen öfters nach vorn ein kleines Ende vor; ferner zeigt sich häufig an den Vorderfüßen eine Spur von Afterklauen, aber nie zwei beisammen.

V. AEGOCEROS.

Dieſer Gattung iſt nur eine einzige ganz neue Art, der Aegoceros hispanicus, und eine andere, früher fälſchlich dem Mufflon zugewieſene, der Aeg. Arkar zugekommen, aber mehrere andere ſind genauer bekannt geworden, doch ſind immer noch nicht alle Zweifel über die Arten der Wildſchafe befriedigend gelöſt. Die Arten laſſen ſich in folgender Weiſe gruppiren.

1. Subgen. Capra. Ziege.

Cornua simpliciter retrorsum curvata, capitis axi parallelim posita; sinus lacrymales folliculique ungulares nulla; nasus plerumque rectus, mentum utplurimum barbatum.

a) cornibus antice applanatis nodosis; naso ovino piloso. — Ibex.

1. Aeg. Ibex Linn.
2. Aeg. sibiricus Ehr.
3. Aeg. caucasicus Güld.
4. Aeg. Walie Rüpp.
5. Aeg. Beden Forsk.
6. Aeg. Pallasii Rouill.; bedarf genauerer Unterſuchungen, um ſicher feſtgeſtellt zu werden.
7. Aeg. pyrenaicus Bruch.
8. Aeg. hispanicus Schimp.

b) cornibus compressis, antice carinatis; naso ovino piloso. — Hircus.

9. Aeg. Falconeri Hüg.
10. Aeg. Aegagrus Linn.
11. Aeg. Capra.

c) cornibus brevibus declinatis, barba nulla, naso cervino, rhinario parvo. — Hemitragus.

12. Aeg. hylocrius Og.
13. Aeg. Iharal Hodgs.

2. Subgen. Ammotragus. Halbſchaf.

Cornua ovina, sinus lacrymales nulli, folliculi ungalares distincti, mentum imberbe.

14. Aeg. Nahur Hodgs.
15. Aeg. Burrhel Blyth.
16. Aeg. Tragelaphus Cav.

3. Subgen. Ovis. Schaf.

Cornua retrorsum curvata, apice antrorsum versa, versus capitis axin transversim posita; sinus lacrymales folliculique ungulares distincta; nasus convexus, mentum imberbe.

17. Aeg. Argali Pall.
18. Aeg. montanus Desm.
19. Aeg. Polii Blyth.
20. Aeg. orientalis Gmel.
21. Aeg. cyprius Blas.
22. Aeg. Musimon Schreb.
23. Aeg. Vignei Blyth.
24. Aeg. Ovis Linn.
25. Aeg. Arkar Brandt.

Ob alle hier aufgestellten Arten bei genauerer Bekanntwerdung und strengerer Prüfung sich als solche bewähren werden, läßt sich zur Zeit nicht verbürgen [1]).

1. Subgen. Capra.

Zu meiner früheren Schilderung dieser Untergattung in der IV. Abtheilung des Supplementbandes sind nur wenig Nachträge nöthig geworden.

Zu S. 491. Aeg. Skyn Wagn., der Skyn.

Capra himalayana. Gray Knowsley Menag. p. 33. — Horsf. catal. p. 171.

Wie Blyth nachträglich bemerklich machte, ist der Bart nicht, wie er früher angab, kurz, sondern bildet einen großen Büschel. Die Farbe ist bräunlichgrau; der Rückenstreif, eine Binde an den Schultern und die Vorderseite der Gliedmassen sind dunkelbraun oder schwarz; Schwanz und Bart schwarz. Dieser Skyn ist identisch mit dem Thiere, welches Freih.

---

1) Ovis Polii ist lediglich auf die Hörner begründet, daher noch unsicher. Ovis cylindricornis, von Blyth ebenfalls blos nach einem Paar Hörner aufgestellt, will Gray bei Capra caucasica unterbringen, was sicherlich nicht zulässig seyn wird. — Ovis Arkar ist zwar eine unbestreitbare Art, aber ihre Stellung unter den übrigen Schafen ist ihr noch nicht sicher angewiesen.

v. Hügel[1]) unter dem Namen Ahu aufführt. — Da die Hörner des Skyns viel länger als die der Capra sibirica s. altaica werden, so darf er immerhin als eine von derselben verschiedene Art betrachtet werden[2]).

Auf S. 497 ist nach dem Aegoceros pyrenaicus eine neue Art einzuschalten:

Aeg. hispanicus Schimp., der spanische Steinbock; fusco-fulvus, subtus sordide albus; cornibus triquetris, versus latus interius carinatis, annulatis, erectis et parallelis, dein raptim divergentibus, apice sursum et spiraliter curvatis; barba brevi.

Capra hispanica. Schimp. compt. rend. XXVI. (1848) p. 318; rev. zool. 1848. p. 90. — Schinz Monograph. d. Säugth. Ziegen S. 11. tab. 8.

Daß auf den südlichen Gebirgen Spaniens Steinböcke hausen, war bekannt, aber welcher Art angehörig, dieß haben wir erst von Schimper erfahren, der dieselben in ihren Heimathsstätten aufsuchte und durch nachstehende Beschreibung bekannt machte.

Gestalt und die Verhältnisse des Körpers sind wie bei Capra Be-

---

1) Kaschmir und das Reich der Siek. II. S. 290. Der Ahu ist von der Höhe eines gewöhnlichen Bockes, doch von viel stärkerem Knochenbaue und von graubrauner Farbe. Seine Hörner, die an und für sich riesenhaft zu nennen sind, scheinen der Kleinheit des Thiers halber noch doppelt so groß, als sie es wirklich sind. Frhr. v. Hügel sah ein Paar dieser Hörner, welche, in gerader Richtung gemessen, über 4 Fuß hoch und eine Last für einen starken Träger waren. An der Basis sind sie von länglich viereckiger Form, die größte Breite erreicht einen Durchmesser von 5 Zoll. Durch den Schnee von den Hochgebirgen (dem nördlichen Abfall des Himalayas und Tibet-Panjahl's) vertrieben, kommen diese Thiere zur Winterszeit in das im Norden von Kaschmir gelegene Thal der Atok, wo die Bewohner sie wegen der unter den Haaren wachsenden Wolle in Menge erlegen. Aus dieser Wolle wird das feinste Gewebe in Kaschmir verfertigt, welches, wie das Thier selbst, Ahu heißt.

2) Noch stellt Gray a. a. O. nach der Angabe von Hutton (Calcutta Journ. II. 521. tab. 19), eine Capra Borz auf, aus den Gebirgsbezirken von Afghanistan und Persien, von der er nur die Angabe beibringt: „Hörner lang, vorn mit breiten Knoppern, Kinn gebartet.“ — Gray vermuthet selbst, daß dieser Borz mit dem Skyn identisch seyn dürfte.

den. Der Pelz besteht ebenfalls aus kurzen Haaren ohne Flaum, aber er ist von dunklerer Farbe; auf dem Rücken und den Seiten braunfalb, auf dem Bauche und der Innenseite der Gliedmassen schmutzig weiß; die an den Spitzen braunen Haare sind in ihrer untern Hälfte aschgrau. Der Kopf, mit Ausnahme des Vordergesichts und des Hinterhaupts, wo die schwarzen Haare weiß getüpfelt sind, ist lichter als der Rücken; hinter jedem Ohr zeigt sich ein weißer Fleck. Der schwarze Fleck, welcher das Hinterhaupt bedeckt, verlängert sich in eine mehr oder minder deutliche schwarze Linie längs des Rückgraths bis gegen den Schwanz; letzterer ist kurz und mit einem schwarzen Pinsel geendigt. Der Bart, der nur dem Männchen zukommt, ist kurz, abgestutzt und stellt sich als wenig vorspringender, schwarzer, trapezoidaler Fleck dar. Der Vordertheil der Beine ist schön schwarz, was sich auf den vordern von den Hufen an bis zur Brust hinaufzieht und auf den hintern in eine Linie übergeht, welche die bräunliche Rückenfarbe von der weißlichen Bauchfarbe trennt. — Die Hörner sind groß, stark, an der Basis fast zusammenstoßend, dreieckig, mit scharfer, gegen die Innenseite gerichteter Kante, und mit 10 bis 12 Querwulsten, die bei Alten verwischt, aber bei den Jungen sehr deutlich sind. Die Hörner erheben sich von der Stirne gerade und fast parallel, alsdann entfernen sie sich plötzlich voneinander, indem sie einen, etwas gegen den Horizont geneigten Bogen beschreiben; zuletzt wenden sie sich mit der Spitze wieder gegen die Achse und erheben sich in einer halben Spiralwindung aufwärts.

Das Weibchen ist kleiner als das Männchen, ohne die geringste Spur von Bart, mit kleinen und schwach comprimirten Hörnern.

Dieser Steinbock bewohnt die höchsten Spitzen der Sierra Nevada und Sierra de Ronda, von wo Schimper acht Stücke erhielt, und wo er unter dem Namen Capra montes oder Montesa allgemein bekannt ist; er findet sich aber auch noch in der Sierra Tejeda und Sierra Morena. Ein neuntes Exemplar hat der genannte Naturforscher von Maladetta in den Pyrenäen erhalten, wo nach der Aussage der Jäger dieses Thier früher unbekannt war. Bei Dr. Rosenhauer in Erlangen hatte ich Gelegenheit, ebenfalls einige aus Spanien ihm zugekommene Exemplare zu sehen und mich dadurch zu überzeugen, daß dieser Steinbock zwar am nächsten

dem Aeg. pyrenaicus verwandt, gleichwohl nach der Form seiner Hörner von ihm verschieden ist und, insoweit diese den Ausschlag geben, als besondere Art betrachtet werden darf.

Zu S. 499. Aegoceros Falconeri.

Freiherr v. Hügel hat in seinem Werke über Kaschmir IV S. 579 meiner daselbst mitgetheilten Beschreibung eine Abbildung beigefügt. Gray giebt in der Knowsley Menagerie p. 34 von dem Markhur, den er, wie ich, für identisch mit Aeg. Falconeri ansieht, folgende Diagnose: „einförmig gelblichbraun, unten weißlich; unterer Theil der Beine von den Knieen an sehr blaß, vorn mit einer dunkeln Linie; Hörner sehr groß, mehr oder weniger gedreht, in der Krümmung variirend von denen der Antilope strepsiceros, nur in entgegengesetzter Richtung, bis zu der geraden Spirale der A. Oreas". — Gray pflichtet wegen der großen Veränderlichkeit, welche beim Markhur die Windungen der Hörner darbieten, der Meinung von Blyth bei, daß diese Ziegen nur eine ausgezeichnete Rasse von Hausziegen wären; wogegen ich jedoch zu erinnern habe, daß mir sehr viele Angaben bekannt sind, nach denen sie im wilden Zustande vorkommen, aber keine, welche von ihrem Hausstande berichtet. Auch Horsfield bezeichnet sie im Catal. p. 171 unter dem Namen Capra megaceros Hutt. als besondere Art.

Zu S. 502. Aeg. Capra.

Unter dem Artikel Daim lieferte Roulin sehr ausführliche und gründliche Betrachtungen über den Ursprung und die Rassen der Hausziege (dict. univ. d'hist. nat. IV. p. 577).

Eine umfassende Aufzählung der Rassen der Hausziege findet sich von Gray in der Knowsley Menagerie p. 33.

Im Journ. of the Asiat. Soc. XVI. 2 p. 1004 lieferte Hodgson eine ausführliche, von 7 Tafeln begleitete Abhandlung über die verschiedenen Rassen der zahmen Schafe und Ziegen, welche in den subhimalayischen Gegenden und in Tibet gehalten werden. Er zählt darin 4 Rassen von Schafen und eben so viele von Ziegen auf[1]).

1) Hiemit sind zu vergleichen die Beschreibungen, welche Horsfield in seinem Catal. p. 174. von einigen ostindischen Ziegen-Rassen lieferte.

Ueber milchgebende Böcke berichteten Schloßberger, (Müller's Archiv für Anatom. 1844 S. 430), und Is. Geoffroy (rev. zool. 1845 p. 323).

Zu S. 502. Hemitragus Hodgs. (Hemicapra Hodgs.)

Nach Hodgson's Vorgange trennt auch Gray Hemitragus als besondere Gattung von Capra ab, mit folgender Charakteristik: „Nase hirschartig, mit kleiner feuchter Muffel zwischen den Nasenlöchern; Hörner kurz und hinterwärts gekrümmt; Klauen- und Thränengruben fehlend. Weibchen kleiner mit 4 Zitzen. Geruch gleich den Ziegen." — Zu einer generischen Abscheidung von Capra sind die angegebenen Merkmale viel zu geringfügig. Gray zählt zu Hemitragus folgende 2 Arten:

1. Aeg. hylocrius Og., der Warryato; cornibus crassis, subquadrangularibus, antice latere exteriore rotundatis, latere interiore applanatis, dense annulatis.

Kemas hylocrius Og. (♀). Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 503. — Capra (Ibex) Warryato. Gray ann. of nat. hist. X. (1842) p. 267. — Hemitragus Warryato. Gray Knowsley Menag. p. 31. — ? Wild sheep of Tanasserim. Low journ. Roy. Asiat. soc. 1836 p. 50.

Das brittische Museum besitzt von dieser Art blos den Kopf und die Hörner von beiden Geschlechtern, welche Partridge mittheilte und von dem auch nachstehende Bemerkungen herrühren. Dieses Thier bewohnt die Nilgherry und die Fortsetzung der westlichen Reihe der Ghats bis zu ihrem Ende. In seiner Lebensweise kommt es mit dem Steinbocke überein, hält sich auf schroffen und unzugänglichen Plätzen auf und wird gewöhnlich in Heerden von 15 bis 50 Stück gesehen. Erwachsene Männchen erreichen eine Höhe von beinahe 3 Fuß, die Weibchen um ohngefähr 6 Zoll weniger. Mit dem Alter nehmen beim Männchen die schwarzen Haarspitzen zu und es zeigt sich ein graulichweißer Fleck am Rücken. Die Farbe des Weibchens scheint nicht zu ändern; das junge Männchen ist wie letzteres gefärbt, ohne Schwarz. Die Hörner des Männchens werden 20" lang, die des Weibchens nicht über 12. Das Männchen hat keinen Bart. Das Weibchen wirft ein Junges von aschgrauer Farbe. Die Farbe des Kopfes giebt Gray als dunkelbraun an, gelblich gesprenkelt.

2. Aeg. Iharal Hodgs., der Iharal; cornibus compressis triangularibus, latere exteriore declivibus et nodosis.

Aegoceros Iharal. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 503. — Hemitragus jemlahicus. Gray Knowsley Menag. p. 32. — Capra jemlaica. Horsf. catal. p. 170. —

Auch Gray vereinigt Capra Iharal und jemlahica miteinander.

Zu S. 505. Aeg. Argali ist folgende Synonymik beizufügen. Ovis Hodgsonii. Blyth ann. of nat. hist. VII. p. 199. — Ovis Ammon. Blyth. journ. of the Asiat. soc. XVI. p. 357. — Horsf. catal. p. 176. — Ovis ammonoides Hodgs. Hutton l. c. p. 568.

Zu S. 505. Aeg. montanus.

In Audubon's und Bachman's Quadrup. 8°. II. 163. tab. 73 ist diese Art unter dem Namen Ovis montana beschrieben und abgebildet worden.

Eine ausführliche Beschreibung des Knochengerüstes mit Abbildungen lieferte Richardson in der Zoology of the voyage of H. M. S. Herald. Fossil Mammals.

Blasius hatte zuerst gezeigt, daß Aeg. montanus nicht blos auf Nordamerika beschränkt ist, sondern daß ihm auch die Ovis nivicola von Kamtschatka angehöre. Nun hat aber neuerdings v. Middendorff (sibir. Reise II. 2 Säugth. S. 116 tab. 12 Fig. 1, 2) dargethan, daß dieser Aeg. montanus an den nordöstlichen Küsten Asiens noch weiter südwärts sich herabzieht, indem er ebenfalls im Küstengebirge des ochotskischen Meeres einheimisch ist; ein interessantes Faktum bezüglich der geographischen Verbreitung.

Zu S. 506. Aeg. Nahur.

Pseudovis Nahoor. Gray Knowsley Menag. p. 40. — Horsf. catal. p. 176. — Ovis Nahur. Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. 1. p. 360.

Nachdem jetzt nachgewiesen worden ist, daß der Nahur zwar Klauendrüsen, aber keine Thränengrube hat, auch der Schädel weder eine Grube, noch eine Fissur vor den Augenhöhlen zeigt, so kann er nicht mehr bei den ächten Schafen belassen werden, sondern ist bei Ammotragus unterzubringen. Gray betrachtet Ovis Burrhel nur als eine kleinere dunklere Varietät

von O. Nahur mit dunklen Hörnern; gegen eine solche Vereinigung spricht jedoch, wie Blasius gezeigt, die verschiedenartige Drehung der Hörner.

Zu S. 507. Aeg. orientalis.

Fraser hat in der Zoolog. typic. tab. 21 eine schöne Abbildung des Widders gegeben; Gray hat einige Bemerkungen über ein weibliches Exemplar in den ann. of nat. hist. sec. ser. VI. p. 57. mitgetheilt.

Zu S. 509. Aeg. Vignei Blyth.

Als Synonym gehört hieher: Ovis cycloceros Hutton. Mac. Clell. Calcutt. journ. II. p. 514. tab. 12; journ. of the Asiat. soc. XV. p. 152. — Ovis Vignei. Horsf. catal. p. 175.

Zu S. 510. Als eine neue Art der Wildschafe ist einzuschalten:

Aeg. Arkar Brandt, der Arkar; rufescens, subtus albus; cornibus mediocribus, lunatis, triquetris, rugosis.

Ovis Arkar. Brandt im zoolog. Anh. zu Lehmann's Reisen S. 16; Tchihatcheff voy. dans l'Altai oriental. I. p. 454. — Aegocerus Musimon. Pall. zoograph. I. p. 231. tab. fig. 7. (Schädel mit Hörnern). — ?Kuldscha. Eversm. bullet. de Moscou 1848 p. 197.

Pallas hatte zuerst diese, dem mittlern Asien angehörige Art bekannt gemacht, sie aber für identisch mit dem sardischen und korsikanischen Mufflon gehalten und diesem zugewiesen. Sowohl seine kurze Beschreibung, als noch vielmehr seine Abbildung der Hörner geben aber ein weit davon verschiedenes Thier zu erkennen, das jedoch bisher übersehen, und erst durch Brandt gewissermassen neu aufgefunden wurde. Noch hat aber derselbe keine nähere Beschreibung vorgelegt, sondern sich mit den wenigen Notizen begnügt, daß dieser Arkar am Usturt vorkomme, indeß nicht selten auch das am Ostufer des kaspischen Meeres gelegene Vorgebirg Airakli besuche. Von diesem ausgezeichneten, der Ovis tragelaphus der afrikanischen Wüsten entsprechenden Steppenschafe habe Lehmann die Hörner, Karelin aber ein vollständiges Exemplar erhalten. Genauere Auskunft versprach Brandt in seinen Beiträgen zur nähern Kenntniß der Säugthiere Rußlands zu liefern. Da diese noch nicht erschienen sind, so mag einstweilen die kurze Beschreibung von Pallas aushelfen.

Nach derselben ist die Größe unter der des Steinbocks und also noch vielmehr unter der des Argali. Der Kopf ist schafsartig, weiß, vorn röthlich, beiderseits vor den Augen mit einem länglichen braunen Fleck. Die Hörner sind dick, gelblich, halbmondförmig, an der Basis dreieckig und quer gerunzelt; dem Weibchen gehen sie ganz ab. Der Körper ist röthlich; an den Weichen, dem Bauche und den Füßen weiß. Der Schwanz ist schwärzlich. Vom Argali, außer der ganzen Form, Färbung und Größe verschieden durch schärfer dreieckige, mit der Spitze nicht auswärts gekrümmte und den Weibchen fehlende Hörner, so wie durch längeren Schwanz.

Körper . .	4′ 9″ 3‴	Hörner	1′ 8″ 6‴
Kopf . . .	0 8 6	Schwanz . . .	0 4 8
Ohren . .	0 4 6	Umfang an der Brust	3 0 0

Betrachtet man die Abbildung des Schädels, so sieht man, daß die Hörner sich zuerst von einander entfernen und dann wieder zangenförmig sich gegen einander krümmen; das rechte Horn ist links, das linke rechts gewunden. Das von Pallas beigebrachte Material ist vollkommen ausreichend, um in diesem Wildschafe eine von allen andern sehr verschiedene Art zu erkennen[1]), da er jedoch über die Thränengrube sich nicht äußert, so bleibt es vor der Hand unentschieden, ob es den eigentlichen Schafen oder den Halbschafen einzureihen ist. Nach den Angaben von Pallas wird dieses Thier von den Truchmenen Dach-kutsch (wildes Schaf), von den Persern Kotsch-Kohi (dieselbe Bedeutung) und von den Chiwanern Arkal genannt.

Es wird wohl keinem Zweifel unterliegen, daß dieser Arkar identisch mit dem Kulbscha aus dem Hochgebirge der Songarei ist, über den Eversmann einige Bemerkungen mittheilte.

VI. Bos. Rind.

Der früheren Beschreibung dieser Gattung ist wenig beizufügen.

---

1) Pallas hatte zwar auch noch Ovis orientalis Gmel. mit diesem Wildschafe zusammengestellt, beide haben jedoch sehr von einander verschiedene Hörnerformen.

Zu S. 512. Bos moschatus.

In der Zoology of the voyage of H. M. S. Herald. Fossil Mammals p. 56 iſt von Richardſon das Skelet des Bos moschatus ſehr ausführlich beſchrieben, und in ſchönen Abbildungen dargeſtellt worden.

Zu S. 513. Bos brachyceros.

Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 239. — Gray Knowsley Menag. p. 46. — Pzl. bijdragen tot de dierk. 5. aflevering mit Abbild. des Schädels.

Nach der Vergleichung des Schädels zweier alter Männchen, die Pel aus Guinea einſandte, iſt auch Temminck zur Ueberzeugung gelangt, daß der Bos brachyceros eine von B. caffer verſchiedene Art ausmacht. Es ſind dieß allerdings zwei ſehr nahe verwandte Arten, die jedoch bei genauerer Betrachtung immerhin noch Unterſchiede auffinden laſſen. Zuvörderſt iſt hervorzuheben, daß Bos brachyceros faſt um ¼ kleiner iſt als der B. caffer. Ferner zeigen ſich conſtante Differenzen im Schädelbau. Der Vordertheil der Schnautze iſt viel ſchmächtiger, die Naſenknochen ſind gewölbter, die Ränder der Augenhöhlen minder vorſpringend, die Stirne iſt nicht ſo gewölbt wie beim kafferſchen Büffel, während das Hinterhaupt mehr vorſpringt. Die Hörner geben gleichfalls einige erhebliche Verſchiedenheiten zu erkennen. Sie ſind im Allgemeinen minder ſtark, oben flacher und in einer ganz andern Weiſe gekrümmt. Von oben geſehen erſcheinen ſie halbmondförmig und gleichen durch ihre Krümmung denen des gemeinen Büffels. Von der Seite betrachtet, wird man gewahr, daß von ihrer Wurzel an die Krümmung weniger nach unten geneigt iſt als beim kafferſchen Büffel, daß ſie nachher etwas aufſteigen und daß ihre glatte und gerundete Spitze ſchwach einwärts gekrümmt und nach hinten umgebogen iſt.

Gray iſt der Meinung, daß das von Rüppell aus Abyſſinien mitgebrachte Exemplar nicht dem B. caffer, ſondern dem B. brachyceros zuzuweiſen iſt. Daß die von Clapperton und Denham aus dem Sudan eingelieferten Köpfe letzterer Art angehören, iſt ſchon früher erwähnt worden. Es iſt demnach dieſe Species von der Küſte Senegambiens an durch den Sudan bis nach Abyſſinien verbreitet und tritt hier als der Repräſentant des ſüdlichen Bos caffer auf.

Zu S. 515. Bos Bison.

Die vielfach erörterte Streitfrage über die Identität des Ur und Wisent behandelte auch Weißenborn in Froriep's neuen Notizen XL. S. 129, und entschied sich für die Einerleiheit. Weißenborn kannte jedoch über diesen Gegenstand aus den neueren Verhandlungen nur die von Cuvier und Bojanus; die Erörterungen von C. v. Bär, Pusch und mir sind ihm unbekannt geblieben. Wenn nicht neue Quellen ausfindig gemacht werden, wozu aber gar keine Aussicht vorhanden ist, läßt sich diese Streitfrage zu keiner endgültigen Entscheidung bringen.

Wichtige Beiträge zur Anatomie des Wisents lieferte Owen in den Ann. of. nat. hist. sec. ser. IV p. 288. — Ebendaselbst (III. p. 148) theilte Dimitri von Dolmatoff seine Erfahrungen mit über die Jagd auf Wisents im Walde von Bialowieza und über die Aufziehung der Kälber.

Zu S. 516. Bos americanus.

Für die Ansicht, welche in Bos Bison und B. americanus nicht zwei verschiedne Arten, sondern nur zwei verschiedne Varietäten findet, hat G. Jäger (Würt. naturw. Jahresh. III S. 176 bis S. 203) sehr triftige Gründe beigebracht.

Zu S. 516. Bos grunniens Pall.

Eine sehr genaue Beschreibung des Yaks im wilden Zustande hat Horsfield in seinem Catal. p. 184 nach einem in Ladakh erlegten Exemplare entworfen.

Zu S. 516. Bos Taurus.

Nach dem Vorgange von Hodgson bildet Gray aus dem zahmen Rinde und dem Zebu die Gattung Bos, während er den Gayal, Gaur und Banteng als besondere Gattung Bibos unterscheidet. Unter den Differenzen führt er an, daß bei Bos die Zwischenkiefer mit den Nasenbeinen zusammenstoßen, bei Bibos aber nicht. Vergleicht man nun aber die schönen Abbildungen, welche S. Müller und Schlegel vom Schädel des Banteng (B. sondaicus) geliefert haben, so sieht man auf Tab. 39 drei Schädel dargestellt, von denen beim oberen (vom alten Stier) die Zwischenkiefer nicht bis zum Nasenbeine hinauf reichen, während beim

mittleren Schädel (vom jüngeren Stier) und beim untern (vom alten Weibchen) beiderlei Knochen zusammenstoßen. Demnach wären die Schädel einer und derselben Species unter zwei verschiedne Gattungen zu stellen, was die Richtigkeit eines solchen Merkmales zu generischen Scheidungen schlagend darthut. Ueberhaupt sind die 4 oben genannten Arten einander so nahe verwandt, daß sie nothwendig in einer und derselben Gruppe belassen werden müssen.

Gray trennt neuerdings wieder den Zebu [1]) als besondere Art von B. Taurus ab, ohne jedoch Gründe anzuführen. Ich habe indeß schon vor geraumer Zeit in Schreber's Säugthieren V. 2 S. 1639 mit aller Evidenz den Beweis geliefert, daß das gemeine Rind und das Zebu einer und derselben Art angehören, so daß ich diese Streitfrage als ein- für allemal abgethan betrachten muß.

Einige interessante Bemerkungen, die S. Müller (in den Verhand. S. 196) über die Zebu mittheilt, sollen hier noch angeführt werden. Das Rindvieh des indischen Archipels besteht theils aus der gewöhnlichen indischen oder Zeburasse, theils aus Bastarden von dieser und dem sundaischen wilden Stier (B. Banteng s. sondaicus). Dieß gilt hauptsächlich von Java und den ostwärts gelegenen Inseln (Bali, Borneo, Celebes u. s. w.), welche von dort ihr Rindvieh erhalten haben. Die Stiere haben gewöhnlich keinen in die Augen fallenden Höcker über den Schultern und bisweilen fehlt er ganz. Auf Sumatra, insbesondere an der Westküste, ist das Rindvieh zierlicher und kleiner, und die Stiere haben selten einen eigentlichen Höcker auf den Schultern; an andern Küstenstrecken dieser Insel findet sich eine andere Zeburasse, wie sie in Bengalen zu Hause ist und wo sich die Stiere durch einen hohen Höcker zu erkennen geben.

Zu S. 517. **Bos Banteng** Raffl., der Banteng; nigro-fuscus (♂), aut fulvo-brunneus (♀); natibus pedibusque albis.

Bos sondaicus. S. Müll. Schleg. verhand. over de natuurl. gesch. der Nederl. overz. bezitt. zool. I. p. 197. tab. 35, 36. (Thier), tab. 37—39 (Schädel). — Bibos Banting. Gray Knowsley Menag. p. 48. — Horsf. catal. p. 183.

---

1) Eine hübsche Abbildung des Zebus findet sich in Schlegel's Dierga arden p. 188.

Durch die ausführliche, von schönen Abbildungen begleitete Beschreibung, welche nunmehr S. Müller und Schlegel vom Banteng beigebracht haben, können wir unsere frühere, unvollständige Darstellung ergänzen.

Die Gestalt ist im Allgemeinen ähnlich der der feineren Rassen unseres Rindes; auch die Größe ist ohngefähr dieselbe, doch ist die Kuh merklich kleiner. Die Hörner sind in beiden Geschlechtern sehr verschieden und zwar schon von Jugend an. Bei dem Stierkalbe laufen sie gerade nach außen und hinten, und nur die Spitze ist etwas vorwärts gebogen; beim Kuhkalbe dagegen sind sie viel kleiner, mehr nach hinten als auswärts gerichtet und von der Hälfte ihrer Länge an gekrümmt, so daß die Spitzen stark nach innen gebogen sind. Mit dem Alter verlängern sich die Hörner der Kühe mehr nach hinten und ihre Erweiterung übertrifft fast nicht die der Kopfbreite an den Augen. Von der Wurzel bis zur Mitte ihrer Länge sind sie schwach halbmondförmig gekrümmt, von wo sie eine starke einwärts und abwärts gehende Beugung bekommen, welche nach den Individuen verschieden sich modificirt. Die Hörner der Kühe bleiben viel kleiner als die der Stiere und sind gewöhnlich nicht länger als die Hälfte des Schädels. Die Hörner der Stiere dagegen nehmen mit dem Alter ihre Richtung, anstatt hinterwärts, mehr auswärts und richten sich von der zweiten Hälfte ihrer Länge an mit einer starken halbmondförmigen Krümmung aufwärts, etwas hinterwärts und mehr oder minder einwärts, so daß bei sehr alten Thieren die Krümmung so ansehnlich wird, daß jedes Horn für sich auf ¾ seiner Erstreckung einen Ring bildet. Die weiteste Entfernung beider Hörner von einander beträgt bei den Stieren ⅓ oder ¼ mehr als die Kopflänge. Die Hörner beider Geschlechter sind übrigens walzig und nur bei sehr alten Exemplaren an der Wurzel von vorn nach hinten zusammengedrückt; an dieser Stelle sieht man auch unregelmäßige Erhabenheiten und Vertiefungen zumal bei alten Stieren.

Die Behaarung ist äußerst kurz und glatt anliegend, nur am Scheitel etwas länger; die Ohren sind am innern Rande länger behaart und der Schwanz endigt mit einer Quaste. Bei den Kälbern sind die Haare etwas länger und schwach gekräuselt. Die Färbung ist theils weiß,

theils schwarz oder falb. Weiß sind bei beiden Geschlechtern: der Rand der Oberlippe, der Vordertheil der Unterlippe, die innern Haare der Ohren, der Hintertheil der Schenkel und die ganzen Füße hinauf bis etwas über die Hand- und Fußwurzel. Alle übrigen Theile sind am Stiere glänzend schwarzbraun mit rothbraunem Schimmer; die Schwanzquaste ist schwarz. Bei den Kühen sind diese Theile schön gelblich rothbraun, bald etwas lichter, bald etwas dunkler; nur an der Brust und auf dem Rückgrath geht diese Farbe ins Schwarze, auf der Kehle ins Weiße über. Die Stierkälber haben die Farbe der Mutter, nehmen aber später, gewöhnlich vom zweiten Jahre an, die Färbung der Stiere an. Die Hörner der Kälber sind schmutzig graulichschwarz. Später nehmen sie eine braune oder gelbliche Hautfarbe an; die der Kühe sind gewöhnlich viel dunkler als die der Stiere und ziehen meist stark ins Schwarze.

Ein erwachsener Stier erreicht folgende Größe.

Länge des Körpers	2m, 60	Schulterhöhe . .	1m, 76
— „ Kopfs	0 62	Schwanzlänge . .	0 92

Die Heimath des Banteng sind die waldigen Gegenden von Java, Borneo und Bali, wo er sowohl die ebenen als die gebirgigen Bezirke bis zu einer Höhe von 4000 Fuß bewohnt. Meist findet man ihn nur in kleinen Heerden von 4 bis 6 Kühen, welche von einem Stiere geleitet werden; sehr alte oder noch nicht ganz erwachsene Stiere trifft man nicht selten vereinzelt. Nach der Aussage der Eingebornen kommt seine Stimme mit der der einheimischen Kühe überein, welche indessen viel minder stark ist als die des europäischen Rindes. Erwachsene Thiere sind unzähmbar, doch jung eingefangen und unter den Menschen auferzogen, wird er sanft und leitbar und lauert auf keine Gelegenheit, um zu seinen Wildnissen zurückzukehren. Auch S. Müller bestätigt die frühere Angabe von Raffles, daß zahme Kühe absichtlich in die Wälder getrieben werden, um von wilden Stieren belegt zu werden, woraus dann oft schöne und kräftige Bastarde hervorgehen. Ein solcher war der von Quoy und Gaimard beschriebene Bos leucoprymnus, der für den Bedarf der Schiffsmannschaft auf Batavia angekauft worden war.

Der Banteng steht sowohl mit dem Gayal (Bos frontalis) und Gaur (B. Gaurus) als mit unserem Rinde in naher Verwandtschaft, mit dem er

jedenfalls zu einer und derſelben Gruppe unter den Rindern gehört. Vom B. frontalis, mit dem ſie auch den B. Gaurus ſpecifiſch vereinigen, unterſcheiden S. Müller und Schlegel den Banteng in folgender Weiſe. Die Farbe iſt bei B. frontalis, mit Ausnahme der weißen Unterfüße, bei beiden Geſchlechtern ſchwarzbraun. Die Haare der Stirne ſind länger, gekräuſelt und meiſt grau oder weißlich. Die Hörner haben bei beiden Geſchlechtern dieſelbe Form, nur daß die der Weibchen ſchwächer ſind. Sie ſind, in gerader Linie gemeſſen, viel kürzer als der Kopf, halbmondförmig, mit der Spitze einwärts gebogen und ſehr kräftig, hauptſächlich an der Wurzel, wo ſie große breite Ringe haben und vorn und hinten abgeplattet ſind, ſo daß dadurch ihr Umfang oval wird. Der Schädel ſteigt hinter den Augen ſtark aufwärts, iſt zwiſchen den Augen flach, zwiſchen den Hörnern breit und bildet da eine ſcharfe Kante, indem das Hinterhaupt in einer mehr oder minder ſchiefen, nach vorn laufenden Linie abfällt. — Bei Bos Banteng dagegen iſt die ganze Hinterſeite der Schenkel weiß, und die Weibchen und Jungen haben eine von der der Männchen verſchiedne Farbe. Die Haare des Scheitels ſind nur wenig länger als die andern und dieſen gleichfarbig. Die Hörner der Weibchen haben eine ganz andere Form als die der Stiere, und die der letzteren ſind größer als die von B. frontalis, dünner, an der Wurzel minder dick, nicht abgeplattet und hier zugleich nicht ſo rauh. Der Schädel iſt durchgängig ſchmäler und mehr langgeſtreckt, zwiſchen den Augen ſtärker gewölbt, mit einer minder aufſteigenden Stirne und einem Hinterhaupte, das nicht oder wenig von der ſenkrechten Linie abweicht.

Von unſerem gewöhnlichen Rinde unterſcheiden S. Müller und Schlegel den Schädel des B. Banteng durch eine ſtärker gewölbte Stirne und minder abſchüſſiges Hinterhaupt bei letzterem. Vom Skelete bemerken ſie, daß es vollſtändig mit dem des gewöhnlichen Rindes übereinſtimmt, auch hinſichtlich der Anzahl der Rücken- und Schwanzwirbel[1]).

Aus dem Vorſtehenden erhellt es, daß allerdings der B. Banteng

1) Als einer eigenthümlichen Abweichung gedenken die Verfaſſer eines von ihren 5 Skeleten, welches, ſtatt 13 Rückenwirbel, 14 Rückenwirbel und eben ſo viele Rippenpaare aufzuweiſen hat.

als eine von B. frontalis verschiedene Art zu betrachten ist, während dagegen die Verschiedenheit vom zahmen Rinde nicht so klar hervorspringt. Bei Vergleichung des Banteng mit letzterem kann man ohnedieß die Verschiedenheiten in der Färbung des Pelzes und der Form der Hörner nicht in Anschlag bringen, weil diese beiden Merkmale bei Hausthieren dem mannigfaltigsten Wechsel unterliegen, während sie dagegen bei Rassen, die aus dem Hausstande verwildert sind und in einförmigeren Lebensverhältnissen sich befinden, meist eine auffallende Uebereinstimmung zeigen. Was die standhafteren Merkmale, nämlich die vom Knochengerüste hergenommenen, anbetrifft, so sind die so eben angeführten Unterschiede zwischen dem Schädel des Bantengs und unseres Rindes sehr geringfügig und werden es noch mehr, wenn man, wie ich es früher schon dargethan habe, den Schädel des Zebu mit dem des Bantengs in Vergleich bringt. Nimmt man hinzu, daß die frühzeitig eingefangenen Kälber des letzteren sich leicht und vollständig an den Hausstand gewöhnen, und daß der wilde Stier die zahme Kuh freiwillig, ohne alle weitere Vermittlung, belegt und zwar mit Erfolg, so tritt die Verwandtschaft des Bantengs mit unserem Hausrinde immer deutlicher hervor. Sollte nun gar nachgewiesen werden können, worauf bisher leider nicht geachtet worden ist, daß diese Bastarde im Stande wären, sich unter einander fortzupflanzen, so wäre der vollständige Beweis geliefert, daß B. Banteng und B. Taurus einer und derselben Stammart angehören.

Zu S. 509. Bos frontalis.

An der specifischen Unterscheidung zwischen B. frontalis und B. Gaurus, die nach meinen Vorlagen im Supplement zu Schrebers Werk a. a. O. vollständig gesichert schien, ist durch S. Müller und Schlegel (in den Verhandl. Zool. I. p. 199) wieder stark gerüttelt worden. Nach einer genauern Untersuchung der von Delessert aus Indien mitgebrachten Felle und Schädel sprechen nämlich sie die Ueberzeugung aus, daß sowohl diese als die durch Evans, Hodgson und H. Smith mitgetheilten Schilderungen des Gaur auf eine und dieselbe Art sich beziehen, welcher sie den Namen Bos frontalis belassen wollen. Die beste Abbildung des Thieres sey die von Fr. Cuvier (sein Bos sylhetanus) und die

beſte des Schädels die von Evans, obſchon alle noch viel zu wünſchen übrig ließen. Ich muß, in Ermangelung alles Materials zur eignen Prüfung, dieſe Behauptung auf ſich beruhen laſſen und ihre Entſcheidung denen überweiſen, welchen die nothwendigen Mittel hiezu vorliegen, nur hinſichtlich der Abbildung des Bos sylhetanus muß ich bemerken, daß nach der von Gray gegebenen Aufklärung die Originalzeichnung Hardwicke's, von der Duvaucel die durch Fr. Cuvier publicirte Copie abnahm, einen Baſtard des Zebus und Bos frontalis darſtellt, mithin nicht mehr den ausſchließlichen Typus des letzteren an ſich trägt [1]).

III. Familie.

Tylopoda. Schwielengänger.

VII. CAMELUS. Kameel.

Die letzte Arbeit, mit welcher Blainville ſeine Laufbahn beſchloß, iſt das 24ſte Heft ſeiner Ostéographie, welches die Einleitung zur Ordnung der Wiederkäuer und die Beſchreibung der Kameele und Lamas enthält. Er beſchränkte ſich hiebei nicht blos auf die Erörterung des Knochenbaues, ſondern gieng auch auf andere wichtige anatomiſche Eigenthümlichkeiten ein, in welcher Beziehung jedoch ſeine Arbeit, durch faſt gänzliche Vernachläſſigung der deutſchen Literatur, in mehreren Stücken ſehr lückenhaft und ſelbſt unrichtig ausgefallen iſt. Die Abbildungen, wie immer, meiſterhaft.

---

1) Horsfield, der die Unterſcheidung zwiſchen Bos frontalis und B. cavifrons gleichfalls feſthält, führt in ſeinem Catal. p. 181 noch eine dritte Art als Bibos Aseel Horsf. auf. Zur Vorlage diente ihm der Schädel, den Hardwicke von der Grenze zwiſchen Bengalen und Sylhet erhalten und unter dem Namen Bos Gayaeus oder Aseel Gayal im Zool. journ. III. p. 233. tab. 7. fig 1. beſchrieben und abgebildet hatte. Der Schädel war, wie Horsfield bemerklich macht, anfangs mit der Haut bekleidet und wurde allgemein dem Bos frontalis zugeſchrieben; nachdem jedoch die Decke entfernt wurde, zeigte es ſich, daß der Schädel näher dem des B. caviſrons als des B. frontalis verwandt iſt. Meines Bedünkens iſt dieß ein Umſtand, der eher für Vereinigung als Trennung dieſer 3 Arten ſpricht.

Ueber die „geographische Verbreitung von Kameel und Dattelpalme, in ihren Beziehungen zum primitiven Völkerleben des Nomadisirens wie der Festsiedlung“ findet sich ein interessanter Vortrag von Ritter in dem Monatsbericht der Berlin. Akadem. 1847 S. 8.[1]).

Beiträge zur Anatomie des zweibuckeligen Kameels, Camelus bactrianus, lieferten Franz Müller und C. Wedl (Sitzungsberichte der Wiener Akadem. 1850 S. 398).

VIII. AUCHENIA. Lama.

Bald nach der Ausgabe der IVten Abtheilung des Supplementbandes zu Schreber's Säugthieren hat J. v. Tschudi in seiner Fauna peruana die Beschreibung der Gattung Auchenia geliefert. Auf eigne mehrjährige Beobachtungen dieser Thiere in ihrer Heimath gestützt, hat er in der befriedigendsten Weise die Lücken und Irrthümer, welche seine Vorgänger in der Schilderung derselben gelassen, beseitigt, eine naturgetreue Darstellung ihrer gesammten Lebensverhältnisse geliefert und die Unterschiede der 4 Hauptformen unter den Lamas scharf und klar auseinandergesetzt, so daß über deren gegenseitige Abgrenzungen von nun an kein Zweifel mehr obwalten kann. Er nimmt 4 Arten an: das Lama (Auchenia Lama), das Huanaco (A. Huanaco), das Paco (A. Paco) und die Vicunna (A. Vicunia)[2]). Von diesen leben zwei (Huanaco und Vicunna) nur im wilden, zwei (Lama und Paco) nur im zahmen Zustande.

Tschudi betrachtet diese 4 Hauptformen als eben so viele Arten und beruft sich zur Unterstützung seiner Ansicht auf die Erfahrungen, die hinsichtlich ihrer Fortpflanzungsfähigkeit durch eigne und durch verbürgte Versuche Anderer gemacht wurden. Gemäß derselben begattet sich das Lama nie mit dem Paco, was schon durch die Verschiedenheit der Größe beinahe unmöglich werde, woraus zugleich hervorgeht, daß auch das Hua-

1) In den Proceed. of the Acad. of Philadelph. V. p. 82. machte Morton auf 2 Tafeln in Layard's Abbildungen der Ruinen von Niniveh aufmerksam, auf welchen bereits C. bactrianus und C. Dromedarius mit größter Genauigkeit dargestellt sind.

2) In ausgezeichnet schönen Abbildungen sind diese 4 Arten in der Knowsley Menagerie dargestellt.

naco mit dem Paco sich nicht vermischen könne. Ferner bespringt zwar das gezähmte Huanaco zur Brunstzeit das Lama, aber die Begattung bleibt immer erfolglos. Tschudi steht deshalb keinen Augenblick an, alle Angaben, welche von einer fruchtbaren Vermischung der Huanacos mit den Lamas, oder eines dieser Thiere mit dem Paco sprechen, als höchst zweifelhaft zu erklären, noch mehr aber die einer erfolgreichen Vermischung der Pacos, Lamas, oder Huanacos mit den Vicunnas.

Diesen Erfahrungen stehen nun aber andere entgegen, welche gleichfalls in neuerer Zeit erlangt wurden.

Es berichtet nämlich Lord Derby (Knowsley Menagerie p. 54), daß er in seinem Thiergarten ein Paar Huanacos besitze, ohne daß sie einen Versuch zur Begattung gemacht hätten. Nachdem er jedoch das Weibchen zu einem Lama-Männchen brachte, wurde es von letzterem belegt, und zwar mit Erfolg, so daß es ein Bastardjunges und im folgenden Jahre ein zweites zur Welt brachte.

Noch erheblicher für die Frage über die gegenseitige Fortpflanzungsfähigkeit der verschiednen Formen des Lamas sind die Mittheilungen von Js. Geoffroy in den Compt. rend. XXVIII p. 53, XXIX p. 513.

Js. Geoffroy behauptet nämlich die Fortpflanzungsfähigkeit der verschiedenen Lamas untereinander. Zu seinen Gunsten bezieht er sich erstlich auf das Zeugniß des Don F. d. Theran, Direktors eines zu Anfang dieses Jahrhunderts errichteten Acclimatisations-Gartens in Andalusien. Derselbe hatte eine Heerde Lamas aus Peru kommen lassen, und es hatten auf der Reise verschiedne Kreuzungen stattgefunden, woraus 3 Bastarde von Pacos und der Vicunna (Alpa-vigonhas, wie sie Theran nennt,) hervorgiengen. Nach der Aussage des Kapitäns, der diese Heerde nach Spanien zu bringen hatte, sollen die Alpa-vigonhas als fruchtbar erkannt worden seyn. — Gewichtiger als diese unbeglaubigte Aussage sind die nun folgenden Berichte von Castelnau und insbesondere von Weddell. Ersterer theilte nach den officiellen Angaben der peruanischen Regierung den Fall mit, daß ein Einwohner von Macucani von einem Paco-Männchen mit 4 Vicunna-Weibchen 23 Bastarde erlangt hätte. Weddell zog an Ort und Stelle genauere Erkundigungen ein und stattete davon Bericht ab. Es war ein Pfarrer Cabrero im gedachten Städtchen, der

durch Kreuzung des Pacos mit der Vicunna einen Mittelschlag zu erzielen hoffte, der von ersterer die Länge, von letzterer die Feinheit der Haare haben möchte. Allein mehrere Jahre hindurch waren alle Versuche vergeblich, bis endlich einer gelang und daraus nicht blos ein Bastard hervorgieng, sondern ein solcher, der zugleich fruchtbar war. Nun verschaffte sich Cabrero sehr junge Vicunna-Weibchen, welche er zugleich mit jungen Paco-Männchen aufwachsen ließ. Erwachsen ließ er sie dann sich untereinander verpaaren, was auch gelang, aber die Weibchen blieben alle unfruchtbar. Schon wollte er fast das Experiment aufgeben, als auf einmal eine Vicunna trächtig wurde, und der von ihr zur Welt gebrachte Bastard ist der Vater der Heerde von Paco-Vicunnas geworden, die nun Cabrero besitzt. Zur Zeit, wo Weddell diese Heerde besichtigte, zählte sie schon 43 Stück. Der Bastard befruchtete nach und nach alle Weibchen, wurde aber so wild, daß er castrirt werden mußte. Die Vicunnas hatten indessen einen neuen Bastard, der ihnen ähnlicher als dem Paco war, gesetzt, und die Weibchen, die aus dieser zweiten Kreuzung hervorgiengen, mochten sie nun von ihrem Vater oder von Pacos belegt werden, lieferten den Stamm von jener vorhin erwähnten Heerde. Der Bastard vom Paco und der Vicunna gleicht in seiner allgemeinen Form mehr dem gewöhnlichen Lama als einem der Aeltern, aber die Ohren sind gerade wie beim Paco. Durch seine Haare unterscheidet er sich von allen andern Arten: sie sind etwas kürzer als die des Paco, aber unendlich feiner und kerniger; ihr einziger Fehler ist, daß sie etwas mit Stichelhaaren vermengt sind, ein Fehler, der von der Vicunna herrührt.

Hier haben wir also Erfahrungen positiver Art, die den negativen von Tschudi geradezu widersprechen und im Falle sie begründet sind, letzteren ihren Werth für Feststellung der Arten in der Gattung Auchenia benehmen.

Was den von Lord Derby angeführten Fall anbelangt, wornach ein Lama-Männchen zweimal mit einem Huanaco-Weibchen fruchtbar sich vermischte, so ist derselbe als authentisch verbürgt zu betrachten. Er ist dieß um so mehr, als denn doch schon von vorn herein anzunehmen war, daß zwei Thiere, die mindestens in so naher Verwandtschaft zu einander stehen, wie ungefähr Pferd und Esel, auch unter günstigen Verhältnissen

gleich diesen Bastarde erzeugen können. Die in der Knowsley Menagerie erlangten Erfolge haben demnach nichts Unerwartetes und können auch zur Entscheidung der Frage, ob Huanaco und Lama Rassen einer und derselben Art oder zwei verschiedne Arten ausmachen, nichts beitragen.

Belangreicher ist aber der von Weddell vorgelegte Bericht. Demselben gemäß ist es endlich nach großen Schwierigkeiten gelungen, von Pacos und Vicunnas Bastarde zu erlangen. Dieß Faktum ist unanstreitbar, denn Weddell, ein scharfsinniger Beobachter, hat die Bastarde selbst gesehen und an ihnen Eigenschaften gefunden, die weder ausschließlich dem Paco, noch der Vicunna zukommen. Gleicher Verläßigkeit entbehrt aber der zweite Theil des Berichtes. Derselbe beruht nämlich blos auf der Aussage des Pfarrers, daß die Bastarde nicht blos mit dem älterlichen Stamme, sondern auch untereinander sich fortgepflanzt hätten. Hiebei hat aber ein Hauptpunkt in dem Berichte seine gehörige Würdigung nicht gefunden. Es ist nämlich nicht nachgewiesen, daß nachdem einmal Bastarde beider Geschlechter erlangt wurden, von nun an jeder Verkehr der Paco-Männchen mit den Bastarden zur Unmöglichkeit gemacht worden war, so daß diese nur in reiner Inzucht sich fortpflanzen konnten. Dieß ist aber der Hauptpunkt, von dessen Constatirung die ganze Entscheidung der Frage abhängt. Besitzen nämlich die erwähnten Bastarde das Vermögen, sich lediglich untereinander, mit absolutem Ausschlusse der älterlichen Stämme, in unbeschränkter Weise fortzupflanzen, so gehören Paco und Vicunna zu einer Art zusammen; ist dieß nicht der Fall, verdanken sie ihre Existenz für die Zukunft nur der fortwährenden Einwirkung der älterlichen Stämme, so stellen sie blos eine Maulthierbildung vor, wie sie bei Pferden und Eseln gewöhnlich ist, und alsdann sind Pacos und Vicunnas mit gleicher Nothwendigkeit wie die letztgenannten für zwei verschiedne selbstständige Arten zu erklären.

Aus dem Vorstehenden ergiebt es sich, daß die Beweisgründe zur Entscheidung der Frage, wie viel Arten in der Gattung Auchenia einen rechtsgültigen Titel aufzeigen können, noch nicht so vollständig beigebracht sind, um einen definitiven Bescheid herbeizuführen. Mir erscheint es, wenn ich eine Muthmassung wagen darf, wahrscheinlich, daß solche dahin ausfallen wird, daß nur zwei Arten anzunehmen seyn möchten, wovon die eine aus dem Huanaco als der wilden und dem Lama als der zahmen

Raſſe, die andere aus der Vicunna als der wilden und dem Paco als der zahmen Raſſe beſtehen würde.

Es iſt ſehr zu wünſchen, daß die großen Menagerien mehr als es bisher geſchehen iſt, ſich die Aufgabe ſtellen möchten, die Grenzen der Fortpflanzungsfähigkeit der Baſtarde durch genau überwachte Verſuche zu ermitteln. Sie können damit eine Frage löſen, deren ſichere Beantwortung für die ganze Naturgeſchichte von der allerwichtigſten Bedeutung iſt.

V. Ordnung.

Einhufer. SOLIDUNGULA.

Die anatomiſchen Verhältniſſe der Einhufer bearbeitete Rymer Jones in Todd's Cyclopedia of Anatomy. Part 36.

E. Rouſſeau[1]) lieferte eine ſehr genaue und von vielen Abbildungen begleitete Schilderung der ſogenannten Kaſtanien und eigenthümlichen Epidermis-Schilder der Einhufer, worin er, mit Beſeitigung der vielerlei irrigen Angaben, den richtigen Sachverhalt beim Pferd und Eſel, ſo wie bei ihren Baſtarden auseinander ſetzte, nebenbei auch noch Bezug auf Equus Hemionus (?) und E. Burchelli nahm.

Intereſſante anatomiſch-phyſiologiſche Bemerkungen über die Zehe des Pferdes wurden von Tſcherning[2]) mitgetheilt.

Der Umſtand, daß das Pferd ſich nicht erbrechen kann, wurde von Flourens[3]) neuerdings in Erörterung genommen und, wie es ſchon frühere Hippologen und Anatomen angegeben hatten, von ihm der Grund ebenfalls in der Beſchaffenheit der obern Magenöffnung gefunden, indem dieſe einen Sphincter hat und zugleich ihre Richtung ſchief iſt.

Zu S. 273 des IV. Supplementbandes: Equus Asinus und Hemionus.

Trotz all dem, was bereits Wiegmann und ich zu wiederholten Malen geäußert haben, daß die in neuerer Zeit aus der indiſchen Provinz

---

1) Rev. zool. 1852. p. 497.

2) Iſis 1845. S. 454.

3) Ann. des sc. nat. X. p. 145. tab. 10.

Cutch nach Paris und London lebend gebrachten Individuen nicht mit dem Dschiggetai zusammen gehören, sondern Wildesel, Kulan's (Asinus Onager) sind, bleiben die pariser und londner Therologen fortwährend dabei, selbige für Repräsentanten des E. Hemionus auszugeben. So hat vor Kurzem Lord Derby in der Knowsley Menagerie 2 schöne Abbildungen des Kulans beiderlei Geschlechtes nach dem Leben anfertigen lassen, die ganz charakteristisch die Merkmale dieser Art an sich tragen, aber die Unterschrift ist gleichfalls mit dem falschen Namen Hemionus versehen.

Wenn man es dem Lord Derby als Dilettanten nachsehen muß, daß er sich in der Bestimmung dieser Thiere irre leiten ließ, so hätte man dagegen von Gray erwarten dürfen, daß ihm die von mir und Wiegmann gegebenen Berichtigungen zur Kenntniß gekommen wären. Allein dieß ist so wenig der Fall, daß Gray[1]) sogar die Confusion vermehrte, indem er neben dem Kulan (Asinus vulgaris var. ? Onager) und dem Asinus Hemionus noch eine neue Art Asinus Kiang aufstellte; mit welcher Berechtigung wird sich gleich zeigen. Nach seinen Angaben kommen A. Hemionus und A. Kiang in der Färbung vollkommen miteinander überein und unterscheiden sich nur in der Lage des Unteraugenhöhlen-Loches. Bei dem Hemionus liegt nämlich dieses Loch hoch oben, ohngefähr auf $\frac{1}{3}$ des Raumes zwischen der Gesichtslinie und dem Rande der Zähne, zugleich weit rückwärts, gerade über dem Hinterrand des dritten Backenzahnes. Beim A. Kiang dagegen liegt dieses Loch tiefer, nämlich fast in der Mitte zwischen der Gesichtslinie und der Basis der Zähne, und überdieß findet es sich in gleicher Linie mit dem Hinterrande des zweiten Backenzahns. Von letzterem Merkmale meint indeß Gray selbst, daß es an einer größern Anzahl von Schädeln constatirt werden müßte, was allerdings sehr räthlich seyn dürfte.

Abgesehen hievon, so ist aber dieser Hemionus von Cutch nichts wei-

---

1) Knowsley Menagerie p. 71; ann. of nat. hist. sec. ser. V. p. 140. Das Material zur Vergleichung bestand in drei Schädeln, die Hodgson unter dem Namen Equus Kiang eingeschickt hatte, und aus einem Schädel des „Equus Hemionus von Cutch" aus der Knowsley Menagerie.

ulan oder A. Onager, eben weil in Cutch nicht der Dschig-
der Kulan zu Hause ist, wie dieß die nach Paris und Lon-
lebenden Individuen sattsam erwiesen haben. Dagegen ist
von Tibet der ächte A. Hemionus, was schon Walker[1])
auptete, was aber von letzterem nicht berücksichtigt wurde.
erhielt nämlich aus den Hochebenen Tibets ein Männchen
das zum Theil noch mit seinem Winterpelz bedeckt war,
on demselben eine kurze Beschreibung mit einer Abbildung.
dieses Thieres ist, mit Ausnahme des großen Kopfes, mehr
des als Esels. Die Nase ist gebogen, die Ohren sind von
zwischen denen des Pferdes und Esels das Mittel hal-
am Grunde mehr genähert als bei diesem. Die Mähne ist
am Schwanzende findet sich eine dicke Quaste, die jedoch
Ende beschränkt ist, sondern sich zur Hälfte gegen die Schwanz-
afzieht. Die Farbe ist oben isabell mit einem braunen oder
unten und an der Nase gelblichweiß; der ganze Rumpf mit
chen Anfluge. Mähne, Rückenbinde und Schwanzquaste sind
die Iris grau. Die Schulterhöhe beträgt 3′ 10″. —
ält Waller diesen Kiang für identisch mit Equus Hemio-
nd macht gleich mir darauf aufmerksam, daß die unter diesem
Paris und London gebrachten Exemplare es nicht sind, son-
ldesel, Gurkhur, angehören. Ganz richtig bezeichnet Wal-
ferenzen zwischen beiden: 1) daß der Kiang wie ein Pferd
Wildesel von Sind wie ein Esel yant; 2) daß beim Kiang,
er jung, sich keine Zebrastreifen finden, während solche Quer-
Wildesel sich an der Schulter, zumal bei den Füllen, zeigen
al auch das Schulterkreuz vorkommt; 3) daß der Kiang den
en an der
uerst den
mit dem

Demnach ist Gray's Equus Kiang der ächte E. Hemionus Pall., dagegen sein E. Hemionus der Asinus Onager Pall.

Noch mit einem dritten Namen ist der E. Hemionus Pall. versehen worden, nämlich durch Hodgson [1]), der ihn als Equus (Asinus) polyodon vorführte. Er hatte nämlich an einem Kiangs-Schädel einen vordern überschüssigen Lückenzahn gefunden, und da es ihm nicht bekannt war, daß dieser auch bei dem Pferde, jedoch gewöhnlich nur als eine bald vorübergehende Erscheinung, sich einstellt, so hielt er sich für berechtigt, darnach eine eigne Species E. polyodon aufzustellen. Indeß schon Walker machte darauf aufmerksam, daß dieser überschüssige Zahn (der Wolfszahn der deutschen Hippologen) kein constanter Bestandtheil des Gebisses ist, indem er ihn bei dem im Museum der Asiatic Society in Calcutta aufbewahrten Schädel des Kiangs nicht vorfand, während dagegen zwei Pferdeschädel ihn aufzuweisen hatten. Auch Blyth [2]) wies nach, daß das Merkmal, worauf Hodgson seinen E. polyodon begründen wollte, keine Gültigkeit habe, was dann auch von Gray [3]) geschah, der diese Art nach dem, von ihrem Begründer ihm überschickten Material wieder einzog und sie dem E. Kiang einverleibte [4]).

Neuere Beobachtungen über das Vorkommen von Wildeseln in den Nilländern sind von Lepsius in seinen Briefen aus Aegypten S. 154 mitgetheilt worden. „Als wir," sagt er, „(auf der Reise nach Chortum) aus den Bergen heraustraten, begegneten mir große Heerden von wilden Eseln. Sie sind grau oder grauröthlich, am Bauche weiß, und alle ha-

---

1) Ebenda XVI. 1. p. 469. tab. 6.

2) Ebenda p. 354.

3) In der Knowsley Menag. p. 72. In den schon angeführten Ann. V. p. 141 macht überdieß Gray bemerklich, daß 2 von den 3 eingeschickten Schädeln des Kiang den vordern überzähligen Lückenzahn aufzuweisen hätten, doch habe er denselben auch an den Schädeln von Pferdearten im brittischen Museum beobachtet. Als einer Abnormität gedenkt er, daß bei Equus Burchellii dieser Zahn an die Innenseite des ersten ächten Backenzahnes gestellt ist.

4) Horsfield, welcher in seinem Catal. p. 190 den Equus Kiang ebenfalls anführt, bleibt zweifelhaft, ob er ihn als besondere Art oder dem Hemionus angehörig ansehen soll.

[illegible] m Rücken einen scharf gezeichneten schwarzen Streifen; auch [illegible] spitze ist gewöhnlich schwarz. Es werden viele gefangen, so [illegible] sind, können aber auch dann nicht zum Reiten oder Tra- [illegible] werden. Erst die folgende Generation läßt sich dazu benu- [illegible] le zahmen Esel hier im Süden von der Eselkatarakte (Schel- [illegible] Berber an stammen von diesen wilden ab und haben die- [illegible] nd Zeichnung."

[illegible] e Erwähnung verdienen die vortrefflichen Abbildungen, welche [illegible] in der Knowsley Menagerie von Bastarden ver- [illegible] Pferdearten publiciren ließ.

[illegible] b. 57. fig. 1. Bastard vom männlichen Hemionus (d. h. [illegible] Onager) und einer Zebra-Stute.

[illegible] 7. fig. 2. Bastard von einem malteser Eselhengste und einem [illegible]

[illegible] 8. fig. 1. Bastard von einem männlichen? Equus Burchellii [illegible] elin.

[illegible] 8. fig. 2. Bastard von einem gewöhnlichen Eselshengste und [illegible] onus (d. h. Kulan).

[illegible] 9. fig. 1. Bastard von einem Hemionus (d. h. Kulan) und [illegible] Burchellii.

[illegible] fig. 2. Bastard eines Maulthiers (Erzeugniß eines Esels- [illegible] eines Zebra) mit einer rothbraunen (bay) Pony-Stute. [illegible] ard ist als Doppelbastard der merkwürdigste unter allen. [illegible] ist eisengrau, mit einer kurzen schmalen Kreuzbinde über die [illegible] hwachen Anzeigen von Seitenstreifen und deutlicheren schwar- [illegible] an der Außenseite der Hand- und Fußwurzel; der Kopf ist [illegible] Mähne braun und grau, der Schwanz gleich einem Pferde- [illegible] 8 [illegible] te.

[illegible] bei (G. [illegible] der Ge- [illegible] wenn nicht [illegible]

[illegible] zwischen [illegible] Maulthier-

zucht im größten Umfange betrieben wird, hat in neuerer Zeit J. v. Tſchudi [1]) zu beſtätigen Gelegenheit gehabt. Caſtelnau [2]) erwähnt eines Falles von fruchtbarer Fortpflanzung eines Maulthieres, mit der Verſicherung, daß er auf ſeinen Reiſen in Südamerika die Thatſache ſelbſt beobachtet habe. Noch wichtiger iſt ein anderer ähnlicher Fall, von dem Dr. de Manzio [3]) berichtete.

---

1) Faun. peruan. I. S. 254. Es ſind in Peru nur einige wenige Fälle einer fruchtbaren Begattung von Pferdehengſt mit Maulthierſtute bekannt. Der Biſchof von Ayacucho beſaß im Jahre 1839 einen Baſtard von einer ſolchen Miſchung.

2) Instit. 1846. p. 206. Ein Maulthier, aus der Vermiſchung eines Eſels mit einer Stute entſproſſen, erzeugte in ſeinem ſiebenten Lebensjahre zum Erſtenmal mit einem Eſel ein Maulthier, das in Allem den andern Thieren dieſes Namens ähnlich war; es zante nicht, indeß variirt ohnedieß bei dieſen Thieren die Stimme ſehr, indem ſie bei den einen faſt wie die des Eſels klingt, während die andern das Wiehern des Pferdes haben. Im neunten Jahre hatte eine zweite Befruchtung ſtatt von einem Pferde: dießmal war der Sprößling eine veritable Stute, aber ſehr elend und kleiner Geſtalt.

3) Intorno al concipimento ed alla figliatura di una mula; angezeigt von Rudolph Wagner in den Nachrichten von der G. A. Univerſ. und der K. Geſellſch. der Wiſſenſch. zu Göttingen 1848 N. 13. S. 169. Die Thatſache, welche Manzio berichtete, beſteht darin, daß in der Gemeinde Anzana, Provinz Capitanota, am 15. Juli 1844 eine Maulthierſtute, die von einem Pferdehengſt beſprungen worden war, ein männliches Fohlen warf. Zugleich fügte der Berichterſtatter die aus der Unterſuchung der Genitalien eines andern weiblichen Maulthiers erhaltenen Reſultate bei, welche darin beſtehen, daß ſowohl das primitive Ei mit Keimbläschen und Keimfleck, als auch Eileiter und Uterus mit Flimmer-Epithelium, ganz wie bei Pferde- und Eſelſtuten, verſehen ſind. R. Wagner ſchloß an dieſe Angaben ſehr wichtige eigene Betrachtungen über die Beſchränkung der Fortpflanzungsfähigkeit der Baſtarde an, wovon ich einen kurzen Auszug in meinem Jahresbericht über 1849 (Archiv für Naturgeſch. 1850. 2. S. 4) mitgetheilt habe. — Die bedeutſame Frage von der Fortpflanzungsfähigkeit der Baſtarde haben Duvernoy (Dict. univ. d'hist. nat. X. p. 545), Morton (Sillim. Americ. Journ. 1847. p. 39, 203) und ich (Münchn. gel. Anz. XXV. S. 361) beſprochen.

VI. Ordnung.

Dickhäuter. PACHYDERMATA.

[illegible] ich zuvörderst die neue Anordnung, welche Owen [1]) mit [illegible] überhaupt vornahm, zu besprechen. Er hebt nämlich die [illegible]eilung ganz auf, und bringt die sämmtlichen Hufthiere in [illegible]ilungen: in paarzehige, Ungulata artiodactyla, und un[illegible]ngulata perissodactyla. Von letzteren sondert er dann [illegible]sondere Abtheilung die U. proboscidea ab. Demnach er[illegible]olgendes Schema, aus dem ich jedoch, als nicht hieher ge[illegible]estorbenen urweltlichen Gattungen weggelassen habe.

[illegible]rtiodactyla.	*Perissodactyla.*
[illegible]oschus.	Tapirus.
[illegible]ntilope.	Equus.
[illegible]gocerus.	Hyrax.
[illegible]s.	Rhinoceros.
[illegible]rvus.	
[illegible]melopardalis.	
[illegible]amelus.	
[illegible]chenia.	
[illegible]ppopotamus.	*Pr[illegible]idea.*
[illegible]	[illegible]

[illegible] Quaterly

Zur Rechtfertigung dieser Anordnung bezieht sich Owen auf die nachfolgenden Erörterungen.

Bei allen Paarzehern, die ein oder zwei Paar Zehen haben, — sie mögen übrigens wiederkäuend seyn oder nicht — findet sich mit dieser Eigenschaft eine besondere Bildung des Sprungbeins in Verbindung. Die zur Einlenkung mit dem Kahn- und Würfelbeine dienende Gelenkfläche desselben ist nämlich tief ausgehöhlt, und durch einen vorspringenden Kiel in zwei Abtheilungen geschieden, Bei den Unpaarzehern dagegen, die ein oder 3 auftretende Zehen haben, ist diese Gelenkfläche abgeplattet und bietet für das Würfelbein nur eine schmale Gelenfläche dar. Cuvier[1]) war es, der zuerst auf diese Differenz aufmerksam machte, und darnach schon die Wiederkäuer und paarzehigen Dickhäuter von den unpaarzehigen Dickhäutern unterschied.

Ein anderer Unterschied zwischen den Hufthieren mit paarigen Zehen und denen mit unpaarigen besteht darin, daß jene einen mehr oder minder abgetheilten Magen und einen einfachen, mäßig großen Blinddarm haben, während diese, die Unpaarzeher, einen einfachen Magen und einen enormen oder complicirten Blinddarm besitzen.

Alle Unpaarzeher haben ferner am Oberschenkelknochen einen dritten Umdreher (Trochanter) aufzuweisen, der sämmtlichen Paarzehern abgeht. Letztere haben durchgängig eine gleiche Anzahl von Rücken- und Lendenwirbeln, nämlich 19; jene haben weit mehr, indem diese Wirbel bei ihnen zwischen 22 (Nashorn) und 29 (Klippschliefer) wechseln. Noch ist anzuführen, daß bei den paarzehigen Hufthieren die Backenzähne, insbesondere die obern, einen gewissen symmetrischen Bau zeigen, mit Hügeln in regelmäßigen Paaren, während bei den unpaarzehigen die Backenzähne minder regelmäßig, gewöhnlich von schiefen Falten durchzogen sind.

Die Rüsselträger kommen zwar mit den unpaarzehigen Hufern darin überein, daß ihre Zehen in ungerader Zahl (fünf) vorhanden sind, daß sie einen verhältnißmäßig einfachen Magen und einen enormen Blinddarm haben, aber ihr eigenthümlicher Rüssel und so manche andere wichtige

1) Rech. sur. les. ossem. foss. 4°. III. p. 72.

[illegible]chnen sie so aus, daß eben dadurch Owen sich veranlaßt [illegible] Rang einer besonderen Gruppe unter den Hufthieren an=

[illegible]hes Recht unter den Hufern will jedoch Owen den Wie= [illegible] angedeihen lassen, indem er nachzuweisen sucht, daß sie [illegible] darböten, durch welche sie sich scharf von den andern Huf= [illegible]n ließen. Der bei einem Känguruh, — welches auch einen [illegible]m, wenn gleich von dem der Wiederkäuer verschieden con= [illegible]n hat, — beobachtete Akt des Wiederkäuens vermindere, [illegible]eint, die Bedeutsamkeit des ruminirenden Magens für Er= [illegible] besonderen Ordnung. Ein Gleiches sey der Fall durch die [illegible]k obern Schneidezähne und Eckzähne im Fötalzustande von [illegible] welche Zähne ohnedieß bleibend bei den Kameelen vorkom= [illegible] Trennung des Metacarpus und Metatarsus entweder nur [illegible]hender Zustand im Foetus und bei Jungen aller Wieder= [illegible]als bleibendes Merkmal für das ganze Leben bei Moschus [illegible]d einer fossilen Antilopen=Art hebe auch dieses Merkmal zur [illegible]. Endlich werde die Lücke zwischen den Wiederkäuern und [illegible]ufthieren immer mehr durch Entdeckung einer ganzen Reihe [illegible]venen urweltlichen Gattungen ausgefüllt.

[illegible]ig ich gegen die Mehrzahl dieser Argumente etwas einzuwen= [illegible] kann ich doch dem zuerst von Owen angeführten nicht bei= [illegible]e schon dieser ausgezeichnete Zootom selbst bemerklich gemacht [illegible]n doch zwischen der Zusammensetzung des Magens der Kän= [illegible]r der Wiederkäuer ein wesentlicher Unterschied, und was das [illegible]n einigen dieser Thiere beobachtete Wiederkäuen betrifft, so [illegible] durchaus nur krankhafter Art gewesen zu seyn. Zudem [illegible]urnhs keine Hufthiere und können demnach nicht dazu dienen, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Der

[illegible] im Zahn= [illegible]ntograph.

Art des Wiederkäuens und die Art der Zusammensetzung des Magens sind so ganz auffallende und eigenthümliche Merkmale, durch welche die Ruminanten von allen andern Hufern sich isoliren, daß ich auf selbige einen ungleich größeren Werth lege als auf diejenigen Charaktere, durch welche sich die Wiederkäuer an die übrigen paarzehigen Ungulaten anschließen. Ich habe deshalb den Ruminanten ihren Rang als einer selbstständigen Ordnung belassen; dagegen habe ich nichts Ernstliches einzuwenden, wenn man, wie es schon Cuvier gethan, die Einhufer mit den Dickhäutern vereinigen will.

Die Ordnung der Dickhäuter habe ich demnach in gleichem Umfange wie früher beibehalten; theile sie aber nunmehr nach den von Owen für die Hufer überhaupt aufgestellten Gruppen, in 3 Familien ab: Pachydermata artiodactyla, perrissodactyla und proboscidea [1]), in deren Charakteristik ich jedoch die Beschaffenheit des Magens, als zu variabel, nicht mit aufgenommen habe [2]).

Als wichtige anatomische Arbeiten allgemeineren Belanges sind hier noch C. Mayer's [3]) „Beiträge zur Anatomie des Elephanten und der

1) Nach einem, von dem unserigen sehr verschiedenen Princip hat Christol (compt. rend. XXIX. p. 363) die Dickhäuter in Abtheilungen zu bringen versucht. Er unterscheidet nämlich in seinen 4 Familien: Rüsselträger, eigentliche Pachydermen, Einhufer und Amphibien-Pachydermen, immer je 2 Gruppen: Pachydermen mit Backenzähnen ohne Cement (Acementodonten), und Pachydermen mit Backenzähnen mit Cement (Cementodonten). Dagegen ist jedoch zu bemerken, das das Vorkommen des Cements ein sehr untergeordnetes Merkmal ist und sogar bei solchen Gattungen (z. B. Phacochoerus) vorkommt, die Christol unter seine Acemendotonten stellt.

2) Owen giebt für seine Pachydermata perissodactyla den Magen als einfach, dagegen für seine P. artiodactyla als etwas abgetheilt oder zusammengesetzt an, offenbar um in solcher Weise die Wiederkäuer leichter mit letzteren verbinden, und von ersteren schärfer sondern zu können. Allein diese Merkmale sind nicht standhaft, denn während der Magen unsers Schweines kaum abgetheilt, und der des Warzenschweins fast ganz einfach ist, ist dagegen der des Babirussa in 2 Säcke gesondert. In gleicher Weise hat unter den Unpaarzehern, deren Magen als einfach bezeichnet ist, der Hyrax einen in 2 Abtheilungen geschiedenen Magen.

3) Nov. act. acad. nat. cur. XXII. 1 p. 1 mit 9 Tafeln. Außer dem Elephanten sind auch noch der Tapir, Babirussa, die beiden Nabelschweine und das gemeine Schwein auf ihren innern Bau untersucht worden.

[illegible]bermen“ in Erwähnung zu bringen. Das Knochengerüste [illegible]ngen, der lebenden wie der ausgestorbenen, ist von Blain[illegible]ldert und durch vortreffliche Abbildungen erläutert worden; [illegible] hat Owen[2]) mit größter Genauigkeit erörtert.

I. Familie.

P. artiodactyla. Paarzehige Dickhäuter.

[illegible]dactyli digitis 4; dentes trium ordinum, canini maximi; [illegible]cum simplex mediocre.

[illegible]n diese Familie in 2 Gruppen theilen: 1) Obesa Ill. und [illegible]ll.

I. HIPPOPOTAMUS. Flußpferd.

[illegible]e Beschaffenheit der Eingeweide, der Frucht und des Gehirns [illegible]rs[3]) sehr werthvolle Untersuchungen mit, von denen wir [illegible]ges in der Kürze berühren wollen. Der Magen besteht [illegible]3, innen aus 4 Abtheilungen. Der Darmkanal war bei [illegible]enen Thiere von 11′ 7″ engl. Länge 138′ lang, ohne Spur [illegible]arms. Die Masse des Gehirns beträgt bei einem alten Thiere [illegible]als die eines mäßigen Kalbes, im Gewicht nur etwa ein [illegible]menschlichen, während das Gehirn des Elephanten wenigstens [illegible]e größer und schwerer als das menschliche ist. Die Win[illegible]der Anordnung und Zahl nach am meisten Aehnlichkeit mit [illegible]chweine; dagegen nähern sie sich dadurch mehr den Wieder[illegible]n Dickhäutern an, daß wie bei ersteren an der untern Fläche [illegible]em langgestreckter wurmförmiger Lappen aus der Tiefe her[illegible]s kleine Gehirn steht hinsichtlich der Gestalt und Entwicklung [illegible] und der

[illegible]richten der

Wiederkäuer. Die Annäherung des Flußpferdes an die Wiederkäuer wird also auch durch die Beschaffenheit des Magens und Gehirnes angedeutet und zwar mehr als es bei den Schweinen der Fall ist.

Zur frühern einzigen Art Hippopotamus amphibius ist nun eine neuentdeckte, wohl begründete zweite Species hinzugekommen; aber auch die altbekannte hat man neuerdings wieder versucht in zwei Arten zu zerfällen, doch freilich noch nicht mit ausreichenden Beweisgründen.

1. H. amphibius Linn., das große Flußpferd; maximus, fronte profunde excavata.

Hippopotamus amphibius. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 293. — Peters Reise nach Mossamb. Säugth. S. 180.

var. α) H. capensis Desmoul.

Hippopotamus australis. Duvern. Institut. 1846 p. 333. (im Auszug im Archiv für Naturgesch. 1846. 2. S. 26); compt. rend. XXXVIII. p. 681, XXXIX. p. 276; im Archiv 1849 2. S. 30). — H. capensis. Leidy journ. of the Acad. of Philadelph. II. (1852) p. 208.

var. β) H. senegalensis Desmoul.

Hippopotamus typus. Duvern. Instit. l. c.; compt. rend. l. c. — H. amphibius. Leidy l. c.

Desmoulins hatte zuerst versucht, die südlichen Flußpferde von den nördlichen specifisch zu trennen, ohne jedoch damit Anerkennung zu finden. Mit besseren Hülfsmitteln versehen unternahm es dann Duvernoy, festere Differenzen zwischen beiden nachzuweisen. Zur Vergleichung hatte er ein Skelet vom Kap, zwei Skelete vom Senegal und einen Schädel aus Schoa, wornach er das senegambische und abyssinische Flußpferd als gleichartig erachtete, das kapische aber für eine verschiedene Species erklärte. Letzterer legte er den Namen H. australis, jener den als H. typus bei. Da jedoch weder Is. Geoffroy noch Blainville den von Duvernoy hervorgehobenen Differenzen die Berechtigung zur Begründung einer zweiten Art zuerkannten, so benützte letzterer den Umstand, daß sich ihm sein Material durch Uebersendung eines Schädels von Port Natal vermehrt hatte, zur nochmaligen Revision seiner früheren Vergleichungen. Das Resultat blieb das frühere, und als Hauptdifferenzen zwischen dem senegambischen und abyssinischen Flußpferd einerseits und dem südafrikanischen

[illegible] eichnet Duvernoy nunmehr folgende. 1) Beim südafrikani- [illegible] o sind die mittlern untern Schneidezähne größer und mit [illegible] en die seitlichen aus, während sie beim senegalschen und abys- [illegible] nd sind. 2) Bei jenem, wenigstens bei den Männchen, ha- [illegible] mittlern und vordern Schneidezähne eine winkelige Form [illegible] breiten Furchen. 3) Bei den abyssinischen und senegal'schen [illegible] er größere Durchmesser der Nasenöffnung der horizontale, [illegible] chen und kapschen der senkrechte. 4) Bei letzteren hat der [illegible] Schnautze, von oben gesehen, eine gedrängtere Form. 5) [illegible] n Schädel hat der Oberkiefer in Bezug auf die Zwischen- [illegible] menbeine eine größere Länge. 6) Bei letzterem liegt die [illegible] chbeins mit dem Fortsatz des Schläfenbeins näher an letzte- [illegible] Anzahl der Rückenwirbel und Rippenpaare beträgt beim [illegible] t nur 15 und bei den beiden senegalschen Skeleten 16, wäh- [illegible] n Typen 4 Lendenwirbel vorkommen.

[illegible] idy gelangte nach Vergleichung von 4 Schädeln: 2 vom [illegible] ter von Gambia und ein vierter von Guinea?, zur Ansicht, [illegible] ien Arten angehörten. Ohne auf die von Duvernoy aufge- [illegible] enzen — weder bestätigend noch verneinend — einzugehen, [illegible] uffallendsten Unterschied in der Anordnung des Schmelzes [illegible] zähne finden. Seiner Angabe zufolge zeigt bei H. capen- [illegible] jung in beiden Geschlechtern, die Außenseite der hintern [illegible] bern Eckzahns einen von Schmelz unbedeckten, bei Alten [illegible] iten Raum; oder die Schmelzumhüllung des Zahnes be- [illegible] i ungleichen Binden: eine den äußern Halb-Umfang be- [illegible] ndere, ohngefähr ½ Zoll breit, an der Innenseite der hintern [illegible] ch. Bei dem senegambischen Flußpferd bildet der Schmelz [illegible] ahme des [illegible]

[illegible] en besitzt, [illegible] haftigkeit [illegible] einmal, [illegible] ren, und [illegible] Geof-

froy möchte ich aber zur Vorsicht in allzuschneller Zulassung besonderer Arten mahnen, indem es oft vorkommt, daß bei Vergleichung von Gegenständen aus weit von einander entfernten Lokalitäten beträchtliche Verschiedenheiten sich darbieten, die indeß sich vermindern und in allmählige Abstufungen sich auflösen, sobald man nur Gelegenheit erhält, die extremen Glieder der Reihe mit zwischenliegenden zu vergleichen. Ein lehrreiches Beispiel dieser Kategorie gewähren die vortrefflichen Untersuchungen, welche v. Middendorff an einer übergroßen Reihe von Schädeln des Ursus arctos aus dem ganzen weiten Gebiete des russischen Reiches anstellte. Mich bedünkt es, daß bei gleichgroßen Hülfsmitteln für das Flußpferd das gleiche Resultat der Arteinheit sich herausstellen dürfte.

Ueber ein vor vier Jahren in den Thiergarten der zoologischen Gesellschaft in London versetztes lebendes Flußpferd erfuhren wir von Owen, daß es ein noch sehr junges Thier war, das erst 7 Fuß Länge hatte. Es wurde an den Ufern des Nils, ohngefähr 350 engl. Meilen oberhalb Cairo, gefangen und zeigte eine große Anhänglichkeit an seinen Führer, dem es wie ein Hund nachfolgte.

2. H. liberiensis Mort., das kleine Flußpferd; praecedente fere duplo minor, fronte subconvexa.

Hippopotamus liberiensis. Morton Journ. of the Acad. of Philadelph. I. p. 232. — H. minor. Morton proceed. of the Acad. of Philadelph. 1844 p. 185; ann. of nat. hist. XIV. p. 75. — Diprotodon liberiensis. Duvern. compt. rend. XXXVIII. p. 681, XXXIX. p. 276. — Choerodes liberiensis. Leidy proceed. of Philadelph. VI. p. 52. — Choeropsis liberiensis. Leidy, journ. Acad. nat. sc. Philadelph. II. (1852) p. 213, tab. 21. (Schädel).

Wenn die Trennung des Hippopotamus amphibius in 2 Species auf sehr zweifelhaften Gründen beruht, so tritt uns dagegen im H. liberiensis ein Flußpferd entgegen, das eine solche Menge auffallender Differenzen schon in seinem Schädelbaue darbietet, daß gar kein Zweifel über seine specifische Verschiedenheit von jenem aufkommen kann.

Morton war es, der im Jahre 1844 zuerst auf diese Art aufmerksam machte, nach zwei Schädeln, die er von Flußpferden aus dem St. Paulsfluße bei Monrovia in Westafrika erhalten hatte. Als unterscheidende Merkmale bezeichnete er erstlich die viel geringere Größe der neuen Art;

[illegible]ädel, obwohl von einem ganz alten Thiere herrührend, an [illegible] Suturen völlig obsolet und die Zähne stark abgenützt sind, [illegible] eine Länge (vom Vorderrande der Kiefer bis zur Auskerbung [illegible] den Gelenkköpfen des Hinterhaupttheins) von 12,3". Dazu [illegible] die einförmige Wölbung des Schädeldaches sowohl von einer [illegible] zur andern, als zwischen dem Hinterhaupt und den Nasenbei[illegible] bei der gewöhnlichen Art die Augenhöhlen auffallend nach [illegible] vorragen und der Zwischenraum zwischen ihnen ausgehöhlt ist. [illegible] bei der neuen Art die Augenhöhlen in die Mitte zwischen [illegible] und Schnauze gestellt, während sie bei der großen Art ohn[illegible] tel vom ersteren entfernt sind. Endlich hat die kleine Art nur [illegible] ne im Unterkiefer, die Lückenzähne sind den Eckzähnen ge[illegible] Basis der Jochbeine liegt in gleicher Fläche mit dem Ober[illegible] Diese Angaben von Morton waren für mich ausreichend, daß [illegible] meinem Jahresberichte über 1844 im Archiv für Naturge[illegible] dahin aussprach, daß aus ihnen allerdings auf das Vorkom[illegible] Arten von Flußpferden geschlossen werden dürfe.

[illegible] ständigste Begründung der neuen Art ist vor Kurzem durch [illegible] t, dem nicht blos die beiden schon von Morton benützten Schä[illegible] gung standen, sondern überdieß noch ein ganzes Skelet von [illegible] lenen Thiere, das gleich den vorigen den St. Paulsfluß be[illegible] bestätigte nicht blos die von Morton angegebenen Differen[illegible] fügte ihnen noch so viele andere bei, daß wir hier, um nicht [illegible] g zu werden, nicht alle aufführen, sondern nur die wichtig[illegible] en können. Zwei Abbildungen des Schädels dienen zur [illegible] ung der Differenzen zwischen beiden Arten.

[illegible] dtigsten der von Leidy aufgezählten Differenzen sind folgende. [illegible] riensis ist die [illegible] des Schädels convex, indem sie von [illegible] gegen den [illegible] selbe Linie [illegible] sich dann [illegible] en Rand [illegible] gegen das [illegible] in einer

geraden Linie und eben so die Divergenz, welche von jener Oeffnung gegen den Eckzahn stattfindet; bei der großen Art ist die hintere Linie mehr unregelmäßig oder wellenförmig und die vordere länger und gekrümmter. 3) Bei H. liberiensis ist der Gesichtstheil kurz, indem die Augenhöhlen gleich hinter der Mitte des Schädels liegen; bei H. amphibius liegen diese erst in der Mitte des zweiten Drittels. 4) Bei letzterer Art springen die Augenhöhlen nach oben außerordentlich hervor; bei der kleinern nicht und verhalten sich in dieser Beziehung wie beim Schweine. 5) Die Stirne ist bei H. liberiensis der Quere nach schwach convex, bei H. amphibius durch die gewaltige Hervorragung der Augenhöhlen tief ausgehöhlt. 6) Bei der kleinen Art verlängern sich die Stirnbeine jederseits in einen langen spitzen Fortsatz, der mit den Oberkieferbeinen zusammenstößt und dadurch das Thränenbein vollständig von einer Verbindung mit den Nasenbeinen ausschließt. Bei der großen Art dagegen stoßen Stirn- und Oberkieferbeine nicht aneinander, sondern das Thränenbein schiebt sich zwischen beide ein und legt sich mit einem breiten Rande an die Nasenbeine an. 7) Bei H. liberiensis sind die Nasenbeine kürzer, erweitern sich allmählig nach hinten und spitzen sich dann plötzlich in einer convexen Linie zu. Bei H. amphibius erweitern sich die Nasenbeine plötzlich hinter den Thränenbeinen und schließen sich in einen breiten Bogen von schwacher Convexität an die Stirnbeine an.

Für das bleibende Gebiß von H. liberiensis giebt Leidy folgende Formel an:

Schneidezähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Eckzähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$, im Ganzen also 38 Zähne.

Das Gebiß ist im Wesentlichen nach dem Typus der großen Art gebildet, bietet indeß doch auch einige leichte Differenzen dar.

Leidy fügt die Bemerkung bei, daß er an 2 Schädeln, außer den 2 Paaren oberer Schneidezähne, vor den seitlichen noch eine Höhle von $\frac{1}{2}$ Zoll wahrgenommen habe, die einen rudimentären Schneidezahn von gleicher Form und Größe einschloß [1]). Da nun auch Blainville an einem

1) Die hiesige Sammlung besitzt den Schädel eines ganz jungen Nilpferdes. Im

Schädel des H. amphibius ein drittes Paar von rudimentä-
ähnen im Unterkiefer auffand, so dürfen wir allerdings mit
nen, daß die Milch-Schneidezähne ursprünglich zu ⅓:⅓ an-

gen Skelete findet Leidy, nach Vergleichung mit den Abbil-
lainville, nichts Abweichendes von der großen Art. Es sind
Wirbel und 15 Rippenpaare vorhanden. Lendenwirbel zählt
uzwirbel 5.

äußern Beschaffenheit des kleinen Flußpferdes weiß man noch
Dem von Leidy beschriebenen Skelete war zwar auch das
n, es befand sich aber in einem so üblen Zustande, daß es
en unbrauchbar war. Nur so viel giebt Leidy an, daß das
und haarlos war, die Ohren 20‴ lang, innen behaart;
3½″ lang, zusammengedrückt und mit 1 – 2″ langen Bor-
Von den zahlreichen Ausmessungen, die Leidy vom Knochen-
erwachsenen Thieres mittheilte, entlehnen wir nachstehende.

Ausmessungen des Schädels.

n Gelenkköpfen zum Schneidezahnrande[1]) . . .	12″	6‴
orderen Augenhöhlenrandes vom Schneidezahnrande	6	9
zwischen den Jochbögen	7	9
der Stirne zwischen den Orbitalfortsätzen . . .	5	3
senbeine	5	9
n in der Mitte	1	6

---

dferbeine ragen nur 2 Milchschneidezähne hervor, und dicht hinter jedem
Grube seinen noch ganz rudimentären Ersatzzahn. Einwärts von dem in-
zeigt sich noch eine längliche Grube, aber wie es scheint leer; dieselbe
ch nun, ob
enthalten
nichts wahr-

wegs von
griffen ist,

Ausmessungen des übrigen Skelets.

Länge der Wirbelsäule nach der Krümmung . . .	4′	6″
— der Vorderglieder vom Kopf des Oberarmbeins an bis zum Ende der zweiten Zehe .	1	11½
Länge der Hinterglieder	2	4
Höhe des Skelets in der Mitte	2	7
Länge des Oberarmknochens	0	10
— des Ellenbogenbeins	0	9½
— des Oberschenkelknochens	0	11
— des Schienbeins	0	8½
— von der Ferse zum Ende der dritten Zehe .	0	10½

Das kleine Flußpferd ist bisher nur in Liberia aufgefunden worden, wo es alle großen Flüße bewohnt und besonders häufig auf den Inseln gegenüber und oberhalb Berley gesehen wird.

II. SUS. Schwein.

Nachdem jetzt der Text zu den von S. Müller und Schlegel schon früher abgebildeten Wildschweinen des indischen Archipels erschienen ist, kann ich meine frühern, in Bezug auf diese Arten mangelhaften Beschreibungen vervollständigen.

α) **auriculis majoribus dense pilosis, vellere setis copiosis vestito.**

1. **S. Scrofa** Linn., das gemeine Schwein.

Sus Scrofa. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 296.

Europa, der Nordhälfte Asiens und Nordafrika angehörig; in den südlicheren Ländern der alten Welt durch andere Arten vertreten.

2. **S. leucomystax** Temm., das japanische Schwein; **praecedente minor, nigro-fuscus; gastraeo striaque malari albidis.**

Sus leucomystax. Temm. faun. japon. I. tab. 20. — Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 206. Anmerk.

Mittlerweile hat zwar Temminck eine Abbildung des japanischen Wildschweines publicirt, die Beschreibung aber ist noch immer rückständig, daher auch die Absonderung von der erstern Art vor der Hand nur eine provisorische Berechtigung haben kann.

3. **S. larvatus** Fr. Cuv., das Maskenschwein; **niger, capite dor-**

[illegible] flavescentibus, fronte dorsoque nigro-intermixtis; auriculis [illegible], margine penicilloque longissimo nigris; protuberantia genuum [illegible] magna.

[illegible]tus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 296. tab. CCCXXVII. A.

[illegible]e Sammlung hat nunmehr ein altes Thier von 4′ 2″ [illegible] dazu gehörigen Schädel erhalten. Letzterer ist ramassirter [illegible] Wildschweins; die halbbogenförmigen Linien, welche vom [illegible]elfortsatz abgehen, stehen mehr als doppelt so weit als bei [illegible]nander ab, die Nasenbeine sind breiter und nicht gewölbt, [illegible]attet; die Jochbögen sind weit stärker auswärts gekrümmt. [illegible]ümliches ist es bei dieser Art, daß die vordern Lückenzähne [illegible] spurlos verschwinden. An unserem Exemplare ist bereits [illegible] auch hinter dem Eckzahne stehende Lückenzahn im Ober- wie [illegible] ausgefallen; ebenso der zweite im Unterkiefer, und von al[illegible] eine Spur einer Alveole mehr sichtlich. Im höheren Alter [illegible] auch der zweite obere Lückenzahn. — Bewohnt das östliche [illegible] Madagaskar; von seinem Vorkommen in Mossambique konnte [illegible] keine Versicherung erhalten.

[illegible] pictus Gray, das schwarzköpfige Maskenschwein; clare [illegible], capite auriculisque nigris; barba malari, stria supra et infra [illegible]larum margine jubaque dorsali pure albis; protuberantia [illegible].

[illegible]potamus pictus. Gray ann. of nat hist. sec. ser. X. (1852)

[illegible]nig rothbraun; Gesicht, Stirne, Ohren und einige große Flecke [illegible]n schwarz; Ohrenrand, Backenbart, ein Streif ober und unter [illegible] und ein fortlaufender, ziemlich kammartiger Streif längs der [illegible]ckens rein weiß. Ein Männchen. Diese Art unterscheidet [illegible] Färbung, [illegible]ilen weiß [illegible]amarun- [illegible]rten hat [illegible]one Art [illegible]ümmel- [illegible]larvatus

schloß. — Was Gray's Gattung Choeropotamus anbelangt, so ist diese ganz zu beseitigen, erstlich weil dieser Name von Cuvier schon längst an ausgestorbene Thiere vergeben ist, und dann, weil Schädel- und Zahnbau des Sus larvatus ganz den Typus von Sus Scrofa an sich trägt.

β) auriculis minoribus nudiusculis, vellere setis rariusculis vestito.

5. S. cristatus Wagn., das indische Schwein.

Sus cristatus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 297. — Sus indicus. Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 261. — Sus Scrofa. Elliot Madras journ. X. (1839) p. 216.

Ueber die indischen Schweine finden wir bei Cantor nachstehende Angaben. „Die Unterschiede zwischen dem indischen und deutschen Wildschweine sind von W. Elliot auseinander gesetzt worden. Die Farbe der Erwachsenen ist bräunlichschwarz, spärlich mit schwarzen Haaren besetzt, von denen einige die jugendliche gelbliche, unterendständige Binde beibehalten. Außer der schwarzen zurückliegenden Mähne auf dem Hinterhaupt und Rücken, dem Backenbarte und Borsten über und unter dem Auge findet sich ein Büschel langer schwarzer Borsten an der Gurgel. Die Haare der letzteren und der Brust sind zurückgelegt. Der Schwanz ist spärlich mit kurzen Haaren besetzt, an der Spitze zusammengedrückt mit langen seitlichen Borsten, die gleich denen des Elephanten wie die Fiedern eines Pfeils gestellt sind. Das Junge ist besser behaart; die Mehrzahl der Haare ist falb, einige an der Wurzel und Spitze schwarz, was, je nachdem sie mehr oder weniger mit schwarzen Haaren vermengt sind, an den Leibesseiten tief falbe Streifen hervorbringt. Die Haare der Gurgel, Brust, des Unterleibs und der Ellbogen (an beiden letztern Stellen sehr lang) sind in der untern Hälfte schwarz, in der obern weiß. Wildschweine sind außerordentlich häufig auf der Halbinsel und den meisten malayischen Inseln. Der größte gemessene Eber hatte von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel eine Länge von 5′, der Schwanz 1 Fuß". — Als nähere Bezeichnung der Heimath des indischen Schweins giebt Cantor an: malayische Halbinsel, Pinang, Singapore, Laucay-Inseln, Nepal, Bengalen, südliche Mahratta-Gegenden.

Ob alle die hier angeführten Lokalitäten ein und dieselbe Art beherbergen, ist zwar nicht verbürgt, aber doch wahrscheinlich, jedenfalls ist indeß

tus mit darunter begriffen, auf den überhaupt die vorge-
g ganz zu passen scheint. Mit Sus vittatus ist er je-
ller und Schlegel meinen, keineswegs identisch, schon
il die bei letzterem gewöhnlich vorkommende weiße Binde
ilen des S. cristatus ganz fehlt, der dafür durch einen
ei Phacochoerus ausgezeichnet ist.

tus Müll., das krausbärtige Schwein.

s. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 298. — S. Müll. Schleg.
. 173, 179. tab. 30 (Thier), tab. 31. fig. 4, 5. (Schädel).

orneo. Zu meiner frühern Beschreibung habe ich nur
daß der Schädel viel weniger kräftig als bei den an-
indischen Archipels, sehr langgestreckt und schmal ist [1]).

cosus Boie, das warzige Schwein; flavido aut nigro-fuscus,
du.; verruca magna mandibulari setis longis supra albidis
tera minore infra oculos tertiaque supra dentes caninos.

cosus. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 299. — S. Müll.
zool. I. p. 175. tab. 28 (Thier), tab. 32. fig. 1—4. (Schädel).

S. barbatus die größte Art des indischen Archipels.
ngewöhnlich stark und lang. Die Suborbitalfurche besteht
ander liegenden halbmondförmigen Einschnitten, über und
ein gerader sich findet, während bei S. vittatus diese
zigen Einschnitt bildet, der in einen Sack ausläuft. Der
Seiten mit 3 warzigen Auswüchsen besetzt, die bei Jun-
i Alten stark entwickelt sind: die größte von diesen War-
Winkel des Unterkiefers und ist ganz durch einen Büschel
erbergen, eine zweite, die bisweilen an 2″ lang wird,
Auge und die dritte, welche die kleinste, oberhalb
er als

Asiat.
einige
zuletzt
sey.

bei den andern indiſchen Arten und bilden auf dem Hinterkopf und Nacken einen etwas längern Kamm als bei S. vittatus. Die Farbe iſt wie bei dieſer Art nach den Individuen verſchieden, indem ſie aus dem Braunen ins Schwarz- und Gelblichbraune übergeht. Ein weißer Streif an den Kopfſeiten fehlt gewöhnlich ganz, oder iſt doch nur ſo ſchwach angedeutet, daß er nicht ins Auge fällt. Bruſt, Bauch und der Vordertheil der obern Hälfte der Gliedmaſſen ſind gelblichweiß; dieſelbe Färbung, nur lebhafter und heller, zeigt der obere Theil des Haarbüſchels, welcher die Warze des Unterkiefers bedeckt. Der Vorderkopf iſt gewöhnlich ſchwärzlich und der Kamm des Hinterhauptes bräunlichgelb. Die Jungen ſind nicht geſtreift.

Körper	1m, 34	Höhe	0m, 75
Kopf	0 43	Schwanz . . .	0 29

Der Schädel iſt mehr geſtreckt als bei S. vittatus, bei den Alten viel länger, die Jochbeine ſtärker und mehr auswärts gerichtet. Nach den verſchiedenen Altersſtufen ändert der Schädel in ſeinen Formen ungemein ab.

Bewohnt ausſchließlich Java und wird von den Eingebornen mit dem Namen Babi bezeichnet.

8. S. celebensis S. Müll., das celebiſche Schwein; praecedenti simillimus, at minor, totus fusco-niger, fasciculo pilorum albornm mandibulari excepto.

Sus celebensis. S. Müll. Schleg. verhandel. I. p. 172, 177. tab. 28bis.

Sehr ähnlich dem S. verrucosus, aber durch geringere Größe und andere Färbung verſchieden. Die warzigen Auswüchſe des Kopfes ſind minder entwickelt und der unter dem Auge ſcheint ganz zu fehlen. Das ganze Thier iſt oben wie unten einförmig braunſchwarz: die einzig lichte Farbe findet ſich am gelblichweißen Obertheil des Büſchels, welcher den warzigen Auswuchs des Unterkiefers bedeckt. Der Schädel iſt ebenfalls ähnlich dem von S. verrucosus, nur minder langſtreckig. An einem alten Männchen betrug die Länge des Körpers 0m, 95, die des Schwanzes 0, 15, die Höhe 0, 56.

Lediglich von Celebes bekannt.

[illegible]tus Boie, das weißbindige Schwein; totus flavido-aut [illegible] albida, a rostro ad mandibulae angulum decurrente ple[illegible] verrucis capitis nullis.

[illegible]us. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 300. — S. Müll. Schleg. [illegible] p. 172, 173. tab. 29 (Thier), tab. 32. fig. 5, 6 (Schädel).

[illegible]arung ist an den meisten Theilen so spärlich, daß die nackte [illegible] durchschaut. Auf dem Rücken sind die Haare etwas länger und [illegible] bilden auf dem Nacken und Hinterhaupt einen kurzen Kamm. [illegible] ohngefähr ⅓ der Länge des Rumpfes ein. Die Ohren [illegible]n mit längeren gelblichen, außen mit kürzeren braunen [illegible]rlich versehen. Der Schwanz ist sehr spärlich behaart, [illegible] Ende stehn sie gedrängter und umgeben die etwas platt[illegible] fast strahlenförmig. Die Färbung ist nach den Indivi[illegible]ieden. Einige sind ganz schwärzlich, andere braun, oder [illegible] rothbräunlich; nicht selten sieht man bei einem und dem[illegible]re Haare von diesen verschiednen Farben unregelmäßig un[illegible]engt. Die Mähne, der Unterrand des Unterkiefers und [illegible] Füße sind schwarz. An den Seiten des Kopfes sieht [illegible] eine breite weiße Binde verlaufen, welche bisweilen ins [illegible] Bräunliche fällt, so daß sie alsdann mehr oder weniger [illegible] oder ganz verschwindet, wie Letzteres bei dem Exemplare [illegible]ammlung der Fall ist. Wo diese Binde, wie es der ge[illegible] ist, deutlich und hellfarbig erscheint, beginnt sie auf dem [illegible] und läuft schief gegen den Winkel des Unterkiefers herab [illegible]sweilen noch etwas auf der Seite des Halses fort. Die [illegible]aulichbraun, Nase und Lippen schmutzig fleischfarbig. Die [illegible]äunlichgelb und auf dem Oberleib röthlich schwarzbraun [illegible] Körper hat eine Länge von 1m. 31 der Schwanz 0, [illegible] wie bei [illegible], findet [illegible] Indi[illegible], trifft [illegible]

10. S. timoriensis S. Müll. Schleg., das timorſche Schwein; S. vittato similimus, at minor, pilis, inprimis jubae, longioribus.

Sus timoriensis. S. Müll. Schleg. verhandel. zool. I. p. 173, 178. tab. 31. fig. 1. (Thier), fig. 2, 3. (Schädel).

S. Müller iſt es nicht gelungen, ſich ganz alte Exemplare zu verſchaffen, daher ſeine Beſchreibung nur auf jungen, noch nicht vollſtändig erwachſenen beruht, von denen das größte eine Körperlänge von 0m, 82 Länge hatte. Dieſe Art ſteht in demſelben Verhältniß zu S. vittatus wie S. celebensis zu S. verrucosus, und unterſcheidet ſich von dem weißbindigen Schweine durch folgende Merkmale. An Größe ſteht ſie hinter letzterem zurück. Alle Haare ſind länger und ſtehen gedrängter; die Borſten des Scheitels und Hinterhauptes bilden einen langen rückwärts gerichteten Kamm, die der Schwanzſpitze eine ziemlich große, jedoch nicht ſehr dichte Quaſte. Der weiße Kopfſtreif iſt minder deutlich, zumal auf der Oberſeite. Von Ferne ſieht das Thier einförmig dunkelbraun aus; in der Nähe wird man gewahr, daß einige Haare gelbbraun ſind, andere ſchwarz mit gelbbraunen Spitzen, und noch andere ganz ſchwarz. Der Untertheil der Beine iſt etwas lichter, die Iris gelblichbraun und die Naſe rußig ſchwarz. Die ganz jungen Thiere ſind wie bei S. vittatus geſtreift. Der Schädel ſtimmt mit dem des letzteren überein.

Auf Timor und Rotti gefunden.

γ) sedis incertae.

* Porcula salviana, das Zwergſchwein.

Hodgson journ. of the Asiat. soc. XVI. 1. p. 423, 593. tab. 12. (Thier), tab. 13 (Schädel); XVII. 2. p. 489. tab. 27. (Kopf, Fuß und Magen). — Horsf. catal. Mus. East-India Comp. p. 194.

Trotz weitläufiger Beſchreibungen und mehreren Abbildungen weiß ich nicht recht, was aus dem Thiere zu machen iſt, das Hodgſon als neue Gattung und Art unter dem Namen Porcula salviana bekannt machte und das die Waldungen von Sikim und Nepal bewohnt. Seine erſte Beſchreibung beruhte auf einem jungen Thiere, das er jedoch für ausreichend erwachſen ſah, um ſeine fixen Merkmale darzubieten. Darnach gab er folgende Gattungskennzeichen: „Schneidezähne $\frac{6}{6}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{7}{7} = 40$. Eckzähne klein, gerade, ſcharfſchneidig, aber nicht, wie

r die Lippen vorragend; an allen Füßen 4 kleine ungleiwanz sehr kurz, aber deutlich." — Das Thier kommt, t, in Form und Größe ganz mit einem, ungefähr einen ischling unsers Wildschweins überein, unterscheidet sich aber lefer, ganz nackte Ohren und kürzeren Schwanz. Die der Innenseite der Beine ist fast nackt; die Oberseite damit Borsten besetzt, die jedoch keine Mähne bilden. Die varzbraun, mit schmutzig Ambra oder Rostroth überlaufen. 9", der Schwanz mißt 7"; Gewicht 7 Pfund.

auf erhielt Hodgson ein zweites Individuum, „ein schönchen," wie er es nennt. An diesem überzeugte er sich, iedenheit von Sus nicht so groß sey als er es früher ge- An diesem Exemplare fanden sich 44 Zähne wie bei Sus; nen wird gesagt, daß sie kleiner und gerader als bei letzwären. Die Länge dieses Thiers betrug 2', der Schwanz t 10 Pfund.

elangte Hodgson ein anderes „altes Männchen," von dem und Magen abbildete. Dieses war abermals größer, nämder Pelz reichlich, gewöhnlich, keine Mähne, ein stark marnbüschel (mystaceal tuft). Vom Gebiß desselben wird och zeigt die Abbildung die Eckzähne nicht blos vorragend, twas mehr gekrümmt als bei den vorhergehenden. Dagehr Hodgson ein Merkmal aufgefunden, wodurch sich seine nicht blos von allen andern Schweinen, sondern auch von Säugthieren unterscheiden würde: er hat nämlich bei ihr irbel gezählt. Da er wohl weiß, daß dieß gegen die Regel sich mit der Erklärung, daß das Bestehen auf der Zahl swirbel eine ganz unberechtigte Anmassung der Anatomen

uf dieser

eu, daß

2 Halsso an:

Wie nun

en Be-

ſchreibung nicht entnehmen. Eine neue Art ſcheint jedenfalls dahinter zu ſtecken, wie einige Angaben, insbeſondere die geringe Größe, andeuten, aber es würde verlorne Zeit ſeyn, irgend eine Meinung motiviren zu wollen, ſo lange nicht eine den wiſſenſchaftlichen Anforderungen beſſer entſprechende Beſchreibung als die bisherige vorliegt. Horsfield, der ein von Hodgſon eingeſendetes Exemplar vor ſich hatte, begnügte ſich leider damit, einige der vom Entdecker gemachten Angaben einfach zu wiederholen.

III. PORCUS. Hirſcheber.

1. P. Babyrussa Linn.

Porcus Babyrussa. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 201.

Vrolik[1]) hat vom Babiruſſa ſehr ausführlich die Anatomie nach 2 männlichen Exemplaren bearbeitet, woraus wir Einiges hier hervorheben wollen. Rückenwirbel ſind 13 vorhanden, Lendenwirbel 6. Das Kreuzbein beſteht beim Schwein, Babiruſſa und Nabelſchwein aus 4, 5 oder 6 Wirbeln; die Zahl der Schwanzwirbel iſt bei dieſen drei Thieren ſehr veränderlich, ſcheint aber nicht 24 zu überſteigen. Das Gehirn unterſcheidet ſich in keinem weſentlichen Stücke von dem des Schweins. Eigenthümlich ſind ein Paar Luftſäcke, die weder beim Schwein, noch beim Nabelſchwein vorkommen. Sie finden ſich in der obern Parthie des Halſes hinter dem Pharynx und da ſie an einander gewachſen ſind, ſo öffnen ſie ſich im Iſthmus des Schlundes mit 2 Oeffnungen, die von der Mundhöhle durch eine Verlängerung des Gaumenſegels geſchieden ſind. Nach hinten endigen dieſe Säcke blind. Am obern Theil des Pharynx fand ſich bei dem einen Exemplare noch eine zweite Erweiterung, die jedoch wohl nur als pathologiſche Abweichung angeſehen werden darf, da ſie dem andern Individuum fehlte. Im Herzen zeigt ſich an der Scheidewand, an der Baſis der halbmondförmigen Klappen, eine Verknöcherung. Die linke Lunge wird nur von einem einzigen Lappen, die rechte von zweien gebil-

1) Nieuwe Verhandel. der ersten Klasse van het K. Nederl. Instituut van Wetensch. Amsterd. X. (1844) p. 207 mit 5 ausgezeichnet schönen Tafeln.

[illegible] der untere noch einen accessorischen Lappen besitzt. Der [illegible] 2 Säcke getheilt, wovon der eine mit dem Pförtner, der [illegible] Cardia in Verbindung ist; letzterer hat einen besonderen [illegible] sich von links nach rechts wendet, indem er sich umschlägt. [illegible] ist die Magenbildung einfacher, bei den beiden Nabelschwei- [illegible] mmengesetzter. Der Blinddarm ist nicht sehr groß, aber sehr [illegible] t keine Samenblasen, aber wohl eine Vorsteherdrüse, die [illegible] en gebildet und aus einer großen Menge kleiner Läppchen [illegible] ist.

IV. PHACOCHOERUS. Warzenschwein.

[illegible] t dem innern Baue dieser Gattung sind wir nunmehr bes- [illegible] werden durch die genauen Untersuchungen, welche Owen[1]) [illegible] ibchen von Phacochoerus Pallasii vornahm. Am Pharynx [illegible] en, wie beim Babirussa, zwei Luftsäcke und etwas tiefer ein [illegible] en ist der Magen nicht zusammengesetzt wie bei letzterem, son- [illegible] ch einfacher als bei unserm Schweine, indem der Cardial- [illegible] ch eine schwächere Einschnürung markirt ist. Der Blinddarm [illegible] esem klein. Es sind nur 2 Paar Zitzen vorhanden: das [illegible] che ohngefähr 1″ hinter dem Nabel, und das andere in den [illegible] s Hauptmerkmal zur generischen Absonderung der Warzen- [illegible] den übrigen Gattungen der Schweine findet Owen in der [illegible] des Zahnbaues; den Modifikationen des Verdauungsappa- [illegible] nicht dieselbe Bedeutung bei.

[illegible] wicklung und Homologien der Backenzähne der Warzenschweine [illegible]) schon früher zum Gegenstande einer ausführlichen Ab- [illegible] acht, wobei ihr [illegible] Aeliani das Hauptma- [illegible] gebiß des [illegible] habe ich

[illegible]

schon im Supplementbande eine ausführliche Beschreibung des Milch- und bleibenden Gebisses geliefert.

1. Ph. Aeliani Rüpp., das vollzähnige Warzenschwein.

Phacochoerus Aeliani. Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 305. tab. CCCXXVI. A. — Owen l. c. — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 179. — Ph. africanus. Peters Mossamb. Säugth. S. 181.

Ueber das Warzenschwein von Mossambique berichtete Peters, daß es im Aeußern und durch das Vorkommen von Schneidezähnen mit dem als Ph. Aeliani, harroja und africanus beschriebenen übereinstimmt. Von 2 Schädeln, die er mitbrachte, hat der eine $\frac{2}{3}$ Schneidezähne und $\frac{4}{4}:\frac{4}{4}$ Backenzähne; der andere hat die gleiche Anzahl von Backenzähnen, doch ist der vorletzte, oben wie unten, schon sehr verkleinert und fast herausgedrängt, ferner sind oben 2, unten 4 ganze Schneidezähne nebst dem Rudimente des äußern linken Schneidezahns vorfindlich, während der entsprechende rechte ausgefallen ist. Als Abweichung seiner beiden Schädel von dem im Rüppell'schen Atlas abgebildeten und beschriebenen Exemplare findet Peters, daß bei jenen zwischen dem Hinterhaupt und Nasenbeinen nicht eine Vertiefung, sondern eine Convexität liegt, wie an dem Schädel eines zahnlosen Ph. aethiopicus des Berliner Museums[1]). Er wünscht daher eine genauere Vergleichung des Warzenschweins vom südlichen mit dem vom nördlichen Theile Ostafrikas, um so mehr, da auch die aus der Wahlberg'schen Sammlung von Port Natal herrührenden Exemplare durch Sundevall als Ph. Aeliani bestimmt wurden.

Merkwürdig ist es, daß dieser Ph. Aeliani jetzt auch in Guinea nachgewiesen ist; die Beschreibung, welche Temminck von ihm lieferte, paßt ganz auf die aus Kordofan und Abyssinien herrührenden Exemplare.

---

1) Bei dem hiesigen, aus Rüppell's Sammlungen herrührenden Exemplare des *Ph.* Aeliani ist leider der Schädel nicht herausgenommen worden, daher ich über dessen Beschaffenheit nichts sagen kann. Dagegen habe ich dieß bei zwei Fellen des Ph. aethiopicus thun lassen und, wie ich schon im Supplementbande IV. S. 305 erwähnte, gefunden, daß am ganz jungen Schädel mit dem Milchgebiße der Zwischenraum zwischen den Augenhöhlen convex, am Schädel eines älteren Thieres dagegen concav ist; Letzteres wird hauptsächlich von der ansehnlichen Hervorragung der Augenhöhlen veranlaßt.

Tapir.

[illegible] thiopicus Pall., das zahnlückige Warzenschwein.
[illegible] oerus aethiopicus. — Wagn. Schreb. Supplem. IV. S. 304.
[illegible] of nat. hist. XI. p. 246.

[illegible] Mossambique, noch in Guinea bisher aufgefunden, daher [illegible] die Südspitze Afrikas beschränkt.

V. DICOTYLES. Nabelschwein.

[illegible] schudi[2]) hat die beiden Arten von Nabelschweinen, Dico[illegible]us und albirostris, in der Waldregion nach der ganzen Län[illegible] von Peru gefunden, doch kommen sie in Höhen, die 2800 [illegible]m, nicht mehr vor.

II. Familie.

P. perissodactyla. Unpaarzehige Dickhäuter.

[illegible] posteriores impares tridactyli, dentes canini nulli aut parvi, [illegible] ecum maximum aut complicatum.

[illegible] ren hieher nur die drei Gattungen: Tapirus, Hyrax und [illegible], die allerdings voneinander so scharf abgesondert sind, daß [illegible] so viel Repräsentanten ganz verschiedner Familien erscheinen. [illegible] aber die ausgestorbenen Gattungen, die uns aus ihren fossi[illegible]n bekannt geworden sind, mit den lebenden in Verbindung, [illegible] ir zahlreiche Mittelformen, durch welche die jetzt sehr isolirt [illegible] stehenden lebenden Gattungen in genauere Verwandtschaft [illegible] reten.

VI. TAPIRUS. Tapir.

[illegible] roskopische Struktur der Zähne des amerikanischen und indi[illegible]

[illegible] der Ta[illegible]

[illegible] nte zwar

ſelbſt nicht ein Exemplar erlangen, aber die Ausſagen der Eingebornen brachten ihm ſein Vorkommen zur Gewißheit. Letzterer lebt auf einer Höhe von 7 — 8000', aber nur in der Cejarregion, alſo am öſtlichen Abhange der Binnencordilleren, während der Tapirus suillus blos die heiße Waldregion bewohnt und in Höhen über 3000' nicht mehr getroffen wird.

Ueber die äußere und innere Beſchaffenheit eines jungen Tapirus bicolor (T. malayanus) gab Cantor [1]) intereſſante Mittheilungen.

VII. HYRAX. Klippſchlieſer.

Die Gattung der Klippſchlieſer [2]) hat Temminck mit einer neuen Art, die Pel in Guinea entdeckte, vermehrt; es iſt zwar noch eine zweite von Fraſer aufgeſtellt worden, aber in ſo oberflächlicher Weiſe, daß man ihre Verſchiedenheit von der neuen Temminck'ſchen Art nicht zu bemeſſen vermag, und ſie daher vor der Hand nur notirt, aber nicht unter den ſicher geſtellten Arten eingereiht werden kann.

H. sylvestris Temm., der Ewia; supra e nigro rufoque mixtus, subtus brunneus; macula dorsali dilatata alba, pilis basi nigris; rostro, circulo oculari auriculisque intus nudis.

Hyrax sylvestris. Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 182.

Dieſe Art iſt zwar zunächſt mit H. arboreus verwandt, aber doch durch ſtandhafte Merkmale verſchieden. Dieß giebt ſchon gleich das Gebiß zu erkennen, in welchem jederſeits nur 6 Backenzähne vorhanden ſind, während ſich bei H. arboreus und den andern Arten 7 finden. Dieſe Verſchiedenheit zeigt bereits das Milchgebiß, indem daſſelbe bei H. sylvestris blos 3, bei H. arboreus 4 Backenzähne zählt. Bei H. sylve-

---

1) Journ. of the Asiat. soc. XV. p. 263.

2) Ueber das in neuerer Zeit in Ruf gekommene und mit dem Namen Hyraceum bezeichnete Heilmittel, welches von den Exkrementen des Hyrax capensis herrühren ſoll, iſt zu vergleichen L. Fikentſcher's Inaugural-Abhandlung: das Hyraceum in hiſtoriſcher, chemiſcher, pharmaceutiſcher und therapeutiſcher Beziehung. Erlangen 1851. — Die Wundernetze des Hyrax syriacus beſchrieb Hyrtl in den Wien. Sitzungsbericht. VIII. S. 462.

[illegible] Füße robuster, die Zehen länger und dicker, die äußere Zehe [illegible]ße, welche bei H. arboreus rudimentär ist, ist hier deutlich. [illegible] H. sylvestris die Schnautze, das Kinn, die Gegend um die [illegible]e Innenseite der Ohren nackt, während bei H. arboreus [illegible]ehaart sind. Endlich bildet der lange weiße Büschel, wel[illegible]üsenfleck auf dem Rücken bedeckt, bei H. arboreus eine [illegible], dagegen bei H. sylvestris eine breite und zugleich sind [illegible]e bei jenem einfarbig, zweifarbig.

[illegible] ist rauh, lang, mit wenig Unterwolle. Die Haare sind [illegible]hwärzlichbraun, dann schwarz und dunkel rostroth geringelt. [illegible]e der Ohren ist reichlich mit Haaren von derselben Farbe [illegible] langen Haare des großen, in der Lendengegend stehenden [illegible]n der Wurzel schwarz, an der Spitze rein weiß. Einzelne [illegible]e Borsten finden sich auf den Lippen und über den Augen. [illegible] schwärzlichbraun; das Uebrige der Unterseite des Körpers [illegible]. Einige lange schwarze Borsten stehn zerstreut hie und da [illegible] gefärbten Pelze. — Die Jungen haben dieselbe Färbung, [illegible]unkel, mit graulichem Anfluge und der Rückenfleck ist klei[illegible]arzen Haaren umgeben, die auch das ganze Rückgrath und [illegible] bedecken.

[illegible] . . .	15″	0‴	Vorderfuß bis zur Spitze des		
[illegible] . . .	4	6	größten Nagels	1″	10‴
[illegible] Nase .	1	7	Hinterfuß	2	5

[illegible]l ist diese Art sehr häufig von der guineischen Küste an bis [illegible]ti-Land, wo man sie allenthalben in den Waldungen an[illegible]age hält sie sich in Baumlöchern verborgen und kommt erst [illegible] hervor. Den Namen Eiwia hat sie von den Negern er[illegible] [illegible] fortwäh[illegible] [illegible] besonders [illegible]ten es sich [illegible]

[illegible] 158.

„Erwachsenes Männchen. Hauptfarbe gesprenkelt braun, dunkler gegen den Rücken, wo die Haare schwarz geringelt sind; eine gelblichweiße, ohngefähr 4″ lange Binde, die über den kurzen Rippen beginnt und hinterwärts läuft; Schnautze nackt und braun, Augen licht haselfarbig. Kopf 4½″ lang, Hals und Leib ohngefähr 18″, Hinterfüße von der Fußwurzel bis zur Zehe 3″. Bewohnt die Insel Fernando Po″. — Der einheimische Name des Thieres ist Naybar; es führt eine nächtliche Lebensweise und läßt zur Regenzeit jeden Abend sein lautes Geschrei kurr kurr hören. Nach Aussage der Eingebornen schläft es am Tage in den Bäumen und frißt in der Nacht deren Blätter. — Dieß ist Alles, was Fraser über diese Art mittheilt und was völlig unzureichend ist, um uns über sie ein Urtheil zu gestatten. Zwar fügte noch Waterhouse die Bemerkung bei, daß sie entschieden von H. capensis und syriacus verschieden sey und daß er aus der Vergleichung des Felles mit den Beschreibungen von H. arboreus ersehe, daß während von letzterem der Pelz als weich und der Unterkiefer als von einer schwarzen Binde umgeben bezeichnet wird, bei der neuen Art eine solche fehlt und der Pelz rauh ist. Allein nicht sowohl der H. arboreus als vielmehr der H. sylvestris wäre zu vergleichen gewesen, der jedoch den englischen Zoologen bis dahin unbekannt geblieben ist. Die dürftige Notiz, die über den H. dorsalis vorliegt, setzt mich außer Stand eine nähere Vergleichung vorzunehmen; nach den Ausmessungen, wenn diese richtig sind, würde er viel größer als H. sylvestris seyn.

VIII. RHINOCEROS. Nashorn.

Die Zahl der Arten scheint um eine vermindert werden zu müssen, indem die Berechtigung des Rhinoceros Keitloa auf Art-Selbstständigkeit angestritten worden ist.

Zu S. 285. Rh. indicus Linn.

Als Zusatz zu seiner Anatomie der Pachydermen lieferte Mayer Beiträge zur Anatomie des Rh. indicus (nov. act. acad. nat. cur. XXIV. 1 S. 1). Sie betreffen die Zunge, Respirationsorgane, Darmkanal, Harnwerkzeuge und männliche Geschlechtsorgane.

Rh. cucullatus WAGN.

habe ich gefunden, daß das in hiesiger Sammlung ste-
des Rh. cucullatus schon vor mir abgebildet worden ist.
München. gel. Anzeigen XXX S. 29 bemerklich machte,
bach, der die erste Abbildung von diesem Individuum
schon im Jahre 1791 in den Bemerkungen, welche er
s Uebersetzung von Bruce's Reisen im V. Bande S.
ferte. Die Abbildung ist sehr gut ausgefallen, entbehrt
ahme etlicher Maaßangaben, einer weiteren Beschreibung.

Rh. javanus.

sondaicus. S. MÜLL. SCHLEG. verhandel. zool. I. p. 184.
OR journ. of the Asiat. s. c. XV. p. 262.

usführlichen Schilderungen von S. Müller und Schle-
er nur noch so viel hervor, was von ihnen zur Unterschei-
ischen Nashorns vom indischen beigebracht worden ist. Der
ist, im Verhältniß zum übrigen Körper, etwas kleiner,
niedriger und oben viel weniger ausgehöhlt. Die Halsfal-
er und stärker, bilden aber unterhalb keine halbmondför-
de Wamme, wie solches beim indischen Nashorn der Fall
ist der hinterste Halseinschnitt, welcher bei letzterem an
Schultern sich allmählig verflacht, beim javanischen viel
oben um die Schultern herum, so daß der Hals durch die-
vom Rumpfe ganz abgesondert wird. Die Vertiefungen
pen ist ferner bei der javanischen Art viel deutlicher,
n den Leibesseiten kleiner als beim indischen. — Die
Allgemeinen trüb graulichbraun, längs des Rückens
an den Kopfseiten und am Bauche jedoch mit röth-
und innerhalb der Hautfalten und auf der Innen-
m An-
ückens
die sie
en die
Die
Größe

und hauptsächlich durch das viel kleinere Horn, das meist sich nur als eine niedrige Erhabenheit darstellt. Nachstehende Maaße sind vom größten Männchen abgenommen.

Körper	3m, 16	Entfernung der beiden Rückenfalten voneinander . .	0m, 97
Kopf	0 72		
Höhe	1 60	Entfernung der Schulter- u. Halsfalten voneinander .	0 40
Umfang des Leibs	3 75		

Mit Sicherheit lediglich von Java bekannt, doch hält es Cantor für wahrscheinlich, daß sowohl diese als die indische Art zahlreich auf der malayischen Halbinsel vorhanden seyn dürfte.

Zu S. 288. Rh. sumatranus.

Rhinoceros sumatranus. S. Müll. Schleg. verhandel. zoolog. I. p. 190. tab. 34. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 263.

Auch von dieser Art können wir jetzt aus der mittlerweilen erschienenen Beschreibung von S. Müller und Schlegel einige Mittheilungen nachtragen. Von dem javanischen Nashorn unterscheidet sie sich durch 2 Hörner und eine glattere Haut, deren Falten weniger tief sind und auf den Hüften und im Nacken ganz aufhören. Von den zweihörnigen südafrikanischen Arten (Rh. bicornis, simus und Keitloa) unterscheidet sich das sumatranische Nashorn durch geringere Größe, viel kürzere Hörner und minder kräftigen Bau. Ferner hat dieses in jedem Kiefer zwei große Schneidezähne und im jüngeren Alter außerdem noch im Unterkiefer 2 kleine zwischen den beiden großen, und im Oberkiefer jederseits einen neben den beiden mittleren großen; während die afrikanischen Arten oben keine Schneidezähne besitzen und im Unterkiefer nur in der ersten Jugend 4 kleine Schneidezähne haben, von denen man selten mehr Spuren bei den Erwachsenen antrifft. Endlich ist der Körper des sumatranischen Nashorns, insbesondere bei jungen Thieren, viel stärker mit Haaren besetzt als bei irgend einer andern Art.

Das sumatranische Nashorn hat eine nur wenig lichtere Farbe als das javanische und ist die kleinste von allen Arten. Ein im Fleisch gemessenes Weibchen zeigte folgende Verhältnisse.

Körper . . .	2m, 48	Schwanz	0m, 32
Kopf . . .	0 70	Umfang des Leibes .	2 10
Höhe . . .	1 35		

Sumatra, ſcheint jedoch nach den Angaben Cantor's und
uf der malayiſchen Halbinſel vorzukommen, was um ſo
va beide Lokalitäten viele Thiere mit einander gemein ha-
Ausſage der Malayen ſoll wenigſtens ein zweihörniges
chteſte Dſchungel bewohnen. Das Muſeum der Asiatic
einen Kopf mit dem Fell, der als Rhinoceros sumatra-
und aus Tenaſſerim herſtammt, wo ohnedieß nach den
elfer und Blyth dieſe Art vorkommen ſoll.

Rhinoceros Keitloa.

g bezweifelte die Artberechtigung des Rh. Keitloa, in-
(Archiv ſkand. Beitr. I. S. 427.) Folgendes ſagt. „Nach-
als neue Spezies beſchriebene Thier geſehen habe, kann
den Ausſpruch zu thun, daß ich meines Theils an der
t deſſelben als Spezies zweifle, ja daß ich faſt das Ge-
icherheit zu behaupten wage. Ich habe eine ſehr große
er und weißer Nashörner ſelbſt getödtet und tödten laſſen,
die Beobachtung gemacht, daß die Hörner bei den beiden
Geſtalt ſowohl, als der Größe und Farbe ſtark variiren.
haben die Weibchen die längſten Hörner, aber die Männ-
e. Die hintern Hörner der alten Weibchen des ſchwarzen
faſt über halb ſo lang als das vordere, da hingegen jene
chen die Hälfte des letztern nicht erreichen. Die beiden
mir zu Theil wurden, waren Weibchen, und ich erſtaunte
als ich aus Smith's Beſchreibung erſah, daß das Indivi-
er erhalten hatte, ein Männchen geweſen war, denn dieß
und gar der Anſicht, welche ich von der Sache gefaßt

intesti-

ne[1]) mit

iſt ſchon

einer neuen und allem Anſchein nach wohlberechtigten Art vermehrt und es kommt Temminck das Verdienſt zu, ſie im Syſteme eingeführt zu haben.

Elephas sumatranus Temm., der ſumatraniſche Elephant; dentium molarium corona e parallelogrammis undulatis multo latioribus quam in E. indico, composita.

Elephas sumatranus. Temm. coup-d'oeil sur les possess. Néerland. dans l'Inde archipél. I. p. 328; II. p. 91.

Die Waldungen Sumatra's ſind in großer Anzahl von Elephanten bewohnt, die man bisher zu derſelben Art als die indiſchen zählte. Nach Vergleichung von 3 Skeleten des ſumatraniſchen Elephanten mit denen des indiſchen und afrikaniſchen hat jedoch Temminck Differenzen aufgefunden, die ihn beſtimmten, für jene eine beſondere Art zu errichten, die er in folgender Weiſe charakteriſirt.

Der ſumatraniſche Elephant gleicht in den allgemeinen Formen des Schädels dem Elephanten des aſiatiſchen Feſtlandes, aber die freie Parthie der Zwiſchenkiefer iſt viel kürzer und ſchmäler, die Naſenhöhlen ſind viel weniger breit, der Raum zwiſchen den Augenhöhlen iſt ſchmäler, dagegen iſt der hintere Theil des Schädels breiter als bei der feſtländiſchen Art.

Die Backenzähne nähern ſich hinſichtlich der Form ihrer Krone vielmehr der aſiatiſchen als der afrikaniſchen Art, d. h. ihre Krone zeigt die Form von Bändern, die gewellt, jedoch nicht rautenförmig ſind; aber dieſe Bänder haben die Breite von denen, welche man auf der Krone des afrikaniſchen Elephanten ſieht, und ſind daher nicht ſo zahlreich als bei dem des aſiatiſchen Feſtlandes. Vergleicht man die Dimenſionen dieſer Bänder in ihrer Richtung von vorn nach hinten mit denen nach der queren und ſeitli-

---

früher gedacht worden. — Harriſon machte (in den Proceed. of the R. Irish Academy IV. p. 132) auf einen eigenthümlichen Muskel beim Elephanten aufmerkſam, der den Hintertheil der Luftröhre mit dem Vordertheil des Oeſophagus verbindet. Er legte ihm den Namen Musculus tracheo-oesophagealis bei, und erläuterte dieſe Verbindungsweiſe durch eine Abbildung.

…o verhalten sie sich wie 3 oder 4 zu 1, während sie beim …ie 4 oder 6 zu 1 sind. Die ganze Länge von 6 solchen … bei der neuen Art, sowie bei der afrikanischen, ungefähr …während sie bei der Art des asiatischen Festlandes nur 8 … ausmacht.

…n osteologischen Formen sind fast dieselben bei den 3 Ar…er Zahl der Wirbel giebt es Verschiedenheiten, wie nach… ausweist.

	E. africanus.	E. indicus.	E. sumatranus.
…rbel	7	7	7
…wirbel	21	19	20
…wirbel	3	3	3
…wirbel	4	5	4
…nzwirbel	26	34	34
… Rippenpaare . .	6	6	6
… " . .	15	13	14

…rkmale hat Temminck an 3 Skeleten der neuen Art: …s Männchen und ein altes Weibchen, constatirt. Felle sind …Ansicht zugekommen, und da überhaupt die äußere Beschaf… …matranischen Elephanten noch nicht in genaue Vergleichung …hen genommen worden, so fehlt allerdings ein wichtiger … um sicher bemessen zu können, ob die Differenz im Zahn… …ch ist, den sumatranischen Elephanten als besondere Art von … zu sondern, oder ob man ihn nur als Lokal-Varietät des… …soll. Es wäre zu wünschen, daß auch die Elephanten Hin… …der malayischen Halbinsel einer genaueren Untersuchung …den möchten, um ermessen zu können, ob sie nicht etwa in … Backenzähne ein vermittelndes Glied zwischen denen Vor…

VII. Ordnung.

Spitzzähner. INSECTIVORA.

Dentes primores et canini variabiles, molares prismatici mucronibus gracilibus instructi; pedes falculati, plantigradi, digitis haud elongatis, pollice haud oppositionabili; claviculae completae.

Die Spitzzähner oder Insektenfresser (Cuspidentata s. Insectivora), die ich früher nach Cuvier's Vorgang den Raubthieren zugetheilt hatte, habe ich jetzt von ihnen als eine eigenthümliche Ordnung abgesondert und ihnen noch die Pelzflatterer zugefügt. Sie bilden eine Uebergangsgruppe, die zunächst an die Fleischfresser sich anreiht, durch die Pelzflatterer mit den Halbaffen und Fledermäusen in Beziehung tritt und im Habitus und Lebensweise Vorbilder der Nager abgiebt. Der Zahnbau ist nur hinsichtlich der ächten Backenzähne zu einem festen Typus gelangt, indem diese gleich denen der insektenfressenden Handflügler mit feinen spitzen Zacken bewaffnet sind; dagegen sind die Schneidezähne nach Form und Zahl sehr großen Abänderungen unterworfen. Was die Eckzähne anbelangt, so sind in der Regel gar keine Zähne als solche anzusprechen, oder man kann ihnen blos die Bedeutung falscher Eckzähne beilegen; nur bei den Spitzhörnchen nähern sie sich bereits wirklichen Eckzähnen an und bei der Gattung Centetes sind sie so charakteristisch als bei den Fleischfressern ausgebildet. — Die Insektenfresser gehören hauptsächlich der alten Welt und Nordamerika an; in Westindien sind sie einzig durch Solenodon repräsentirt; vom südamerikanischen Festlande und von Australien sind keine gekannt. Insekten und Würmer machen ihre Hauptnahrung aus, wobei manche nebenbei oder hauptsächlich auch vegetabilische Kost genießen.

I. Familie.

Dermoptera. Pelzflatterer.

[illegible]ntagio piloso circumdatum, mammae pectorales.

[illegible]flatterer sind von so eigenthümlichem Typus, daß sie in je-
[illegible]per sie zugetheilt werden, einen mehr oder minder fremdar-
[illegible]heil ausmachen. Früher wurden sie gewöhnlich zu den Halb-
[illegible]mit denen sie allerdings in der Bruststellung der Zitzen,
[illegible] mit den Makis in einigen Analogien übereinkommen; da-
[illegible]sie bei solcher Zusammenstellung die Ordnung der Affen
[illegible]igsten Merkmale, die von der Handbildung und dem
[illegible]genommen sind. Aus diesem Grunde hat man später die
[illegible]en Handflüglern zugewiesen, damit aber dieser Ordnung eben-
[illegible]ist höchst natürlichen Charakter entzogen, indem zwischen bei-
[illegible]Bruststellung der Zitzen und zum Theil der Form der Bak-
[illegible]entfernte Aehnlichkeit, aber keine wirkliche Verwandtschaft
[illegible]Flughaut der Pelzflatterer und der Handflügler sind zwei
[illegible]schiedenartige Gebilde; eben so ist das Knochengerüste und
[illegible]e vordere Extremität bei beiden nach ganz differenten Typen
[illegible]habe daher die Dermoptera von den Chiropteren ausge-
[illegible]nunmehr bei den Insektenfressern eingereiht, weil sie den
[illegible]Ordnung am mindesten stören und mehrere wichtige Merk-
[illegible]theilen. Denn wenn auch gleich die Pelzflatterer von letz-
[illegible]Mangel der Bauchzitzen abweichen, so kommen sie dage-
[illegible]nicht blos in der Form der Backenzähne, sondern, was
[illegible]will, in der unregelmäßigen Bildung der Vorder- und
[illegible]ferner in dem Mangel der Daumenbildung, der Nichtver-
[illegible]Vorderzehen und der Bewaffnung aller Zehen mit sichel-
[illegible]überein. Sie sind in der Ordnung der Insektenfresser
[illegible]zu den

[illegible]albinsel.

Flughaut beiderseits behaart und die vier Füße nebst dem Schwanz einhüllend. Kopf zugespitzt, Ohren klein, Schwanz kurz, Füße durchgängig fünfzehig und mit Sichelkrallen bewaffnet, Zitzen, jederseits ein Paar, in der Achselgegend stehend. Gebiß sehr eigenthümlich, aber im Allgemeinen von dem Typus der Insektenfresser. Schneidezähne $\frac{2}{2}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{1}{1}$, ächte Backenzähne $\frac{4}{4}$ = 34. Oben ist der vordere Schneidezahn weit von dem der andern Seite entfernt, klein, gezackt, der zweite vor und hinter der großen Spitze gekerbt; im Unterkiefer sind die Schneidezähne kammförmig eingeschnitten. Die Eckzähne sind nur der Lage nach als solche anzusprechen, in der Form und der doppelten Wurzel kommen sie mit dem hintern obern Schneidezahn überein. Der Lückenzahn ist noch lang gestreckt, aber die ächten Backenzähne, zumal des Oberkiefers, verschmälern sich und sind nach dem Typus dieser Ordnung geformt.

Unter den indischen Pelzflatterern hatte ich früher, wo Beobachtungen an lebenden Thieren nicht vorlagen, 2 Arten: G. volans und G. undatus unterschieden; die umfassenden, an Ort und Stelle vorgenommenen Untersuchungen von Salomon Müller haben jedoch dargethan, daß diese Thiere in der Färbung so außerordentlich wechseln, daß hiemit nur Farbenabänderungen einer und derselben Art bezeichnet werden.

1. G. volans Pall., der Kubong; diversissime coloratus, unicolor aut variegatus.

Galeopithecus volans. Pall. act. acad. Petrop. IV. 1. p. 208. tab. 8. — Schreb. tab. 307.— C. Blainv. ostéogr. Lemur tab. 6. (Skelet). — Owen odontogr. p. 433. tab. 114. fig. 1. (Gebiß). — G. rufus. Geoffr. cours 12 leç. p. 37. — Schreb. tab. 307. E. — G. undatus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 326. tab. 307. B. — G. variegatus. Geoffr. cours, 12. leç. p. 37. — Schreb. tab. 307 D. — S. Müller verhandel. I. p. 19, 49. — G. Temminckii. Waterh. proceed. VI. p. 119; transact. of the zool. soc. II. p. 335. tab. 58 (Schädel). — Cantor, journ. of the Asiat. soc. XV. p. 177. — G. ternatensis Geoffr. Schreb. tab. XLIII.

Von S. Müller auf Java, Borneo und Sumatra gefunden, von Lesson auf den Pelew-Inseln, nach Cantor auf der malayischen Halbinsel, Singapore, Pinang und einigen andern Eilanden in der Straße von Malakka, nach Diard auch in Siam. Von einem Männchen giebt Cantor die Länge des Körpers zu 1′ 4″, des Schwanzes zu 9″ an; es giebt aber

…kere. Wie S. Müller nachgewiesen hat, ist die Färbung …dividuen höchst verschieden: der Rücken ist lichtgrau, oder …der braungelb, rothgelb, braunroth, dabei entweder fast ein… …r etwas dunkler gescheckt, oder mit schwarzen Streifen und …migen Flecken wie marmorirt. Die Unterseite ist lichter …

…ippinensis Waterh., der Caguang; praecedenti simi… …majoribus, rostro breviori obtusiori, dente anteriore supe…

…ecus philippinensis. Waterh. proceed. VI. p. 119; transact. …II. p. 335. tab. 58. (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. …guang. Cumming proceed. VI. p. 67.

… und Bohol (Philippinen). Der Körper mißt 1′ 5″, der …s 11″, die Ohren 9‴. Die Färbung ist, wie bei vori… …veränderlich: dunkel schwärzlichbraun, oder aschgrau oder …ils einfarbig, theils schwarz und weiß gescheckt. Die Oh…, die Hände länger, die Schnautze breiter und stumpfer, …h kleiner als bei G. volans. Der erste obere Zahn, der …durch zwei Kerben dreizackig ist, hat bei G. ph. nur eine …er 2. und 3. Zahn sind bei G. volans am vordern und …gekerbt, bei G. ph. sind diese Ränder eben; auch nehmen …5 hintern Zähne einen größern Raum als bei jenem.

…urus Temm. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 327.

…einem Skelet ohne Schädel aufgestellt, bei welchem statt …7 Schwanzwirbel des G. volans sich 21 solcher Wirbel …gn von G. philippinensis das Skelet noch nicht kennt, …ie Selbstständigkeit des G. macrurus nichts bestimmen.

…canini

…chränkt,

und bei ihnen kann man bereits ächte Eckzähne unterscheiden, die, wenn auch nicht ihrer Funktion nach, doch wegen ihrer Form, abgerückten Stellung und einwurzeligen Beschaffenheit als solche erklärt werden können. Sie nähren sich von Insekten, deren Larven und Eiern, so wie auch von saftigen Früchten.

II. CLADOBATES. Spitzhörnchen.

Auriculae mediocres, corpus gracile pilis mollibus tectum, cauda longa distiche villosa, rarius rotundata.

Gleich den Pelzflatterern Bewohner des indischen Archipels und Hinterindiens; neuerlich aber auch in Vorderindien entdeckt. Aeußerer Habitus dem der Eichhörnchen ähnlich, aber mit viel längerer zugespitzter Schnautze. Ohren mittelmäßig, abgerundet, Augen groß und vorspringend, Schnurren kurz, Füße regelmäßig gebildet, fünfzehig. Schwanz sehr lang und zweizeilig behaart. 4 Bauchzitzen. Der Schädel ist ausgezeichnet dadurch, daß Augenhöhle und Schläfengrube durch eine dünne, von den hintern Fortsätzen des Stirn- und Jochbeins gebildete Leiste geschieden sind; überdieß ist das Jochbein von einer Oeffnung durchbrochen. Das Gebiß besteht aus 38 Zähnen, nämlich Schneidezähne $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$, Eckzähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$, ächte Backenzähne $\frac{7}{7}:\frac{7}{7}$. Owen giebt für Cl. Tana nur 4 untere Schneidezähne an: hier war also bereits ein Paar ausgefallen.

Die Arten des indischen Archipels sind durch die vortreffliche Monographie von S. Müller und Schlegel jetzt genau bekannt, auch haben sie eine neue Art beigefügt. Eine zweite Art, die erst seit meiner früheren Bearbeitung dieser Gattung entdeckt wurde, hat Waterhouse aufgestellt.

a) cauda distiche villosa.

1. Cl. Tana Raffl., die Tana; ruso-fuscus nigro-adspersus; rostro longissimo gracili, cartilagine nasali postice acuminata; unguibus anterioribus longioribus.

Cladobates Tana. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 40. — Tupaia Tana, Raffl. Linn. transact. XIII. p. 257. — Horsf. zool. research. N. 3. — Hylogalea Tana. Müll. Schleg. verhandel. I. p. 161. tab. 26. fig. 2. (Kopf), 27. fig 1—6. — Cladobates speciosus. Wagn. a. a. O. S. 43.

[illegible] und Borneo angehörig. Der Körper ist 8" 8''', der [illegible] Haaren fast eben so lang. Die Augen stehn viel näher [illegible] der Nasenspitze, der Nasenknorpel läuft auf der Oberseite [illegible] rückwärts in einen spitzen Winkel aus; die Krallen der Vorder- [illegible] als die der hintern, der Schwanz ist breit. Die Haupt- [illegible] lich schön rothbraun, auf der Unterseite lichter, auf Kopf [illegible] n ins Fahlgelbe fallend und schwarz gesprenkelt, auf dem [illegible] nterrücken dunkler. Die Färbung ist veränderlich, indem [illegible] bald lebhafter ist. Ehe S. Müller's genaue Beobach- [illegible] waren und ich mich deshalb nur auf die mangelhaften [illegible] konnte, hatte ich gemeint von Cl. Tana eine zweite Art als [illegible] abscheiden zu dürfen; jetzt erkenne ich nach Müllers [illegible] daß beide zusammen gehören.

[illegible] rugineus Raffl., das rostfarbige Spitzhörnchen; fer- [illegible] nigro-adspersus, subtus rufescens aut cano-flavescens; rostro [illegible] gine nasali postice truncata; unguibus aequalibus. — Tab. 34. [illegible] s ferrugineus. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 41. — Tu- [illegible] a. Raffl. Linn. transact. XIII. p. 256. — Horsf. zool. research. [illegible] Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 188. — Hylogalea [illegible] Müll. Schleg. verhandel. I. p. 163. tab. 26. fig. 3 (Kopf), 27. fig. [illegible] torex-Glis. Duvauc. Asiat. research. XIV. p. 471. tab. 9. — [illegible] mamm. II.

[illegible] del größeres Wohngebiet als die vorige Art, indem es sich [illegible] umatra, Borneo, Pinang, Singapore und die malayische [illegible] kt. Der Körper mißt 7" 9''', der Schwanz ist etwas [illegible] chnautze ist kürzer als bei Cl. Tana, der Schwanz schmä- [illegible] hinten gerade abgestutzt, die Vorderkrallen sind nicht [illegible] ch oben [illegible] stfarbig [illegible]

[illegible] r; supra [illegible] bus ae- [illegible]

Auf den östlichen Ghats in Vorderindien entdeckt. Der Körper mißt 7" 9‴, der Schwanz mit Haaren 9", von der Nase zum Ohr 1" 8‴ (bei Cl. ferruginea 2"). Der Kopf ist kürzer als bei den 2 vorigen Arten, die Farbe blasser als bei Cl. Tana, der Schwanz minder buschig und die Zähne kleiner. Der Pelz des Männchens ist oben blaß rothbraun, auf den Vordertheilen unbestimmt schwarz gesprenkelt; der Bauch goldgelb, an Brust, Vorderhals und Kinn ins Weiße übergehend. Die Schwanzhaare sind schön rothbraun mit einem schmalen dunklen Ring. Bei einem Weibchen ist der Pelz oben einförmig und sehr blaß röthlich, der Bauch licht gelblich, Brust und Vorderhals gelblichweiß.

4. Cl. javanicus Horsf., das olivenfarbige Spitzhörnchen; flavidus nigro-adspersus, subtus cano-albescens aut lutescens, olivaceo-tinctus; rostro minus elongato, cartilagine nasali postice truncata, cauda angusta corpore longiore.

Cladobates javanicus. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 44. — Tupaja javanica. Horsf. zool. research. N. 3. mit fig. — Hylogalea javanica. Müll. Schleg. verhandel. I. p. 165. tab. 26. fig. 4. (Kopf), 27 fig. 11—16. — Cerp. Fr. Cuv. mammif. II.

Bewohnt Java, Sumatra und Borneo. Der Körper ist 5" 7‴, der Schwanz 6" 8‴ lang. Die Schnauze ist kürzer als bei Cl. ferrugineus, daher das Auge mehr mittelständig, die äußere Zehe der Hinterfüße und der Schwanz sind länger als bei diesem, die Nasenkuppe ist aber eben so geformt. Der Pelz ist oben fahlgelb, schwarz gesprenkelt, unten graulich weiß oder ockergelblich, auf beiden Seiten mit deutlichem olivenfarbigen Anflug.

5. Cl. Belangeri Wagn., das peguanische Spitzhörnchen; fulvidus nigro-adspersus, subtus flavus; rostro longissimo gracili, cauda corpore longiore.

Cladobates Belangeri. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 42. — Tupaia de Pégou. Is. Geoffr. voy. de Bélang. p. 105. tab. 4.

Pegu. Der Körper ist 7", der Schwanz $7\frac{1}{2}$", der Kopf 2" 2‴ lang. In den Formen stimmt diese Art überein mit Cl. Tana, aber der Schwanz ist verhältnißmäßig länger. Der Pelz ist oben hasenfarbig, unten fahlgelb; nach Is. Geoffroy differirt die Färbung von der des Cl. javanicus

heren Ton und durch den einfachen fahlgelben Schulter-
Striches. Diese Art ist noch nicht sicher festgestellt.

pilosa rotundata. — Dendrogale Gray.

inus Müll. Schleg., das kleine Spitzhörnchen; mini-
pilosa, fere rotunda, apice subpenicillata.

murina. Müll. Schleg. verhandel. I. p. 167. tab. 26. fig. 5.
. 18. (Schädel).

kleinste Art, die von Diard bei Pontianak an der West-
o entdeckt, aber erst durch S. Müller und Schlegel
rde. Der Körper mißt nur 4", und der Schwanz eben
Schnautze ist schmäler, spitziger und verhältnißmäßig etwas
Ul. javanicus. Der Schwanz ist unten mit sehr kurzen,
oben mit etwas längeren Haaren besetzt, die gegen die
ger werden und eine Art Pinsel bilden. Obwohl der
deutlich zweireihig ist, erscheint er doch vielmehr rund, da die
Seiten und oben zu kurz sind, so daß ihre Richtung un-
die Augen fällt. Die übrige Behaarung ist etwas kürzer
ern Arten. Die Oberseite ist gelblichbraun, was an der
dälfte ins Olivenfarbige, an der hintern und auf dem
Rothbraune zieht. Die Haare der Oberseite haben schwarze
nze Unterseite ist weißlich. Zwischen Aug und Ohr ver-
ger Streif; darüber ein kürzerer, darunter ein längerer
Eine Schulterbinde wie bei den vorigen Arten ist nicht

III. PTILOCERCUS. Pfeilhörnchen.

vellus molle.

y be-
rnchen,
z, der

Schnur-

ren sind länger, die Ohren mäßig, die Füße fünfzehig, und der Pelz weich. Der Schwanz ist lang, cylindrisch, an der Basis behaart, dann nackt, mit breiten Schuppenringen und kurzen einzelnen Haaren, im Endbrittel mit längern, zweizeilig gestellten Haaren besetzt. Der Schädel ist wie bei Cladobates geformt, aber der Schnautzentheil ist kürzer, und das Jochbein statt eines Längsschlitzes blos von einem runden Loch durchbohrt. Das Gebiß ist ebenfalls wie bei jener Gattung beschaffen, also mit 38 Zähnen (nach Gray's Vertheilung $\frac{1.1.1.1}{3.3}$ Schneidezähne und $\frac{7:7}{}$ Backenzähne), aber von den untern Schneidezähnen ist das äußere Paar kürzer als das mittlere Paar, und von den obern Schneidezähnen ist der hintere an die Naht des Zwischenkiefers gestellt.

1. Pt. Lowii Gray, das zierliche Pfeilhörnchen; fusco luteoque adspersus, subtus lutescens. — Tab. 35.

Ptilocercus Lowii. Gray proceed. with illustr. 1848. p. 24. tab. 2.

Der Körper mißt $5\frac{1}{4}$" Schwanz $6\frac{1}{2}$". Die Farbe ist oben schwärzlichbraun, durch die gelben Haarspitzen sehr fein gesprenkelt; die Lippen und ganze Unterseite sind gelblich, die Augenringe schwarz. Der Schwanz ist schwarz, sein Bart weiß, mit Ausnahme einiger schwarzer Haare gegen den nackten Theil. Das einzige bisher bekannte Exemplar wurde im Hause des Radscha von Sarawak (Borneo) gefangen.

IV. HYLOMYS. Ferkelhörnchen.

Auriculae mediocres, vellus submolle, cauda brevissima nuda, dentes 44.

S. Müller und Schlegel haben diese Gattung aufgestellt, die sich von den beiden vorhergehenden durch den rudimentären Schwanz und die größere Anzahl von Zähnen erheblich unterscheidet. Sie bewohnt Java und Sumatra, und bildet eine Mittelgattung zwischen den Spitzhörnchen und Spitzmäusen, doch ersteren weit näher stehend. Der Rüssel ist in eine lange, zugespitzte, im Leben sehr bewegliche Schnautze auslaufend; die Ohren sind mittelgroß und nackt; die Füße durchgängig fünfzehig mit Sichelkrallen, die äußern Zehen viel kürzer als die mittlern; der Schwanz ist sehr kurz und nackt; die Behaarung ziemlich weich. Der Schädel ist

ähnlich dem der Spitzhörnchen, aber flacher, die Augenhöhlen hinten nicht geschlossen, die Jochbeine mit kleiner Spalte. Das Gebiß zählt 44 Zähne, welche Schlegel und Müller also anordnen: Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$:$\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{3}{3}$:$\frac{3}{3}$, Backenzähne $\frac{4}{4}$:$\frac{4}{4}$. Das Gebiß ist nach dem von Cladobates geformt, nur daß im Oberkiefer hinter dem seitlichen Seitenzahn noch ein kleiner eingeschoben ist und die Lückenzähne ebenfalls in der Unterkinnlade um einen vermehrt sind.

1. H. Suillus Müll. Schleg., das kurzschwänzige Ferkelhörnchen; saturate flavido-fuscus, subtus dilutior. — Tab. 36.

Hylomys Suillus. Müll. Schleg. verhandel. I. p. 50, 153. tab. 26. (Thier), 25. fig. 4—7. (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 554.

Der Körper mißt 5″, der Schwanz $5\frac{1}{2}$‴. Die Haare auf der Oberseite sind an der Wurzel grau, in der Mitte gelblichroth, an der Spitze schwarz, woraus eine dunkel gelblichbraune, ins Rothbraune spielende Farbe entsteht; außerdem sind viele lange schwarze Haare eingemengt. Der Unterleib ist lichter gelblichbraun. Man kennt bisher nur 2 Exemplare, wovon das eine auf Java auf einem Kaffestrauche, das andere auf Sumatra auf einem umgefallenen Baumstamme gefangen wurde.

III. Familie.

Soricina. Rüsselmäuse.

Habitus rattiformis aut murinus, rostrum proboscideum valde elongatum, pedes regulares, dentes canini haud distinguendi aut spurii, annulus orbitalis osseus nullus aut imperfectus.

Die Rüsselmäuse unterscheiden sich von den Spitzhörnchen durch ihre weit mehr verlängerte, sehr bewegliche, einen förmlichen Rüssel bildende Schnautze; ferner sind Eckzähne entweder gar nicht zu unterscheiden, oder wenn man ja im Oberkiefer solche anerkennen wollte, so sind sie doch nicht durch ihre Form ausgezeichnet und haben überdieß wie die Lückenzähne zwei Wurzeln, sie können also höchstens als falsche Eckzähne angesehen werden; endlich kommt es zu keiner oder doch nur zu einer unvollständigen Bildung eines knöchernen Augenringes. In der Lebensweise unterscheiden sich die Rüsselmäuse von den Spitzhörnchen dadurch, daß sie nicht Bäume besteigen, sondern am Boden oder in Höhlen sich aufhalten.

V. RHYNCHOCYON. Rutan.

Auriculae mediocres, oculi magni, pedes tetradactyli, vellus rigidum, cauda squamosa brevipilosa, pili annulati rigidi.

Peters hat dieſe merkwürdige Gattung in Moſſambique entdeckt und von ihrem äußern und innern Baue eine ſo vollſtändige Beſchreibung geliefert, daß dieſe neue Form uns jetzt genauer bekannt iſt als eine Menge ſchon ſeit langer Zeit im Syſteme aufgenommene. Durch die ſehr lange rüſſelförmige Naſe, die überwiegende Länge der hintern Gliedmaſſen und den geringelten Rattenſchwanz nähert ſie ſich den Rohrrüßlern, während ſie durch die ſtarre Beſchaffenheit der Haare und die Geſtalt und Größe der Krallen an die Manguſten erinnert. Die Augen ſind groß, die Ohren mittelmäßig und behaart, der Rüſſel hat eine untere behaarte Längsfurche, die Schnurrhaare ſind kurz. Die Füße ſind blos vierzehig, indem die Daumenzehe fehlt; an den Vorderfüßen iſt die äußere Zehe abgerückt und viel kleiner; die Nägel ſind kräftig und zuſammengedrückt. Die Sohlen ſind nackt; an den Hinterfüßen iſt jedoch die Fußwurzel bis auf eine nackte Schwiele behaart. Der Schwanz iſt wie bei den Ratten geringelt und kurz behaart. Die Behaarung iſt ſteif, oben dicht, unten ſpärlich. Das Weibchen hat zwei Paar Bauchzitzen.

Der Schädel nähert ſich unter den Soricinen am meiſten dem der Rohrrüßler und hat ebenfalls einen vollſtändigen Jochbogen, unterſcheidet ſich aber gleich durch die anſehnliche Breite zwiſchen den Augenhöhlen und durch den nicht durchlöcherten knöchernen Gaumen. In dieſer Beziehung, ſo wie in ſeinen Hauptumriſſen kommt er am meiſten mit dem der Spitzhörnchen überein, insbeſondere auch noch durch den Anſatz zur Bildung eines Augenringes, der jedoch hinten nicht wie bei letzteren geſchloſſen iſt.

Die Zahnformel giebt Peters folgendermaſſen an: Schneidezähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$ oder $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Eckzähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{2}{2}:\frac{2}{2}$, ächte Backenzähne $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$, im Ganzen alſo 34 oder 36 Zähne, die im Allgemeinen große Aehnlichkeit mit denen der Rohrrüßler haben. In der Oberkinnlade fehlen beim erwachſenen Thiere die Schneidezähne ganz; an einem andern Schädel fanden ſich jedoch zwei kleine derartige Zähnchen. Der Eckzahn iſt lang, zuſammengedrückt, ſpitz, vorn und hinten ſchneidend, innen und außen flach

gekielt, und hat 2 lange Wurzeln. Die Lückenzähne nehmen nach hinten an Größe zu, sind zweiwurzelig und dreieckig; die beiden folgenden ächten Backenzähne haben 2 äußere Spitzen und zwei innere stumpfe Höcker, der dritte ist kleiner und dreieckig. Im Unterkiefer stehen jederseits 3 einwurzelige, zweilappige, etwas vorwärts gerichtete Schneidezähne. Gleich hinter ihnen folgt in derselben Richtung, und nicht größer als sie, der sogenannte Eckzahn, der ebenfalls einwurzelig, aber nur einspitzig ist, und vor dem obern eingreift. Die 3 Lückenzähne sind zweiwurzelig, zusammengedrückt, dreieckig zugespitzt. Der erste ächte Backenzahn ist der längste, mit 3 inneren spitzeren und 3 äußeren stumpferen Höckern, der zweite hat jederseits nur 2 Höcker, der letzte ist viel kleiner aber von ähnlicher Gestalt.

Wirbel sind im Ganzen 59 vorhanden, nämlich 7 Hals-, 13 Rücken-, 8 Lenden-, 3 Kreuzbein- und 28 Schwanzwirbel. Das Oberarmbein ist an seinem untern Ende von zwei Löchern durchbohrt. Der Magen ist einfach und sackförmig, der Blinddarm von der Weite des Dickdarms und 2″ 10‴ lang. Das Gehirn nähert sich sehr dem der Rohrrüßler.

1. Rh. Cirnei Pet., der gefleckte Mutau; ferrugineo-flavidus, maculis badiis seriatim positis ornatus.

Rhynchocyon Cirnei. Peters Bericht der Berlin. Akadem. 1847. S. 36; Mossamb. I. S. 106. tab. 21. (Thier), 22. fig. 1—7. (Schädel), 23. (Skelet), 24. fig. 1—10. (Füße und Weichtheile).

Ein schönes schlankes und für diese Ordnung großes Thier, indem seine ganze Länge 1′ 7½″ beträgt, wovon der Schwanz etwas über zwei Drittel ausmacht. Der lange bewegliche Rüssel ist an seiner Wurzel doppelt so breit als hoch, walzenförmig, kurz behaart, am Ende etwas über 3‴ nackt. Der Schwanz ist an der Basis fingersdick, nach seinem Ende hin allmählig verdünnt. Die Hauptfarbe ist verwaschen braungelb oder rostrothgelb, was von zahlreichen unregelmäßigen schwarzen Zikzaklinien durchbrochen wird, indem die meisten Haare vor ihrer Spitze einen breiten braungelben oder rothgelben Ring haben. Auf jeder Seite verlaufen 3 Längsreihen schön kastanienbrauner Flecken. Die Ohren und der hintere Theil der Oberschenkel sind glänzend rostroth. Die ganze Unterseite ist schmutzig rostrothgelb. Die Gliedmassen sind dem Körper gleichfarbig,

die nackte Naſenſpitze iſt braun, die Iris braunſchwarz, die Nägel braun. Die Stichelhaare ſind entweder ganz ſchwarz oder meiſt vor ihrem Ende, wie angegeben, geringelt; die Wollhaare verhalten ſich ebenſo. Der Schwanz iſt oben ſchwarz, an den Seiten braungelb und unten gelbgrau; die Spitze iſt ſchmutzigweiß.

Körper . .	0m, 300	Abſtand des Auges vom	
Schwanz .	220	Rüſſelende . . .	0m, 068
Kopf . .	100	Vorderfuß	041
Ohr . .	037	Hinterfuß	077

Peters erhielt 2 Thiere beiderlei Geſchlechtes auf dem, dem Herrn Cirne gehörigen Lehnsgute Boror in Moſſambique. Sie leben in Erdhöhlen, aus denen ſie zur Nachtzeit hervorkommen und nähren ſich von Inſekten.

VI. GYMNURA. Spitzratte.

Habitus rattiformis, auriculae rotundatae nudae, pedes 5-dactyli, cauda longa nuda.

Den ſundaiſchen Inſeln und Malakka angehörig. Die Geſtalt iſt rattenähnlich, mit langem, runden, nackten, ſchuppigen Schwanz, aber der Kopf iſt ſehr verſchieden, indem er in eine lange, verdünnte, weit über den Unterkiefer vorragende Schnauze endigt. Die Ohren ſind wenig vorragend, die Augen klein, die Schnurren lang, der Körper mit weichen Wollhaaren und einzelnen Borſten bedeckt. Die Beine ſind nicht ſonderlich lang und fünfzehig, die innere und äußere Zehe iſt kurz, die Krallen ſind ſichelförmig und einziehbar. — Der Schädel iſt im Umriß ähnlich dem von Centetes und Sorex, hat aber einen vollſtändigen Jochbogen. Das Zahnſyſtem iſt im hintern Theil ähnlich dem vom Igel, im vordern dem von Centetes, im Ganzen aus 44 Zähnen beſtehend, die Blainville alſo anordnet: Schneidezähne $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$, Eckzähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{4}{4}:\frac{4}{4}$, Backenzähne $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$. Die obern Schneidezähne ſind ſeitenſtändig, hakenförmig, der erſte iſt viel größer. Die Eckzähne kommen durch ihre lange gekrümmte Form mit ächten Eckzähnen überein; aber der obere iſt zweiwurzelig. Die ächten Backenzähne ſind faſt ganz wie die des Igels gebildet. — Die Lebensweiſe der Spitzratten iſt noch nicht gekannt.

1. G. Rafflesii Horsf. Vig., die weißköpfige Spitzratte; nigra, capite caudaeque dimidio extremo albidis.

α) nigra, setis dorsalibus raris albidis.

Gymnura Rafflesii. Horsf. Vig. zoolog. journ. III. p. 246. tab. 8. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 46. — S. Müll. verhandel. I. p. 26. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 190. — Blainv. ostéogr. Insectiv. p. 59. tab. 6. (Schädel mit Gebiß).

β) flavido-alba, setis dorsalibus nigris.

Gymnura Rafflesii. Waterh. ann. of nat. hist. sec. ser. XI. p. 529.

Die Varietät α bewohnt Sumatra, Singapore und Malakka, die Var. β Borneo. Körper 14″ 3‴, Schwanz 10″ 6‴. Die Var. α ist schwarz, Kopf und Hals weiß, am Hinterkopf mit einzelnen schwarzen, auf den Rücken mit einzelnen weißen eingemengt. Der Schwanz ist in der ersten Hälfte schwarz, in der zweiten weiß. — Die Var. β ist ganz gelblichweiß, mit längern schwarzen Haaren untermengt.

VII. MACROSCELIDES. Rohrrüßler.

Auriculae majusculae, artus posteriores anterioribus multo longiores, pedes 5-dactyli aut posteriores 4-dactyli, cauda longissima brevipilosa.

Die Rohrrüßler haben seit meiner frühern Bearbeitung einen Zuwachs von 3 Arten erhalten, so daß man jetzt 9 Species kennt, wovon nur eine auf Nordafrika kommt, alle andern Südafrika zuständig sind. Ohren und Augen sind groß, die Schnurren lang, der Rüssel gleicht einer dünnen Röhre, und der Leib ist untersetzt. Die Hinterbeine sind viel länger als die vordern und fünfzehig, nur bei einer Art hinten blos vierzehig; die Daumenzehe ist sehr kurz und an den Hinterfüßen mehr oder minder hoch am Laufe angesetzt. Der Pelz ist weich, der Schwanz lang und kurz behaart. Die Weibchen haben 3 Paar Zitzen, bei M. tetradactylus nur 2.

Der Schädel ist sehr eigenthümlich geformt und mehr mit dem des Mutaus und der Spitzhörnchen als mit dem der Spitzmäuse verwandt. Der Jochbogen ist vollständig, der Gaumen von 5 Paar Löchern zierlich durchbrochen, die Paukenknochen stark aufgeblasen.

Zähne sind im Ganzen 40 oder 42 vorhanden, nämlich Schneide-

zähne $\frac{1}{1}$, falſche Eckzähne $\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{1}{1}$, ächte Backenzähne bei M. typicus, rupestris, Rozeti und tetradactylus $\frac{3}{3}$, bei M. intufi, fuscus und brachyrhynchus (nach Peters) $\frac{4}{4}$.

Blainville nimmt nur $\frac{2}{2}$ Schneidezähne an, weil im Unterkiefer der hinter ihnen folgende weit kleiner als ſelbige iſt; allein auch der vierte, der ſogenannte Eckzahn, ſtellt ſeiner Form nach keinen ächten Eckzahn, ſondern einen Lückenzahn vor. Im Oberkiefer iſt zwar der Eckzahn etwas breiter als die Schneidezähne, iſt aber doch mehr einem Lückenzahn ähnlich und hat gleich dieſen zwei Wurzeln. Bei denjenigen Arten, die 42 Zähne haben, rührt der Ueberſchuß davon her, daß im Unterkiefer hinter den 3 ächten Backenzähnen noch ein vierter kleiner ſteht.

Die Rohrrüßler halten ſich am Boden auf, verſtecken ſich in Schlupfwinkeln, ſpringen zwar nach Inſekten, haben aber keineswegs eine hüpfende Bewegungsweiſe, ſondern laufen auf allen Vieren.

a) pedibus omnibus 5-dactylis.

1. M. typicus Smith, der gemeine Rohrrüßler; supra flavido-brunneus aut rufo-griseus, nigro-adspersus; auriculis mediocribus latis rotundatis; oculis in medio positis.

Macroscelides typicus. A. Smith illustr. of the zool. of South Afric. I. tab. 10. (Thier), fig. 1 a. — 1 i. (Schädel und Eingeweide). — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 86. — Rhinomys Jaculus. Lichtenſt. Darſtell. tab. 38.

Bewohnt die Kapkolonie und die Oſtküſte des Kaffernlandes. Der Körper iſt 5″, der Schwanz $4\frac{1}{2}$″, die Ohren 8‴ lang. Der Pelz iſt oben gelblichbraun, ſchwarz geſprenkelt, mitunter mausgrau, unten weiß; die Haare (wie bei allen Arten) in ihrem untern Theile ſchwarz. Der Schwanz iſt am Ende ſchwarz. Die Augen ſtehen faſt in der Mitte zwiſchen Ohren und Rüſſelwurzel; die Ohren ſind gerundet. Der Schädel iſt von dem der andern Arten ſehr verſchieden durch die Breite des Hinterhaupts, welche von der blaſigen Auftreibung des Schläfenbeins bewirkt wird.

2. M. rupestris Smith, der ohrfleckige Rohrrüßler; supra fulvido-brunneus, nigro-adspersus; nucha maculaque post auriculas elongatas saturate fulvis.

Macroscelides rupestris. A. Smith zool. of South-Afr. tab. 11. (Thier),

15. fig. 2 a. — 2 c. (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 88. — M. typus. Is. Geoffr. ann. des sc. nat. 1829. p. 165. — Lesson cent. zool. p. 51. tab. 12. — Duvernoy mém. de Strasb. I. 2. p. 22.

Südafrika. Der Körper ist gegen 6″, der Schwanz 5″, die Ohren 10‴ lang. Von voriger Art verschieden durch längere und schmälere Ohren, einen gelben Fleck hinter der Ohrwurzel, gelberen Farbenton, die Augenstellung näher am Ohr als an der Rüsselwurzel, insbesondere auch durch den weit schmächtigeren Schädel.

3. M. Intufi Smith, der Intufi; supra subochreus; auriculis elongatis apice valde attenuatis.

Macroscelides Intufi. A. Smith zool. of South Afr. tab. 12. (Thier), 15. fig. 3 a.—3 c. (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 90. — Gray list. of Brit. mus. I. p. 77. — Peters Mossambiq. I. S. 90. tab. 24. fig. 13. (Gehirn). — M. Alexandri. Ogilb. ann. of nat. hist. II. p. 146.

Im innern Afrika in der Nähe des Wendekreises von A. Smith und in Mossambique von Peters gefunden. Der Körper mißt 5½″, der Schwanz 4″, die Ohren 9‴. Die Ohren sind lang, an der Wurzel breit, gegen die abgerundete Spitze viel schmäler, am Außenrande ausgeschnitten. Der Pelz ist oben zwischen sienna- und rahmgelb mit einigen schwarzen Haaren. Der Schädel ist kürzer, in der Stirngegend schmäler, am Anfang des Schnautzentheils breiter als bei M. rupestris, und hat einen untern Backenzahn mehr. Die Schwanzdrüse fand Peters weder bei Weibchen noch jungen Männchen, wohl aber bei einem Männchen mit entwickelten Geschlechtsdrüsen. Wird das Thier verfolgt, so sucht es sich nicht durch Sprünge zu retten, sondern eilt stelzenartig auf den Spitzen der Zehen mit größter Schnelligkeit davon.

4. M. fuscus Peters, der schwarzbraune Rohrrüßler; nigro-fuscus, subtus cinereo-virescens; auriculis, labiis plantisque nigris; auriculis triangularibus postice excisis, rostro mediocri, artubus gracilibus.

Macroscelides fuscus. Peters Mossambiq. I. S. 87. tab. 19. (Thier), 22. fig. 13—17. (Schädel).

Peters entdeckte diese Art in Mossambique, doch erhielt er nur ein einziges Individuum aus Boror, welches in der Gestalt und Skeletbildung mit M. Intufi sehr übereinstimmt, aber durch ganz andere Färbung, etwas

steifere Behaarung und eine geringe Verschiedenheit im Bau der Zähne (der 2te obere Backenzahn ist länger und hat mehr Höcker als bei M. Intufi) von demselben sich unterscheidet. Beide Arten haben einen kleinen hintersten unteren Backenzahn mehr als die übrigen.

Die obern und seitlichen Theile sind dunkel nußbraun mit Schwarz gemengt, was allmählich in das Graubraune der Unterseite übergeht, welches einen olivengraulichen Schimmer hat. Ohren, Lippen, Schnurrhaare, Nasenkuppe, Sohlen und Nägel sind schwarz, die Iris braunschwarz. Der Schwanz ist oben schwarz, unten dunkelbraun. Der Körper ist 4″ 2‴, der Schwanz 3″ 7½‴, die Ohren 7½‴ lang. Wirbel finden sich so viel als bei M. Intufi, nämlich 7 Hals-, 13 Rücken-, 7 Lenden-, 3 Kreuzbein- und 26 Schwanzwirbel.

5. **M. Edwardii** Smith, der schmalöhrige Rohrrüßler; supra pallide flavo-brunneus, lateribus cinereus; auriculis longis, angustis, ad basin extus fulvis.

Macroscelides Edwardii. A. Smith zool. of South Afr. tab. 14. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 91.

Am Elephantenfluß in den mittlern Distrikten der Kapkolonie. Körper 5″ 5‴, Schwanz 5″ 3‴, Ohren 11‴. Die Ohren sind schmäler als bei andern Arten, der Rücken licht gelbbraun, mit vielen schwärzlichen Haaren untermengt, die Seiten aschgrau, blaß fahl überlaufen, die Unterseite weiß.

6. **M. brachyrhynchus** Smith, der kleine Rohrrüßler; supra ex fulvido et flavido-brunneo mixtus; auriculis elongatis; proboscide brevi, cauda ochraceo-brunnea.

Macroscelides brachyrhynchus. A. Smith zool. of South Afr. tab. 13. (Thier), tab. 15. fig. 4 a. — 4 c. (Schädel).

Diese Art, die unter dem Wendekreise des Steinbocks von A. Smith entdeckt wurde, ist in meiner früheren Beschreibung noch nicht aufgenommen. Der Körper mißt 4½″, der Schwanz 3½″, die Ohren 7‴. Der Rüssel ist abgekürzt, die Ohren sind lang, oval, außen fast ganz nackt. Der Pelz ist oben röthlich-gelbbraun mit Schwarz gemengt; der Rüssel rostig weiß, oben von einer schwärzlichbraunen Linie durchzogen. Der Schwanz ist oben ockerbraun mit ockergelb melirt, unten lichter.

7. M. melanotis Ogilb., der schwarzöhrige Rohrrüßler; auriculis nigro-fuscis, tarsis brunneis.

Macroscelides melanotis. Ogilb. proceed. 1838. p. 5. — Gray list of Brit. mus. I. p. 77. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 92.

Damhara in Südafrika. Körper 6". „Von beträchtlicherer Größe als M. Alexandri (= M. Intufi), Kopf groß, Ohren dunkelbraun oder schwarz; Unterlippe sandfarbig, Kehle und Bauch schmutzigweiß, Brust blaß röthlichbraun; Farbe der obern Theile fast dieselbe, nur vielmehr aschgrau; Tarsen hellbraun." Erfordert noch genauere Vergleichung.

8. M. Rozeti Duv., der numidische Rohrrüßler; supra flavido-brunneus, nigro-irroratus; auriculis ovato-rotundatis albido-pilosis; dentibus primoribus maxillae inferioris disjunctis. — Tab. 37.

Macroscelides Rozeti. Duvern. mém. de Strasb. I. 2. p. 1, 23. tab. 1, 2; III. p. 50. — M. Wagner, Algier III. S. 58. — A. Wagn. und R. Wagn. ebenda S. 9, 72. tab. 1. (Thier), 2 (Anatom.) — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 93.

Algerien. Körper 4" 2‴, Schwanz 4" 3‴, Ohren 11‴. Die Ohren sind ziemlich breit, oval und nicht ausgerandet. Der Pelz ist oben licht fahlbraun, fein schwarz gesprenkelt, unten weiß. Der Schwanz ist oben bräunlich, unten schmutzig gelbweißlich. Die unteren Schneidezähne sind alle von einander gesondert.

b) pedibus posterioribus tetradactylis. — Petrodromus Pet.

9. M. tetradactylus Pet., der vierzehige Rohrrüßler; supra ferrugineus, subtus albus, annulo oculari ad auriculam porrecto albo.

Petrodromus tetradactylus. Peters Mossamb. I. S. 92. tab. 20. (Thier), 22. fig. 8—12. (Schädel), 23. fig. 6, 7. (Füße), 24. fig. 11. (männliche Geschlechtstheile), fig. 12. (Gehirn).

Diese große Art wurde von Peters in Mossambique entdeckt und von ihm hinsichtlich ihrer äußern und innern Beschaffenheit mit einer Genauigkeit beschrieben, die an die klassischen Arbeiten von Pallas erinnert.

In der Größe kommt dieses Thier ziemlich mit einer starken Ratte überein. Besonders ausgezeichnet ist es dadurch, daß am Hinterfuße die Daumenzehe ganz fehlt. Die Oberseite des Kopfes und der Rücken ist rostbraun mit etwas Schwarz gemengt. Die Leibesseiten sind gelbgrau,

was durch eine Mischung von Ockergelb und Schwarz bewirkt wird; weiter unten werden sie nebst den Gliedmassen ockergelb. Die ganze Unterseite, sowie die Lippen und die Ohrwurzel sind schneeweiß; um die Augen läuft ein weißer Ring, der bis an die Ohren fortzieht. Die Füße sind gelblichgrau oder braungelb. Die Sohlen sind schwarz, die Nägel schwarzbraun. Der Schwanz ist in der Endhälfte schwarz; in der ersten Hälfte oben schwarz, an den Seiten braungelb, unten weiß.

Körper	8″ 2‴	Ohren	1″ 3‴
Schwanz . . .	6 0	Hinterfuß . . .	2 2

Zähne sind 40 vorhanden. Wirbel finden sich im Ganzen 55, nämlich am Halse 7, Rücken 13, Lenden 7, Kreuzbein 3, Schwanz 25. Von Zitzen finden sich nur zwei Paare: eines am Halse und eines am untern Theil der Brust, während die fünfzehigen Arten noch ein drittes Paar am Unterleibe zeigen.

Peters fand diese Art bei Tette, Sena und Boror in Mossambique. Während die andern Rohrrüßler mehr in ebenen Gegenden, im Grase und unter Gebüsch sich aufhalten, scheint dieses Thier vorzugsweise solche Lokalitäten zu lieben, wo ihm die Höhlungen und Klüfte der Felsen einen sichern Zufluchtsort gewähren.

VIII. SOREX. Spitzmaus.

Auriculae parvae (rarissime nullae), lobulis 2 internis instructae, pedes 5-dactyli fissi, cauda plus minus elongata, dentes 26—36.

Ueber die ganze alte Welt und Nordamerika verbreitet, dagegen in Südamerika und Neuholland fehlend. Der Schädel ist langgestreckt, ohne Jochbein, die Paukenknochen auf der Unterseite nur durch eine Haut geschlossen, die Gelenkhöhle des Schläfenbeins mit einem besonderen Fortsatz versehen.

Das Gebiß besteht aus 26 bis 36 Zähnen und ist von sehr abnormer Bildung, indem man keine Eckzähne, auch nicht einmal falsche, unterscheiden kann und hinter dem großen Vorderzahn jederseits sich die andern Zähne ohne Unterbrechung anschließen. Nach der Verschiedenheit der Formen hatte ich in meiner früheren Bearbeitung das Gebiß jederseits

eingetheilt in $\frac{1}{1}$ Schneidezähne, $\frac{3}{3}$ ächte Backenzähne und zwischen diesen $\frac{3-5}{2}$ kleine einspitzige Lückenzähne. Bei dem frühzeitigen Verschwinden der Zwischenkiefernäthe ist es mir nicht möglich gewesen die wirkliche Zahl der Schneidezähne sicher zu ermitteln; indeß liegen jetzt bestimmtere Angaben hierüber vor. Peters berichtete, daß er an einem Schädel von Crocidura sacralis den ganzen Verlauf der Zwischenkiefernath habe verfolgen können und daß darnach jederseits 3 obere Schneidezähne anzunehmen wären; für Sorex vulgaris vermuthete er dagegen 4 solcher Zähne. Die Verfasser der Fauna boica aber behaupten, daß der Zwischenkiefer, dessen Grenze sie nach ihrer ganzen Ausdehnung wahrnahmen, nicht blos bei Sorex vulgaris, sondern auch bei Crocidura aranea und Crossopus fodiens jederseits 4 Schneidezähne trägt. In diesen Angaben ist also noch eine kleine Differenz auszugleichen. Was die ächten Backenzähne anbelangt, so habe ich früher oben jederseits 4 angegeben, weil der auf die kleinen, an Größe hinterwärts abnehmenden Lückenzähne folgende Zahn (der vierte Zahn von hinten) sich durch seine ansehnliche Größe und engen Anschluß an die folgenden 3 Backenzähne auffallend von seinen Vorgängern unterscheidet. Um jedoch das Zahnsystem mehr in Conformität mit dem Gebiße der andern Spitzzähner zu bringen, werden jetzt gewöhnlich $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$ ächte Backenzähne angenommen; die Schneidezähne könnten zu $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$ bestimmt werden. Weil aber die kleinen Zwischenzähnchen, die jederseits zwischen dem großen Vorderzahn und dem vierten Backenzahn (von hinten gezählt) liegen, wegen ihrer Verschiedenheit in der Zahl und Form sehr brauchbare Anhaltspunkte zur Abtheilung in Gruppen darbieten, so habe ich sie, ohne Rücksicht auf ihre schematische Vertheilung, in der Charakteristik der Arten unter dem Namen der Zwischen- oder Lückenzähne (dentes intermedii) zusammengefaßt.

Nach Owen's [1]) Untersuchungen geht der Zahnwechsel bei den Spitzmäusen schon im Foetus vor sich. Bei Sorex araneus fand er $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$ Foetalzähne von mikroskopischer Kleinheit, nur die Schneidezähne waren etwas mehr entwickelt.

---

1) Odontograph. p. 423.

Die Spitzmäuse laſſen ſich in 4 Untergattungen theilen, die ſich durch ſehr charakteriſtiſche Merkmale von einander unterſcheiden. Meine erſte Bearbeitung zählte nur 22 Arten auf, während die vorliegende mehr als die doppelte Zahl aufzuweiſen hat. Zwei monographiſche Arbeiten ſind rühmlich zu erwähnen: die eine von Duvernoy[1]) mit ausführlichen Beſchreibungen und vielen Abbildungen, die andere von Sundevall[2]), welche ſich auf eine kurze Charakteriſtik der Untergattungen und Arten beſchränkte. Wie ſchon in der vorhergehenden Abtheilung habe ich auch bei dieſer und den nachfolgenden Gruppen der Ordnung der Spitzzähner die ſämmtlichen Arten mit ihrer Synonymik aufgenommen.

1. Subgen. Crossopus Wagl. (Hydrosorex Duvern.).

Dentes 30, intermedii superiores utrinque 4; primores inferiores haud serrati, angulo aucti; dentium apex coloratus; pedes ciliati, auriculae absconditae. — In wenigen Arten in der alten und neuen Welt.

1. S. fodiens Pall., die gemeine Waſſerſpitzmaus; supra niger, subtus albus; (cauda subtus linea pilorum vestita).

Sorex fodiens. Schreb. III. S. 571. tab. 161. — Jenyns ann. of nat. hist. I. p. 425; II. p. 43. — Bell. hist. of Brit. quadrup. p. 115. — S. Longch. microm. p. 24. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 52. — Bonap. faun. ital. tab. 18. fig. 6. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 186. — Nilss. skandin. faun. I. p. 87. — Ribbenb. ſibir. Reiſe Säugth. S. 76. — S. Daubentonii. Erxl. syst. p. 124. — Geoffr. ann. d. mus. XVII. p. 176. — Is. Geoffr. dict. class. XI. p. 322. — S. hydrophilus. Pall. zoogr. I. p. 130. — S. carinatus und constrictus. Herm. observ. p. 46. — S. nigripes. Melchior, Wiegm. Arch. II. 1. S. 77. — Amphis. Pennantii, A. Linneanus und Crossop. Daubentonii. Gray proceed. V. p. 125, 126; ann. of. nat. hist. II. p. 287. — S. Hermanni. Duvern. mém. de Strasb. II. 1. p. 23. tab. 1. fig. 1; II. 3. suppl. p. 4. — Hydros. carinatus. Duvern. l. c. II. 3. suppl. p. 4; II. 1. p. 17; magas. de Zool. 1842. p. 34. tab. 51. — Musaraigne d'eau. Buff. VIII. p. 64. tab. 11.

β) supra niger, infra nigello-cinereus.

---

1) Notices pour servir à la monographie du genre Musaraigne. Sorex Cuv. (magas. de Zoologie 1842).

2) Om slägtet Sorex med några nya arters beskrifning (Stockh. Vet. Acad. Handl. 1844. p. 163).

Sorex ciliatus. Sowerby brit. misc. 1806 tab. 49. — Jenyns. ann. of nat. hist. I. p. 426; VII. p. 263. — Bonap. tab. 18. fig. 7, 8. — S. remifer. Geoffr. ann. XVII. p. 182. — Is. Geoffr. dict. class. XI. p. 321. — Bell. l. c. p. 119. — S. collaris und lineatus. Geoffr. ann. XVII. p. 181.

Durch den größten Theil Europas und Sibiriens verbreitet; von v. Middendorff sogar noch an der Küste des ochotskischen Meeres gefunden. Körper 3″ 4‴, Schwanz ohne Pinsel 2″ 3‴, mit Pinsel 2″ 5½‴. Oben schwarz, unten abgeschnitten weiß; mitunter ein schwärzlicher Fleck auf der Brust und unterm Schwanz. Sohlen öfters schwarz gefärbt (S. nigripes). Bei S. ciliatus ist die Unterseite graulich schwarz; Brust und Mitte des Unterleibs mit gelblichem Anfluge. Zwischen S. fodiens und S. ciliatus finden viele Uebergänge statt, so daß man zu ihrer specifischen Vereinigung völlig berechtigt ist.

2. S. palustris Rich., die amerikanische Wasserspitzmaus; niger, subtus cinereus.

Sorex palustris. Richards. faun. bor. amer. p. 5. — Gray proceed. V. p. 125. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 55. — Audub. Bachm. quadrup. of North America III. p. 108. tab. 125.

Von der Hudsonsbay bis zu den Felsgebirgen verbreitet. Der Körper mißt 3″ 6‴, der Schwanz 2″ 7‴, der Hinterfuß 9‴, die Ohren 3‴. Nach Fuß- und Zahnbau eine ächte Wasserspitzmaus mit 30 Zähnen; ihre Verschiedenheit von unserer einheimischen Art ist mehr aus der großen Differenz des Wohnortes als aus den vorliegenden Beschreibungen zu folgern. Audubon lieferte zwar eine Abbildung, aber nur nach einem von Richardson im brittischen Museum aufgestellten Exemplare [1]).

---

1) S. fimbripes Bachm., die wimperzehige Spitzmaus; supra fuscus, subtus fusco-flavidus, auriculis nullis.

Sorex fimbripes. Bachm. journ. Acad. nat. sc. Philadelph. VII. p. 391. — Dekay zool. of New York I. p. 22. — Audub. Bachm. quadrup. III. p. 312.

Als neue Art aus Pennsylvanien von Bachman aufgestellt und folgendermaßen beschrieben. Augen sehr klein, Schnurren länger als der Kopf, kein äußeres Ohr; Vorderfüße breit und bis zu den Krallenspitzen mit feinen Haaren besetzt, die Ränder an der untern Seite reichlich mit langen bräunlichen Haaren gewimpert. Zähne gelblich. Schnau-

4. S. platycephalus Temm., die japaniſche Waſſerſpitzmaus; **S. fodiente multo major, saturate fuscus, subtus obscure cinereus.**

Sorex (Crossopus) platycephalus. Temm. faun. japon. I. p. 23. tab. V. fig. 1. (Thier), IV. fig. a. a. (Schädel).

Temminck reiht dieſe neue Art aus Japan ſelbſt bei Crossopus ein; ſie iſt um ein Drittel größer als S. fodiens und wird ſo groß als S. indicus. Die Schnauze iſt niedergedrückt und verläuft in einer Flucht mit der Hirnſchale, die ebenfalls ſtark verflacht iſt. Augen und Ohren ſind ganz unter dem Pelze verborgen. Die ganze Oberſeite iſt dunkelbraun, mit bläulich aſchgrau gewäſſert, indem die Haare von letzterer Farbe und nur an der Spitze braun ſind; einige lange ſilbergraue Haare ſtehen auf dem Kreuze und der behaarten Schwanzwurzel. Die Unterſeite iſt dunkel aſchgrau. — Man findet dieſe Art an feuchten Plätzen bei Nagaſaki, häufiger im Bungo-Lande und auf der Inſel Kiuſiu; ihr japaniſcher Name iſt Kawa-neſumi oder Waſſerratte.

2. Subgen. Sorex Wagl. (Amphisorex Duv.).

Dentes 32, intermedii superiores utrinque 5; primores inferiores serrati; dentium apex coloratus; cauda pilis brevibus aequalibus adpressis tecta.

Im ganzen Verbreitungsbezirk der Spitzmäuſe, hauptſächlich aber in Nordamerika vorkommend.

a) cauda capite longiore. — Corsira Gray, Amphisorex Duv.

†) species veteris orbis.

4. S. alpinus Schinz, die Alpen-Spitzmaus; **unicolor schistaceo-cinereus, cauda longa supra nigricante, infra albida.**

---

ren weiß, Füße ſchmutzig gelblich. Pelz ſehr lang, oben dunkelbraun, indem die Haare auf ⅔ ihrer Länge aſchblau, dann braun ſind; die Unterſeite dunkel falblich (dark fawn). Der Schwanz auf der Unterſeite bräunlichgelb (buff), an der Spitze faſt ſchwarz.

Körper	2½″	Vom Auge zur Naſenſpitze	⅝″
Schwanz	1¾	Hinterfuß	¼

Es iſt unmöglich nach dieſer Beſchreibung mit Sicherheit dieſe angeblich neue Art einer der Untergattungen einzureihen. Nach der Beſchaffenheit der Füße könnte ſie zu Crossopus gehören, vielleicht als ein junges Exemplar von S. palustris, indeß ſcheint die Bewimperung nur für die Vorderfüße angegeben zu ſeyn.

Sorex alpinus. Schinz europ. Faun. I. S. 27. — S. Longch. microm. p. 22, 160. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 59. — Bonap. faun. ital. tab. 18. fig. 3. — Amphis. alpinus. Duvern. mém. de Strasb. II. 3 suppl. p. 4; magas. de zool. 1842. p. 31. tab. 49.

Schweizer und bayrische Alpen. Körper 2″ 10‴, Schwanz 2″ 6‴. Der Schwanz ist länger als bei den andern deutschen Arten. Schwanz- und Kreuzwirbel zusammengerechnet bei S. alpinus 23, bei S. fodiens 22, bei S. vulgaris 20, bei S. araneus 19. Der Pelz ist dunkel schieferfarben, unten etwas lichter; der Schwanz oben schwärzlich, unten weißlich, die Füße weißgelblich.

5. S. vulgaris Linn., die gemeine Spitzmaus.

Sorex vulgaris. Linn. Mus. Ad. Fred. 10. — Rathus. Wiegm. Arch. IV. 1. S. 45. — Jenyns ann. of nat. hist. II. p. 329. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 56. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 183. — Nilss. skand. faun. I. p. 75. — Wibdenb. sibir. Reise Säugth. S. 76. — S. araneus. Linn. faun. suec. II. N. 24. — Nilss. illum. fig. H. 16. tab. 32. — Bonap. faun. ital. I. tab. 18. fig. 1, 2. — S. tetragonurus. Herm. tab. aff. 79. not. — Schreb. III. tab. 159. B. — Geoffr. ann. XVII. p. 177. — Is. Geoffr. dict. class. XI. p. 320. — S. Longch. microm. p. 18. — Amphis. tetragonurus. Duvern. mém. de Strasb. II. 3. p. 4; II. p. 19. tab. 1. fig. 2. — Jenyns ann. of nat. hist. I. p. 423; II. p. 326. — S. labiosus. Jenyns l. c. p. 326. — S. concinnus, rhinolophus, melanodon. Wagl. Isis 1832. S. 54.

Durch Frankreich, Deutschland, die Lombardei, England, Schweden, Galizien, Rußland und Sibirien bis zur Küste des ochotskischen Meeres und nordwärts bis zum 71° verbreitet. Körper 2″ 8‴, Schwanz 1″ 9‴. Oberseite dunkel röthlich-, oder kastanien- oder schwarzbraun, Unterseite graulichweiß.

* S. rusticus Jenyns; praecedenti simillimus, at minor, rostro pedibusque gracilioribus, cauda cylindrica pilis haud dense adpressis.

Sorex rusticus. Jenyns ann. of nat. hist. I. p. 423; VII. p. 263. — S. hibernicus. Jenyns l. c. — S. araneus. Jenyns Man. Brit. Vert. p. 17.

Gemein in Irland, nicht ganz so häufig in England. Körper 2″ $2\frac{1}{2}$‴, Schwanz 1″ 5‴. Von Jenyns beschrieben als sehr ähnlich dem S. vulgaris, aber kleiner, ganzer Körper mehr oder minder röthlich oder gelblich überlaufen, Schnauze und Füße schmächtiger, Schwanz fast cylin-

briſch, an der Spitze nicht verdünnt, wohl beſetzt mit Haaren, die bei Jungen ſehr abſtehen und niemals dicht anliegend ſind, (bei S. vulgaris dicht angedrückt, im Alter faſt nackt). — Scheint doch nur Abänderung von S. vulgaris zu ſeyn [1]).

6. S. pygmaeus Pall., die Zwerg-Spitzmaus; fusco-rufescens, subtus cinerascens; cauda longa crassiuscula, setoso-annulata, basi valde constricta, apice attenuata.

Sorex pygmaeus. Pall. zoogr. I. p. 134. tab. 10. fig. 4. — Glog. nov. act. Bonn. XIII. 2. p. 479. tab. 25. — Rathuſ. Wiegm. Archiv IV. 1. S. 46. — Jenyns ann. of nat. hist. II. p. 328. — S. Longch. microm. p. 21; faun. belge p. 26. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 60. — Steenſtrup, Iſis 1841. S. 903. — Bonap. faun. ital. tab. 19. fig. 1. — Nilss. skand. faun. I. p. 81. — S. minutus. Linn. XII. p. 74. — Schreb. III. S. 578. tab. 161. B. — S. exilis. Linn. Gm. XIII. p. 115. — S. pumilio. Wagler Iſis 1832. S. 54, 1218. — S. minimus. Geoffr. ann. XVII. p. 186. — S. Gmelini. Pall. zoogr. p. 135. tab. 10. fig. 3. — Wagn. Schreb. a. a. O. S. 69. — Blaſ. Bericht über die 19te Verſ. d. Naturf. S. 87. — ?S. rusticus. Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 184.

Vom Oberrhein und Belgien an durch Deutſchland, Dänemark, ſüdliches Schweden, Galizien bis zum Jeniſey in Sibirien verbreitet, und ſogar in Oran (Algerien) vorkommend. Körper 1″ 8‴, Schwanz ohne Haare 1″ 4‴. Kleiner als S. vulgaris, aber Rüſſel und Schwanz verhältnißmäßig länger. Der Schwanz iſt rund, an der Wurzel ſehr eingeſchnürt, wird dann dicker und verſchmächtigt ſich wieder an der Spitze; er iſt allenthalben behaart ohne die Ringe zu verdecken, die Haare an der Schwanzwurzel ſehr fein, dann länger werdend, an der Spitze 2‴. Oben röthlichgrau oder röthlichbraun, nach unten ins licht Graulichе ziehend, am Kinn oder auch an der Kehle ins Weißliche verlaufend. — Ob Hodgſon's S. pymaeus (ann. of nat. hist. XV. p. 269) mit dem von Pallas identiſch iſt, bleibt ganz ungewiß.

---

1) Noch hat Bonaparte (faun. ital. tab. 18. fig. 4) einen S. Antinorii nach einem ausgeſtopften Exemplare unbekannter Heimath aufgeſtellt, der ſich durch ſeinen längern Schwanz und gelbliche Zimmtfarbe von S. vulgaris unterſcheidet. Körper 1″ 11‴, Schwanz 2″.

*S. pumilus Nilss.

Sorex pumilus. Nilss. skand. faun. I. p. 85; Hornſch. Archiv ſtand. Beitr. I. S. 145.

Nur nach einem, in Schonen gefundenen Exemplare bekannt. Körper 1" 4½"', Schwanzrübe 1" 2½"' ſchw. M. Noch kleiner als S. etruscus, Kopf beinahe ſo lang als der übrige Körper; Schwanz dünn, mit längeren Haaren beſetzt, zwiſchen welchen keine kleineren vorkommen, und in einen ſpitzen Haarpinſel geendigt; Pelz oben roſtig graubraun, unten weiß. — Bedarf weiterer Vergleichungen.

7. S. nigrescens Gray, die ſchwärzliche Spitzmaus; nigrescens, rufo-tinctus, subtus pallide rufescens.

Corsira nigrescens. Gray ann. of nat. hist. X. p. 261. — S. seccatus. Hodgs. ann. of nat. hist. XV. p. 270.

Indien. Körper 3" 6"', Schwanz 1" 4"'. Schwärzlich bleifarben mit Roth überlaufen; Kinn und Unterſeite blaß und viel mehr roth, Schnurren dunkel, Füße und Schwanz ziemlich nackt, geſchuppt, Krallen und Zähne weiß, letztere an der Spitze braun.

††) species americanae.

8. S. Richardsoni Bachm., die Richardſon'ſche Spitzmaus; supra ferrugineo-fuscus, subtus cinereus.

Sorex Richardsoni. Bachm. journ. of the Acad. of Philadelph. VII. p. 373. tab. 23. fig. 3. — De Kay zool. of New-York I. p. 21. — Audub. Bachm. quadrup. III. p. 334. — S. parvus. Richards. faun. I. p. 8. (theilw.). — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 64.

Nordweſtliches Amerika. Körper 2" 9"', Schwanz 1" 9"'. Oben dunkel roſtbraun, unten grau, Füße und Nägel lichtbraun. Ich hatte ſchon a. a. O. bemerklich gemacht, daß Richardſon's S. parvus nicht mit dem von Say identiſch ſeyn könne; Bachman hat nun erſteren als S. Richardsonii von letzterem abgeſondert.

9. S. Forsteri Rich., die Forſter'ſche Spitzmaus; supra fuscus, subtus cinereus aut dilute brunneus; cauda fere trunci longitudine.

Sorex Forsteri. Richards. faun. I. p. 6. — Gapper zool. journ. V. p. 201. tab. 7. — Gray proceed. V. p. 124. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 63. — Bachm. journ. of Philad. VII. p. 386. tab. 24. fig. 6. — De Kay zool. of New York I. p. 20. tab. 21. fig. 3. — Audub. Bachm. quadrup. III. p. 310.

Von den Vereinigten Staaten an nordwärts bis zum 67. Breitengrade. Körper 2″ 3‴, Schwanz 1″ 3‴. Haare der Oberseite dunkel aschgrau mit braunen Spitzen, Unterseite hell aschfarbig, Schwanz oben dunkelbraun, unten schmutzig weißlich, Füße fleischfarbig, Nägel weiß. Richardson nennt die Farbe oben graulich- oder nelkenbraun, unten schmutzig gelblichbraun.

10. S. longirostris Bachm., die langnasige Spitzmaus; supra castaneus, subtus dilutior, auriculis prominulis.

Sorex longirostris. Bachm. journ. of Philadelph. VII. (1837) p. 370. tab. 23. fig. 2. — Audub. Bachm. quadrup. III. p. 249. tab. 150. fig. 3. (unkenntlich verkleinert). — Otisorex longirostris. De Kay zool. of New York I. p. 23.

Südcarolina, Neu-York, Neuengland. Nach Audubon's Beschreibung ragen die Ohren beträchtlich über den Pelz hervor. Der Pelz ist oben einfarbig kastanienbraun, unten um einen Ton lichter, die Nägel weiß mit schwarzer Spitze.

Körper	$1\frac{7}{8}$″	Ohren	$\frac{1}{4}$″
Schwanz	1	Hinterfuß	$\frac{3}{8}$

Ein unter dem Namen S. longirostris der hiesigen Sammlung zugekommenes Exemplar ist oben rostig kastanienbraun, unten gelblich grauweiß; der Schwanz ist eben so gefärbt, mit feinen Haaren besetzt, die am Ende einen längern spitzen Pinsel bilden, die Füße und Nägel sind weißlich, die Ohren ganz unter dem Pelze versteckt. Der Körper mißt 1″ 10‴, der Schwanz ohne Pinsel 1″ 1‴. Durch die ganz versteckten Ohren scheint sich dieses Exemplar sowohl von S. longirostris als S. platyrhinus zu unterscheiden.

*** S. platyrrhinus De Kay, die breitnasige Spitzmaus; obscure fuscus, subtus cinereus, cauda corpore dimidio longiore.**

Otisorex platyrhinus. De Kay zool. of New York I. p. 22. tab. 5. fig. 1.

Neu-York. Körper 2. 5″, Schwanz 1. 6‴. — Die Schnautze ist flach gedrückt, die Ohren sind ziemlich groß, der Schwanz zugespitzt, dünn behaart; Zähne 32. Oben dunkelgrau, schwach mit trüb Roth überlau-

fen, zumal auf der Oberſeite der Schnautze und Untertheil des Nackens; Unterleib aſchgrau. Nach De Kay von S. longirostris durch Färbung, erheblichere Größe und verhältnißmäßig längeren Schwanz verſchieden; nach Audubon mit dieſer Art identiſch.

11. S. personatus Geoffr., die maskirte Spitzmaus; fusco-rufescens, subtus griseus, rostri apice supra nigro-fusco; cauda longitudine dimidii corporis.

Sorex personatus. Is. Geoffr. mag. de zool. 1833. tab. 14.

Vereinigte Staaten. Körper 2", Schwanz 1". Dieſe Art beruht ganz auf der von Is. Geoffroy gegebenen kurzen Charakteriſtik. Die Farbe iſt oben rothbraun, unten grau, der Vordertheil der Schnautze, mit Ausnahme der Lippen, iſt ſchwärzlichbraun; der Schwanz oben braun, unten, gleich den Füßen, blaß gelblich. — Bei unſerem S. longirostris iſt die Schnautze mit dem Rücken gleichfarbig.

12. S. Lesueurii Duvern., die aſchgraue Spitzmaus; cineraceus, subtus dilutior; cauda supra nigro-cinerea, subtus pallida; labiis albidis.

Amphisorex Lesueurii. Duvernoy, magas. de zool. 1842. p. 33. tab. 50.

Vereinigte Staaten am Wabaſch-Fluß. Körper- und Schwanzlänge ohngefähr wie bei unſerem, dem S. longirostris zugeſchriebenen Exemplare, aber die Färbung ſehr verſchieden, nämlich oben ziemlich dunkel aſchgrau, was nach unten lichter wird. Der Schwanz iſt oben ſchwärzlichgrau, unten blaß; die Lippen und ein ſchiefer Streif unter dem Auge ſind weiß.

b) cauda capite breviore. — Brachysorex Duv., Blarina Gray.

13. S. Dekayi Bachm., die blaugraue Spitzmaus; coeruleo-cinereus, subtus pallidior; mento brunneo.

Sorex Dekayi. Bachm. journ. of Philad. VII. p. 377. tab. 23. fig. 4. — De Kay, zool. of New York I. p. 17. tab. 5. fig. 2. — Audub. Bachm. quadrup. III. p. 246. tab. 150. fig. 2. (unkenntlich).

Vereinigte Staaten von Maſſachuſetts bis Virginien. Körper 4. 8", Schwanz ohne Haare 0. 8"; bei einem andern Exemplare Körper 3. 5, Schwanz 0. 7. Nach De Kay ſind nur 30, nach Bachman richtiger 32 Zähne vorhanden. Der Schwanz iſt ſehr dünn, faſt quadratiſch, mit

angedrückten Haaren am Ende schwach gepinselt. Der Pelz ist einförmig dunkel blaulich oder schieferfarbig, unten etwas lichter, Kinn und Nase lichtbraun, Füße röthlichbraun. — Audubon bezeichnet die Farbe der Oberseite als rostig gelbgrau, die der Unterseite um einen Ton heller.

14. S. brevicaudus Say, die kurzschnauzige Spitzmaus; fuliginoso-fuscus, subtus cinerascens; rostro caudaque abbreviatis.

Sorex brevicaudus. Say, Longs exped. I. p. 174. — Harlan faun. americ. p. 29. — Is. Geoffr. dict. class. XI. p. 320. — Bachm. journ. of Philad. VII. p. 381. — De Kay zool. of New York I. p. 18. — Audub. Bachm. quadrup. III. p. 335. — Brachysorex brevicaudatus. Duvern. mag. de zool. 1842. p. 38. tab. 52. — S. talpoides. Gapper zool. journ. V. 1. 202. tab. 8. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 62. — Corsira (Blarina) talpoides. Gray proceed. V. p. 124.

Nördliche vereinigte Staaten und Oberkanada. Nach Say mißt der Körper 3⅛", Schwanz 1"; nach Gapper 4¼", Schwanz 1". Zähne sind 32 vorhanden mit 5 obern Lückenzähnen. Duvernoy nennt die Färbung schwarzgrau ins Dunkelbraune übergehend, unten heller, dabei der Pelz glänzend wie der des Maulwurfs; Füße braun behaart, Nägel weißlich; Rüssel auffallend kurz. Zwei Exemplare der hiesigen Sammlung kommen mit dieser Beschreibung überein.

15. S. parvus Say, die Stummel-Spitzmaus; cano-fuscus, subtus cineraceus, cauda brevi.

Sorex parvus. Say Longs expedit. p. 163. — Harlan faun. americ. p. 28. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 64. — De Kay, zool. of New York I. p. 19. — Audub. Bachm. quadrup. II. p. 145. tab. 70.

Vom Missuri und Connecticut an nordwärts bis vielleicht zur Behringstraße verbreitet. Nach Say mißt der Körper 2⅜", Schwanz ¾", nach Collie 2" 4"' und 1", nach Dekay 2" und 0,75"; der Schwanz ist also verhältnißmäßig länger als bei S. brevicaudus. Oben ist die Farbe graubraun, unten grau; Füße, Nägel und Unterseite des Schwanzes sind weißlich. Richardson's S. parvus ist ganz verschieden von diesem und unter N. 8 als S. Richardsonii aufgeführt. — Nach Audubon sind 32 Zähne vorhanden mit 5 oberen Lückenzähnen; die

Zahnspitzen sind tief schwarz. Die Farbe giebt er an: oben aschbraun, unten um einen Ton lichter.

16. S. Harlani Duvern., die Harlan'sche Spitzmaus; griseo-rufescens, subtus pure griseus; cauda brevi, dentibus intermediis supra 4.

Brachysorex Harlani. Duvern. magas. de zool. 1842. p. 40. tab. 53.

Am Wabasch. Körper 2" 2‴, Schwanz 6‴. Lediglich aus der Beschreibung von Duvernoy gekannt. Die Färbung ist ähnlich der von S. araneus, oben grau mit röthlichem Anflug, unten rein grau. Die Zähne sind minder und nicht so dunkel gefärbt wie bei S. brevicaudus, auch sind nicht mehr als 4 Zwischenzähne oben vorhanden. Scheint von S. parvus verschieden zu seyn.

c) auriculis externis nullis, dentibus 36. — Anotus.

17. S. carolinensis Bachm., die karolinische Spitzmaus; unicolor ferreo-griseus, cauda vix longitudine capitis dimidii, auriculis nullis, dentibus 36.

Sorex carolinensis. Bachm. journ. of Philad. VII. p. 366. tab. 23. fig. I. — De Kay zool. of New York I. p. 21. tab. 21. fig. 2. — Audub. Bachm. quadrup. II. p. 176. tab. 75.

Vereinigte Staaten. Körper 4", Schwanz 0,4", Kopf 1". Bachman giebt $\frac{3}{1}$ Schneidezähne und $\frac{14}{14}$ Backenzähne = 36 Zähne an, die alle an der Spitze dunkel gefärbt sind, wobei Dekay bemerkt, daß die Anzahl noch größer sey; ferner berichten Beide, daß kein äußeres Ohr, sondern nur die Gehöröffnung vorhanden ist; Merkmale, die allerdings eine Absonderung dieser Art von den übrigen Gruppen der Spitzmäuse erheischen. Uebrigens ist die Schnautze lang, die Füße spärlich behaart, der Schwanz flach, mit kleinem Pinsel an der Spitze; der Pelz auf der Oberfläche einförmig und glänzend eisengrau, am Grunde schieferfarbig[1]).

---

1) Noch hat Bachman 2 nordamerikanische Arten charakterisirt, die ich jedoch nur aus den kurzen Notizen von De Kay (l. c. S. 21) kenne und deshalb nicht in die Reihenfolge einzuschalten weiß. a) Sorex cinereus, oben dunkel eisengrau, unten silbergrau; Zähne 26 (!), Länge 3. 3". Carolina. — b) Sorex Cooperi, dunkelbraun, unten aschfarbig, Nase lang und zugespitzt, Schwanz so lang als Kopf und Rumpf; ganze Länge 3. 5". N. M. Territorium; das kleinste (?) bis jetzt in den

Eine genauere Beschreibung dieser von allen andern sehr verschiedenen Art hat neuerdings Audubon geliefert. Nach seinen Angaben sind 34 Zähne vorhanden, die er also vertheilt: mittlere Schneidezähne $\frac{2}{2}$, seitliche Schneidezähne $\frac{1}{1}$:$\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{5}{5}$:$\frac{5}{5}$. Der Ueberschuß würde also auf die obern Zähne fallen, von denen Audubon Folgendes sagt: die 3 seitlichen Schneidezähne sind die größten, der hintere sehr klein, der erste und fünfte Backenzahn am kleinsten, die drei andern fast gleich. Aeußere Ohren sind nicht sichtlich, auch wenn die Haare entfernt werden. Die Augenöffnung ist so klein, daß sie nur mit einem Vergrößerungsglas aufgefunden werden kann. Der Schwanz ist flach, dicht behaart mit einem kurzen Pinsel. Die Vorderfüße sind verhältnißmäßig breit. Die Färbung ist fast einförmig glänzend und dunkel eisengrau, unten um einen Ton lichter, auf dem Kopf merklich dunkler.

Körper	3″	Kopf	1″
Schwanz	$\frac{5}{8}$	Hinterfuß	$\frac{1}{2}$

Wäre das Gebiß mit wissenschaftlicher Bestimmtheit beschrieben, so könnte man sich veranlaßt sehen, aus diesem S. carolinensis eine besondere Untergattung zu errichten.

3. Subgen. Crocidura Wagl. (Sorex Duv.).

Dentes toti albi, 28 aut 30, intermedii superiores utrinque 3 aut 4, primores inferiores integerrimi; cauda brevipilosa pilis longioribus patentibus, retrorsum versis instructa. — Alle Arten ausschließlich der alten Welt angehörig.

a) dentibus intermediis supra 4, cauda basi plus minus incrassata. — Pachyura Selys.

†) species maximae. — Südasien und Afrika.

18. S. coerulescens Shaw, die Riesen-Spitzmaus; pallide ci-

Vereinigten Staaten bekannte Säugthier. — Letztere Art ist zwar in Audub. Bachm. quadrup. III. p. 311 aufgeführt, aber nicht vollständig beschrieben. Das Gebiß ist nicht angegeben, dagegen erfahren wir, daß das äußere Ohr ganz fehlt. Die Füße sind grau, der Schwanz oben braun, unten silbergrau. Der Körper mißt nach Audubon $1\frac{3}{8}$″, der Schwanz eben so viel. — Auffallend ist es, daß in Audub. Bachm. quadrup. der S. cinereus nicht aufgenommen worden ist.

nerascens, interdum supra flavido-lavatus; cauda fere dimidii corporis longitudine, basi valde tumida; membranis nudis pallide carneis.

Sorex coerulescens. Shaw zool. I. 2. p. 533. — Raffl. Linn. transact. XIII. p. 255. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 69. — S. Pilorides. Mus. Lever. I. p. 31. tab. 8. — Parfuming Shrew. Pennant quadr. 2. p. 222. — S. giganteus. Temm. faun. japon. I. p. 25. — Is. Geoffr. mém. du mus. XV. p. 137. tab. 4. fig. 3; dict. class. XI. p. 326; Belang. voy. zool. p. 117. — Lichtenst. Verh. d. Gesellsch. naturf. Fr. 1829. S. 387. — Sykes proceed. I. (1830) p. 99. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. verh. 1842. p. 175. — ?Monjourou (S. indicus). Fr. Cuv. mamm. II.

Vorderindien, woher wir mehrere Exemplare aus der Lamare Picquot'schen Sammlung erhalten haben. Der Körper hat an unserem kleinsten Exemplare eine Länge von 7″ 1‴, der Schwanz 3″ 6‴; am größten mißt der Körper fast 9″. Oben finden sich 4 Zwischenzähne, wovon die mittlern fast gleich sind. Der Schwanz ist an den ganz großen Exemplaren etwas kürzer als an den kleinern, an der Wurzel überaus dick, fast in einer Flucht mit dem Hinterleib verlaufend und an der Basis mit dem Rückenpelz noch überzogen. Die Farbe ist licht aschgraulich, schwach ins Schieferblauliche spielend, manche Individuen auf der Oberseite schmutzig rostgelb überlaufen; der Schwanz ist mit weißen Haaren besetzt; die Haut hellgelblich, im Leben licht fleischfarbig. Hodgson's S. murinus (ann. of nat. hist. XV. p. 269) könnte vielleicht als jüngeres Thier hieher gehören.

19. S. myosuros Pall., die dunkle Spitzmaus; obscure fusco-cinereus, supra fulvido-lavatus; cauda longitudine dimidii corporis, fere tetragona, basi crassiuscula.

Sorex myosuros. Pall. act. acad. Petrop. 1781. 2. p. 337. tab. 4. — ?Geoffr. ann. d. mus. XVII. p. 185. tab. 3. fig. 2, 3. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 72. — S. Müll. verhandel. I. p. 26. — S. murinus. Linn. XII. p. 74. — Schreb. III. S. 576. — Is. Geoffr. voy. de Bélang. zool. I. p. 124. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 191. — S. indicus. Geoffr. l. c. p. 183; mém. d. mus. I. p. 309. tab. 15. fig. 1. — Temm. faun. japon. I. p. 25. tab. 5. fig. 2. (Thier), 4. fig. b. b. (Schädel). — S. capensis. Geoffr. ann. XVII. p. 184. — S. Sonneratii. Is. Geoffr. mém. du mus. XV. p. 132; voy. de Belang. p. 109. — Duvern. magas. de zool. 1842. p. 27. tab. 46. — Musaraigne musquée de l'Inde. Buff. suppl. VII. p. 281. tab. 71.

Bewohnt nach Temminck Südafrika?, den indischen Archipel und Japan. S. Müller hat sie auf allen von ihm besuchten indischen Inseln, Cantor auch auf der malayischen Halbinsel getroffen; sie kommt aber auch in Vorderindien und Nepal[1]) vor. Nach der Charakteristik von Temminck mißt der Körper 5″, der Schwanz 2″ 6‴; oben sind 4 Zwischenzähne vorhanden, Schwanz mehr vierkantig als rund, an der Wurzel nicht behaart und von gleicher Dicke. Der Pelz ist oben dunkel braungrau, die äußersten Haarspitzen nur in der Jugend schwach röthlichbraun, die Unterseite dunkel grau. Mitunter giebt es Albinos; die japanischen Exemplare haben einen etwas dunklern Ton als die javanischen. Schon Pallas hat von dieser Art ein dunkles und ein weißes Individuum charakterisirt. Geoffroy's S. Sonneratii ist noch ein sehr junges Thier.

* S. Griffithi Horsf., die afghanische Spitzmaus; unicolor nigro-fuscus, vellere brevi molli.

Sorex Griffithi. Horsf. catal. East. Ind. Comp. p. 134.

Horsfield unterscheidet diese aus Afghanistan stammende Spitzmaus von S. murinus durch die einförmig schwärzlichbraune, schwach ins Röthliche schillernde Färbung und durch den kurzen, weichen und anliegenden Pelz. Der Schwanz ist an der Wurzel dick und nach der ganzen Länge mit einzelnen längeren Haaren besetzt; die Ohren sind klein und gerundet. Körper 5¾″, Schnautze 2½″. — Scheint mir nur eine ganz dunkle Abänderung von S. myosuros zu seyn.

20. S. serpentarius Is. Geoffr., die rattenschwänzige Spitzmaus; cineraceus, supra flavido-lavatus; cauda longitudine dimidii corporis, rattiformi, basi haud pilosa.

Sorex serpentarius. Is. Geoffr. voy de Bélang. zool. p. 119. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 71. — Temm. faun. japon. I. p. 26.

Nach Is. Geoffroy Pondichery und Ile de France, nach Temminck auch Bengalen angehörig. Nach Letzterem mißt der Körper 5″

1) Hodgson's S. nemorivagus (ann. XV. p. 269) aus Nepal wird von Gray (Hodgs. catal. p. 16) als ein halbwüchsiger S. murinus erklärt.

5‴, der Schwanz 2″ 9‴; Zwischenzähne finden sich oben 4. Der Schwanz ist nicht dicker als der der Ratten, an der Wurzel nicht behaart und von gleicher Dicke. Nach den Angaben von Is. Geoffroy ist der Pelz aschgrau, oben röthlich gewässert, unten hellgrau; das Grau reiner als bei S. Sonneratii, der Schwanz schmächtig, eher vierkantig als abgerundet, mehr als ½ der ganzen Länge ausmachend; der Körper mißt 3″ 11‴, der Schwanz 2″ 1‴ (also noch junges Exemplar). — Ein Exemplar der hiesigen Sammlung kommt in der Zahl der Zwischenzähne und der Färbung mit diesen Angaben überein; sein Körper mißt 4″ 9‴, der Schwanz 2″ 1‴.

21. S. crassicaudus Ehr., die dickschwänzige Spitzmaus; pallide cinereus; cauda longitudine dimidii corporis, robusta, basi incrassata pilosa.

Sorex crassicaudus. Lichtenst. Verh. d. Gesellsch. naturf. Fr. 1829. S. 386; Darstell. neuer Säugth. tab. 40. fig. 1. — Duvern. mém. de Strasb. II. 3 suppl. p. 3; magas. de zool. p. 23. tab. 44. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 75. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 176, 178. — Temm. faun. japon. I. p. 26. — Suncus sacer. Ehrenb. symb. phys. dec. II. — S. giganteus. Duvern. magas. p. 25. tab. 45.

Aegypten (um Suez), Oberägypten und die arabische Westküste. Der Körper mißt nach Lichtenstein 5″ 6‴, der Schwanz 2″ 9‴; nach unserem Exemplare 5″ 4‴ und 2″ 5‴. Ehrenberg, Temminck und Duvernoy geben nur 3 obere Zwischenzähne an, und da Letzterer an einem andern Exemplare 4 ursprüngliche wahrnahm, so wollte er in diesem den S. giganteus Is. Geoffr. sehen. Allein schon der Umstand, daß bei diesem Exemplare rechts der dritte und links der vierte dieser Zähne fehlte, ließ vermuthen, daß bei den andern der Mangel auf ähnliche Weise möchte entstanden seyn, und wirklich sind am Lichtenstein'schen Original-Exemplare die 4 Zwischenzähne vollständig erhalten. Der Schwanz ist an der Wurzel sehr dick und verläuft in einer Flucht mit dem Hinterleib, der Pelz ist licht aschfarbig, zuweilen auf dem Rücken mit einem leichten rostbräunlichen Anflug [1]).

1) Der S. religiosus Is. Geoffr., der in verschiedenen altägyptischen Gräbern gefunden wurde, ist, wie Sundevall mit Recht vermuthet, identisch mit S. crassicaudus.

††) species minimae.

22. S. etruscus Sav., die toskaniſche Spitzmaus; supra e rufescente cinereus, subtus dilute griseus; auriculis majusculis.

Sorex etruscus. Savi nuov. giornal. de lett. N. 1. p. 60. tab. 5. — Wagn. Schreb. Supplem. II, S. 67. — Wagl. Iſis 1832. S. 275. — Rathuſ. Wiegm. Archiv IV. 1. S. 45. — S. Longch. microm. p. 32. — Duvern. magas. de zool. 1842. p. 41. tab. 54. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 175. — Coquerel ann. des scienc. nat. 3. sér. IX. p. 195. tab. 11. fig. 2. (Schädel). — Pachyura etrusca. Bonap. faun. ital. tab. 19. fig. 2. — S. suaveolens. Pall. zoogr. I. p. 133. — Rathke, mém. de Pétersb. III. p. 295. — Wagn. a. a. O. S. 68. — Blaſius Bericht über die 19. Verſ. d. Naturf. S. 87.

Südfrankreich, Italien, Krimm und Algier. Körper 1″ 7 bis 10‴, Schwanz 11 bis 12‴. Vier obere Zwiſchenzähne, wovon der 2te und 3te gleich ſind; Ohren ſehr entwickelt, Schwanz ziemlich dick; keine Seitendrüſe. Oben grau mit Röthlich überlaufen, unten hellgrau; Schwanzhärchen oben braun, unten lichter, die längern Haare weißlich.

23. S. Perrotteti Duv., die indiſche Zwergſpitzmaus; supra nigricans, subtus pallidior; auriculis majusculis.

Sorex Perrotteti. Duvern. magas. de zool. 1842. p. 29. tab. 47. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 175.

Wurde von dem Botaniker Perrottet in den Nyl-Gherrys in Indien in einer Höhe von faſt 7000 Fuß entdeckt. Gebiß und Ohren ſind wie bei S. etruscus. Körper 1″ 5‴, Schwanz 11‴. Der Pelz iſt dunkelbraun, oben und an den Seiten ſchwärzlich, unten mit grauem Tone. Die Hinterfüße ſind mit braunen Haaren beſetzt, die an den vordern lichter ſind.

24. S. gracilis Blainv., die afrikaniſche Zwergſpitzmaus; obscure fuscus, ventre sensim albido; auriculis majusculis.

Sorex gracilis. Blainv. ann. d. sc. nat. 2. sér. X. p. 120; ann. etrang. II. tab. 14. fig. 8. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 175. — Coquerel, ann. d. sc. nat. 3. sér. IX. p. 193. tab. 11. fig. 3. (Schädel).

Blainville erwähnte dieſe, aus der Kapkolonie herrührende Art zuerſt, ohne jedoch von ihr eine Beſchreibung zu liefern, was durch Coquerel geſchah. Der Körper mißt 1″ 7‴, der Schwanz 1″. Von

den 4 Zwiſchenzähnen iſt der 2te kleiner als der 3te; die Ohren ſind groß, aber die innern Klappen viel kleiner als bei S. etruscus und S. madagascariensis; der Schwanz iſt an der Wurzel ſehr dick. Die Farbe iſt oben dunkel kaſtanienbraun, was an den Seiten und Wangen lichter wird; die Unterſeite iſt graulich, an der Bruſt etwas dunkler als am Bauch; Schwanz und Füße ſind lichtbraun.

25. S. madagascariensis Coq., die madagaskariſche Spitzmaus; fusco-griseus, subtus pallidior; auriculis majusculis.

Sorex madagascariensis. COQUEREL ann. des sc. nat. 3 sér. IX. p. 193. tab. 11. fig. 1. (Thier mit Schädel).

Wurde vom Schiffschirurgen Coquerel an der Nordoſtküſte von Madagaskar entdeckt. Der Körper iſt 1″ 6½‴, der Schwanz 12¼‴, lang. Der Leib iſt ſehr ſchlank und ſchmächtig, der Pelz dicht und glänzend, die nackten Ohren groß mit ſehr entwickelten innern Klappen; Zwiſchenzähne ſind 4 vorhanden; der Schwanz iſt dünn und ſchmächtig, kurz behaart mit einigen längern feinern Haaren wie bei den verwandten Arten. Die Farbe iſt bräunlichgrau, was auf der Oberſeite etwas dunkler iſt; die Schnurrhaare ſind weiß, bei den längſten am Grunde ſchwarz; die Nägel ſind bräunlich.

b) dentibus intermediis supra 3, cauda crassiuscula elongato-conica.

26. S. Hedenborgi Sund., die kaffebraune Spitzmaus; unicolor umbrino-castaneus; nitore aeneo.

Sorex Hedenborgi. SUNDEV. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 171, 177. — Schreb. tab. CLX. B. — S. indicus var. cinereo-aenea. Rüppell, Mus. Senckenb. III. p. 133.

Von Hedenborg und Kotſchy im Sennaar aufgefunden; meine Charakteriſtik iſt nach einem Exemplare des Letzteren entworfen. Körper 6″ 2‴, Schwanz 2″ 6‴; nach Sundevall 5″ 2‴ und 2″. Oben finden ſich 3 Zwiſchenzähne, wovon der letzte etwas kleiner als der mittlere iſt; die Ohren ſind groß; der Rüſſel iſt in eine ſtark eingekerbte Spitze vorgeſtreckt. Der Pelz iſt weich, dicht anliegend, hinter der Mitte der Leibesſeite mit einer 5‴ langen Quervertiefung, ohne Zweifel Sitz der Moſchusdrüſe. Die Farbe iſt einförmig umber- oder kaffebohnenbraun mit metalliſchem Schimmer; die Unterſeite kaum lichter als die obere; der

Schwanz und zum Theil die Füße sind dunkler. Ohren und Sohlen sind dunkel, die Schnurren schwärzlich mit etwas lichtern Spitzen, die Nägel hornfarbig. — Rüppell's S. indicus var. cinereo-aenea wird von Sundevall zu S. sericeus gezogen, allein Größe und Färbung scheinen eher für S. Hedenborgi zu sprechen.

27. S. sericeus Hedenb., die Seiden-Spitzmaus; supra pallide cinnamomeo-brunescens, subtus cinereus, nitidus; auriculis nudis.

Sorex sericeus. Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 171, 177.

Sennaar und Kordofan. Der Körper eines von Kotschy mitgebrachten Exemplares, wornach ich die nachfolgenden Notizen mittheile, mißt 3" 3‴, der Schwanz 1" 9‴; nach Sundevall 3" 4‴ und 1" 9‴.

Oben stehen 3 Zwischenzähne, von denen der dritte eben so groß als der mittlere ist. Die Schnautze ist lang und spitz, der Schwanz an der Wurzel dicker als der Mittelfuß. Die Farbe auf der Oberseite ist licht zimmtbräunlich, an den Seiten und dem ganzen Unterleib aschgrau, auf letzterem etwas gelblichweiß überlaufen. Ohren und Sohlen sind licht fleischfarbig, die Füße schmutzig weißlich behaart.

28. S. fulvaster Sund., die lichtfalbige Spitzmaus; pallide griseo-fulvescens, subtus cinereo-albus; cauda longitudine dimidii corporis, auriculis intus villosis.

Sorex fulvaster. Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 172, 178.

Sennaar. Körper 3" 4‴, Schwanz 1" 8‴. Von den 3 obern Zwischenzähnen sind die beiden letzten gleich, die Ohrklappen innen zottig behaart. Die Färbung ist ähnlich der des S. flavescens, aber heller, glänzender und mit gleichfarbiger Nase.

29. S. flavescens Is. Geoffr., die falbe Spitzmaus; fulvescens, subtus griseus; cauda tertiam corporis partem aequante, auriculis intus villosis.

Sorex flavescens. Is. Geoffr. mém. du mus. XV. p. 126; magas. de zool. 1833. tab. 13. — Duvern. mém. de Strasb. II. 3. suppl. p. 3. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 74. — Bonap. faun. ital. tab. 19. fig. 4. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 178. — A. Smith zool. of South Afr. I. tab. 45. fig. 2.

Kaffern- und Hottentotten-Land. Nach Is. Geoffroy mißt der Körper

4½", der Schwanz 1½"; der Kopf ist sehr gestreckt, alle Zähne sind weiß; die Farbe ist oben isabellgelb (roux blond), unten hellgrau, auf der Nase verläuft eine braune Längslinie, der Schwanz ist oben licht röthlichgrau. — A. Smith giebt die Länge zu 4" 4‴ und 1" 9‴ an, die Entfernung vom Auge bis zur Nasenspitze zu 7½‴, den Pelz als kurz, steif und dicht anliegend.

30. S. capensis Smith (nec Geoffr.), die haftnasige Spitzmaus; supra fuscescens, subtus cinereus, flavido-lavatus; cauda tertiam corporis partem aequante, rostro antice integro.

Sorex capensis. A. Smith zool. of South Afr. I. tab. 45. fig. 1.

Kapkolonie. Körper 4", Schwanz 1" 5‴, vom Auge zur Nasenspitze 5½‴. Gebiß unbekannt. Die Schnautzenspitze ist nicht wie bei voriger und den meisten andern Arten ausgeschnitten, sondern ganz. Die Farbe der ganzen Oberseite ist zwischen broccoli- und kastanienbraun, die Unterseite zwischen asch- und gelblichgrau, die Schnautze bräunlichroth. Von S. flavescens durch die ungetheilte Rüsselspitze, den kürzeren Kopf und die Färbung verschieden. — Vielleicht gehört Sundevall's S. flavescens mit 3 Zwischenzähnen eher zu dieser als zur vorigen Art, da er die Rüsselspitze kaum gespalten nennt.

31. S. hirtus Pet., die rauhe Spitzmaus; cinnamomeus, subtus flavido-canus, rostri latere fusco, cauda corpore dimidio longiore.

Crocidura hirta. Peters Mossamb. I. S. 78. tab. 18. fig. 2.

Diese und die drei folgenden Arten wurden von Peters in Mossambique entdeckt und haben viel Aehnlichkeit unter sich wie mit einigen andern Species dieser Abtheilung. Unter ihnen ist S. hirtus die größte Art, etwa so groß wie S. fodiens. Die Ohren sind vorragend, an den Rändern und der vorspringenden Falte etwas behaart; die Nasenkuppe ist tief gespalten. Die Behaarung ist kurz und etwas rauh; der Schwanz an der Wurzel sehr dick. Zähne sind jederseits oben 8, unten 9, also im Ganzen 28 vorhanden. — Die Farbe ist oben zimmetbraun, unten gelblichgrau; alle Haare am Grunde schieferfarbig. Längs den Seiten des Rüssels und durch die Oberlippe bis zum Auge geht ein dunkler Streif. Der Schwanz ist von der Farbe des Körpers, oben braun, unten grau; die Nägel sind schmutzig weiß.

Körper	3″ 3‴	Ohren	0″ 4‴
Schwanz . . .	2 ½	Hinterfuß . . .	0 6½

Bei Tette in Moſſambique gefunden.

32. S. sacralis Pet., die kreuzfleckige Spitzmaus; dilute cinnamomeus, subtus albo-canescens; macula sacrali fusca, cauda longitudine dimidii corporis.

Crocidura sacralis. Peters Moſſamb. I. S. 82. tab. 18. fig. 3.

Der Pelz iſt etwas weicher, der Schwanz ebenfalls an der Wurzel verdickt, die Zähne in derſelben Anzahl. Die Oberſeite iſt blaß bräunlichgelb, zimmtfarbig, die Unterſeite weißgrau, die Kreuzgegend durch einen dunkelbraunen Fleck ausgezeichnet. Der Schwanz iſt oben bräunlichgelb, unten weißgrau.

Körper	2″ 7‴	Ohren	0″ 3‴
Schwanz	1 4½	Hinterfuß . . .	0 6

Peters erhielt nur ein einziges Exemplar, ein junges Weibchen von der Halbinſel Cabaceira unter 15° ſ. Breite.

33. S. canescens Pet., die ſchieferbraune Spitzmaus; cinereo-fuscus, subtus cinereus, ingluvie flavescente, cauda longitudine dimidii corporis.

Crocidura canescens. Peters Moſſamb. I. S. 83. tab. 18. fig. 4.

Die Ohren ſind mit Haaren bewimpert, die Behaarung iſt fein und weich, der Schwanz anfangs ſehr dick, die Zähne wie bei den beiden vorigen Arten. Die Farbe iſt oben dunkel graubraun und an den Seiten mehr braungrau, was allmählich in das Weißlichgrau des Unterleibs übergeht. Die Unterkinngegend iſt bräunlichgelb, die Schnurren weiß, am Grunde braun, die Hände weißgrau, die Füße blaßbräunlich, die Nägel ſchmutzig weiß. Der Schwanz oben und unten gleichfarbig, heller braun als der Körper.

Körper	3″ 0‴	Ohren	0″ 4‴
Schwanz . . .	1 6	Hinterfuß . . .	0 0

Wurde von Peters bei Tette gefunden und unterſcheidet ſich von S. sericeus durch die Bewimperung der Ohren und durch die vierkantigen Schwanzwirbel.

34. S. annellatus Pet., die geringelte Spitzmaus; cinnamomeus, pilis albido-annulatis, subtus cano-flavescens, cauda dimidio corpore longiore.

Crocidura annellata. Peters Mossamb. I. S. 83. tab. 18. fig. 5.

Die Ohren sind kurz behaart, am Rande mit längeren steifen Haaren versehen, die Behaarung ist viel länger als bei S. hirtus, die vordern Nägel sind etwas kürzer als die hintern, die Zähne wie bei diesem. Die Oberseite erscheint gesprenkelt, indem die am Grunde schieferfarbigen und an der Spitze mehr oder minder dunkelbraunen Haare in der Mitte weißlich sind. Die Haare der Bauchseite sind am Grunde schieferfarbig, an der Spitze gelblichweiß oder silbergrau. Der Schwanz ist oben braun, unten schmutzig weiß.

Körper . . .	3″ 4‴	Ohren	0″ 3½‴
Schwanz . . .	2 ½	Hinterfuß . . .	0 6

Ebenfalls von Peters bei Tette entdeckt.

c) dentibus intermediis supra 3, cauda angustiore sublineari.

†) species europaeo-asiaticae.

35. S. araneus Schreb., die Haus-Spitzmaus; ferrugineo-fuscus, subtus sensim in cinereum transiens.

Sorex araneus. Schreb. III. S. 373. tab. 160. — Hermann tab. affin. 79. not. — Geoffr. ann. du mus. XVII. p. 169. — Is. Geoffr. dict. class. XI, p. 318. — Jenyns ann. of nat. hist. II. p. 323. — Duvern. mém. de Strasb. II. 1. p. 15. II. 3. suppl. p. 2; magas. de zool. 1842. p. 18. tab. 38. — Nathus. Wiegm. Archiv IV. S. 45. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 65. — S. Lonch. microm. p. 34; faun. belg. p. 27. — Crocidura musaranea. Bonap. faun. ital. tab. 19. fig. 5, 6. — Cr. moschata, major, rufa, poliogastra. Wagl. Isis 1832. S. 54, 275, 1218. — S. pachyurus. Küster, Isis 1835. S. 76, — S. russulus Zimm. Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 179. — Musette Daubent.

var. β) facie, jugulo pectoreque rufescentibus.

Crocidura thoracica. Bonap. faun. ital. tab. 69. fig. 7.

Von Frankreich und Belgien an durch das mittlere und südliche Europa verbreitet, auch in Oran; dagegen in Holland, England, Dänemark und Schweden fehlend. Die Größe ist sehr verschieden; bei großen Exemplaren mißt der Körper 3″ 4‴, der Schwanz 1″ 8‴. Die Farbe

ist gewöhnlich schmutzig rostbraun, was abwärts allmählich ins Weißlichgraue übergeht; die Oberseite fällt bald mehr ins Braune, bald mehr ins Rothe.

36. S. leucodon Herm., die schneidfarbige Spitzmaus; supra fuscus aut nigricans, subtus abrupte albidus.

Sorex leucodon. Herm. tab. aff. 79. not.; observ. p. 49. — Schreb. III. tab. 159. D. — Duvern. mém. de Strasb. II. 1. p. 12; magas. de zool. 1842. p. 19. tab. 39. — Jenyns ann. of nat. hist. II. p. 325. — Nathus. Wiegm. Archiv IV. 1. S. 45. — Wagl. Isis 1832. S. 275. — S. Longch. microm. p. 37; faun. belg. p. 27. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 66. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 180. — Crocidura leucodon. Bonap. faun. ital. tab. 19. fig. 8, 9.

Die Verbreitung durch Europa verhält sich wie bei voriger Art; sie findet sich weder in Schweden noch England, und ist schon in Belgien selten. Der Körper ist bis zu 5″, der Schwanz 1″ 2‴ lang; unter den deutschen Arten hat diese den kürzesten Schwanz. Die Oberseite ist mehr oder minder dunkel röthlichbraun, die Unterseite weiß, was von der Rückenfarbe scharf abschneidet.

*** S. Güldenstaedtii Pall., die kaukasische Spitzmaus; „subauriculatus, fuscescens, cauda nudiuscula, tereti, setis arrigeris aspersa.“**

Sorex Güldenstaedtii. Pall. zoogr. I. p. 132. tab. 9. fig. 1. — Gloger nov. act. Bonn. XIII. 2. p. 499. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 67. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 180. — Brandt bullet. de St. Petersb. 1852. p. 453.

Gegend des südlichen Kaukasus, besonders Georgien. Körper 2″ 8‴, Schwanz 1″ 9‴. Farbe oben braungrau, unten weiß. Gloger rechnet nach den Berliner Exemplaren den S. Güldenstaedtii zu S. leucodon. Brandt erklärt ihn für identisch mit S. araneus Schreb. Herm. und mit S. pusillus Gmel., stimmt also insofern mit jenem überein, weil er zwischen S. araneus und S. leucodon keinen specifischen Unterschied statuiren will.

37. S. Dsi-Nezumi Temm., der Dsi-Nezumi; supra rutilo-fuscus, subtus cineraceo-brunneus; auriculis nudis.

Sorex Dsi-Nezumi. Temm. faun. japon. I. p. 26. tab. V. fig. 3. (Kinezumi), IV. fig. c. c. (Schädel).

Japan. Körper 3″ 2‴, Schwanz 1″ 4‴. Oben finden sich 3 Zwischenzähne; der Rüssel ist lang und spitz, die Ohren sind ganz nackt. Der Sommerpelz ist kurz, glatt, oben glänzend schokoladbraun, unten schmutzig blaulichbraun; der Winterpelz ist länger und heller, indem die Haarspitzen röthlichbraun sind.

38. S. umbrinus Temm., die umberfarbige Spitzmaus; unicolor et nitide nigro-fuscus, cauda corpore parum breviore.

Sorex umbrinus. Temm. faun. japon. I. p. 27.

Japan. Körper 2″ 4‴, Schwanz 2″. Die Zähne sind wie bei voriger Art beschaffen, aber der Schwanz ist viel länger und die Schnautze kürzer. Der Schwanz ist an der Wurzel behaart. Der Pelz der ganzen Ober- und Unterseite ist glänzend dunkelbraun.

††) species africanae.

39. S. cinnamomeus Licht., die zimmtfarbige Spitzmaus; supra cinnamomeus, subtus griseus; cauda tertiam corporis partem aequante.

Sorex cinnamomeus. Lichtenst. Verh. d. Gesellsch. naturf. Freunde 1829. S. 384; Darstell. neuer Säugth. tab. 39. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 77. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 179.

Kaffernland. Körper 5″ 6‴, Schwanz 1″ 11‴. Oben finden sich 3 Zwischenzähne. Der Schwanz ist nur halb so dick als bei S. crassicaudus, aber, wie ich mich aus Besichtigung der im Berliner Museum aufgestellten Exemplare selbst überzeugte, eben so mit langen abstehenden Haaren wie bei den andern Arten von Crocidura besetzt. Die Farbe ist oben zimmtbraun, unten silbergrau; beide Farben ziemlich scharf von einander abgesetzt.

40. S. infumatus Wagn., die rostige Spitzmaus; supra fulvido-brunneus, subtus griseus; cauda dimidio corpore longiore, auriculis majusculis.

Sorex infumatus. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 76. tab. CLX. A. fig. 2.

Kapkolonie. Körper 3″ 1‴, Schwanz 1″ 9½‴. Gestalt schmächtig, Ohren groß und nackt; Schwanz dünn. Pelz dicht, oben glänzend rostfarbigbraun oder licht zimmtbraun, unten graulich; Schwanz rostbräunlich, unten wenig lichter.

41. S. cyaneus Duv., die ſchiefergraue Spitzmaus; e schistaceo coeruleo-cinerascens, subtus paulo pallidior; cauda tenui fere ⅔ corporis.

Sorex cyaneus. Duvern. mém. de Strasb. II. 3. suppl. p. 2; magas. de zool. 1842. p. 21. tab. 40, 41. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 76. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 180.

Vom Elephantenfluß in Südafrika. Körper 3″ 4‴, Schwanz 2″. Gebiß wie bei S. araneus, Ohren groß und nackt. Einförmig ſchiefer-blaugrau, unten etwas lichter.

d) dentibus intermediis supra 2. — Diplomesodon Brandt.

42. S. pulchellus Licht., die zierliche Spitzmaus; niveus, dorso schisticolore macula intermedia notato.

Sorex pulchellus. Lichtenſt. in Eversm. Reiſe I. S. 124; Darſtell. neuer Säugth. tab. 40. fig. 2. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 78. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 180. — Diplomesodon pulchellus. Brandt im Anhang zu Lehmann's Reiſe S. 5.

Kirgiſen-Steppe. Körper 2″ 2‴, Schwanz 9‴. Die ſchneeweißen Zähne zeigen Crocidura an, zugleich aber auch eine beſondere Unterabtheilung derſelben, indem, wie Brandt und Peters nachgewieſen haben, nur 2 obere Zwiſchenzähne, im Ganzen alſo nur 26 Zähne vorhanden ſind. Körper, Schwanz und Füße ſind ſchneeweiß; längs der Oberſeite verläuft ein ſchiefergrauer, 2‴ über der Schwanzwurzel gerad abgeſchnittener Rückenſtreif, in deſſen Mitte abermals ein ſchneeweißer Fleck liegt.

e) dentibus intermediis haud cognitis.

43. S. himalayicus Gray, die himalayiſche Spitzmaus; supra schistaceo-nigricans, subtus ferrugineus.

Crossopus himalayicus. Gray ann. of nat. hist. X. p. 261.

Himalaya. Körper 5½″, Schwanz 3″. „Schieferſchwarz, mit längeren, an den Seiten und dem Kreuze weiß zugeſpitzten Haaren; Untertheil des Vorderhalſes und Mitte des Unterleibs roſtbraun; Schwanz geſchuppt, oben mit anliegenden dunkelbraunen Haaren, unten mit langen ſteifen weißlichen Haaren; Füße ziemlich nackt; Zähne weiß.“ — Kann wegen der weißen Zähne und nackten Füße nicht Crossopus angehören, ſondern wird zu Crocidura zu ſtellen ſeyn.

44. S. Newera Kelaart, die newerische Spitzmaus; schistaceo-niger, subtus pallidior, cauda nigra.

Corsira Newera Ellia. Kelaart ann. of nat. hist. sec. ser. VIII. p. 340.

Von Ceylon. Die Zähne sind durchgängig weiß, die Ohren groß und nackt, der Schwanz schwarz, rund, dünn und kurz behaart mit längeren glänzenden steifen Haaren. Der Pelz ist schieferschwarz, oben sehr schwach ins Rothe schimmernd, unten ohne Spur von Roth, blasser schieferfarbig. Nägel weiß. In Newera Ellia und selbst auf dem Pedrotellgala, dem höchsten Berg von Ceylon gefunden. Körper 3½", Schwanz 2¼. Kann wegen der weißen Zähne und der Schwanzbehaarung nicht, wie es Kelaart vermuthet, eine Varietät von Corsira nigrescens seyn.

45. S. poënsis Fras., die poensische Spitzmaus; supra saturate fuscus, paululum griseo-variegatus, subtus canus, flavido-lavatus; pedibus nigrescentibus; cauda dimidio corpore parum breviore.

Sorex (Crocidura) poënsis. Fraser ann. of. nat. hist. XII. p. 436.

Insel Fernando Po. Körper 3" 3‴, Schwanz 1" 10‴. Das Gebiß ist nicht beschrieben, aber die Besetzung des kurz behaarten Schwanzes mit längeren Borstenhaaren zeigt Crocidura an. Oben dunkelbraun, undeutlich grau gesprenkelt, unten grau mit schmutziggelb überlaufen.

46. S. mariquensis Smith, die mariquinische Spitzmaus; supra brunneo-rufus, subtus pallidior; cauda basi crassa, dimidio corpore parum breviore.

Sorex mariquensis. A. Smith zool. of South Afr. tab. 44. fig. 1.

Südafrika, unterm Wendekreise des Steinbocks. Körper 3" 4‴, Schwanz 1" 10‴. Die Zähne sind weiß, daher wohl Crocidura. Der Schwanz ist an der Wurzel dick und gegen die Spitze sich verdünnend. Die Oberseite des Körpers, Schwanzes und der Füße ist bräunlichroth; die Unterseite etwas lichter mit perlgrauem Anflug.

4. Subgen. Myosorex Gray.

Dentes Crocidurae, intermedii superiores 3, cauda brevipilosa pilis longioribus destituta.

47. S. varius Smuts, die bestäubte Spitzmaus; supra e griseo

brunneoque varius, subtus sordide albidus; unguibus anterioribus majoribus.

Sorex varius. Smuts mammal. capens. p. 108. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 77. tab. CLX. A. fig. 1. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 181. — A. Smith zool. of South Afr. I. tab. 44. fig. 2. — Myosorex varius. Gray proceed. V. p. 124. — S. Herpestes. Duvern. magas. de zool. 1842. p. 22. tab. 42, 43.

Gemein in den östlichen und südlichen Theilen der Kapkolonie. Körper nach meiner Messung 3″, Schwanz 1″ 4‴; nach Smuts 3″ 4‴, und 1″ 6‴. Als eigne Untergattung von Crocidura verschieden durch den Mangel der langen Borstenhaare am Schwanze und die viel größeren Nägel an den Vorder- als Hinterfüßen. Alle Zähne sind weiß; oben finden sich 3 Zwischenzähne, von denen der mittlere viel kleiner als der hintere ist; unten ist der hintere Zwischenzahn mit einer zweiten kleinen Spitze hinter der großen versehen, was ebenfalls zur Auszeichnung dieser Abtheilung dient. Der Schwanz ist dünn, der Pelz reichlich, etwas kraus, die Ohren ganz versteckt. Die Farbe ist oben grau und licht rostbraun gesprenkelt, indem die graulichweißen Haarspitzen häufig rostbräunlich geendigt sind; die Unterseite ist schmutzig weißlich. — S. caffer Sund. (öfvers. 1847 p. 119) scheint davon specifisch abzuweichen.

5. Species sedis incertae.

48. S. viarius Is. Geoffr., die Weg-Spitzmaus; supra griseo-rufescens, subtus griseus; cauda dimidio corpore longiore.

Sorex viarius. Is. Geoffr. voy. de Bélang. zool. I. p. 127. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 76.

Am Senegal. Körper etwas über 3″, Schwanz 2″. „Pelz oben graulichroth, unten hellgrau. Ohren groß, in den Haaren nicht versteckt. Schwanz in seiner ersten Hälfte etwas zusammengedrückt, gegen das Ende abgerundet und mit langen, hinterwärts gerichteten Borsten besetzt.“ Gebiß nicht beschrieben; nach der Schwanzbehaarung zu Crocidura gehörig.

49. S. tenuis S. Müll., die schlanke Spitzmaus; supra griseo-fuscus, subtus fusco-griseus; cauda valde elongata.

Sorex tenuis. S. Müll. verhandel. I. p. 50.

Timor. Körper 2″ 7‴, Schwanz 2″ 1‴. Schwanz rund und

sehr dünn mit dunkleren glattliegenden Haaren besetzt, wovon allein der hinterste Theil ausgenommen ist, dessen dichtstehende Haare eine Länge von 5‴ und die Farbe des Rückens haben. Der schmale Kopf in eine sehr spitze Schnautze auslaufend. Oben graulichbraun, unten braungrau. — Untergattung darnach nicht bestimmbar.

50. S. niger Elliot. Horsf. catal. East. Ind. Comp. p. 135.

Madras. Körper 3¼″, Schwanz 2¼″. Schwärzlichbraun, oben mit röthlichem Anflug, Unterleib graulich. — Ob mit S. Newera identisch.

51. S. caudatus Hodgs. Horsf. catal. p. 135.

Oberindien. Körper 2¼″, Schwanz eben so viel. Dunkel schwärzlichbraun mit röthlichem Schimmer. Schwanz dünn, fast nackt.

52. S. sikimensis Hodgs. Horsf. catal. p. 136.

Oberindien. Schwanz dünn, nackt, halb so lang als der Körper; Pelz kurz, weich, anliegend, Ohren versteckt. Oben gesättigt schwärzlichbraun, etwas röthlich mit silberfarbigem Anfluge, Unterseite graulich.

IX. SOLENODON. Schlitzrüßler.

Habitus soriciformis, pedes 5-dactyli fissi, cauda longa nuda, dentes 40.

Diese Gattung erscheint als der Repräsentant der Spitzmäuse in Westindien. Das äußere Ansehen ist das der Spitzmäuse mit langem, dünnem, an der Spitze kahlen Rüssel, großen gerundeten, fast nackten Ohren, ohne innere Klappen, langem nackten, schuppigen Schwanz. Der Körper ist behaart; die Füße sind fünfzehig, mit starken Krallen, zumal an den Vorderfüßen. Der Schädel ist ähnlich dem des Wüchuchols, ohne Jochbein. Das Gebiß ist mit dem von letzterem und von Chrysochloris verwandt und aus 40 Zähnen bestehend, nämlich Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Lückenzähne $\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{4}{4}$. Die Zahl der obern Schneidezähne ist durch die deutliche Zwischenkiefergrenze scharf bezeichnet; der vorderste gleicht dem des Wüchuchols, die beiden hintern sind klein. Im Unterkiefer ist der vorderste Schneidezahn sehr klein, der folgende sehr groß, eckzahnähnlich, innen mit ei-

nem Längsſchlitz; der dritte ebenfalls ſehr groß. Eckzähne laſſen ſich der Form und Stellung nach nicht unterſcheiden; den Raum zwiſchen den Schneidezähnen und den ächten mehrſpitzigen Backenzähnen füllen alſo die kegelförmigen Lückenzähne aus.

1. S. paradoxus Brandt, der große Schlitzrüßler; supra nigro-fuscus, subtus flavo-brunneus.

Solenodon paradoxus. Brandt, mém. de Pétersb. VI. sér. II. 1. tab. 1, 2. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 80. — Blainv. ostéogr. Insectiv. p. 53. tab. 5, 9. (Schädel und Gebiß).

St. Domingo und Cuba. Körper 11½", Schwanz 9". Vorderkörper braunſchwarz, Hinterkörper ſchwarzbraun, Unterleib fahlbräunlich; Schwanz grau, gegen die Spitze weißlich. — Wahrſcheinlich wird die von Funk (bull. de l'acad. de Brux. XI. p. 371) in der berühmten Höhle der Guacharos (Provinz Cuma) beobachtete Spitzmaus von Rattengröße und mit viereckiger Schnauze ebenfalls Solenodon geweſen ſeyn.

X. MYOGALE. Biſamrüßler.

Nasus in proboscidem longam cartilagineam porrectus, auriculae nullae, pedes 5-dactyli palmati, cauda longa nuda squamata.

Die Heimath iſt auf das weſtliche und öſtliche Europa beſchränkt und zwar für jede der beiden Arten geſondert. Die äußere Geſtalt iſt durch die oben angegebenen Merkmale ſehr charakteriſirt[1]). Der Schädel zeichnet ſich vor dem der Spitzmäuſe ſchon durch den Beſitz des Jochbeins aus, das freilich nur ein dünnes Stäbchen beiderſeits bildet. Gebiß aus 44 Zähnen beſtehend, die nach meiner Deutung ſich in $\frac{4}{4}$ Schneidezähne, $\frac{4}{4}$:$\frac{4}{4}$ Lück-

1) Wie Brandt (bullet. de St. Pétersb. 1852. p. 455) bemerklich macht, fehlen die Ohren keineswegs, ſondern ſind nur ungemein verkürzt, laſſen aber ſonſt alle bei den Sorices vorkommenden Theile wahrnehmen. Derſelbe (a. a. O. IX. N. 13.) publicirte vorläufig einige Bemerkungen über abſondernde Zellchen oder Bläschen der Moſchusdrüſen dieſer Thiere, nebſt einem die chemiſche Beſchaffenheit ihres Sekrets betreffenden Anhang von Doepping.

kenzähne und $\frac{4}{4}$:$\frac{4}{4}$ ächte Backenzähne vertheilen. Obwohl ich von jeder der beiden Arten 2 Schädel vor mir habe, bin ich über die hintere Grenze des Zwischenkiefers nicht ganz sicher, doch scheint sie gleich hinter den großen Schneidezahn zu fallen, was eine Abweichung von den Schlitzrüßlern und Spitzmäusen ist. Blainville und Owen nehmen $\frac{6}{6}$, Geoffroy bei M. pyrenaica $\frac{4}{4}$ Schneidezähne an. Der vordere Schneidezahn ist sehr groß, dreiseitig und senkrecht gestellt; die 4 untern stabförmig, abgestutzt, schief vorwärts geneigt, die mittlern kürzer. Eckzähne sind nicht vorhanden; die Lückenzähne sind einspitzig und zu ihnen könnte man auch noch oben den ersten von den 4 Backenzähnen zählen; die ächten Backenzähne sind nach dem Typus der Ordnung geformt.

1. M. moschata Pall., der Bisamrüßler; fusca, subtus cana; cauda corpore breviore, compressa, ancipiti.

Sorex moschatus. Pall. act. acad. Petrop. 1781. 2. p. 215. tab. 3, 5; zoogr. I. p. 128. tab. 8. — Schreb. III. S. 567. tab. 159. — Mygale moscovitica. Desm. mamm. p. 154. — Myogale moschata. Brandt, Wiegm. Archiv II. 1. S. 176; nov. act. acad. nat. cur. Bonn XVIII. 1. p. 241. tab. 10. (Anatom.) — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 97. — Caprios moschatus. Wagl. nat. Syst. d. Amphib. S. 14.

Südöstliches Rußland zwischen Don und Wolga bis in die Nähe von Moskau (bullet. de Mosc. 1840 p. 382), aber nicht am kaspischen Meer. Körper 8″ 7‴, Schwanz 7″; an unserem größeren Exemplare ist der Körper 10″ lang. Der schmal zusammengedrückte, zweischneidige Schwanz verdickt sich nur an der Schwanzwurzel. Der Pelz ist oben kastanienbraun, unten grau.

2. M. pyrenaica Geoffr., der pyrenäische Bisamrüßler; supra fusco-nigra, subtus cana; cauda longitudine corporis, cylindrica, apice compressa.

Mygale pyrenaica. Geoffr. ann. d. mus. XVII. p. 193. tab. 4. fig. 1—4; mém. d. mus. I. tab. 15. fig. 10—12. (Gebiß). — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 100. — Blainv. ostéogr. Insectiv. p. 53. tab. 5, 9. (Schädel und Gebiß). — Galemys pyrenaicus. Wagl. Isis 1832. S. 1218.

An den Gewässern am Fuß der Pyrenäen bei Tarbes. Um die Hälfte kleiner als voriger und mit längerem Schwanze, der, wie unser

Skelet zeigt, 3 Wirbel mehr zählt, nämlich 30, während M. moschata nur 27 hat. Körper 5″ 6‴, Schwanz 5″. Die Farbe ist oben glänzend bräunlichschwarz, unten silbergrau.

IV. Familie.

Talpina. Würfe.

Auriculae nullae, artus breves, manus latae unguibus validis fossoriis instructae.

Unterscheiden sich durch die kurzen Beine, die erst am Hand- und Fußgelenke aus der Haut hervortreten und die breiten handartigen Vorderfüße mit starken Grabkrallen auffallend von allen andern Familien. Das Gebiß ist wie bei voriger Familie in seinen Formen sehr schwankend, ohne zu ächten Eckzähnen zu gelangen. Von unterirdischer wühlender Lebensweise, daher sehr kleine, zum Theil vom Pelze ganz bedeckte Augen. Weit verbreitet, doch nicht im tropischen Asien.

XI. UROTRICHUS. Spitzwurf.

Rostrum in proboscidem elongatam, tenuem, nudiusculam, e duabus tubis compositam porrectum; oculi tecti, pedes 5-dactyli, anteriores talpiformes, cauda mediocris pilosa.

Eine von Temminck aufgestellte Gattung der Würfe, die ausschließlich Japan angehört und in mehreren Stücken den Uebergang zu den Soricinen vermittelt. Der Kopf ist gestreckt, in einen ziemlich langen, dünnen, aus 2 aneinander gehefteten Röhren bestehenden Rüssel geendigt, der seitlich gewimpert, am Ende ganz nackt ist. Die Augen sind unter dem Pelze versteckt. Die Vorderfüße sind wie bei den Maulwürfen, die Hinterfüße wie bei den Spitzmäusen gebildet. Der Schwanz ist mittelmäßig, dick, schuppig, mit langen Borsten besetzt, die am Ende einen Pinsel bilden. Füße und Zehen sind nackt, aber der Rand der Grabfüße ist mit kurzen, gekrümmten Borsten wie bei den Maulwürfen besetzt.

Das Gebiß hat noch große Aehnlichkeit mit dem der Spitzmäuse. Zähne giebt es im Ganzen 36, die Temminck in $\frac{4}{4}$ Schneidezähne, $\frac{1}{1}$ Eckzähne, $\frac{8}{8}$ Backenzähne jederseits abtheilt, doch will er auch die Formel

zulassen: $\frac{1}{1}$ Schneidezähne, $\frac{4}{4}$ Lückenzähne, $\frac{5}{5}$ Backenzähne. Letztere Formel ist insofern passender, als wirkliche Eckzähne nicht vorhanden sind. Der obere Schneidezahn ist stark, gerade, dreiseitig und kommt ganz mit dem des pyrenäischen Bisamrüßlers überein. Dicht hinter ihm steht ein kegelförmiger Zahn, der nochmals so stark ist als die darauf folgenden 4 kleinen, nach hinten an Größe zunehmenden Lückenzähne, an die sich die 4 Backenzähne von gewöhnlicher Form anschließen. Im Unterkiefer ist der vordere Schneidezahn stark, etwas gekrümmt und hat einen großen Ansatz; darauf folgen 3 kleine, unter sich gleiche Lückenzähne, hinter denen ein vierter steht, der nochmals so groß ist und einen Ansatz hat; die 3 ächten Backenzähne sind von gewöhnlicher Beschaffenheit.

Der Schädel kommt mehr mit dem des Maulwurfes überein und hat gleichfalls einen dünnen stabförmigen Jochbogen. Das Schulterblatt ist ähnlich dem derselben Gattung, aber das Schlüsselbein unterscheidet sich sehr, indem es einen langen Knochen wie beim Bisamrüßler bildet. Eben so verschieden ist das Oberarmbein, das kräftig, flach und gestreckt ist. Der Vorderarm gleicht mehr dem des Maulwurfs, ist aber länger und schmächtiger. Die Hand ist ähnlich der des letzteren, aber der überzählige innere sichelförmige Knochen fehlt und ist nur durch ein an die Mittelhand geheftetes Rudiment angedeutet. Die Nägel sind kleiner und zusammengedrückter als bei andern Grabern. Das Becken differirt nicht von dem des Maulwurfs. Der Femur ist kurz und das Schienbein verhältnißmäßig länger als bei letzterem; beide haben dieselbe Form wie bei den Spitzmäusen. Der Fuß ist klein, lang und an der Innenseite mit einem sehr kleinen Rudiment, als Repräsentanten des beim Maulwurf viel längern Knochens, der unter der Haut eine sechste Zehe zu bilden scheint.

1. U. talpoides Temm., der japanische Spitzwurf; saturate castaneo-fuscus. — Tab. 38.

Urotrichus talpoides. Temm. faun. japon. I, p. 22. tab. 4. fig. 6—11; Guér. magas. de zoolog. 1842. tab. 55.

Von der Größe des Sorex fodiens. Der Kopf ist lang und in einen ziemlich langen Rüssel geendigt, der seitlich mit kurzen, gegen die nackte Spitze gerichteten Borsten besetzt ist, während einzelne längere Borsten die behaarte Rüsselwurzel garniren. Die Ohren und Augen sind

durch den Pelz verdeckt. Der Pelz ist dicht, reichlich, sammetartig, glänzend und durchgängig dunkel kastanienbraun, an der Basis der Haare schwärzlich; einige Individuen haben die untern Theile etwas lichter; die Schwanzhaare sind braun. Die Jungen sind oben lichter braun, unten blaulichbraun, die Schwanzhaare gelblichbraun. Die Länge des Körpers beträgt 3″ 9‴, des Schwanzes 1″ 3‴; der Rüssel ragt über die Schneidezähne um 5‴ hinaus.

Der Spitzwurf ist auf Japan in gebirgigen Gegenden ziemlich verbreitet, wo man ihn in den südlichen und östlichen Theilen, wie zu Kiusiu und Sikok, aber selten nördlicher trifft. Man sieht ihn niemals in den Ebenen, sondern immer nur in den gebirgigen Gegenden bis zu einer Höhe von 1000 bis 1200 Fuß über dem Meere. Er gräbt sich unter dem Boden Gänge wie der Maulwurf, doch scheint er keine Hügel aufzuwerfen.

XII. SCALOPS. Wasserwurf.

Nasus elongatus attenuatus cartilagineus, oculi tecti, pedes talpiformes, cauda brevis, dentes 36 aut 44, primores anteriores 2 supra validi curvati.

Der eigentliche Repräsentant in Nordamerika von unserem Maulwurf, dem er im Aeußerlichen täuschend ähnlich ist, sich aber sehr von ihm durch das Gebiß unterscheidet [1]). Cuvier und Desmarest zählen im Ganzen 30 Zähne, Fr. Cuvier, Blainville, Owen und ich 36, Richardson und De Kay 44 Zähne. Diese Widersprüche sind durch Bachman vollständig gelöst worden. Die gemeinste Art, Sc. canadensis hat erwachsen 36 Zähne, in der Jugend nur 30; Sc. Townsendii und Breweri dagegen 44. Dieses Zahnsystem formulirt Bachman folgendermassen: Schneidezähne $\frac{2}{2}$, Lückenzähne $\frac{1}{1}$ Backenzähne $\frac{3}{3} = 36$; oder Schneidezähne $\frac{2}{2}$, Lückenzähne $\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{4}{4} = 44$. — Für ersteren

1) Richardson führte zwar den Maulwurf als Bewohner Nordamerikas auf; Audubon (quadrup. III. p. 254) erkannte jedoch in den von jenem mitgebrachten Exemplaren 2 Arten von Wasserwürfen, nämlich Scalops aquaticus und Sc. Breweri.

Typus, welchen Sc. canadensis repräsentirt, vertheilen Owen und Blainville das Gebiß also: Schneidezähne $\frac{4}{4}:\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$, Backenzähne $\frac{3}{3}:\frac{3}{3}$. Die Bestimmung der Zahl der obern Schneidezähne bleibt so lang unsicher, als man nicht die Grenze des Zwischenkiefers kennt. Sehr charakteristisch ist der obere Vorderzahn, der durch Stärke und Form dem des Bisamrüßlers ähnlich ist. Zwischen diesem und den 3 ächten Backenzähnen liegen 6 einfache Zähne, wovon der 1ste, 2te und 4te sehr klein sind und in der Jugend ganz fehlen. Zwischen dem 2ten und 4ten dieser Zähne steht ein etwas größerer, den Blainville und Owen für den Eckzahn ansehen, der aber weder durch Form noch Größe einem solchen ähnlich ist und daher nur sehr uneigentlich als Eckzahn angesprochen werden kann. Von den untern Schneidezähnen sind die mittlern klein, der äußere aber sehr groß und eckzahnähnlich.

Die Wasserwürfe halten sich gern im feuchten Boden auf und führen die Lebensweise unseres Maulswurfs. An der Innenseite der Schenkel in der Nähe des Afters findet sich eine Drüse, von der ein sehr unangenehmer Geruch ausgeht. Bachman unterscheidet 5 Arten, die jetzt ausführlich beschrieben sind.

†) dentibus 36.

1. Sc. aquaticus Linn., der gemeine Wasserwurf; corpore cylindraceo, vellere argenteo-canofuscus.

Sorex aquaticus. Linn. XII. p. 74. — Schreb. III. S. 566. tab. 158. — Scalops aquaticus. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 104. (theilw.). — Bachm. journ. of Philad. VIII. 2; quadrup. of North Am. I. p. 81. tab. 10. — Dekay nat. hist. of New York I. p. 15. tab. 4. fig. 2. — Audub. Bachm. quadrup. I. p. 81. tab. 10. — Sc. canadensis et pennsylvanicus. Harlan faun. americ. p. 32, 33. — Scalops canadensis. Desm. mamm. p. 155. — Shrew Mole. Godm. nat. hist. I. p. 84. tab. 5. fig. 3.

In der Osthälfte Nordamerikas von Florida und Louisiana an bis zum 50° Breite in Canada. Größe Erwachsener 5″ 8‴, Schwanz 8″, Handbreite 5‴. Schwanz kurz, fast nackt, blos spärlich mit feinen Härchen besetzt. Schnautze und Hände röthlichfarben, Kinn, Füße und Schwanz weiß. Der Pelz ist sehr weich, glänzend, auf ⅔ seiner Länge bleifarben, die Spitzen hellbraun, was eine dunkelbraune Färbung giebt, die je nach dem

Licht ins Schwarze, Silbergraue oder Purpurfarbige spielt. Es giebt mancherlei Abänderungen von fast Schwarz bis Lichtgelb: in den Sammlungen verblaßt die Farbe auffallend. Die Jungen haben nur 30 Zähne.

2. Sc. latimanus Bachm., der breithändige Wasserwurf; major, fuscus, manibus latissimis.

Scalops latimanus. Bachm. journ. of Philadelph. VIII. 2. — Audub. Bachm. quadrup. III. p. 323.

Mexiko und Texas. Körper 6″ 8‴, Schwanz 1″ 7‴, Handbreite 10‴. Größer als Sc. aquaticus, Haare länger, lockerer und dünner, ohne dasselbe glänzende schmucke Ansehen wie bei den andern Arten, dunkelgrau mit dunkelbraunen Spitzen, fast schwarz Zähne und Hände fast doppelt so groß als bei Sc. aquaticus, Schwanz nackt.

3. Sc. argentatus Bachm., der silberige Wasserwurf; argenteocanus, pilis plumbeo alboque annulatis, fronte mentoque flavido-albis.

Scalops argentatus. Bachm. journ. of Philad. VIII. — Audub. Bachm. quadrup. III. p. 252. tab. 150. fig. 4.

Staat Michigan. Körper 7″, Schwanz 1″, Handbreite 10‴. Die Haare des Rückens sind von der Wurzel an mit schmalen schwarzblauen und weißen Ringen besetzt, bis nahe zur Spitze, wo ein breiter grauweißer Ring mit so kurzer brauner Spitze steht, daß die hellere Farbe an der Oberfläche noch sichtlich ist und ein schönes silberiges Ansehen giebt. Die Haare der Unterseite sind bleifarben mit endständigen weißlichen und lichtbraun zugespitzten Ringen. Nase, Stirn, Lippen und Kinn sind gelblichweiß. Die Nasenlöcher liegen auf der Oberseite der Schnautze wie bei Sc. aquaticus.

††) dentibus 44.

4. Sc. Breweri Bachm., der schmalhändige Wasserwurf; cinereus, manibus angustis, cauda plana, naribus lateralibus.

Scalops Breweri. Bachm. journ. of Philad. VIII. 1.

Ohio und mehrere andere nördliche Staaten. Körper 6″, Schwanz ohne Haare 1″, mit Haaren 1″ 5‴, Breite der Hand 4‴, des Schwanzes 4‴. Glänzend aschgrau, oben schwarz, unten bräunlich; Hände schmal, Schwanz flach, breit und behaart; Nasenlöcher, statt wie bei Sc. aquaticus in der Oberseite der Schnautze eingefügt, an die Seiten gestellt.

5. Sc. Townsendii Natt., der große Waſſerwurf; obscure rufo-fuscus.

Scalops Townsendii. Bachm. journ. of Philad. VIII. 1. p. 58. — Audub. Bachm. quadrup. III. p. 217. tab. 145. — Sc. canadensis. Richards. faun. I, p. 9. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 104.

Am Columbia-Fluße. Nach Bachman's Angaben mißt der Körper $7\frac{1}{2}''$, die Breite der Hand $7'''$; ein anderes Exemplar iſt um 1" länger und hat eine weiße Linie unterm Bauch. Pelz oben und unten dunkel, beim gewöhnlichen Lichteinfall ſchwarz, Haare bis gegen die Spitze graulichſchwarz; Schwanz ſpärlich mit kurzen Haaren beſetzt.

Aus der genaueren Beſchreibung in Audubon und Bachman's Werke füge ich noch Folgendes bei. Zähne ſind 44 vorhanden. Die Farbe iſt oben dunkel leberbraun, je nach dem Lichteinfall ins Silberige oder Schwarze ſchillernd. Die Haare ſind bis gegen die Spitzen ſchwarz; letztere ſind weiß oder braunſchwarz, was den verſchiednen Schiller giebt. Ein Exemplar zeigte eine lichtgelbe, etwas unregelmäßig verlaufende Binde längs des Unterleibs; ebenſo zeigte ſich ein weißer Streif, der von der Stirne ausgehend ſich über die Schnauze, Lippen und Unterkiefer verbreitete. Die Füße, Naſenkuppe und Schwanz ſind fleiſchfarben, die Nägel hellbraun. Körper $8\frac{1}{4}''$, Schwanz $1\frac{1}{4}''$, Breite der Hand $7'''$.

6. Sc. aeneus Cass., der ſchwarzkrallige Waſſerwurf; splendide aeneo-fuscus, unguibus nigris.

Scalops aeneus. Cassin proceed. of Philadelph. 1853. p. 299. — Audub. Bachm. quadrup. III. p. 321.

Das Gebiß iſt wie bei C. Townsendii. Die Farbe iſt lebhaft glänzend kupferbraun mit metalliſchem Schimmer, dunkler am Kopfe; die Naſe iſt dunkel, die Füße bräunlich, die Sohlen dunkelbraun, die Krallen nebſt dem erſten Zehenglied ſchwarz, der Schwanz hellbraun und ſpärlich mit zerſtreuten Borſten beſetzt. Ganze Länge 5", Schwanz 1. 25. Wurde in Oregon entdeckt. Kommt im Farbenglanze mit Chrysochloris überein und unterſcheidet ſich hiedurch ſo wie durch ſeine ſchwarzen Krallen von allen andern Arten der Waſſerwürfe.

XIII. RHINASTER. Sternwurf.

Nasus elongatus caruncúlis stellatim circumdatus, pedes talpiformes, cauda elongata.

Gleich den Wasserwürfen Nordamerika angehörig, von ihnen aber verschieden dadurch, daß die Nasenlöcher von spitzen, beweglichen Knorpelfortsätzen in einem Kreise umgeben sind, und der Schwanz von halber Körperlänge ist. Das Gebiß ist mehr mit Scalops als mit Talpa verwandt; nach Desmarest: Schneidezähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{5}{5}:\frac{5}{5} = 40$; nach Blainville: Schneidez. $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Eckz. $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Lückenz. $\frac{2}{2}:\frac{2}{2}$, Backenz. $\frac{5}{5}:\frac{5}{5} = 44$. Diese Differenz in der Zahl der Zähne entspringt daraus, daß nach Blainville oben hinter dem ersten und unten hinter dem zweiten Schneidezahn ein sehr dünnes Zähnchen eingeschoben ist, das bei dem Schädel von Desmarest und dem der hiesigen Sammlung fehlt; auch Audubon und Bachman geben nur 40 Zähne an. Oben ist der vordere Schneidezahn stark und ähnlich dem von Scalops; hinter ihm (abgesehen von dem kleinen Zwischenzähnchen) folgt ein längerer eckzahnartiger, und dahinter, gerade auf der Zwischenkiefernath, ein ähnlicher, aber kleinerer. Unten stehn vorn jederseits 2 löffelförmige Schneidezähne, dahinter ein winziges Stümpfchen und dann ein größerer etwas eckzahnähnlicher Zahn, den Blainville noch zu den Schneidezähnen rechnet. Unter den darauf folgenden Lückenzähnen ist kein ächter Eckzahn; die ächten Backenzähne sind von typischer Form.

Die 3 oder 4 Arten, die man früher unterschied, haben sich bei genauerer Vergleichung als zu einer und derselben Species gehörig erwiesen.

1. Rh. cristatus Linn., der gemeine Sternwurf; fusco-niger.

Sorex cristatus. Linn. XII. p. 73. — Schreb. III. S. 566. — Condylura cristata. Desmar. mamm. p. 158. — Richards. faun. I. p. 285. — Dekay nat. hist. of New York I. p. 12. tab. 4. fig. 1. — Blainv. ostéogr. Insect. p. 52. tab. 5, 9. (Schädel und Gebiß). — Audub. Bachm. quadrup. II. p. 139. tab. 69. — Rhinaster cristatus. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 117. — Radiate Mole. Penn. syn. p. 313. tab. 28. fig. 1. — Talpa longicaudata. Erxl. syst. p. 118. — Schreb. III. S. 561. — Condylura longicaudata. Desmar. mamm. p. 158. — Richards. l. c. p. 13. — Wagn. Schreb. l. c. S. 116. — Longtailed Mole. Penn. hist. quadr. II. p. 232. tab. 90. fig. 2. — Starnose Mole. Godm. Am. nat. hist. I. p. 100; Taylor's phil. mag. and journ (1826) 67. p. 373.

β) cauda tamido-incrassata, apice acuminata.

…oura. HARL. faun. p. 39. — RICHARDS. faun. I. p. 284. …Schreb. l. c. S. 115. tab. CLVI. A. — C. prasinata. …mag. l. c. p. 191; Wagn. Schreb. a. a. O. S. 555.

… und Rh. longicaudatus bilden nur eine Art, … bis zur Hudsonsbay verbreitet ist. Körper 4" 9‴, … Schwanz fast walzig, am Ende zugespitzt, geschuppt, …besetzt. Pelz weich, bräunlichschwarz, unten lichter; …heil ihrer Länge schieferfarbig. — Rh. macrurus …on nur dadurch, daß der an der Wurzel schmale …einem Umfange von 1½" anschwillt, dann aber bis …allmählig verschmälert. Nach Godman und Au… Anschwellung nur temporär bei Männchen und zwar …unstzeit. Die Condylura prasinata, auf ein …Staate Maine begründet, hat dieselbe Schwanzan… macrurus, aber Harris nennt die Färbung des …aus Lesson „une magnifique coloration en vert …e. Wahrscheinlich wollte Harris mit diesem Worte …Schimmer bezeichnen, denn einen grünen Sternwurf …gefunden. Die Sternwürfe graben sich unterirdische …würfe.

XIV. TALPA. Maulwurf.

…us cartilagineus, pedes breves 5-dactyli, cauda brevis; …upra minimi contigui cestriformes.

…n angehörig und von ganz unterirdischer Lebensweise. …T. europaea genommen) aus 44 Zähnen bestehend. …st 6 kleine meißelförmige Zähne in gedrängter Reihe,

jeder ebenfalls mit 2 Wurzeln, und dahinter die 3 ächten typiſchen Backenzähne. — Im Unterkiefer ſtehen vorn in gedrängter Reihe 8 kleine Schneidezähne von ähnlicher Form wie die obern, aber nicht ſenkrecht, ſondern vorwärts geneigt. Dahinter folgt ein größerer eckzahnähnlicher Zahn, der auch gewöhnlich als ſolcher angeſehen wird, obgleich er wie die folgenden 2 Wurzeln hat. Die noch folgenden 3 Lückenzähne und die 3 ächten Backenzähne haben nichts Beſonderes. Demnach vertheilen ſich die Zähne folgendermaſſen: Schneidezähne $\frac{8}{8}$, Lückenzähne $\frac{1-1}{1-1}$, Backenzähne $\frac{3-3}{3-3}$. Aechte Eckzähne ſind daher nicht vorhanden, obwohl dazu der Anſchein gegeben iſt [1]).

1. T. europaea Linn., der gemeine Maulwurf; nigra; apertura palpebrali minima, dentibus incisivis omnibus aequalibus, subtus 8.

Talpa europaea. Linn. XII. p. 73. — Schreb. III. S. 558. tab. 156. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 111. — Bonap. faun. ital. tab. 17. fig. 2. — Nilss. skand. faun. I. p. 65.

Durch das ganze mittlere Europa (ſüdwärts bis ins nördliche Italien, nordwärts bis nach England und im ſüdlichen Schweden, aber nicht in Irland und Sardinien) und durch Sibirien bis zur Lena verbreitet. Die gewöhnliche Farbe iſt ſchwarz mit ſchönem Sammetglanz, bisweilen weiß gefleckt, ganz weiß, oder gelblich, oder grau.

2. T. coeca Sav., der blinde Maulwurf; nigra, apertura palpebrali haud conspicua, dentibus incisivis mediis supra majoribus.

Talpa coeca. Savi mem. supra la Talpa. Pisa 1822. — Bonap. faun. ital. tab. 17. fig. 1. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 112.

Dem ſüdlichen Europa angehörig, woher man dieſe Art aus dem mittlern und untern Italien, Südfrankreich, Portugal (von wo Erdl ein Exemplar mitbrachte) kennt; der griechiſche Maulwurf wird ebenfalls hieher gehören. Körper 5″, Schwanz 1″ 2‴. Die Augen ſind unter der Haut verborgen, die hier gar keine Oeffnung, oder, wie Is. Geoffroy angiebt, nur von der Größe eines Nadelſtichs hat. Im Oberkiefer ſind die mittlern Schneidezähne etwas größer als die ſeitlichen, während bei T. europaea alle gleich groß ſind. Sonſt beſteht in Färbung, Form, Größe und Lebensweiſe völlige Uebereinſtimmung bei beiden Arten.

1) Anatomiſche Bemerkungen über das Auge des Maulwurfs lieferte John Davy (ann. of nat. hist. sec. ser. XII. p. 65).

Temm., der japaniſche Maulwurf; brunnea, dentibus 6.

Temm. faun. japon. I. p. 19. tab. 4. fig. 2—5.

[illegible] japaniſchen Inſeln. Körper gegen 8″, Schwanz [illegible] Exemplare mißt der Körper nur 5½″. Von T. europaea [illegible] geringere Zahl der untern Schneidezähne, deren (ſtatt [illegible] ſind, und durch die Färbung. Der Pelz iſt weich, [illegible] lichtbraun, an den Seiten etwas heller, am Bauche [illegible] Anfluge. Es giebt auch mitunter ſchwarze, weiße [illegible] jungen. Der Schwanz iſt dünn, ſehr kurz, mit länglichen [illegible] beſetzt.

Hodgs., der ſtutzſchwänzige Maulwurf; nigra, nigrescens, cauda minutissima, dente spurio secundo subtus tertio

Hodgs. journ. of the Asiat. soc. X. 2. p. 910. — Blyth journ. XII. 2. — Horsf. catal. p. 129.

[illegible] Nepal, Butan, Kaſchmir und Darjiling aufgefunden. [illegible] Schwanz ⅛. Die Zähne ſind in derſelben Anzahl wie bei [illegible] angegeben; bei den Exemplaren von Aſſam und Nepal findet [illegible] der Schwanz, der wenigſtens unterm Pelze geſpürt [illegible] von Darjiling zeigt ſich keine äußere Spur deſſelben. [illegible] ſchwarz mit ſilbergrauem Schimmer, iriſirend, wenn [illegible] Füße und Schwanz fleiſchfarbig weiß, Structur

Blyth, der weißſchwänzige Maulwurf; cauda [illegible] dentibus spuriis supra utrinque 3, infra secundo tertio-

Blyth journ. of the Asiat. soc. XIX. p. 215. fig. 1.

rend sie bei T. micrura gleich sind. Der Pelz fällt gewöhnlich weniger ins Falbe als bei letzterer.

XV. CHRYSOCHLORIS. Goldwurf.

Nasus proboscideus cartilagineus, pedes anteriores 4-dactyli ungue tertio arcuato validissimo, pedes posteriores 5-dactyli, cauda nulla.

Als Repräsentant der Maulwürfe in Südafrika und von der nämlichen Lebensweise. Von Talpa verschieden durch den Mangel des Schwanzes und eine andere Beschaffenheit der Vorderhand. Diese besteht blos aus 4 Fingern, von denen der 1te und 2te zwei Phalangen, der 3te und 4te nur eine haben. Der innere und noch mehr der äußere Finger sind sehr verkürzt, mit ganz kleiner Kralle; etwas mehr entwickelt ist der zweite Finger; der dritte ist mit einer ungemein großen, gekrümmten Kralle bewaffnet. Die Hinterfüße haben 5 Zehen, von denen jede blos zwei Phalangen hat. Die Augen sind verdeckt, die Schnautze ist in einen nackten Knorpel geendigt; die Behaarung zeigt einen schönen Metallglanz. Das Gebiß zählt 40 oder 36 Zähne, nämlich Schneidezähne $\frac{2}{2}:\frac{2}{2}$, Lückenzähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{5}{5}:\frac{5}{5}$, oder $\frac{4}{4}:\frac{4}{4}$. Oben ist der vordere Schneidezahn groß, dreiseitig, und ziemlich ähnlich dem von Myogale; die 2 hintern sind klein und einspitzig. Aehnlich den letztern ist der kleine obere Lückenzahn, dahinter folgen 5 oder 6 schmale (von vorn nach hinten zusammengedrückte) Backenzähne. In der Unterkinnlade stehen vorn zwei eckzahnähnliche Schneidezähne, von denen wie bei Myogale der erste weit kürzer ist; dahinter ein kleiner spitzer Schneidezahn. Aehnlich, aber etwas größer, sind die zwei Lückenzähne, auf welche die 5 oder 4 schmal gedrückten Backenzähne folgen. Mit Ausnahme des ersten obern und der 2 untern Schneidezähne, die gedrängt an die entsprechenden der andern Seite sich anschließen, sind alle andern Zähne durch Zwischenräume von einander geschieden. Es ist noch bemerklich zu machen, daß die Lücken- und Backenzähne so unmerklich in einander übergehen, daß keine scharfe Grenze zwischen ihnen zu ziehen ist.

1. Ch. inaurata Schreb., der grünliche Goldwurf; saturate fusca, nitore viridi et violaceo; cartilagine nasali latiore quam longiore; dentibus 40.

Talpa inaurata. Schreb. III. S. 562. tab. 157. — Wagn. Schreb.

Supplem. II. S. 122. — Ch. aurata. Lichtenst. Darstell. tab. 41. fig. 1. — Blainv. ostéogr. Insectiv. p. 50. tab. 5, 9. (Schädel und Gebiß). — Owen odontogr. I. p. 412. tab. 110. fig. 1. (Gebiß). — Ch. capensis. Desm. mamm. p. 156. — Fr. Cuv. dict. des sc. nat. IX. p. 159. mit fig. — Talpa asiatica. Linn. XII. p. 73.

Kapkolonie. Körper 5", Nasenknorpel lang 2‴, breit 3‴. Nasenknorpel breiter als lang, hinten in einer geraden Linie geendigt. Am Schädel die Schläfengrube von einer knöchernen Blase ausgefüllt; Zähne 40. Dunkelbraun mit schönem grünem und kupferfarbigem Schimmer (im Weingeist von prachtvoller grüner, goldner und kupferiger Metallfarbe).

2. Ch. obtusirostris Peters, der stumpfschnaußige Goldwurf; fusca, nitore viridi-aureo; labiis, genis gulaque albidis; cartilagine nasali duplo latiori quam longa, unguibus anterioribus mediocribus, dentibus 36.

Chrysochloris obtusirostris. Peters Bericht d. Berl. Akademie 1851. S. 467; Mossamb. I. S. 70. tab. 18. (Thier), 22. fig. 18—23 (Schädel und Füße).

Von Peters bei Inhambane in Mossambique entdeckt und nach dem äußern und innern Bau sehr sorgfältig beschrieben. Der Körper mißt 4" 1‴, der Nasenknorpel ist $2\frac{1}{2}$‴ lang und 5‴ breit. Zähne sind 36 vorhanden. Wirbel 43, nämlich 7 Hals-, 19 Rücken-, 4 Lenden-, 5 Kreuz- und 8 Schwanzwirbel. Die Farbe ist dunkelbraun, mit grünem goldigen oder kupferigen Metallglanz; Lippen, Kopfseiten, Kinn und Kehle sind gelblichweiß, was in einem Bogen um das Ohr scharf abgrenzt; die Nase ist bräunlichgelb, Nägel schmutziggelb. Die einzelnen Haare, mit Ausnahme der einfarbigen gelblichen, sind am Grund schieferfarbig, in der Mitte blasser und am metallisch glänzenden Ende dunkelbraun.

Von Ch. inaurata verschieden durch minder starke Krallen, geringere Zahl von Zähnen und Mangel der knöchernen Auftreibung in der Schläfengrube. In letzteren beiden Stücken kommt Ch. obtusirostris mit Ch. affinis überein, welche auch einen ähnlich geformten Jochbogen hat, aber bei letzterer finden sich 20 Rippenpaare und der Schädel ist erheblich länger und erscheint dadurch schmächtiger.

3. Ch. rutilans Wagn., der Röthel-Goldwurf; splendide rutilo-castanea, genis maxillaque inferiori albentibus; cartilagine nasali parum longiore quam lata, unguibus anterioribus validissimis.

Chrysochloris rutilans. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 125.

Kaffernland. Körper 4½", Krallen 6‴, Zähne 36, Krallen sehr lang und breit, Nasenknorpel etwas länger als breit. Pelz glänzend kastanien- braunroth, aber ohne merklich irisirenden Schiller; Unterkiefer in's schmutzig Weißliche fallend; Krallen licht horngelblich. — Wahrscheinlich wird das von mir als Ch. affinis a. a. O. S. 123 beschriebene Skelet dieser Art angehören, doch habe ich zur sicheren Entscheidung keinen vollständigen Schädel von Ch. rutilans vor mir.

* Ch. hottentotta Smith.

A. Smith, South Afr. quart. journ. 1833. p. 81; zool. journ. IV. p. 436. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 126.

In den inneren Theilen von Südafrika. Länge ohngefähr 4". Schnautze schwach verlängert, mit nackter fleischfarbiger Spitze; Pelz röthlichbraun, ins Rost- oder Kastanienfarbige übergehend; bei Jungen mehr oder weniger dunkel schwärzlichgrün. — Scheint mir mit Ch. rutilans identisch, doch muß das Gebiß noch untersucht werden.

** Ch. holosericea Licht.

Lichtenst. Darstell. tab. 41. fig. 2. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 124.

Kapkolonie gegen die Grenze des Kaffernlandes. Nasenknorpel mehr lang als breit. Pelz braungelb mit grünlichem Schiller. Körper 5", Nasenknorpel 3‴ lang und breit. Nähert sich Ch. rutilans, doch läßt sich, da von Ch. holosericea der Schädel- und Zahnbau nicht bekannt ist, keine weitere Vergleichung vornehmen.

4. Ch. albirostris Wagn., der weißschnautzige Goldwurf; splendide castanea nitore cupreo; faciei colore albo postice lunatim exciso; cartilagine nasali attenuato, unguibus anterioribus mediocribus. — Tab. 39.

Chrysochloris albirostris. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 125.

Kaffernland. Körper 4", Nasenknorpel 3‴, Grabnagel 5‴. Zähne 36, Schädel ohne Auftreibung in der Schläfengrube; Nasenknorpel länger als breit und zugespitzt; Krallen an Größe beträchtlich denen der Ch. rutilans nachstehend. Der Pelz prächtig röthlich kastanienfarbig mit schönem, nur selten ins Grünliche spielendem Kupferschimmer; das Gesicht

Fleck bedeckt, der in der Mitte tief concav ausgeschnit-
und Kehle lichtgraulich. Ist nach der Form der obern
ne sowohl von Ch. rutilans als Ch. obtusirostris spe-

nsis Ogilb., der damarische Goldwurf; fusca, nitore
xillaque inferiore albidis.

is damarensis. Ogilb. ann. of nat. hist. II. p. 146. —
lem. II S. 126.

n Südafrika. Länge 4½". Braun oben wie unten mit
gelblichweißer Halbkreis die Wangen, Lippen und den
nend. — Von Ch. albirostris schon durch die
es ganzen Unterkiefers verschieden. Gebiß nicht be-

sa Smith, der borstige Goldwurf; flavido-fusca, vellere

ris villosa. A. Smith South Afr. quart. journ. 1833. I. p
— Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 127.

örper 5", große Grabkralle 6'''. Von allen andern Arten
rigiden Pelz verschieden. Glänzend gelblichbraun, etwas
gesprenkelt; Ober- und Unterlippe, Kinn und ein schiefer
Mundwinkel und Halsseiten gelblichweiß. Schädel und
eben.

V. Familie.

Aculeata. Gestachelte Insektenfresser.

dis setisve tectum, pedes regulares, cauda brevis aut

veri,

Ursprünglich blos auf Madagaskar einheimisch und eine Uebergangsform von den Spitzmäusen zu den eigentlichen Igeln darstellend. Der Habitus ist fast schweinsartig, der Kopf in eine sehr lange spitze Schnauze auslaufend, die Ohren kurz, Augen mäßig, der Schwanz ganz fehlend, die Füße fünfzehig mit mittelstarken Krallen, die Oberseite mit Borsten und mehr oder minder auch mit wirklichen Stacheln besetzt. Der Schädel stellt eine Mittelform zwischen dem der Spitzmäuse und Schweine dar, mit ersteren den Mangel des Jochbeins theilend. Das Gebiß besteht aus 38 bis 40 Zähnen, nämlich Schneidezähne $\frac{6}{6}$ oder $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$:$\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{6}{6}$:$\frac{6}{6}$. Die Schneidezähne sind klein und von den obern fällt der hintere mit der Zeit aus. Die Eckzähne gleichen denen der Fleischfresser, indem sie lange, einwurzelige Fangzähne darstellen und der untere vor dem obern eingreift. Von den Backenzähnen kann man die 2 ersten als Lückenzähne ansehen; die hinter ihnen folgenden 4 sind im Oberkiefer mehr zusammengedrückt als beim Igel. Unter allen Insektenfressern sind die Borstenigel die einzigen, welche ächte Eckzähne besitzen.

1. C. ecaudatus Schreb., der Tanrek; flavidus, albido-punctulatus; cervice, colli lateribus, interscapulioque aculeis armatis.

Centetes ecaudatus. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 34, 552. — C. setosus. Desmar. mammif. p. 161. — Is. Geoffr. dict. class. XVI. p. 40; mag. de zool. 1839. p. 30. tab. 1. — C. variegatus. Gray ann. of nat. hist. 1836. p. 581. — Erinaceus ecaudatus. Schreb. III. S. 584. tab. 165. — Tanrec. Buff. XII. p. 438. tab. 56. — Clark ann. of nat. hist. 2. ser. I. p. 75. — Desjard. ann. des sc. nat. XX. p. 179.

Madagaskar; auf Isle de france eingeführt und hier in ungeheurer Anzahl verwildert. Körper 10″, Kopf allein über $3\frac{1}{2}$″. Fell falb, oben mehr oder weniger weiß getüpfelt; am Hinterkopf, Nacken, Halsseiten und Widerrist mit Stacheln, weiter hinterwärts mit Borsten besetzt.

* C. semispinosus Cuv., der weißschopfige Tanrek; minor, cervice aculeis omnino albidis tecto.

Centetes semispinosus. Cuv. règn. anim. I. p. 125. — Is. Geoffr. dict. class. XVI. p. 41; magas. de zool. 1839. p. 15. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 35, 553. — Setiger variegatus. Geoffr. nouv. dict. XXXIII. p. 54. —

[illegible] Schreb. tab. 165*. — Jeune Tanrec. Buff. suppl. III.

[illegible] Körper 4 bis 5". Nur nach Buffon's Exemplare ge- [illegible] ein junges Thier ist. Stacheln des Schopfs durch- [illegible] C. ecaudatus in der Mitte braunschwarz; Kopf [illegible] licher Längslinie auf dem Nasenrücken, bei C. ecauda- [illegible] fahlgelb. — Ist wohl nichts weiter als eine Farben- [illegible] eren.

[illegible] s Is. Geoffr., der stachlige Tanrek; nigricans, albido- [illegible] toto aculeis armato.

[illegible] atus. Is. Geoffr. magas. de zool. 1839. p. 17. 31. tab. 2. [illegible] Supplem. II. S. 552.

[illegible] Körper $7\frac{1}{2}$". Pelz schwärzlichgrau, mit Weiß sehr be- [illegible] Nacken und der übrigen Oberseite mit sehr starren [illegible] Kreuz mit sehr feinen und halbbiegsamen Stacheln [illegible]

[illegible] culeis tantum tectum. cauda breviuscula, dentes laniarii spurii, [illegible]

XVII. ERICULUS. Spitzigel.

[illegible] gatum, ungues validi, dentes primores $\frac{4}{4}$, molares an- [illegible] longati.

[illegible] angehörig. Im ganzen Habitus, Stachelbesatz, Form [illegible] handenseyn eines kurzen Schwanzes mit den Igeln, [illegible] reckte Schnautze und den Mangel des Jochbeins aber [illegible] n übereinkommend. — Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$:$\frac{1}{1}$, [illegible] 6. Die Form der Backenzähne ist ähnlich der der Borsten- [illegible]

[illegible] Inv. [illegible] f. p. [illegible] II.

S. 33, 551. — Erinaceus setosus. Schreb. III. S. 583. tab. 164. — Tendrac. Buff. XII. p. 438. tab. 57.

β) aculeis nigris, apice albidis.

Ericulus nigrescens. Is. Geoffr. mag. p. 25, 33. tab. 3, 4. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 551.

Madagaskar. Körper 5″ 10‴ bis 7½″, wovon der Kopf allein ohngefähr ⅛ ausmacht. Is. Geoffroy unterscheidet 2 Arten: 1) E. spinosus, von dem nur das Buffon'sche Exemplar bekannt ist, mit Stacheln, deren seitlicher Theil nach außen röthlich ist mit kurzer weißlicher Spitze; 2) E. nigrescens, sichtlicher Theil der Stacheln nach außen schwarz, zum Theil mit weißlichen oder röthlichen Spitzen. — Diese geringen Differenzen werden wohl nicht ausreichend seyn zur specifischen Trennung.

XVIII. ECHINOGALE. Sokinah.

Rostrum breviusculum, ungues parvuli, dentes primores ¼, molares angusti transversim elongati.

Ebenfalls Madagaskar angehörig. In der äußern Beschaffenheit der Schnautze, Ohren, des Schwanzes, Stachelbesatzes und der fünfzehigen Füße ganz mit den Igeln übereinkommend, von welchen der Sokinah sich nur in der Beschaffenheit des Schädels und Gebißes unterscheidet, während er dagegen in beiden letzteren Stücken mit dem Spitzigel nahe verwandt ist, von dem er jedoch durch die kurze Schnautze und die schwächeren Krallen differirt. Der Schädel ist dem des Igels ähnlich, aber schon durch den Mangel der Jochbögen von ihm abweichend. Das Gebiß mit seinen 32 Zähnen ordnet Martin so an: Schneidezähne ¼, Eckzähne 1·1, Lückenzähne 1·1, ächte Backenzähne 4·4. Die Eckzähne sind nur falsche; die Backenzähne sind wie bei Centetes beschaffen.

1. E. Telfairi Mart., der Sokinah; spinis basi brunneo-albis, apice castaneis.

Echinops Telfairi. Martin proceed. VI. p. 17; transact. of the zool. soc. II. p. 249. tab. 46. — Echinogale Telfairi. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 30, 549.

Madagaskar. Körper 5″ 2‴, Ohren 5‴. Stacheln an der Basis

[illegible] der Spitze kastanienfarbig, Kopf oben braun, Unter[illegible]ßlich.

XIX. ERINACEUS. Igel.

[illegible] mediocre, dentes primores superiores 6, molares lati quadrati, [illegible] validus.

[illegible] Welt verbreitet. Der Kopf ist spitz zulaufend, aber [illegible]ng; der Rücken mit harten Stacheln, dagegen Unterleib, [illegible]opf nur mit borstigen oder weichen Haaren besetzt. Die [illegible]mäßig oder selbst lang; Schwanz und Füße kurz, letztere [illegible]igen Arten an den Hinterfüßen blos vierzehig, mit star[illegible]rper vollkommen einrollbar. Der Schädel ist von den [illegible]n dieser Familie schon durch das Vorkommen eines star[illegible]erschieden. Zähne sind 36 vorhanden, die wir mit Owen [illegible]innen: Schneidezähne $\frac{3-3}{3-3}$, Lückenzähne $\frac{1-1}{1-1}$, Backenzähne $\frac{3-3}{3-3}$. [illegible]idezahn im Ober- wie im Unterkiefer ist sehr lang und [illegible] erste Lückenzahn hat keine Aehnlichkeit mit einem Eckzahn; [illegible]n 3 hintersten Backenzähnen ist seiner Form nach mehr [illegible]Backenzähnen beizuzählen; der vorletzte und der diesem [illegible]ackenzahn im Oberkiefer ist quadratisch.

[illegible] scutis simpliciter sulcatis, gastraeo setis tecto.

[illegible] europaeus Linn., der gemeine Igel; auriculis mediocribus, [illegible]ltis unguibusque validis, toto corpore subtus et lateribus [illegible]escentibus, fronte haud spinosa.

[illegible] europaeus. Linn. XII. p. 75. — Schreb. III. S. 580. tab. [illegible]t. quadr. p. 76. — Pall. zoogr. I. p. 137. — Wagn. Schreb. [illegible]0. — Nilss. skand. faun. I. p. 92. — Sundev. Stockh. Vet. [illegible] p. 223. — Hérisson. Buff. VIII. p. 28. tab. 6; Daubent.

[illegible] zum [illegible] Der [illegible] 11‴, [illegible] furcht. [illegible] fuscus, [illegible] ntibus,

Erinaceus concolor. Martin proceed. V. p. 102. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 20. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1841. p. 227.

Um Trapezunt in Kleinasien. Körper 9½". Stacheln bis auf ⅓ ihrer Länge gelblichbraun, dann dunkler, was an der äußersten Spitze wieder in die vorige Farbe übergeht. Unterseite intensiv schwärzlichbraun, Brust schmutzig weißlich. Durch die mit Stacheln besetzte Stirne, längeren Hinterfüße und düstere Färbung vom vorigen verschieden.

3. E. frontalis Smith, der weißstirnige Igel; spinis albidis in medio fuscis, gastraeo fusco pilis griseis intermixto, fascia frontali transversa alba.

Erinaceus frontalis. A. Smith, South Afr. journ. 1831. N. 5; zool. of South. Afr. tab. 3. — Bennett proceed. II. (1832). p. 193. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 21, 548. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1841. p. 226.

Südafrika. Körper 7½", Schwanz ½". Die Stacheln sind bis auf die Stirne vorgerückt, gelblichweiß, in der Mitte und manchmal auch an der feinen Spitze saftig schwarzbraun gefärbt. Kopf und Seiten sind schwärzlichbraun oder rostbraun mit eingemengten weißlichen Borsten; Unterseite des Halses nebst der Längsmitte des Unterleibs grauweißlich. Ueber die Stirne und Wangen verläuft eine breite weiße Querbinde; Füße bräunlich oder in der untern Hälfte weißlich.

4. E. albiventris Wagn., der weißbäuchige Igel; gastraeo toto lateribusque setis albis tectis, aculeis albo et flavido-brunneo annulatis, pedibus gracilibus.

Erinaceus albiventris. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 22.

Angeblich aus Indien. Länge nach der Krümmung 6½", Ohren 8‴. Stacheln ziemlich lang, fein längsgefurcht, weiß mit falbbräunlichem Ringe. Kopf, Leibesseiten und ganze Unterseite mit weißen Borsten besetzt. Füße schlank, weißlich, Hinterdaumen (wenn nicht zufällig abgestoßen) nur durch eine Warze angedeutet, Nägel weißlich.

5. E. Pruneri Wagn., der Straubigel; gastraeo toto setis albidis tecto, aculeis brevibus albo et nigro-annulatis, pedibus posterioribus 4-dactylis.

Erinaceus Pruneri. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 23. — E. heterodactylus. Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1841. p. 227.

Sennaar, nach Sundevall auch am Senegal. Körper 7½", Ohren 7½'''. Stacheln kurz, fein gefurcht, in der Mitte, bisweilen auch die feine Spitze, mit schwarzbraunem Ring. Stirne, Kopf- und Leibesseiten, ganze Unterseite und Beine schmutzig weißlich; Hinterbeine ohne Daumen.

††) aculeis sulcatis et granulatis, gastraeo pilis mollibus tecto.

6. E. auritus Pall., der langöhrige Igel; gastraeo toto vellere molli, albo aut brunneo vestito, auriculis majoribus ovalibus.

Erinaceus auritus. Pall. nov. comment. acad. Petrop. XIV. p. 573. tab. 21. fig. 4; zoogr. I. p. 138. — Schreb. III. S. 582. tab. 163. — Lichtenst. in Eversm. Reise S. 124. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 24. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1841. p. 231. — Horsf. catal. p. 138.

Von der Wolga und dem Kaukasus durch das mittlere Asien bis zum Baikalsee und in Mesopotamien verbreitet. Gewöhnliche Länge 6 bis 7½", Ohren 1" 4'''; ein Dauurisches Exemplar war 9" 7''' lang. Bei jüngeren Thieren sind die Stacheln lichter gefärbt und die weiche Behaarung des Gesichts und der Unterseite ist weiß; ältere werden oben schwärzer und unten bräunlichgrau.

7. E. brachydactylus Wagn., der kurzzehige Igel; supra albo-flavescens, subtus vellere molli albo aut fuscescente tecto, auriculis mediocribus, digitis unguibusque brevibus.

7. E. brachydactylus. Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 24. — E. aethiopicus. Ehrenb. symb. phys. dec. II. k. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1841. p. 229.

Aegypten, ohne nähere Bezeichnung. Körper nach der Krümmung 19", in gerader Linie 7" 4''', Ohren 1", Stacheln ohngefähr eben so lang oder etwas länger, gegen die Stirne etwas kürzer, gelblichweiß, am Beginn des obern Drittels mit schmalem bräunlichem Ringe. Die weiche Behaarung der Stirne, der Leibesseiten und zum Theil des Unterleibs ist weiß; Schnautze, Brust, Bauchmitte und Hintertheil licht rostbraun, Beine bräunlich.

* E. platyotis Sund., der breitöhrige Igel; „dense albido-pilosus, auriculis maximis, pollice postico brevissimo.“ Sund.

Erinaceus platyotis. Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1852. p. 232.

Aegypten. Körper $6\frac{1}{2}''$, Ohren 12 — 13‴, Stacheln des Mittelrückens 8‴. Nach Sundevall verhalten sich die Stacheln in Größe und Färbung wie bei E. auritus. Behaarung weiß, Gesicht und Stirne graulich, Schnautze brauner, Füße lichtbraun. Ich würde diesen E. platyotis mit E. brachydactylus zusammen stellen, wenn nicht in der Länge der Stacheln ein allzu großer Unterschied wäre.

8. E. libycus Ehrenb., der libysche Igel; „E. europaeo et aurito minor, supra nigrofuscus, subtus flavidus, postice albicans, antice rufescens, toto capite fusco."

Erinaceus libycus. Ehrenb. symb. phys. dec. k. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 26.

Um Alexandrien. Nach einem einzigen Exemplare charakterisirt.

* E. aegyptius Sund., der aegyptische Igel; „dense molliter albido-pilosus, auriculis longit. $\frac{1}{3}$ capitis, pollice postico brevi perfecto." Sund.

Erinaceus aegyptius. Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1841. p. 234.

Unterägypten. Länge 6 bis 8". Sundevall unterscheidet diesen E. aegyptius von seinem E. platyotis hauptsächlich durch die kleineren Ohren, die kaum größer seyen als beim E. heterodactylus. Mit ihm vereinigt er den E. libycus und Geoffroy's E. auritus aus Aegypten, von welchem letzteren ich jedoch meine, daß er sich auf den E. brachydactylus bezieht. Sundevall führt mehrere Farbenabänderungen an: bei einer sind Ohren, Schnautze und Füße schwarz, bei andern fallen diese Theile ins Braune.

** E. algirus Duv., der algier'sche Igel; „auriculis subarcuatis, digitis et unguibus mediocribus; toto corpore subtus pilis confertissimis, mollibus, magnopere albis vestito." Duv.

Erinaceus algirus. Duvern. et Lereboullet, mém. de Strasb. III. p. 4.

Oran. Länge 6". Könnte zu E. brachydactylus oder E. libycus gehören, doch fehlt es noch an speciellen Vergleichungen.

†††) sedis incertae.

9. E. hypomelas Brandt, „longissime auritus, rostro, gula pectorisque media parte nec non antipedum apicibus albidis; auriculis, mento et

[illegible] um basin albis; aculeis basi nigricantibus, medio sor- [illegible] cauda, aculeorum apicibus pedibusque nigris."

[illegible] omelas. Brandt bullet. de l'acad. de Pétersb. I. p. 32. [illegible] pplem. II. S. 21.

[illegible] nd. Die ausführliche Beschreibung fehlt noch.

[illegible] Gray.

[illegible] ool. I. tab. 8; list. of Brit. mus. I. p. 81. — Ogilb. Royle [illegible] Blyth journ. of the Asiat. soc. 1853. p. 582.

[illegible] blich das Doab. Nach der Abbildung (die Beschrei- [illegible] Ohren groß, spitz und stark ausgebuchtet; Farbe [illegible] lichen Reflexen, Kopf und Füße bräunlich; von den [illegible] t ein schmales weißes Band um die Kehle herum. [illegible] ach Vergleichung der Original-Exemplare nicht für un- [illegible] llaris mit E. Grayi und E. Spatangus zusammen [illegible] yth's Bemerkungen haben zur Feststellung dieser Art [illegible] nen.

[illegible] Benn.

[illegible] 2) p. 124. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 28. — Gray [illegible] 81.

[illegible] rper 6", Ohren 1". Form breit oval. Stacheln [illegible] obern Hälfte mit schwärzlichem Ring. Kopf oben [illegible] Haaren untermischt, Ohren und Unterkiefer weiß be- [illegible] aß braun. Ein Junges ist viel dunkler. — Bennett [illegible] h den Mangel des weißen Halsbandes für verschieden [illegible] ch Gray trennt beide.

[illegible] us Benn.

[illegible] ray

[illegible] lfte [illegible] iten [illegible] und [illegible] gus

nur ein junger E. Grayi ſeyn dürfte, wird wohl das Wahre getroffen haben [1]).

1) Bis genauere Nachweiſungen beigebracht werden, mag es genügen die Namen einiger andern, angeblich neuen, indiſchen Arten anzuführen. Dieß ſind: 1) Erinaceus micropus Blyth (Journ. of the Asiat. soc. XV. p. 170); 2) E. nudiventris Horsf. (catal. p. 136), den Horsfield für identiſch mit voriger Art vermuthet; 3) E. mentalis Gray (list. of mamm. p. 81), von dem nichts weiter als der Namen und der Himalaya als Wohnort angegeben iſt.

VIII. Ordnung.

[illegible]ndflügler. CHIROPTERA.

[illegible] tenui denudato, inter antipedum digitos longissimos [illegible] cinctum; mammae pectorales; dentes trium ordinum.

[illegible] dieser Ordnung die Gattung Galeopithecus, die [illegible] aufgedrungen wurde, hinwegnimmt, ist sie eine der na[illegible] Thierreiche, die sich durch die Beschaffenheit ihrer [illegible] von allen andern abgrenzt. Zur Feststellung der Un[illegible] Cuvier und Andere die Zahl der Phalangen in [illegible] habe jedoch gefunden, daß dieß Merkmal nicht ganz [illegible] die Anzahl der Fingerglieder sich in nachstehender [illegible] kommen hierbei nur die Chiroptera insecti[illegible] bei den Ch. frugivora kein Zwiespalt in den An[illegible] der Fingerphalangen besteht, wohl aber bei jenen. [illegible] Cuvier die insektenfressenden in 2 Gruppen: die erste [illegible] Phyllostoma) mit 3 Phalangen am Mittelfinger, mit [illegible] anderen Fingern; die zweite Gruppe (Megaderma, [illegible] ertilio) am Zeigefinger mit nur 1, an den andern [illegible] angen. Andere Zählungen haben zum Theil Tem[illegible] i. Letzterer theilt überhaupt die Handflügler ab in:

[illegible]

ger Autoritäten, ergeben sich folgende Resultate: 1) Der Mittelfinger hat blos bei den amerikanischen Phyllostomen 3 knöcherne Phalangen aufzuweisen, während er bei allen andern Handflüglern nur 2 besitzt. Die einzige Ausnahme macht unser Skelet von Vespertilio serotinus aus, indem bei ihm der Mittelfinger ebenfalls 3 knöcherne Phalangen hat, eine Anomalie, die wahrscheinlich blos durch Verknöcherung der Endsehne entstanden ist. 2) Temminck's Angabe von der Gliederzahl der Finger bei Vespertilio, der ich leider ohne weitere Prüfung in meiner Fortsetzung von Schreber gefolgt bin, ist irrig. 3) Tschudi's Eintheilungsgrund nach der Gliederzahl des Zeigefingers ist nicht ganz stichhaltig, da die Phyllostomen entweder gar keine knöcherne Phalanx, sondern nur einen sehnigen Faden tragen, oder es ist wirklich eine knöcherne Phalanx vorhanden. Ferner lassen sich Noctilionen und Vespertilionen nicht in 2 verschiedene Gruppen bringen, da bei ihnen der Zeigefinger von gleicher Beschaffenheit ist. 4) Der Zeigefinger fehlt den meisten insektenfressenden Handflüglern; nur mitunter findet sich am Anfang eine Verknöcherung seines kurzen Sehnenfadens. Eine vollkommen knöcherne Phalanx stellt sich blos bei einigen Phyllostomen und an unserem Skelet von Vesp. serotinus ein. 5) Bei allen Arten haben 4ter und 5ter Finger nie mehr oder weniger als 2 knöcherne Phalangen.

Ich habe die frühere Eintheilung in 3 Familien, die unter 2 Hauptabtheilungen begriffen werden, beibehalten, nämlich:

A. Chiroptera frugivora.

1ste Familie: Frugivora.

B. Chiroptera insectivora.

2te Familie: Istiophora.

3te Familie: Gymnorhina.

Meine erste Bearbeitung der Ordnung der Handflügler ist bereits im Jahre 1840 erschienen. In den 15 Jahren, die mittlerweilen verflossen, haben sich viele Zusätze und Berichtigungen nothwendig gemacht, so daß ich es, wie bei der vorhergehenden Ordnung, für zweckdienlich erachtet habe, die sämmtlichen, mir dermalen bekannten Arten in einer gedrängten Uebersicht mit Diagnosen und kurzen Erläuterungen zusammen zu stellen.

[illegible] Arbeit bei einer Art nicht citirt ist, ist es ein [illegible] erst seitdem als neu zugegangen ist.

I. Familie.

[illegible] frugivora. Stumpfzähnige Handflügler.

[illegible] veri longitudinales obtusi.

[illegible] der Gattung Hypoderma ist bei allen außer dem [illegible] der Zeigefinger mit einer Kralle bewaffnet. Sie [illegible] nahrung aus dem Pflanzenreiche und gehören ledig- [illegible] egenden der östlichen Halbkugel an.

I. PTEROPUS. Flederhund.

[illegible] es $\frac{4}{4}$, index antipedum unguiculatus, rostrum productum [illegible] cauda brevissima aut nulla.

[illegible] Gattung aus dieser Familie, welche von Aegypten bis [illegible] Arabien bis nach Vandiemensland verbreitet ist. Das [illegible] $\frac{4}{4}$ Schneidezähnen, $\frac{1}{1}$:$\frac{1}{1}$ Eckzähnen, $\frac{5}{6}$:$\frac{5}{6}$ oder $\frac{4}{5}$:$\frac{4}{5}$ Backen- [illegible] en sind die drei hintersten ächte Backenzähne, die vor [illegible] kenzähne. Der erste Lückenzahn stellt blos ein kleines [illegible] nd fehlt bisweilen.

1. Subgen. Pteropus.

[illegible] s $\frac{5}{6}$, rostrum elongatum.

[illegible], pollex liber, mammae axillares. — Pteropus.

[illegible] Merkmal fügt Peters noch bei, daß der Schädel hin- [illegible] des Schädels am meisten verschmälert und die Eichel [illegible] m Knochen versehen ist. Diese Abtheilung ist auf Asien [illegible] afrikanischen Inseln beschränkt; dem Festlande von [illegible]

[illegible] ser- [illegible] coo- [illegible] nogr. [illegible] —

[illegible] V. p.

186. — S. Müller verhandel. I. p. 20. — Horsf. catal. of the mus. of the East-Ind. Comp. p. 27. — Pteropus javanicus. Horsf. zool. research. N. IV.

Java, Sumatra, Banda, malayiſche Halbinſel, Aſſam, Bengalen. Die größte Art: Körper 15", Vorderarm 7" 7‴.

2. Pt. Pluto Temm., der Mohren-Flederhund; totus niger, macula nuchali rutilo-fusca.

Pteropus Pluto. Temm. esq. zool. sur la côte de Guiné. p. 56.

Bewohnt die ſundaiſchen Inſeln Bali und Lombok und kommt an Größe mit dem Kalong überein. Der Pelz der Unterſeite iſt ziemlich lang und buſchig mit rauhen, etwas gekräuſelten Haaren; die der Oberſeite ſind glatt, gerade und ſpärlicher, in der Kreuzgegend etwas gekräuſelt. Die Ohren ſind lang, zugeſpitzt und ſchwarz. Flugweite 4' 7", Vorderarm 8", Schienbein 4". Der ganze Pelz iſt faſt einförmig ſchwarz, oben mit einzelnen falben Haaren. Auf dem Nacken ſteht ein großer dunkel röthlichbrauner Fleck, der von keiner Nackenbinde eingeſäumt iſt; das Uebrige der Oberſeite iſt vollkommen und glänzend ſchwarz. Alle Häute ſind nackt und ſchwarz, unten mit ſpärlichen ſchwarzen Haaren längs der Seiten, auf dem Oberarm und einem Theil des Vorderarms. Die Schenkelflughaut iſt groß und hat am Steiße eine Breite von 14‴.

3. Pt. jubatus Esch., der gemähnte Flederhund; fuscus aut nigricans, occipite cerviceque flavis, auriculis longis apice rotundatis, patagio anali ad coccygem interrupto.

Pteropus jubatus. Eſchſcholtz zool. Atl. IV. S. 1. tab. 16. — Temm. monogr. II. p. 59. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 343. — Blainv. ostéogr. Vespert. tab. 1, 2. (Skelet). — Pteropus pyrrhocephalus. Meyen nov. act. Bonn. XVI. 2. p. 604. tab. 45, 46, fig. 1—3. — Acerodon Jourd. Fr. Cuv. ann. des. sc. nat. 2° sér. VIII. p. 376.

Inſel Luzon. Körper 11", Vorderarm 6½". Haare des Hinterhalſes verlängert. Von Pt. edulis und Edwardsii, außer der Färbung, hauptſächlich durch die abgerundeten Ohren und die am Steiße unterbrochene Schenkelflughaut unterſchieden.

4. Pt. Edwardsii Geoffr., der rothbäuchige Flederhund; e fulvo ferrugineus, dorso nigricante, auriculis longis acuminatis, patagio anali ad coccygem haud interrupto.

rdsii. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 92. — Temm. mo-
gn. Schreb. Supplem. I. S. 345. — Blyth ann. of nat.
onogr. catal. p. 28. — Peters Mossamb. I. S. 23. —
Hodgs. journ. of the Asiat. soc. IV. p. 700. — Pt. assa-
p proceed. VII. p. 148. — Pt. medius. Temm. monogr. I.
collis. Mc. Clell.

jen, Assam, Nepal, Ceylon, Madagaskar, Comoren,
ischen Inseln. Körper 11″, Vorderarm 5″ 9‴.
anienbraun, Rücken schwärzlich, Hinterhals lebhaft
seite braunroth. Altes Männchen mit Haarbüschel
alses. Peters hat begründetes Bedenken erregt,
piduen mit denen von Madagaskar wirklich zu einer

s Temm., der düstere Fledерhund; niger, cervice
ostro tenui, auriculis longis acuminatis, patagio anali

reus. Temm. monogr. II. p. 63. tab. 35. fig. 4. (Kopf). —
m. I. S. 316.

neo, Amboina, Timor. Körper 11″, Vorderarm 6¼″.
Schnautze dünner, Schenkelflughaut schmäler als bei
ig nach Alter und wohl auch nach Jahreszeiten ver-

atus Gray, der silberige Fledерhund; niger, cer-
pillis nonnullis apice argentatis.

ntatus. Gray zool. of the voy. of Sulphur mamm. p. 30.

annt, ob Amboina? Körper 10″ 6‴, Vorderarm
Rücken fein gesprenkelt, Kopf schwach gelb angelaufen,
und Nacken licht goldgelb; einige der längern Haare

Celebes, Amboina und Banda. Körper 10 — 11″, Vorderarm 5″ 8‴. Flügel so hoch angesetzt, daß sie nur ¼ Zoll voneinander abstehen; Rücken bei Alten ganz nackt.

8. Pt. poliocephalus Temm., der grauköpfige Flederhund; cinereus, torque collari castaneo-rufo per fasciam nigram a colore cinereo sejuncto.

Pteropus poliocephalus. Temm. monogr. I. p. 179, II. p. 66. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 347.

Neuholland, Vandiemensland. Körper fast 1′, Vorderarm 5″ 7‴. Ohren mittellang, Schenkelflughaut am Mittelfuß 10‴ breit, allmählig sich verschmälernd und am Steiß ganz verschwindend.

9. Pt. conspicillatus Gould, der Brillen-Flederhund; niger, torque collari incompleto fusco.

Pteropus conspicillatus. Gould ann. of nat. hist. sec. ser. VI. p. 138. — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 57.

Fitzroy-Insel bei Neuholland. Größe fast des Pt. poliocephalus, aber verschieden dadurch, daß Kopf und Rücken fast kohlschwarz sind, daß das Halsband statt rostroth tief sandig braun und auf dem Nacken unterbrochen ist und die Augen mit einem dunkelbraunen Ringe umgeben sind.

10. Pt. chrysoproctus Temm., der goldbrüstige Flederhund; e fusco nigricans, capite, collo et pectore aurato-rufis, patagio anali angusto ad coccygem rudimentario.

Pteropus chrysoproctus. Temm. monogr. II. p. 67. tab. 35. fig. 2. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 348.

Amboina. Körper 10″, Vorderarm 6″. Von Pt. edulis und Edwardsii leicht zu unterscheiden durch die sehr schmale, am Steiße fast verschwindende und hier von der Behaarung verdeckte Schenkelflughaut.

11. Pt. Macklotti Temm., der gelbköpfige Flederhund; auriculis longis acuminatis, patagiis rufo-brunneis, occipite et cervice stramineis, dorso ♂ rubro, ♀ stramineo.

Pteropus Macklotti. Temm. monogr. II. p. 69. tab. 35. fig. 5. (Kopf), 36. fig. 4—6. (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. S. 348.

Timor. Körper 9½", Vorderarm 4" 8‴. Das Männchen am Halſe mit großem Haarbüſchel.

12. Pt. dasymallus Temm., der wollige Fledermaus; lanatus, fuscus, pilis apice ochraceis, collo scapulisque flavido-albidis, auriculis parvis maximam partem absconditis.

Pteropus dasymallus. Temm. monogr. I. p. 180. tab. 10; faun. japon. p. 12. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 349. — Pt. rubricollis. Siebold spicil. faun. japon. p. 13.

Japan. Körper 8", Vorderarm 4" 4‴. Behaarung lang und wollig, Schenkelflughaut am Steiße ganz fehlend.

13. Pt. pselaphon Temm., der rauhfüßige Fledermaus; lanatus, niger, pilis apice griseis, auriculis parvis maximam partem absconditis.

Pteropus pselaphon. Temm. monogr. II. p. 70. tab. 37; faun. japon. p. 12. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 350. — Collin, zool. of Beechey's voy. p. 11. tab. 2.

Bonin-Inſeln im Oſten des japaniſchen Reiches. Körper 8" 3‴, Vorderarm 4¼". Vom Vorigen verſchieden ſowohl durch die Färbung als auch dadurch, daß ſelbſt noch Mittelfuß und Zehen von den Haaren bedeckt ſind.

14. Pt. molossinus Temm., der buſchige Fledermaus; lanatus, flavido-brunneus, subtus nigro-fuscus; capite abbreviato, auriculis parvis maximam partem absconditis.

Pteropus molossinus. Temm. esq. zool. sur la côte de Guiné p. 62.

Von Temminck nach einem männlichen Exemplare unbekannter Heimath beſchrieben, die aber, nach der Beſchaffenheit des Pelzes zu ſchließen, mit der der beiden vorigen Arten übereinkommen wird. Dieſe Art iſt ausgezeichnet durch kurzen Kopf, ſtumpfe Schnautze, kurze, ſchmale und nur wenig aus dem Pelze vorragende Ohren; ferner durch fettige Büſchel an den Halsſeiten, deren Haare von einem Mittelpunkte ausſtrahlen, durch ganz nackte Hinterbeine und durch eine nur rudimentäre Schenkelflughaut. Der Pelz iſt wie bei Pt. dasymallus und pselaphon reichlich, wollig und gekräuſelt mit einzelnen längeren Stichelhaaren. Die Schnautze iſt kurz, behaart, der Vorderarm unten nackt. Schnautze, Kinn und Halsbüſchel ſind hellbraun; die Wolle der Unterſeite iſt ſchwärzlichbraun mit einzelnen

glänzend gelben Stichelhaaren. Kopf und Hals sind etwas dunkler als die Unterseite; der Rücken ist heller braun, mit Gelblich gemischt, indem auf ihm die Stichelhaare häufiger sind. Ohren und Flughäute sind schwarz. Körper 5″ 2‴, Vorderarm 3″ 3‴, vom Auge zur Nasenspitze 6‴.

15. Pt. Alecto Temm., der langflügelige Flederhund; niger, cervice castanea, auriculis brevibus acuminatis, patagio anali ad coccygem subnullo.

Pteropus Alecto. Temm. monogr. II. p. 75; esq. zool. sur la côte de Guiné p. 58. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 351.

Insel Bawean und Celebes. Körper 8½″, Vorderarm 5½″. Flügel sehr lang in Bezug zur Breite, Schenkelflughaut am Steiße nur durch eine Hautfalte angedeutet.

16. Pt. leucopterus Temm., der weißflügelige Flederhund; pallide cinereo-canus, alis angustis albido-terminatis.

Pteropus leucopterus. Temm. esq. zool. sur la côte de Guiné p. 60.

Temminck stellt als zweifelhaft diese Art auf, von welcher er nur ein Exemplar, angeblich von den Philippinen, erhielt; er reihte sie zwischen Pt. Alecto und hypomelanus ein. „Diese große Art, welche von allen ihren Verwandten auf den ersten Blick durch ihre lichte Färbung und die geringe Breite ihrer, mit einem großen weißen, und fast durchsichtigen Fleck geendigten Flügel unterschieden werden kann, läßt sich folgendermassen definiren: der auf allen Theilen des Körpers aschgraue Pelz genügt, um sie nicht mit den andern Flederhunden zu verwechseln; die graue Farbe ist blos auf dem Nacken und den Schultern etwas heller."

17. Pt. hypomelanus Temm., der gesäumte Flederhund; cano nigroque mixtus, subtus fulvidus, nigro-cinctus, capite canescente, torque collari fulvo.

Pteropus hypomelanus. Temm. esq. zool. sur la côte de Guiné p. 61.

Eine neue, auf der Insel Ternate entdeckte Art von der Größe und den Formen des Pt. pallidus, während die Anheftung der Flügel, die Natur des Pelzes und die Farbenvertheilung mehr an Pt. Edwardsii erinnern. Gesicht, Wangen und Hinterhaupt sind weißlichgrau mit einzelnen schwarzen Haaren; Kinn schwarz oder dunkelbraun. Nacken, Halsfei-

ten und Vorderbruſt lebhaft dunkelroth, was bei einigen Individuen minder intenſiv und mit braunen Haaren untermengt iſt. Bruſt und Bauch gelblichroth, was durch ein breites, ſchwärzlichbraunes, von den Achſeln ausgehendes, an den Seiten ſich fortſetzendes und die Aftergegend umſchließendes Band eingeſäumt wird. Der glatte Pelz des Rückens und der gekräuſelte des Kreuzes beſteht aus unregelmäßig gemengten ſchwarzen und grauen Haaren. Die Flughäute ſind ſchwarz; den Steiß umgiebt nur ein ſchmales, durch den Pelz verdecktes Band. Ganze Länge 7 bis 8″, Flugweite 2′ 6 — 7″, Vorderarm 4″ 2‴. — An einem Exemplare fehlt die ſchwarze Einſäumung des Bauches, der ſelbſt mit unregelmäßig gemengten gelblichrothen und braunen Haaren beſetzt iſt, ebenſo iſt es der Rücken mit braunen und gelblichen Haaren.

18. Pt. pallidus Temm., der welkbraune Flederhund; pallide brunneus, nucha, scapulis pectorisque torque ferrugineo-rufis, auriculis brevibus rotundatis.

Pteropus pallidus. Temm. monogr. I. p. 184. tab. 15. fig. 8, 9. (Schädel); II. p. 77. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 352.

Sumatra, Banda, Malakka. Körper 7½″, Vorderarm 4½″. Behaarung kurz, Schenkelflughaut am Steiß kaum merklich, Rücken blaßbraun, Kopf und Unterſeite braun wie welkes Laub.

19. Pt. Keraudrenius Quoy, der Faniḥi; nigricans, griseo-mixtus, occipite, collo scapulisque crispis pallide flavis, auriculis brevibus.

Pteropus Keraudrenius. Quoy et Gaim. voy. de l'Uranie I. p. 51. tab. 3. — Temm. monogr. I. p. 186. tab. 15. fig. 7. (Schädel); II. p. 77. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 353. — Peale, U. St. explor. expedit. VIII. p. 18. — Pt. marianus. Desmar. mammif. p. 547.

Marianen und Fidſchi-Inſeln. Körper 6 bis 8″, Vorderarm 3″ 10‴ bis 4″ 6‴. Farbe aus Braungrau und Schwarzbraun gemengt mit hellerem Tone auf dem Kopfe; Hinterhaupt, Hals und Obertheil der Bruſt etwas ſchmutzig weißlichgelb.

20. Pt. tonganus Quoy, der tonganiſche Flederhund; nigricans, gutture ventreque saturate fuscis; occipite, cervice scapulisque rufis.

Pteropus tonganus. Quoy et Gaim. Astrolabe I. p. 74. tab. 8. — Temm.

monogr. II. p. 79. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 353. — Peale U. St. explor. expedit. VIII. p. 19.

Tonga-Tabu (Freundſchafts-Inſeln). Körper 6". Sehr ähnlich dem vorigen, aber der Kopf ſchwarz, bei jenem grau, ganze Unterſeite dunkelbraun, Hinterſeite des Kopfes und Halſes bis zu den Schultern herab roth.

21. Pt. vanicorensis Quoy, der vanikoriſche Flederhund; brunneus, gutture rufo-brunneo; occipite, cervice scapulisque fulvis, rostro brevi crasso.

Pteropus vanicorensis. Quoy et Gaim. Astrolabe I. p. 77. tab. 9. — Temm. monogr. II. p. 78. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 354.

Inſel Vanikoro in der Südſee. Körper 9", Vorderarm 4" 9"'. Ebenfalls dem Pt. Keraudrenius ähnlich, aber die Schnautze kürzer, Färbung heller, Kopf minder ſchwarz, rother Halsmantel tiefer herabreichend.

22. Pt. Dussumieri Is. Geoffr., der braunkehlige Flederhund; fuscus, albido-mixtus; facie, gula collique regione anteriore fuscis, lateribus colli et cervice flavis.

Pteropus Dussumieri. Is. Geoffr. dict. class. XV. p. 701. — Temm. monogr. II. p. 76. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 355.

Heimath nicht ſicher bekannt: indiſches Feſtland, Amboina? Körper 7". Durch die braune Farbe der Kehle und des Vorderhalſes von Pt. Keraudrenius verſchieden, bei welchem dieſe Theile blaß gelb ſind.

23. Pt. vociferus Peale, der grauflügelige Flederhund; saturate fuscus, capite, collo gastraeoque rufo-brunneis, alis medio griseis, rostro longo angusto.

Pteropus vociferans. Peale U. St. explor. expedit. VIII. p. 19. tab. 1.

Inſel Mangſi in der Straße von Balabak. Körper 8", Vorderarm 4⅛". Haare des Kopfes, Halſes und Leibes weich, wollig und rothbraun, am dunkelſten an den Seiten; Rücken dunkelbraun mit kurzen, geraden und glatten Haaren; Flughaut in der Mitte grau, die Blutgefäße dunkler; die Schnautze lang, ſchmal, die Naſenlöcher geſpalten; Backentaſchen (??) geräumig; Hodenſack nicht ſichtlich; Iris braun.

24. Pt. samoënsis Peale, der ſamoaniſche Flederhund; rutilo-fuscus, capite brevi robusto fulvido, fronte grisea, nucha rufa.

ënsis. Peale U. St. explor. expedit. VIII. p. 20. tab. 2.

nden der Samoan-Gruppe. Körper 8″, Vorderarm obuſt, falb mit grauer Stirne, Ohren kurz, rundlich, d Kehle röthlichbraun, Nacken der Alten roth, der eite röthlichbraun; Haare aufgerichtet und etwas wol- f dem Rücken; Flügel ſchwarz, Iris braun.

us Geoffr., der graue Flederhund; e rufescente viceque crispis dilute rufescentibus, alis approximatis, acuminatis.

bus. Geoffr. ann. du mus. XV. p. 94. tab. 6. — Temm. 11; II. p. 81. tab. 36. fig. 12, 13. (Schädel). — Wagn. 355.

na. Körper 7″, Vorderarm 4″. Altes ♂ am Rü- weißlichen Haarſpitzen, Hinter-, Seiten- und Vorderhals den Schultern ins Goldfarbige übergehend. Altes ♀ auch hellgrau, Nacken nebſt Halsſeiten röthlich. Im Nacken und Schultern röthlichweiß oder lichtröthlich,

natus Temm., der maskirte Flederhund; canus, in- llinus, facie albo et fusco picta, occipite colloque toto

natus. Temm. monogr. I. p. 189. — Wagn. Schreb.

(Molukken). Körper 6½″, Vorderarm 3″ 5‴. Oh-

ris Geoffr., der Kreuz-Flederhund; niger aut ni- ite, cervice fasciisque duabus longitudinalibus laterum

vido-brunneus, subtus cano-brunneus, torque collari aurato-rufo, pectore obscure fusco.

Pteropus rubricollis. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 93. — Temm. monogr. I. p. 183. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 351.

Isle de Bourbon und Madagaskar. Körper 7" 4‴, Ohren klein, abgerundet, versteckt.

b) cauda brevissima, pollex patagio semiinvolutus, mammae pectorales. — Cynonycteris.

Der Schädel ist vor dem Jochfortsatz des Schädels am meisten verschmälert und die Ruthe ist ohne Stützknochen. Die hieher gehörigen Arten sind in Afrika und Indien einheimisch.

29. Pt. stramineus Geoffr., der bleiche Flederhund; supra dilute stramineus aut canescens, pilis apice brunneis, subtus sordide albescens; alis dorso impositis, cauda tuberculiformi.

Pteropus stramineus. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 95. — Temm. monogr. I. p. 195. tab. 15. fig. 12, 13. (Schädel); II. p. 84; esq. zool. sur la côte de Guiné p. 54. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 357. — Sundev. Stockh. Vet. Acad. Handl. 1842. p. 206.

Sennaar und Senegal. Körper 8", Schwanz 2‴, Vorderarm 4" 3‴. Schwanz äußerlich nur als Höcker erscheinend; Flügel hoch am Rücken angesetzt. Pelz kurz, oben gelblich- oder graulichweiß mit braunen Haarspitzen, unten schmutzig weißlich, längs der Mitte bräunlich überlaufen. Das Männchen ist an den Seiten und dem Vordertheil des Halses mit Halsband und Haarbüschel von goldrother oder falber Färbung versehen.

30. Pt. Geoffroyi Temm., der graubraune Flederhund; supra dilute cano-brunneus, subtus sordide albescens; alis lateraliter affixis; cauda brevissima exserta.

Pteropus Geoffroyi. Temm. monogr. I. p. 197. tab. 15. fig. 14, 15. (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 358. — Pt. aegyptiacus. Geoffr. descript. de l'Egypt. II. p. 135. tab. 3. fig. 2.

Aegypten und am Senegal. Körper 5½", Vorderarm 3" 5‴, Schwanz 7‴. Beträchtlich kleiner als voriger, Flügel an den Seiten angeheftet, Pelz weich, licht graubraun, unten viel heller, Häute graubraun.

31. Pt. Leschenaultii Desm., der punktirte Fledерhund; griseo-brunneus, subtus cinereo-fulvus; alarum basi punctis albis seriatim positis notata; cauda brevissima.

Pteropus Leschenaultii. Temm. monogr. II. p. 86. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 359. — Pteropus seminudus. Kelaart. journ. of the Asiat. soc. of Beng. 1852 p. 345.

Pondichery, Calcutta und Ceylon. Körper $5\frac{1}{2}''$, Schwanz 9‴. Der an den Körper, die Vorderarme und Finger angrenzende Theil der Flügel ist mit einer großen Anzahl weißlicher, in Parallellinien gestellter Punkte besetzt.

32. Pt. amplexicaudatus Geoffr., der Scheiden-Fledерhund; supra e fusco, subtus e cano rufescens, cauda brevissima.

Pteropus amplexicaudatus. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 96. tab. 7. — Temm. monogr. I. p. 200, 260. tab. 13, tab. 15. fig. 16; II. tab. 36. fig. 18, 19. (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 359. — Xantharpyia amplexicaudata. Gray, zool. of Sulphur mamm. p. 30.

Java, Sumatra, Amboina, Timor. Körper $4\frac{1}{2}''$, Schwanz 7‴, Vorderarm fast 3″. Schwanz nur an der Wurzel umwickelt und dem größeren Theile nach frei. Behaarung kurz, Rücken fast nackt; Pelz röthlichbraun, unten röthlich braungrau oder röthlichweiß.

33. Pt. Leachii Smith, der schmalflügelige Fledерhund; rufo-brunneus, subtus cinereo-brunneus, ad pectus paululum rufescens, cauda brevissima.

Pteropus Leachii. A. Smith zool. journ. IV. p. 433; Zoolog. of South Afric. tab. 48. — Temm. monogr. II. p. 88. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 361. — Pteropus collaris. Illig. Abh. der Berlin. Akad. 1815 S. 84. — Lichtenst. Verz. d. Doubletten S. 3. — Cynonycteris collaris. Peters Mossamb. I. S. 25.

Kapkolonie und Mossambique. Körper 5″ 3‴, Vorderarm 3″ 2‴, Schwanz 8‴. Ohren mittellang und abgerundet, Flügel schmal, Schwanz von der Schenkelflughaut bis über die Hälfte umwickelt.

34. Pt. Hottentottus Temm., der Hottentotten-Fledерhund; fuscus, subtus griseus; cauda brevi omnino libera, patagio anali ad coccygem exciso.

Pteropus Hottentottus. Temm. monogr. II. p. 87. tab. 36. fig. 16, 17. (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 360. — Eleutherura Hottentotta. Gray, zool. of Sulphur mamm. p. 29.

Kapkolonie. Körper 5″, Vorderarm 3″ 4‴, Schwanz 4‴. Von allen vorhergehenden Arten dadurch verschieden, daß die Schenkelflughaut am Steiße ausgeschnitten ist und aus diesem Ausschnitt der Schwanz frei heraustritt.

2. Subgen. Pachysoma.

Dentes molares utrinque $\frac{2}{2}$ aut $\frac{1}{2}$; cauda brevissima inclusa, pollex patagio seminvolutus, mammae pectorales.

Der Hauptunterschied von Pteropus liegt in dem Mangel des letzten Backenzahns auf jeder Kieferseite. Durch die Umhüllung des Daumens, des Vorhandenseyn eines sehr kurzen Schwanzes, der leicht übersehen wird, und durch die Lage der Zitzen stimmt diese Untergattung mit der vorhergehenden, als Cynonycteris aufgeführten Abtheilung überein. Nach Temminck's Angaben genießen die Pachysomen außer Früchten auch noch Insekten.

a) dentes molares $\frac{2}{2}$, inter se sejuncti. — Epomophorus Benn.

Alle Arten gehören Afrika an. Im Oberkiefer fehlt außer dem hintersten Backenzahn auch der vordere kleine Lückenzahn; die Männchen haben gewöhnlich an jeder Halsseite einen Haarbusch, der jedoch auch bei manchen andern Arten von Flederhunden vorkommt. Die Species sind noch nicht mit Sicherheit auseinander gesetzt.

35. Pt. crypturus Pet., der tettische Flederhund; dilute umbrinus, subtus pallidior, macula albida ante et post auriculas, scopis humeralibus nullis.

Epomophorus crypturus. Peters Mossamb. I. S. 27. tab. 5. (Thier), 13. fig. 1—6. (Schädel).

Von Peters bei Tette in Mossambique entdeckt und sehr genau beschrieben. Der Kopf ist groß, doppelt so lang als breit; das Auge steht viel weiter von der Schnautzenspitze als vom Ohr ab. Die Behaarung ist dicht und wollig, am Vorderhalse kragenartig verlängert, über der Schulter bei Männchen und Weibchen einen Wirbel bildend; an den vor-

dern Gliedmaſſen reicht ſie über ⅔ des Vorderarms hinaus, an den hintern auf der Rückſeite bis gegen die Fußwurzel, auf der Vorderſeite bis zur Mitte der Unterſchenkel. Die Schenkelflughaut iſt faſt ganz unter dem Pelze verdeckt. Der Rücken iſt blaß umbrabraun wie Milchkaffee, Schultern, Hals und Bauchſeite ſind heller, die Mitte des Bauches ins Graue ſtreifend, um die Augen und den Geſichtsſeiten iſt die Farbe geſättigter; vor und hinter dem Ohre ein großer gelblichweißer Fleck. Ohren und Flughäute ſind ebenfalls umbrabraun, aber etwas dunkler, die Nägel ſchwarzbraun. Die einzelnen Haare ſind einfarbig, am Grunde etwas dunkler. Körper bis zur Mitte der Schenkelflughaut 6″, Vorderarm 2″ 10‴, Flugweite 18″ 7‴, Kopf 2″ ½‴. Peters fand an 7 Exemplaren verſchiedenen Alters immer nur ⅔·⅔ Backenzähne, die ſämmtlich zweiwurzelig ſind, mit Ausnahme des erſten untern kleinen Lückenzahns, der blos eine Wurzel hat. Im Magen traf er nie etwas anders als Ueberreſte von Früchten an.

36. Pt. Wahlbergii Sund., der Wahlberg'ſche Fledermaus; rufescens, macula albida ante et post auriculas, scopis humeralibus maris albis.

Pteropus Wahlbergii. Sundev. öfversight af K. Vetensk. Akadem. förhandlingar. 1846. p. 118.

Sundevall's Charakteriſtik lautet: molliter rufescenti-villosus, auriculis oblongis, ad basin utrimque macula albo-villosa. Patagium fuscum, ad corpus late denseque villosum; caudale totum cum pedibus posticis et brachia supra subtusque villosissima. Cauda parva, apice sub patagio libera, prominula. Pili laterales colli radiantes; mas praeterea fasciculo albipiloso ante humeros ornatus. Prope Port-Natal et in Caffraria interiore occisus. Mas 150 millim., caput 60, cubitus 85. — Von Pt. crypturus iſt dieſe Art durch die Schulterbüſchel des Männchens verſchieden; indeß bedarf ſie einer geſicherteren Feſtſtellung.

*** Pt. macrocephalus Ogilb., der großköpfige Fledermaus; Pt. crypturo simillimus, at alis obscurioribus et brevioribus diversus.**

Pteropus macrocephalus. Ogilb. proceed. III. p. 101. — Wagn.

Schreb. Supplem. I. S. 367. — Peters Mossamb. I. S. 30. — Pachysoma macrocephalum. Temm. esq. zool. sur la côte de Guiné p. 70.

Bisher nur aus der nicht ausreichenden Beschreibung von Ogilby bekannt und stammt vom Gambia. Körper 6″, Kopf 2″, Flugweite 1′ 3″. Peters unterscheidet diese Art von seinem E. crypturus, welcher ihr außerordentlich nahe steht, dadurch, daß bei Pt. macrocephalus die Flügel schwärzlich und kürzer sind. Gray vereinigte diesen Pt. macrocephalus mit Pt. Whitei; jedenfalls ist seine Artselbstständigkeit noch ganz problematisch.

37. Pt. gambianus Ogilb., der gambische Flederhund; rutilo-murinus, alis brunneis, maculis albis ad auriculas nullis, scopis humeralibus maris albis.

Pteropus gambianus. Ogilb. proceed. III. p. 100. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 366. — Gray mag. of zool. and botan. II. p. 504. — Pachysoma gambianum. Temm. esq. zool. sur la côte de Guiné p. 69.

Vom Gambia. Körper 6¾″, Flugweite 1′ 8″. Wie Gray bemerklich macht, finden sich keine weißen Haarbüschel an der Basis der Ohren, dagegen dergleichen über den Schultern. Hiedurch unterscheidet Peters seinen E. crypturus von dieser Art, welch letztere wieder Ogilby durch die helleren und längeren Flügel von seinem Pt. macrocephalus absondert.

38. Pt. Whitei Benn., der weißbuschige Flederhund; brunneus, subtus pallidior, macula alba ante et post auriculas, scopis humeralibus maris magnis albis.

Pteropus Whitei. Benn. transact. of the zool. soc. II. p. 31. tab. 6. — Temm. monogr. II. p. 560; esq. zool. sur la côte de Guiné p. 65. — Pteropus epomophorus. Benn. proceed. III. p. 149. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 367.

Durch Temminck haben wir jetzt diese Art nach ihren Geschlechts- und Altersverschiedenheiten vollständig kennen gelernt. Der Pelz ist wollig, ziemlich kurz und glatt. Die Farbe des Männchens ist blaßbraun mit röthlichem Anfluge, was auf dem Kreuze lichter wird; die Unterseite ist ebenfalls heller und fällt ins Graulichte, die Mittellinie ist schmutzig weiß. An der Ohrwurzel finden sich zwei rein weiße Flecken, der eine

am vordern, der andere am hintern Rande. Auf jeder Seite der Bruſt ſteht ein dicker Buſch langer weißer, aus einem Mittelpunkt entſpringender Haare. Die Flughäute ſind ſchwärzlichbraun. — Beim Weibchen iſt die Oberſeite ſchmutzig roth mit lichtern Tönen; die Unterſeite iſt röthlichgrau, längs der Mitte und an den Seiten der Bruſt, wo beim Männchen die weißen Büſchel ſtehen, weißlich. Die Flughäute ſind welkbraun. Die Ohrengegend iſt durch zwei weiße Flecken bezeichnet. — Den jungen Männchen gehen die Schulterbüſchel ab. — Körper 6″ 5‴, Kopf 2″ 3‴, Abſtand des Auges von der Naſenſpitze 1″ 2‴, Vorderarm 3″, Flugweite 18″.

In den Gambiagegenden und Guinea einheimiſch. Von Pt. crypturus iſt das Männchen durch ſeine Schulterbüſchel leicht zu unterſcheiden; dagegen zwiſchen den Weibchen fand Peters keine andere Differenz, als daß bei Pt. Whitei die Augen in der Mitte zwiſchen Ohr und Naſenſpitze liegen.

39. Pt. labiatus Temm., der breitlippige Flederhund; **rufescens, subtus pallidior, ventre medio sordide albo, auriculis albo-notatis, scopis humeralibus maris albis.**

Pteropus labiatus. Temm. monogr. II. p. 83. tab. 39. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 356. — Pachysoma labiatum. Temm. esq. zool. sur la côte de Guiné p. 68.

Temminck kannte anfänglich die Beſchaffenheit der Backenzähne dieſer aus Abyſſinien ſtammenden Art nicht, womit er erſt ſpäterhin bekannt wurde. Er fand nämlich bei Alten nur $\frac{4}{4}$ Backenzähne, wozu jedoch bei Jungen im Oberkiefer noch ein kleiner Lückenzahn kommt. Körper 4″ 2‴, Vorderarm 2″ 4‴. Sowohl durch die Verſchiedenheit des Wohnortes als insbeſondere durch die weit geringere Größe und die hängende Oberlippe des Männchens unterſcheidet ſich dieſe Art in beſtimmter Weiſe von Pt. Whitei.

40. Pt. schoënsis Rüpp., der ſchoaner Flederhund; **„auriculis brevibus, halluce elongato, corporis colore cervino, regione epigastrica canescente; macula albicante ante et post auriculas, ad latera faciei a naribus per oculos fascia umbrina; unguibus nigris.“ Rüpp.**

Pteropus schoënsis. Rüpp. Mus. Senckenb. III. S. 131.

Schsa. Körper 3″ 9‴. Dem vorigen sehr ähnlich, aber die Ohren viel kürzer.

* Pt. Haldemani Halow., der Haldeman'sche Flederhund; saturate fuscus, pectore lateribusque fuscis, ventre albido.

Pteropus Haldemani. Halowell, Sillim. americ. journ. 1846; ann. of nat. hist. XVIII. p. 356.

Nach Halowell von Westafrika abstammend und von ihm folgender Weise beschrieben. Kopf einer Dogge ähnlich, Ohren mittelmäßig, Lippen voll, Flügel lang, kein Schwanz (wohl nur übersehen); Lückenzähne jederseits $\frac{1}{2}$, Backenzähne $\frac{3}{3}$. Körper oben dunkelbraun, Hals, Hinterhaupt und Scheitel etwas heller, Flughäute siennabraun. Brust und Vordertheil des Bauches und die Seiten braun, das Uebrige des Unterleibs weiß. Ganze Länge $3\frac{1}{4}$″, Kopf $1\frac{3}{4}$″, Vorderarm 3″, Flugweite $14\frac{1}{4}$″. — Nach dem Gebisse gehört dieser Flederhund zur Unterabtheilung Epomophorus. Obwohl die Beschreibung ganz ungenügend ist, auch die Maaße nicht recht zusammen passen, so könnte doch die dunkle Färbung eine von den andern verwandten Arten unterschiedene Species anzeigen.

b) dentes molares $\frac{4}{4}$, contigui. — Pachysoma.

Diese Unterabtheilung ist auf Südasien beschränkt und ist in der Zahl ihrer Arten dadurch sehr reducirt worden, daß man in neuerer Zeit fünf ihrer Species in eine einzige zusammenzog.

41. Pt. marginatus Geoffr., der weißsäumige Flederhund; rufo aut cinereo-fuscus, subtus griseus, collo maris aurantio-rufo, labiis verrucosis, auriculis albo-marginatis.

Cynopterus marginatus F. Cuv. Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 187. — Blyth journ. of the Asiat. soc. of Beng. 1852. p. 345.

α) e rufescente aut brunneo griseus, subtus pallidior.

Pteropus marginatus. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 97. tab. 8. — Temm. monogr. I. p. 202. n. 261. tab. 14. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 361. — Pt. pyxiverus. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. IV. p. 700, X. p. 908.

β) ♂ supra rufescens aut olivaceo-brunneus, subtus griseus, scopa humerali, pectore lateribusque aurantio-rufis; ♀ flavido aut cano-brunnea, subtus pallidior.

Pteropus (Pachysoma) titthaecheilus. Temm. monogr. I. p. 198, 261 tab. 15. fig. 17—24. (Schädel); II. p. 92. tab. 35. fig. 8. (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 362. — Pachysoma brevicaudatum. Is. Geoffr. dict. class. XIV. p. 705. — Temm. II. p. 92. tab. 35. fig. 9. (Kopf). — Wagn. Schreb. S. 364. — Cynopterus Horsfieldii. Gray list. of mamm. of the Brit. mus. p. 38. — Horsf. catal. East Ind. mus. p. 30.

γ) cano-brunneus, subtus griseus, lateribus brunneis.

Pachysoma Diardii. Geoffr. cours 13. leç. p. 27. — Temm. II. p. 95. — Wagn. Schreb. S. 365.

δ) pallide cano-brunneus.

Pachysoma Duvaucelii. Geoffr. dict. class. XIV. p. 705. — Wagn. Schreb. S. 363. Anmerk.

Java, Sumatra, Malakka, Siam, Assam, Bengalen und Ceylon. Körper 5″ 3‴, Vorderarm 3″, Schwanz 7‴. Auf eigene Beobachtungen gestützt, vereinigte Cantor die 5 Arten: Pt. marginatus, titthaecheilus, brevicaudatus, Diardii und Duvaucelii in eine einzige. Blyth zeigte sich mit dieser Ansicht einverstanden und fügte auch noch Pt. Horsfieldii Gray hiezu. Nach Cantor's Beobachtungen ist die Färbung sehr veränderlich nach Individualität wie nach Alter und Geschlecht, aber alle gleichen sich im Habitus und Zahnbau, nehmen gemeinsame Ruheplätze ein und die Neugebornen oder ganz Jungen sind von einförmiger Färbung. Bei allen Alten sind die Ohren mehr oder minder deutlich weiß eingesäumt.

42. Pt. brachyotis Müll., der Bandu; flavido-fuscus, subtus flavido-griseus, gula collique lateribus rufis, patagiis fuliginoso-nigris.

Pachysoma brachyotis. S. Müll. v. d. Hoev. tijdschr. V. p. 146. — Temm. monogr. II. p. 362. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 363.

Borneo, als Repräsentant des Pt. marginatus, aber um $\frac{1}{3}$ kleiner, indem der Körper nur 3½″, der Schwanz 3‴ mißt; Färbung ähnlich, aber die Flügel, die bei jenem gelblichbraun sind, sind bei Pt. brachyotis fast rußschwarz.

43. Pt. melanocephalus Temm., der schwarzköpfige Fledermaus; obscure cinereus, subtus sordide albidus; nucha, vertice rostroque brevi nigris.

Pteropus melanocephalus. Temm. monogr. I. p. 190. tab. 12. (Thier), tab. 16. fig. 3, 4. (Skelet). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 365.

Java. Körper 2″ 10‴, Vorderarm 1″ 7‴. An den Halsſeiten mit Haaren, die von einem gemeinſchaftlichen Mittelpunkte aus divergiren.

3. Subgen. Megaera Temm.

Dentes primores $\frac{4}{4}$, molares $\frac{5}{5}$ ad normam Pachysomatum, cauda nulla.

44. Pt. ecaudatus Temm., der kurzflügelige Flederhund; canus, dorso brunneo, auriculis alisque brevibus, rostro perobtuso.

Pachysoma ecaudatum. Temm. monogr. II. p. 94; (Megaera ecaudata) p. 359. tab. 69. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 365.

Sumatra. Körper $3\frac{1}{2}$″, Vorderarm 2″. Schnautze ſehr ſtumpf, Naſenlöcher etwas vorſpringend, Flügel kurz. Schädelform wie bei Harpyia, aber die Naſenbeine länger und am Ende röhrenartig aufgetrieben.

II. MACROGLOSSUS. Großzüngler.

Dentes primores $\frac{4}{4}$, molares $\frac{4}{4}$:$\frac{5}{5}$, rostrum elongatum tenue, lingua longissima vermiformis, cauda minima.

Unterſcheidet ſich von Pteropus durch die lange, dünne, cylindriſche Schnautze, die lange wurmförmige Zunge und anders geſtellte Backenzähne. Bisher nur mit einer Art aus Indien bekannt.

1. M. minimus Geoffr., der kleine Großzüngler; e rufescente runneus, subtus dilutior, patagio anali tenuissimo villoso.

Pteropus minimus. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 97. — Temm. monogr. I. p. 191. tab. 15. fig. 25—30 (Schädel), tab. 16. fig. 1, 2. (Skelet). — Macroglossus minimus. Temm. II. p. 96. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 369. — Horsf. catal. of the East Ind. mus. p. 29. — Pteropus rostratus. Horsf. zool. research. n. 3. — Kiodote. Fr. Cuv. mammif. vol. II.

Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Amboina, Banda, Timor, angeblich auch das indiſche Feſtland. Körper $3\frac{1}{2}$″, Vorderarm $1\frac{1}{2}$″, Schwanz 1‴, Ohren kurz und ſchmal.

III. HARPYIA. Die Harpye.

Dentes primores $\frac{2}{2}$, molares $\frac{4}{5}$:$\frac{5}{5}$, index antipedum unguiculatus, cauda mediocris.

Mit Pteropus übereinſtimmend durch den benagelten vordern Zeige-

finger, und der Schädel und die Backenzähne vollkommen wie bei Pachysoma. Die Verschiedenheit liegt hauptsächlich im Gebiß: Schneidezähne nur $\frac{2}{3}$, indem wahrscheinlich die untern frühzeitig durch die untern Eckzähne ausgetrieben werden; letztere sind vorwärts geneigt und berühren sich fast an der Spitze. Eine einzige Art von den östlichen indischen Inseln.

1. H. Cephalotes Pall., die dickköpfige Harpye; **brunneo-cinerea, subtus albida, naribus tubulosis.**

Harpyia Cephalotes. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 370. — Harpyia Pallasii. Temm. monogr. II. p. 101. tab. 39. — Cephalotes Pallasii. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 107. — Vespertilio Cephalotes. Pall. spicil. zool. III. p. 10. tab. 1, 2. — Schreb. I. S. 172. tab. 61.

Amboina und Celebes. Körper 4″, Vorderarm 2″ 3‴, Schwanz 9‴. Kopf fast rund, Schnautze kurz und breit, Nasenlöcher röhrenförmig, Ohren kurz, rundlich, Oberlippe gespalten. Ueber den Rücken des Männchens verläuft eine dunkle Binde, welche sich gegen den Nacken in zwei Aeste spaltet, während sie beim Weibchen ungetheilt bleibt. Pelz oben licht braungrau, unten graulichweiß; Flughäute gelblichroth.

IV. HYPODERMA. Mantelflatterer.

Dentes primores $\frac{4}{4}$, aut $\frac{2}{4}$ aut $\frac{2}{3}$; index antipedum exunguiculatus; alae dorsum totum tegentes; cauda brevis.

Die Flügel sind nur längs des Rückgrathes angeheftet und überdecken also in einem Stück den ganzen Rücken. Der kurze Schwanz ist zur Hälfte von der Schenkelflughaut eingeschlossen. Die Schneidezähne reduciren sich im Alter auf $\frac{2}{3}$; die untern Eckzähne berühren sich an der Wurzel; Backenzähne jederseits $\frac{4}{4}$, wobei im Oberkiefer der erste Lückenzahn und der letzte Backenzahn frühzeitig ausfallen. Eine Art im indischen Archipel.

1. H. Peronii Geoffr., der gemeine Mantelflatterer; **olivaceo-cinereum, flavo-aut griseo-tinctum.**

Hypoderma Pallasii. Is. Geoffr. dict. class. XV. p. 708. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 372. — Hypoderma moluccensis. Guoy et Gaim. Astrolab. zool. I. p. 86. tab. 11. — Cephalotes Peronii. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 104. tab. 7. — Temm. monogr. II. p. 106. tab. 35. fig. 7. — Pteropus palliatus. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 99. (jung).

Amboina, Banda, Timor, Samao. Länge 6" 3‴, wovon der freie Theil des Schwanzes 6‴ einnimmt. Ohren ſchmal und ſpitz. Pelz oliven aſchfarbig, bei dem Männchen mit Gelblich, bei dem Weibchen mit Grau überlaufen; Junge mehr röthlich.

II. Familie.

Istiophora. Blattflederer.

Dentes molares cuspidati; nasus appendice foliacea, nares includente ornatus.

Die Naſe iſt mit einem häutigen, die Naſenlöcher umgebenden Beſatze verſehen, der der vorhergehenden und nachfolgenden Familie abgeht. Wo der Naſenbeſatz vollſtändig iſt, beſteht er aus 3 Theilen: 1) dem aufrechten Naſenblatt (prosthema), 2) dem Hufeiſen (ferrum equinum), das die Naſenlöcher umgiebt, und 3) bei den Kammnaſen noch aus dem Sattel (sella). An den Vorderhänden iſt blos der Daumen mit einer Kralle bewaffnet, die übrigen Finger aber nicht. Nur in dieſer Familie giebt es Blutſauger.

a) Desmodina. Schneidflatterer.

Dentes molares in aciem longitudinalem excurrentes, patagium anale brevissimum aut nullum, cauda nulla.

Eine merkwürdige Abtheilung durch die abnorme Bildung ihrer Backenzähne, deren Krone eine Längsſchneide bildet und die zugleich in der geringſten Anzahl, $\frac{1}{1}\cdot\frac{1}{1}$, auftreten. Der Naſenbeſatz hat kein aufrecht ſtehendes Blatt, die Ohren ſind getrennt und mäßig groß, die Klappe (tragus) iſt ſchmal, die Schnauze kurz, und an der Unterlippe findet ſich vorn an der Spitze ein dreiſeitiger kahler Fleck.

V. DESMODUS. Der Schneidflatterer.

Dentes primores inferiores disjuncti bifidi, patagium anale brevissimum.

Die Naſenlöcher liegen in einem kleinen, breit herzförmigen Blatte, was ſeitlich und hinten von einer nackten Haut umgeben iſt, die jederſeits eine tiefe Grube bildet und hinten mit einem rundlichen Höcker endigt.

Die Schenkelflughaut macht nur einen ſchmalen, gerade abgeſtutzten Saum aus; der Schwanz fehlt ganz. — Das Gebiß [1]) beſteht aus Schneidezähnen $\frac{4}{4}$ oder $\frac{2}{2}$, Eckzähnen $\frac{1}{1}$, Backenzähnen $\frac{3}{3}$. Im Oberkiefer finden ſich 6 Schneidezähne nur bei ganz jungen Individuen, bei ältern ſind blos noch die beiden mittlern vorhanden, die groß und ſchnabelartig geformt ſind; die untern Schneidezähne ſind zweilappig. Aechte Backenzähne fehlen ganz, denn die vorhandenen, oben 2 und unten 3, ſind nur als Lückenzähne anzuſehen, deren Kauflächen in Schneiden auslaufen, welche am hinterſten Zahn des Unterkiefers durch eine Einkerbung in 2 Zacken abgetheilt iſt. — Die Schneidflatterer bewohnen Südamerika und nähren ſich hauptſächlich vom Blutſaugen.

1. D. rufus Neuw., der rothbraune Schneidflatterer; supra rufo-fuscus, subtus albidus.

α) cannellino-fuscus, subtus albidus, pilis omnibus bicoloribus.

Desmodus rufus. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 233 mit Abbild. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 379. — Blainv. ostéogr. Vespertilio tab. 7. (Schädel), tab. 13. (Gebiß). — Desmodus murinus. Wagn. Schreb. a. a. O. S. 377. — Edostoma cinerea. D'Orbign. voy. dans l'Amer. mérid. mammif. p. 11, tab. 8.

β) supra saturate fuscus, subtus albidus, pilis gastraei unicoloribus.

Desmodus D'Orbignyi. Waterh. zool. of the Beagle I. p. 1. tab. 1. (Thier), 35. fig. 1. (Schädel). — Wagn. a. a. O. S. 380. — Gay hist. de Chile zoolog. I. p. 33.

Von Coquimbo in Chile an (D. D'Orbignyi) durch Bolivien (Edostoma cinereum), die Provinz Mato groſſo und Umgebungen des Fluſſes Itabapuana in Braſilien (D. rufus), ferner durch Guiana (D. rufus nach Blainville Osteogr. Vesp. p. 103) bis Mexiko (D. murinus) verbreitet, wahrſcheinlich in einer und derſelben Art. Körper 3″ bis 3″ 3‴, Vorderarm 2″ 3‴. Die erſte Varietät iſt auf der Oberſeite glänzend nelken- oder zimmtbraun, auf der Unterſeite graulichweiß mit ſeidenartig-

1) Abbildungen vom Gebiß finden ſich bei Waterhouſe in der Zool. of the Beagle I. tab. 35. fig. 1; Blainville Ostéogr. Vespertilio tab. 13; Owen Odontograph. tab. 112. fig. 9.

gem Schimmer; alle Haare sind zweifarbig: die der Oberseite am Grunde lichter, die der Unterseite am Grunde dunkler. Bei der zweiten Varietät, die aus Chile kommt und wovon ich ein Exemplar vergleichen kann, ist die Oberseite dunkler braun als bei der ersten, dagegen die Unterseite reiner weiß, indem die Haare derselben einfarbig sind. Ob dieser Unterschied zur specifischen Unterscheidung ausreichend ist, mag dahin gestellt bleiben [1].

VI. DIPHYLLA. Kammzahn.

Dentes primores inferiores 4 continui pectinato-dentati, patagium anale nullum.

Noch immer ist das von Spix zurückgebrachte Exemplar das einzige, das von dieser merkwürdigen Gattung in irgend einer Sammlung existirt, denn weder Blainville's noch D'Orbigny's Diphylla gehört hieher. Im Habitus, Nasenbesatz und in der Anzahl der Zähne, nämlich Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1-1}{1-1}$, Backenzähne $\frac{3-3}{3-3}$, auch in der Beschaffenheit der Zähne ähnlich wie Desmodus, aber mit folgenden Unterschieden: 1) die untern Schneidezähne sind bei Diphylla anschließend, ungemein breit und kammförmig gezähnt, 2) die Ohren sind nicht spitz oval, sondern halbmondförmig, 3) die Schenkelflughaut fehlt, und 4) der Mittelhandknochen des Daumens ist nur halb so lang als bei Desmodus.

1. D. ecaudata Spix., der ungeschwänzte Kammzahn; villosa, rufo-fusca, subtus albida.

Diphylla ecaudata. Spix vesp. bras. p. 68. tab. 36. fig. 7. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 383.

Brasilien, ohne nähere Bezeichnung des Fundortes. Körper 2″ 7‴, Vorderarm 1″ 7‴. Rücken rothbraun mit einfarbigen Haaren; Unterleib schmutzig gelblichweiß, wobei die Haare am Grunde braun sind.

b) Phyllostomata. Blattnasen.

Dentes molares cuspidati; auriculae conjunctae tragi praeditae, prosthema fere omnium orentum lanceolatum.

---

1) Desmodus fuscus Lund, bei Burmeister (Syst. I. S. 57) in den Höhlen von Minas geraes fand, habe ich oben nicht eingereiht, weil nicht deutlich gesagt ist, ob die Haare der Unterseite ein- oder zweifarbig sind.

Das Gebiß ist von typischer Anordnung: $\frac{4}{4}$ Schneidezähne, zum Theil hinfällig, $\frac{1}{1}$, $\frac{2}{2}$, oder $\frac{3}{3}$ Backenzähne, letztere in einfache Lückenzähne und mehrzackige ächte Backenzähne geschieden. Mit Ausnahme von Brachyphyllum haben alle ein aufrecht stehendes lanzettförmiges Nasenblatt. Der Mittelfinger hat wie bei den Desmodinen 3 knöcherne Phalangen, während er bei den übrigen Handflüglern nur aus 2 besteht. Bewohner des tropischen Amerikas.

VII. BRACHYPHYLLUM. Spaltflatterer.

Appendix nasalis ovata plana, postice fovea cincta; patagium interfemorale breviusculum profunde excisum; cauda brevissima.

Die Schnautze ist ziemlich kurz; das Nasenblatt oval, flach, hinten von einer tiefen Grube umgeben, die Unterlippe in der Mitte mit einer dreieckigen, von runden Wärzchen besetzten Spalte versehen. Die Zunge ist lang und fein warzig. Der Schwanz ist rudimentär, aus einem einzelnen, in die Schenkelflughaut eingeschlossenen Gliede bestehend, von dem aus zwei Sehnen zur Mitte der Schienbeine verlaufen. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$, Lückenzähne $\frac{2}{2}$, ächte Backenzähne $\frac{3}{3}$. Eine Uebergangsform, welche durch die Form des Nasenblatts an die Desmodinen, durch das Gebiß an die Phyllostomen, und durch den warzigen Schlitz in der Unterlippe und die lange Zunge insbesondere an Glossophaga sich anschließt. Westindien und Südcarolina.

1. B. **cavernarum** Gray, der Spaltflatterer; **badium, infra flavido-brunneum.**

Brachyphylla cavernarum. Gray proceed. I. (1833) p. 123; ann. of nat. hist. IV. p. 2. tab. 1. fig. 1. (Kopf). — Wagn. Schreb. I. S. 385. — Stenoderma cavernarum. Blainv. ostéogr. Vespert. p. 101. tab. 7. (Schädel).

St. Vincent in Westindien, Cuba und Südcarolina. Körper $4\frac{1}{2}$", Vorderarm $2\frac{1}{4}$". Oben rothbraun mit dunklern Haarspitzen, unten blaß gelblichbraun.

VIII. GLOSSOPHAGA. Blattzüngler.

Appendix nasalis duplex prosthemate lanceolato erecto; rostrum et

lingua elongata tenuis; labium inferius apice fissum; cauda nulla aut brevissima.

Von den eigentlichen Blattnasen unterscheiden sich die Blattzüngler durch ihre dünne und lange Schnautze, sowie durch ihre lange, vorstreckbare, wurmförmige Zunge. Das Gebiß besteht aus Schneidezähnen $\frac{4}{4}$, Eckzähnen $\frac{1}{1}$, Lückenzähnen $\frac{2}{2}$, ächten Backenzähnen $\frac{3}{3}$. Mit dem Alter fallen die Schneidezähne theilweise oder ganz aus, auch die vordern Lückenzähne gehen mitunter verloren. Die Blattzüngler gehören zu den Blutsaugern. Gray hat nach der Beschaffenheit der Schenkelflughaut und des Schwanzes aus den 10 bis 11 Arten 6 Gattungen errichtet; indeß kann solchen untergeordneten Merkmalen kein generischer Werth beigelegt werden. Dagegen kann man sie nach der Beschaffenheit des Gebißes und der Zunge in 2 Untergattungen vertheilen, wie es Tschudi für die peruanischen Arten gethan hat und ich solches für zwei brasilische bestätigen kann.

1. Subgen. Glossophaga.

Dentes primores superiores contigui, medii majores; cauda distincta, rarissime nulla; lingua apice utrinque fimbriata.

Die Zunge ist gegen das Ende zu beiden Seiten mit Borsten besetzt und auf der Oberfläche fast ganz flach.

†) patagium interfemorale latum, truncatum.

1. G. amplexicaudata Geoffr., der hüllschwänzige Blattzüngler; e rufescente fuscus, subtus pallidior, auriculis capite brevioribus.

Glossophaga amplexicaudata. Geoffr. mém. d. mus. IV. p. 418. tab. 18. A. — Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 208. — Spix vesp. bras. p. 67. tab. 36. fig. 4. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 387. — Tschud. Faun. peruan. I. p. 69. — Burmeist. Brasil. I. S. 54. — Phyllophora amplexicaudata. Gray zool. of Sulphur. mamm. p. 18.

Brasilien, Peru, Columbien, Guiana und Insel St. Thomas. Körper 2″ 2‴, Vorderarm 1″ 3‴, Schenkelflughaut in der Mitte 6‴, Ohren 6‴. Ist von mir auf Gebiß und Zunge untersucht. Nasenblatt nicht viel länger als breit. Schwanz ganz kurz, eingeschlossen, nur mit einem kleinen Knöpfchen vorragend.

2. G. nigra Gray, der ſchwarze Blattzüngler; nigricans, subtus pallidior, auriculis capite dimidio brevioribus, prosthemate elongato.

Phyllophora nigra. Gray zool. of Sulphur. mamm. p. 18. tab. 5. fig. 1.

Tropiſches Amerika. Körper 2″, Vorderarm 1″ 4‴. Wie bei G. amplexicaudata iſt der Schlitz in der Unterlippe mit kleinen Wimpern beſetzt, aber das Naſenblatt iſt länger, die Ohren kürzer und der Pelz ſchwärzlich, unten merklich lichter. Gebiß und Zunge unbekannt. Nur nach Analogie hiehergeſtellt. Als Phyllophora iſt die Schenkelflughaut breit und abgeſtutzt, der Schwanz kurz, eingeſchloſſen, die Spitze oben.

3. G. megalotis Gray, der großohrige Blattzüngler; nigricans, subtus pallidior, auriculis longitudine capitis.

Phyllophora megalotis. Gray zool. of Sulphur. mamm. p. 17. tab. 5. fig. 2. — Mimon megalotis. Gray ann. of nat. hist. XIX. p. 406.

Tropiſches Amerika. Körper 2″, Vorderarm 1″ 3‴. Schlitz in der Unterlippe nicht gewimpert, Pelz ſchwärzlich, unten merklich blaſſer; Naſenblatt groß, oval-lanzett, länger als breit; Ohren ſehr groß, ſo lang als der Kopf, abgerundet; Schwanz wie bei voriger Art beſchaffen. Nach der Analogie hieher geſtellt und weil Gray von ſeiner Gattung Mimon die beiden mittlern obern Schneidezähne als groß bezeichnet. Als 2te Art von Mimon führt Gray auf Phyllostoma Bennettii Gray (mag. zool and bot. II. p. 6), was mir unbekannt iſt.

4. G. soricina Pall., der Spitz-Blattzüngler; griseo-fusca, subtus albicans, patagio interfemorali dilatato, cauda nulla.

Vespertilio soricinus. Pall. spicil. zool. III. p. 24. tab. 3, 4. — Schreb. I. S. 161. tab. 47. — Glossophaga soricina. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 390.

Surinam und die karaibiſchen Inſeln. Körper in gerader Linie 2″ 1‴, Ohr 4½‴, Vorderarm 1″ 4‴, Breite der Schenkelflughaut in der Mitte 9‴. Aſchfarbig grau, unten weißlich; die Männchen mehr dunkelfarbig, unten mehr aſchfarbig. Kein Schwanz, was dieſe Art von den verwandten unterſcheidet; Schenkelflughaut mit einem hohlen Winkel ausgeſchnitten. Nach der Beſchreibung, die Pallas von den Vorderzähnen und der Zunge giebt, gehört dieſe Art zur nämlichen Abtheilung wie G. amplexicaudata.

††) patagium interfemorale breve, angulatim excisum.

5. G. caudifer Geoffr., der kurzſcheidige Blattzüngler; fuliginoso-fusca, subtus pallidior, cauda longitudine dimidia patagii interfemoralis.

Glossophaga caudifer. Geoffr., mém. du mus. IV. p. 418. tab. 17. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 388. — Nicon caudifer. Gray ann. of nat. hist. XIX. p. 407. — Monophyllus Leachii. Gray zool. of Sulphur mamm. p. 18.

Nach Geoffroy bei Rio Janeiro, nach Gray bei Realejo in Central-Amerika. Körper 1" 5‴, Vorderarm 1" 4‴. Gray hat ſelbſt ſeinen M. Leachii mit G. caudifer für identiſch erklärt und von jenem folgende Beſchreibung geliefert: „dunkelbraun, Unterſeite viel blaſſer; Schwanz halb ſo lang als die Breite der Schenkelflughaut; Naſenblatt verlängert, oval-lanzett." Die Schenkelflughaut bezeichnet er als deutlich, kurz, winkelig ausgeſchnitten. Zur Einreihung dieſer Art in die erſte Abtheilung halte ich mich durch Gray's Charakteriſtik der Vorderzähne von Nicon berechtigt: „duo medii superiores longiores truncati."

6. G. Redmanni Leach., der jamaikaniſche Blattzüngler; fusca, subtus murina; auriculis mediocribus, cauda brevi.

Monophyllus Redmanni. Leach. Linn. transact. XIII. p. 76. — Gray voy. of Sulphur. mamm. p. 18. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 403.

Jamaika. Größe nicht angegeben. Der bisher wegen der mangelhaften Beſchreibung nicht mit Sicherheit unter den Phylloſtomen einreihbaren Gattung Monophyllus von Leach (mit der einzigen Art M. Redmanni) hat Gray ihre Stelle unter den Gloſſophagen angewieſen; nach Leach's Angabe, daß die beiden mittlern obern Vorderzähne größer ſind, mag ſie proviſoriſch hier ſtehen. Gray unterſcheidet ſeinen M. Leachii (Nicon caudifer) von M. Redmanni durch viel geringere Größe, breitere Schenkelflughaut, kürzern Schwanz und längeres Naſenblatt.

2. Subgen. Choeronycteris Licht.

Dentes primores superiores per paria disjuncti, medii minores; lingua haud fimbriata; cauda nulla.

Der Zunge fehlen (nach Unterſuchung von G. ecaudata) die Bor-

ſten an den Seiten ganz, dagegen iſt die vordere Hälfte von einer tiefen Längsrinne ausgehöhlt, zugleich auch mehr platt.

7. G. ecaudata Geoffr., der ungeſchwänzte Blattzüngler; fuliginoso-castanea, subtus pallidior, patagio interfemorali angustissimo.

Glossophaga ecaudata. Geoffr. mém. d. mus. IV. p. 418. tab. 18. B — Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 212. mit Abbild. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 389. — Burmeiſt. Braſil. I. S. 54.

Südliches Braſilien. Körper 2″ 5‴, Vorderarm 1″ 6‴, Naſenblatt 1⅓‴. Naſenblatt kurz, Ohren mittelmäßig, Schwanz ganz fehlend, Schenkelflughaut von der Ferſe an längs der Hinterbeine als ein ſchmaler Saum verlaufend, der am Steiße noch mehr ſich einengt und hier von den Haaren des Unterrückens überdeckt wird. Farbe veränderlich: oben dunkel rußbraun, unten graubräunlich, oder oben rußig kaſtanienbraun, unten ſchmutzig gelblichbraun. Die Rückenhaare entſchieden zweifarbig, mit weißlicher unterer Hälfte. Ein Männchen der hieſigen Sammlung iſt oben faſt ganz weiß [1]).

8. G. villosa Rengg., der zottige Blattzüngler; villosissima, nigra, subtus cinerascens, patagio interfemorali angustissimo.

Glossophaga villosa. Rengger Paraguay S. 80. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 389.

Paraguay. Ganze Länge 2″ 10‴. Schneidezähne ½, Backenzähne ½. Zunge wie bei G. ecaudata. Behaarung zottig; kein Schwanz; Schenkelflughaut einen ſehr ſchmalen behaarten, am Rande gewimperten Saum bildend. Pelz oben ſchwarz, unten graulichſchwarz; die nackten Theile ebenfalls ſchwarz.

9. G. peruana Tschud., der peruaniſche Blattzüngler; fuliginoso-fusca, subtus brunneo-canescens, patagio interfemorali subnullo.

Choeronycteris peruana. Tſchud. Faun. peruan. I. S. 71. tab. 3. fig. 1, 2.

---

1) Auf dieſe Art gründet ſich Gray's Gattung Anoura: Schenkelflughaut ſehr ſchmal, die Beine einſäumend, kein Schwanz. Seine Gattung Glossophaga (Schenkelflughaut tief ausgeſchnitten, kein Schwanz) bezieht ſich auf G. soricina.

Peru am Oſtabhange der Cordilleren. Körper 3″, Vorderarm 1″ 8‴. Naſenblatt ſehr kurz; kein Schwanz, Schenkelflughaut nur an der Innenſeite der Hinterbeine als eine ſehr ſchmale, ganz behaarte Hautfalte bemerkbar. Oberſeite rußbraun, Bauch heller, ins hell Graubraune übergehend, Flügel ganz ſchwarz. Die Haare der Oberſeite ſind am Grunde weißlich, die der Unterſeite lichtgrau. Nahe der vorigen Art verwandt.

10. G. mexicana Tschud., der mexikaniſche Blattzüngler; brunneo-canescens, subtus dilutior, patagio interfemorali dilatato, lunatim exciso.

Choeronycteris mexicana. Tſchud. Faun. peruan. I. S. 72. tab. 3. fig. 3.

Mexiko. Körper 3″, Vorderarm 1″ 6‴. Naſenblatt länger und ſchmäler als bei G. peruana; kein Schwanz, Schenkelflughaut ähnlich wie bei G. amplexicaudata. Färbung einförmig bräunlichgrau, am Bauche etwas heller, Nägel ſchwarz.

IX. PHYLLOSTOMA. Blattnaſe.

Appendix nasalis duplex prosthemate erecto, rostrum tumidum obtusum, labium inferius integrum, auriculae mediocres.

Der Kopf iſt dick, die Schnauze etwas verlängert, dabei angeſchwollen und abgeſtutzt, die Ohren meiſt nur mittelmäßig, weit von einander abſtehend und mit einer Klappe verſehen. Der Naſenbeſatz beſteht aus einem liegenden Hufeiſen und einem aufrecht ſtehenden, mehr oder minder lanzettförmigen Naſenblatte. Die Unterlippe iſt an ihrem ſtumpfen Ende mit Warzen beſetzt, die in ein V geſtellt ſind. Die Zunge iſt dick, fleiſchig, oben platt mit einem rauhen Beſatz. Der Zeigefinger hat ſelten eine vollſtändige Phalanx (Ph. vampyrus), meiſt fehlt eine ſolche oder es iſt doch nur der ſie vertretende ſehnige Faden an ſeinem Anfange verknöchert; der Mittelfinger beſteht aus 3, die übrigen Finger aus 2 Gliedern. Der Schwanz iſt kurz oder fehlt ganz; die Schenkelflughaut ſehr groß, oder klein oder gar nicht vorhanden. Schneidezähne giebt es normal $\frac{4}{4}$, von denen die untern leicht verloren gehen; Backenzähne $\frac{5}{5}$ oder $\frac{4}{4}$, ſehr ſelten $\frac{3}{3}$. Die Blattnaſen ſind über das ganze tropiſche Amerika ver-

breitet und gehören ebenfalls zu den Blutſaugern. Nach der Beſchaffenheit des Schwanzes und der Schenkelflughaut, zum Theil auch nach der Anſatzſtelle der Schwingen an den Hinterfüßen, werden die Arten in Gruppen getheilt, denen Gray einen generiſchen Werth beilegte und in dieſer Weiſe 9 Gattungen erhielt: Macrophyllum, Vampyrus, Carollia, Phyllostoma, Arctibeus, Sturnira, Trachops, Ametrida und Nyctiplanus. Wir halten dieſe Vervielfältigung der Gattungen für eine unnöthige Zerſplitterung einer enge unter ſich verbundenen Gruppe von Arten.

a) patagium interfemorale longum truncatum.

†) cauda longitudine patagii interfemoralis. — **Macrophyllum Gray.**

1. **Ph. macrophyllum** Neuw., die langſchwänzige Blattnaſe; **fuliginosum, cauda tota patagio interfemorali innata.**

Phyllostoma macrophyllum. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 188. mit Abbild. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 394.

Am Mucuri in Braſilien. Körper 1″ 10‴, Schwanz 1″ 4‴, Ohr 7‴, Naſenblatt 5‴. Ohren ziemlich groß, Naſenblatt länglich ſpeerförmig, jederſeits mit einem Ausſchnitte; Backenzähne $\frac{4}{4}$. Die Flügel reichen nur bis zum halben Schienbeine. Farbe oben wie unten rußbraun.

2. **Ph. longifolium** Natt., die langblätterige Blattnaſe; **supra fuscum, subtus flavido-brunneum; prosthemate longissimo basi denticulato; cauda longitudine dimidia patagii interfemoralis.**

Phyllostoma longifolium. Wagn. Wiegm. Archiv f. Naturgeſch. 1843. S. 365; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 163. tab. 2. fig. 8.

Provinz Mato groſſo in Braſilien. Vom Scheitel zum Steiß 1″ 11‴, Ohren 8‴, Naſenblatt 5½‴, Vorderarm 1″ 9‴, Schwanz 8½‴, Schenkelflughaut 1″ 4‴. Eine ſehr ausgezeichnete Art. Ohren groß, Klappe zugeſpitzt, am äußern Rande gezähnelt. Naſenblatt ſehr lang, ſchmal, zugeſpitzt, der Rand behaart, in der untern Hälfte ſtark gekerbt[1],

1) Ich weiß nicht durch welches Verſehen in meiner Beſchreibung in den Münchn. Abh. das Naſenblatt als ganzrandig angegeben iſt, da doch gerade das Gegentheil ſtattfindet, wie dieß ſchon die Abbildung zeigt.

Schwanz nächst dem von Ph. macrophyllum am längsten, indem er die Mitte der großen Schenkelflughaut erreicht. Sporen sehr lang, Schwingen etwas unter der Fußwurzel am Mittelfuße sich ansetzend. Pelz oben dunkelbraun, unten trübgelb, am Unterkiefer und den Halsseiten lebhaft rostgelb. Ueber den Rücken ein schmutzig grünlichgrauer Längsstreif.

††) cauda patagio interfemorali brevior.

3. Ph. cirrhosum Spix, die warzige Blattnase; pallide castaneum, prosthemate mediocri lato ovato-acuminato, simul cum ferro equino ad marginem crenulato; labiis, praecipue mento, verrucosis.

Vampyrus cirrhosus. Spix vesp. bras. p. 64. tab. 36. fig. 3. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 394.

β) fuliginoso-nigrum.

Trachops fuliginosus. Gray ann. of nat. hist. XIX. p. 406.

Das Exemplar von Spix stammt wohl von Para her. Körper 3″ 10‴, Schwanz 6½‴, Vorderarm 2″ 3‴, Ohren 1″ 1½‴, Nasenblatt 4⅓‴. Ohren enorm groß mit vielen Querfurchen, Klappe unter der Mitte mit etlichen Seitenzacken, Nasenblatt kurz, oval, an den Rändern fein gekerbt. Lippen, zumal aber das Kinn, mit zapfenförmigen Warzen besetzt. Am Vorderhalse eine röhrenförmige Grube, Schwingen an der Fußwurzel sich ansetzend; Schenkelflughaut sehr groß. Pelz hell kastanienfarben. — Trachops fuliginosus ist als rußig schwarz angeben und stammt von Pernambuco; ob er vom V. cirrhosus specifisch zu sondern ist, darüber ist Gray selbst ungewiß.

4. Ph. crenulatum Geoffr., die gekerbte Blattnase; rufescens, prosthemate elongato, triangulari, marginibus rectilineis dentato.

Phyllostoma crenulatum. Geoffr. catal. p. 61; ann. d. mus. XV. p. 183. tab. 10. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 395.

Heimath nicht näher bekannt. Ganze Länge 2″ 3‴, Schwanz 10½, Ohren 9‴, Nasenblatt 5‴. Ohren breit, oval; Unterlippe warzig; Nasenblatt und Klappe gezähnelt, ersteres einem langen gleichschenkligen Dreieck gleichend. Schenkelflughaut nochmals so lang als der Schwanz. Pelz im Allgemeinen röthlich.

5. Ph. elongatum Geoffr., die langstreckige Blattnase; ni-

gricans, subtus griseum; prosthemate elongato lanceolato, marginibus curvatis integro.

Phyllostoma elongatum. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 182, 185. tab. 9. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 396. — Tſchud. Faun. peruan. I. S. 61.

Braſilien und Peru. Körper 3″, Schwanz 7‴, Vorderarm 2″ 4‴, Ohr 1″, Naſenblatt 7‴. Habitus, Zahnbau, Beſatz der Unterlippe, Flughäute wie bei Ph. hastatum, aber Größe geringer, Naſenblatt viel länger, Klappe ſchmäler und länger. Die Färbung iſt nach Tſchudi auf dem Rücken ſchwarz, am Bauche grau, die Haare mit lichter Baſis, Flughäute ſchwarz. Gray's Ph. elongatum iſt gänzlich von dieſer Art verſchieden.

6. Ph. hastatum Pall., der Guandira; fuscum, prosthemate mediocri lato, ovato-acuminato, pedicellato, ad marginem integro; ferro equino lato; cauda calcari breviore.

Phyllostoma hastatum. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 177. tab. 11. (Kopf und Schädel). — Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 179 mit Abbild. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 397. — Tſchud. Faun. peruan. I. S. 62. — Gray voy. of Sulphur mamm. p. 19. — Blainv. ostéogr. Vesp. tab. 7. (Schädel).

Braſilien, Peru. Körper 4″ 6‴, Schwanz 7½‴, Vorderarm 3″ 3‴, Ohren 1″, Naſenblatt mit Stiel 5½″, Schenkelflughaut 1″ 10‴. Die größte Art. Backenzähne $\frac{4}{4}$. Oberlippe ohne Warzen, Unterlippe an der ſtumpfen Spitze mit dem gewöhnlichen winkligen Beſatz von Warzen. Am Halſe eine Grube. Ohren mäßig groß, Klappe kurz, tief. Farbe veränderlich: oben bald mehr ins dunkel rußig Roſtbraune, bald mehr ins röthlich Kaſtanienbraune fallend, auf der Unterſeite lichter.

* Ph. fuliginosum Gray, (mag. zool. and bot. II. p. 6.) iſt mir nur bekannt aus Gray's Citat in voy. of Sulphur. p. 19. wo er von demſelben das Ph. hastatum durch mehr röthliche Färbung und anſehnliche Größe unterſcheidet.

7. Ph. sylvicola D'Orb., die boliviſche Blattnaſe; griseo-brunneum, subtus cinereum; prosthemate mediocri, lato, ovato-acuminato, ad marginem integro; dentibus molaribus $\frac{4}{4}$.

Lophostoma sylvicolum, D'Orbign. voy. dans l'Amér. mérid. mammif. p. 11. tab. 6.

Am Oſtfuß der boliviſchen Cordilleren. Körper 3″ 4‴, Schwanz

allein 6‴, Vorderarm 2″, Schenkelflughaut 1″ 6‴. Backenzähne $\frac{2}{2}$. Naſenblatt einfach, lanzettförmig, nach der Abbildung ähnlich dem von Ph. hastatum. Ohren groß, Klappe an ihrer innern Baſis ausgerandet, Schwanz viel kürzer als die Schenkelflughaut, Sporen ſtark, aber kurz, die Schwingen an die Fußwurzel ſich anheftend. Pelz oben braun mäuſegrau, unten aſchfarben, am Halſe etwas heller; Haare des Geſichts kurz und braun.

8. **Ph. bidens** Spix, die Knopf-Blattnaſe; **nigro-fuscum, subtus pilis apice albidis; auriculis amplissimis, cauda brevi, calcaribus longissimis.**

Vampyrus bidens. Spix vesp. bras. p. 65. tab. 36. fig. 5. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 399.

Braſilien. Körper 3″, Schwanz 5‴, Vorderarm 2″, Ohren 10‴, Naſenblatt 3‴, Schenkelflughaut 1″, Sporen 10‴. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Backenzähne $\frac{5}{5}$. Naſenblatt kurz, ganzrandig; Ohren groß, namentlich breit, auf der innern Hinterhälfte mit Querfalten. Unterlippe mit dem Warzenbeſatz. Haare oben einfarbig oder dunkel roſtbraun, mit etwas lichtern Spitzen, unten zweifarbig: am Grunde dunkelbraun, an der Spitze grauweißlich.

9. **Ph. amblyotis** Natt., die großohrige Blattnaſe; **castaneo-fuscum, subtus pilis brunneis, basi paululum albidis; auriculis amplissimis, cauda brevi, calcaribus longis, alis metatarso affixis.**

Phyllostoma amblyotis. Wagn. Wiegm. Archiv f. Naturgeſch. 1843 S. 365; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 164.

Mato groſſo in Braſilien. Vom Scheitel zum After 2″ 5‴, Ohren 1″ 2‴, Naſenblatt 5‴, Vorderarm faſt 2″, Schwanz $5\frac{1}{2}$‴, Schenkelflughaut 1″ 4‴. Von Ph. bidens verſchieden durch noch größere Ohren, kürzeren Daumen, tiefer angeſetzte Flügel (bei Ph. bidens nur an der Fußwurzel), kürzere Sporen, auf der Innenſeite ganz nackte Flügel (bei Ph. bidens um Arme und Leib dicht wollig), endlich die Haare auf der Unterſeite einförmig lichtbräunlich (bei Ph. bidens entſchieden zweifarbig). Die Haare der Oberſeite am Grunde weißlich, dann kaſtanienbraun.

10. Ph. bicolor Wagn., die geſcheckte Blattnaſe; bicolor, supra pilis basi et apice ferrugineo-fuscis, gastraeo albido; cauda calcaribusque brevissimis.

Vampyrus soricinus. Spix vesp. bras. p. 65. tab. 36. fig. 2, 6. — Ph. bicolor. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 400.

Braſilien. Körper faſt 3″, Ohren 7‴, Schenkelflughaut 6‴, Sporen 2‴. Wahrſcheinlich mit Spix V. soricinus identiſch. Ein kleines Knöpfchen auf der Oberſeite der Schenkelflughaut, die weit darüber hinausgeht, läßt auf die Exiſtenz eines kleinen Schwänzchens muthmaſſen. Unterlippe mit dem Warzenbeſatz, Schwingen an der Fußwurzel endigend. Sehr ausgezeichnet durch die Färbung, indem auf der Oberſeite die dunkel rothbraunen Haare in der Mitte einen breiten weißen Ring haben, auf der Unterſeite ſind ſie am Grunde roſtbraun, in der längern Spitzenhälfte gelblichweiß.

11. Ph. discolor Natt., die mißfarbige Blattnaſe; bicolor, supra saturate castaneo-fuscum, pilis basi albidis, apice fuscis; gastraeo sordide albicante; cauda calcaribusque brevissimis.

Phyllostoma discolor. Wagn. Wiegm. Archiv f. Naturgeſch. 1843. S. 366; Abh. der Münchn. Akadem. V. S. 167.

Mato groſſo in Braſilien. Vom Scheitel zum Steiß 2″ 7‴, Ohren 8‴, Naſenblatt 3½‴, Vorderarm 2″ 2‴, Schwanz 3‴, Schenkelflughaut 8‴. Naſenblatt kurz, breit, ganzrandig; Unterlippe mit dem dreieckigen Warzenbeſatz, Schwingen an der Ferſe angeheftet. Größer als Ph. bicolor, die ganze Oberſeite einfarbig dunkel kaſtanienbraun, indem der lichte Grund der Haare nur am Nacken durchſchimmert, während bei Ph. bicolor die Haare der Oberſeite dreimal geringelt ſind, wobei am Kopf das Weiß ſo vorherrſcht, daß dieſer faſt ganz weiß iſt.

12. Ph. brevicaudum Neuw., die kurzgeſchwänzte Blattnaſe; bicolor, pilis basi et apice fuscis, medio albidis; gastraeo griseo-fusco; auriculis mediocribus, cauda calcaribusque brevissimis.

Pyllostoma brevicaudum. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 192. mit Abbild. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 401. — Burmeiſt. Braſil. I. S. 41.

Braſilien und Guyana. Körper 2″ 6‴, Schwanz 3½‴, Vorderarm 1″ 6‴, Ohren 7½‴, Naſenblatt 3½‴, Schenkelflughaut 7‴. Na-

senblatt länger oder kürzer zugespitzt; Unterlippe mit dem dreieckigen Warzenbesatz; Schwingen nackt und der Fußwurzel sich ansetzend. Oberseite röthlich rußbraun mit graulichem Anflug, unten merklich heller. Haare der Oberseite am Grunde braungrau, in der Mitte weißlich, dann dunkelbraun, häufig mit lichten Spitzen. Haare der Unterseite einförmig braun mit lichtgrauen Spitzen. Nahe verwandt mit Ph. bicolor, aber etwas kleiner und durch die dunklere Färbung der Unterseite verschieden.

* Ph. Grayi. Waterh. zool. Beagle p. 3. tab. 2. (Thier); 35 fig. 2. (Schädel); Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 401.

Von Fernambuk. Im Habitus nach Beschreibung und Abbildung mit Ph. brevicaudum übereinkommend. Bräunlich aschgrau. Haare der Oberseite am Grunde grau, dann weißlich, gegen die Spitze bräunlich aschgrau und an der Spitze weißgrau; Unterseite fast einförmig braun aschfarben, indem nur die Haarspitzen weißlich sind. Körper 2″, Vorderarm 1″ 4½‴. Scheint nur Varietät der vorigen Art zu seyn.

* Ph. Childreni. Gray mag. of zool. and bot. n. 12; Wagn. Schreb. a. a. O. S. 402.

Mir nur aus der Bemerkung von Waterhouse bekannt, daß es durch den Warzenbesatz der Unterlippe mit Ph. Grayi übereinkomme, aber viel kleiner und anders gefärbt sey[1]).

13. Ph. scrobiculatum Wagn., die grubenlippige Blattnase; brunneum, subtus pallidius, prosthemate elongato, labio inferiore antice fovea centrali instructo.

Phyllostoma elongatum. Gray, ann. of nat. hist. X. p. 257; voy. of Sulphur mamm. p. 19. tab. 8. fig. 2.

Heimath nicht näher bekannt. Körper 2″, Vorderarm 1″ 2‴, Nasenblatt 4‴, Sporen 4½‴. Unterlippe vorn mit einem breiten, dreiseitigen Raum wie bei den vorhergehenden, aber statt des Warzenbesatzes, den diese zeigen, mit einer mittelständigen Grube. Ohren groß, am Ende ab-

1) Noch führt Gray 2 Arten an, die mir nicht bekannt sind: Artibeus fimbriatus aus Brasilien und Acapulco, und Phyllostoma fuliginosum (mag. of zool. and bot. II. p. 5. u. 8.)

gerundet; Naſenblatt verlängert, lanzett; das untere Daumenglied beträchtlich länger als das obere. Schwingen von der Mitte des Knöchels entſpringend, Schenkelflughaut ziemlich groß. Haare der Oberſeite braun, am Grunde rein weiß, auf der Unterſeite einförmig graubraun nach ihrer ganzen Länge; Schwingen dunkelbraun. — Gray's Benennung kann nicht beibehalten werden, da mit derſelben ſchon Geoffroy eine ganz andere Art bezeichnete.

14. Ph. innominatum Tschud., die kaſtanienbraune Blattnaſe; supra subtusque cano-badium; prosthemate ovato lanceolato integro.

Phyllostoma innominatum. Tschud. faun. peruan. I. p. 62. — Pöppig, Notiz. für Natur- u. Heilk. XXXIII. p. 141.

An das Ende dieſer Gruppe wird eine Blattnaſe angereiht, die Pöppig in der Provinz Maynas auffand und eine Charakteriſtik von ihr ohne Beifügung eines ſpecifiſchen Namens lieferte, daher ſie Tſchudi als Ph. innominatum bezeichnete. Sie iſt um $\frac{1}{3}$ kleiner als Ph. elongatum, oben und unten kaſtanienbraun, ins Graue übergehend. Naſenblatt reicht bis zum vordern Augenwinkel, iſt oval lanzett, ganzrandig mit abgerundeter Baſis. Ohren rautenförmig, etwas abgerundet und ſtumpf. Schwanz erreicht die halbe Länge der Schenkelflughaut. — Scheint eine eigene Art zu ſeyn, die freilich noch genauerer Prüfung zu unterſtellen iſt.

†††) cauda nulla, alae basi digitorum posteriorum affixae. — Vampirus Geoffr. et Gray; Ametrida Gray.

15. Ph. Spectrum Linn., die Geſpenſt-Battnaſe; maximum; auriculis, patagio interfemorali calcaribusque longis; prosthemate lanceolato parvo, rostro elongato.

Vampirus Spectrum. Geoffr. cours. 14. lec. p. 32. — Ph. Spectrum. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 174, 186 tab. 11 (Kopf und Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 411. tab. XLV. — Vampire. Blainv. ostéograph. Vespertil. tab. 3. (Skelet); 13 (Gebiß).

Guiana. Körper 5″ 6‴, Schenkelflughaut 2″, 7‴, Ohren 1″ 1‴, Naſenblatt $4\frac{1}{2}$‴, Sporen 1″ 6‴. Wegen des geſtreckten Schädels und der Zahl der Backenzähne, $\frac{4}{4}$, hat Geoffroy aus dieſer Art eine beſondere Gattung Vampirus errichtet, die nicht mit der von Spix zu verwechſeln iſt. Die größte aller Arten. Naſenblatt klein und ganzrandig, Schwanz

fehlt ganz, Flügel bis zur Zehenwurzel reichend. Farbe oben kaſtanienbraun, unten röthlichgelb.

16. Ph. Centurio Gray, die weißſchulterige Blattnaſe; fuliginosum, macula scapulari alba, rostro abbreviato.

Ametrida Centurio. Gray ann. of nat. hist. XIX. p. 407.

Para in Braſilien. Vorderarm 11‴. Ohren mäßig, an der Spitze abgerundet; Schnautze ſehr kurz und breit, Naſenblatt oval lanzett, Kinn mit dem dreieckigen Warzenbeſatz, Sporen ½ ſo lang als das Schienbein. Farbe rußigbraun, Stirne, Kinn und ein Flecken auf jeder Schulter an der Wurzel der Schwingen weiß.

††††) cauda nulla, alae talo affixae. — Carollia Gray.

17. Ph. brachyotum Neuw., die kurzöhrige Blattnaſe; fuliginosum, subtus pallidius, auriculis brevibus et latis, prosthemate gracili acuminato, calcaribus brevibus.

Phyllostoma brachyotum. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 196. mit Abbild. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 409. — Burmeiſt. Braſil. I. S. 46.

Am Mucuri in Braſilien. Körper 2″ 4‴, Naſenblatt 2¼ bis 3‴, Sporen 3‴. Backenzähne ⅔. Ohren breit, mäßig hoch, oben und am innern Rande abgerundet; Klappe ſehr klein, nach oben ſtark zugerundet, etwa ſo hoch als breit. Naſenblatt ſchlank, oben unter der Spitze ſeicht ausgeſchnitten, Schenkelflughaut zwiſchen den Beinen ziemlich gerade ausſpannt. Pelz dunkel rußfarben, die Haare an der Wurzel graubräunlich; Unterſeite heller, mehr ins Graubräunliche fallend.

18. Ph. verrucatum Gray, die warzige Blattnaſe; praecedenti simillimum, at auriculis majoribus tragoque acuminato diversum.

Carollia verrucata. Gray voy. of Sulphur, mamm. p. 20 tab. 8. fig. 3. (Kopf.)

Tropiſches Amerika. Gray unterſcheidet dieſe Art von der vorigen, mit der ſie in der Färbung übereinkommt, durch beträchtlich längere Ohren, und die oval dreieckige ſcharfſpitzige Klappe.

19. Ph. superciliatum Neuw., die augenſtreifige Blattnaſe; cano-fuscum, stria alba utrinque a naso ad auriculam currente.

Phyllostoma superciliatum. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S 200. — Reng-

ger Paraguay S. 74. — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 406. — Burmeist. Brasil. I. S. 44. — Chauve-souris I. Azar. ess. II. p. 269.

Paraguay und Südbrasilien. Körper 3″ 8‴ nach Rengger; nach dem Prinzen zu Neuwied bis zu Ende der Flughaut 4″ 5‴; die Schenkelflughaut läßt sich auf 9½‴ abziehen, Nasenblatt oval lanzett, ganzrandig 4 bis 6‴ lang. Schenkelflughaut den größten Theil des Raumes zwischen den Beinen ausfüllend, durch starke Sporen unterstützt und an ihrem Rande nur wenig ausgeschnitten. Farbe graulichbraun; vom Nasenblatte läuft jederseits über dem Auge hin ein weißer Streif bis zum Ohr.

20. Ph. calcaratum Wagn., die langspornige Blattnase; supra fuliginosum: pilis albidis, apice basique fuscis; subtus brunnescens pilis fere unicoloribus; prosthemate elongato, angusto, lanceolato; calcaribus longissimis.

Phyllostoma calcaratum. Wagn. Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 168.

Angeblich aus Brasilien. Vom Scheitel zum Steiß 2″ 1‴, Ohren 6¼‴, Nasenblatt 3½‴, Vorderarm 1″ 5‴, Schenkelflughaut 6½‴, Sporen 10¼‴. Backenzähne $\frac{5}{5}$. Nach wiederholter Untersuchung bin ich nicht sicher, ob diese Art wirklich zu den ungeschwänzten gehört, da sich auf der Außenseite der seicht ausgeschnittenen Schenkelflughaut ein kleines Knöpfchen findet, welches das Ende eines kurzen Schwänzchens, das beim Ausbalgen mit ausgezogen worden seyn könnte, anzeigen dürfte. Die Schwingen reichen nicht ganz bis zur Fußwurzel herab. Nasenblatt schmal lanzett, mit stumpfer Spitze und ganzrandig.

21. Ph. infundibuliforme Rengg., die Trichter-Blattnase; fuscum, prosthemate integro brevi, apice rotundato; calcaribus longis.

Phyllostoma infundibuliforme. Rengg. Paraguay S. 77. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 410. — Ph. rotundum. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 181. — Chauve-souris III. Azar. ess. II. p. 275.

Paraguay. Körper 3″, Ohren 10‴, Sporen 7‴. Muthmaßlich hieher gestellt, weil Rengger von der Schenkelflughaut zwar nichts weiter angiebt, als daß sie ausgeschnitten sey, die langen Sporen aber nicht zur folgenden, dagegen zu dieser Abtheilung passen. Nasenblatt beinahe eben so breit als hoch, oben abgerundet. Ohren nach oben zugespitzt;

Klappe schmal, spitz, am äußern Rande mit einem Zahn. Flughaut nicht ganz bis zum Fußgelenk herablaufend. Farbe oben braun, unten gelblichbraun.

22. Ph. Lilium Geoffr., die Lilien-Blattnase: e rufescente fuscum, subtus cano-fuscum; prosthemate fere orbiculari, paululum acuminato.

Phyllostoma Lilium. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 181, 186. — Rengg. Paraguay S. 78. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 411. — Ph. spiculatus. Lichtenst. Doubl. Verz. S. 3. — Chauve-souris IV. Azar. ess. II. p. 277.

Paraguay. Körper 2″ 3‴, Ohren 6‴, Nasenblatt 3‴ lang und eben so breit. Ohren zugespitzt, Klappe lanzett, außen mit zwei Zähnchen. Nasenblatt beinahe kreisförmig, oben jedoch etwas zugespitzt; Schenkelflughaut ausgeschnitten. Farbe oben röthlichbraun, unten graulichbraun.

b) patagium interfemorale profunde et triangulatim excisum, cauda nulla. — Artibeus Leach et Gray; Stenoderma Geoffr. [1]).

23. Ph. perspicillatum Linn., die kerblippige Blattnase; saturate fuscum, subtus pallidius; prosthemate integro, ovato- acuminato, longitudinaliter bisulcato; labiis ad marginem crenulatis.

Phyllostoma perspicillatum. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 176. tab. 11. (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 402; Abh. d. Münchn. Akadem. V. tab. 2. fig. 2. bis 7. (Kopf). — Burmeist. Brasil. I. S. 45. — Stenoderma perspicillatum. D'Orbign. voy. dans l'Amér. mérid. mammif. p. 11. tab. 9. fig. 7 — 9. — Blainv. ostéogr. vesp. p. 103. tab. 13. (Gebiß). — Phyllostoma planirostre. Spix vesp. bras. p. 66. tab. 36. fig. 1. — Ph. obscurum. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 203.

Von Südbrasilien und Bolivia an durch Guiana bis nach den An-

1) Geoffroy gab von seiner Gattung Stenoderma als Merkmale an: Backenzähne $\frac{4}{4}$, Nase einfach, Schwanz fehlend, Schenkelflughaut rudimentär. Sein St. rufum bezeichnete er als einförmig kastanienrothbraun, Körper 3″ lang (vgl. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 444). — Die Angabe der Nase als einfach ist demnach unrichtig. Blainville, der vom Gebiß dieses St. rufum eine Abbildung auf tab. 13. giebt, und mit Recht vermuthet, daß im Unterkiefer der 5. Zahn nur zufällig fehlen wird, macht dabei bemerklich, daß das Original nicht mehr existire und es kann demnach diese Art nicht näher bestimmt werden. Blainville faßt übrigens die Gattung zu weit, indem er ihr auch noch Brachyphylla cavernarum unterstellt.

tillen verbreitet. Körper 3″ 8‴, Schenkelflughaut ſtark abgezogen 6 bis 7‴, Ohren 9‴, Naſenblatt 4½‴, Vorderarm 2″ 4‴. Backenzähne $\frac{4}{4}$, wovon der hintere im Oberkiefer rundlich iſt. Schnauze dick, Ohren kurz und ſchmal, Klappen außen mit 2 bis 3 Zacken, Lippenränder außen gekerbt. An der Spitze der Unterlippe 3 Warzen, wovon die mittlere die größte; darunter eine andere Reihe. Keine ſackartige Grube am Halſe. Schwingen bis zur Zehenwurzel reichend, Schenkelflughaut tief ausgeſchnitten, Sporen ſehr kurz. Färbung veränderlich: auf dem Rücken aus dem rußig Schwarzbraunen ins Roſtbraune, auf der Unterſeite bräunlichgrau; vom Naſenblatt gewöhnlich beiderſeits ein weißlicher Streif gegen das Ohr verlaufend.

* Ph. jamaicense. Horsf. zool. journ. III. p. 238. tab. suppl. 21. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 405, 550. — Gervais. R. de la Sagra hist. de Cuba, mammif. p. 32. — Artibeus jamaicensis. Leach, Linn. transact. XIII. p. 75. — Gray ann. of nat. hist. IV. p. 2. — Madataeus Lewisii. Leach Linn. transact. XIII. p. 82.

Bewohnt Jamaika und Cuba, und iſt vollkommen identiſch mit Ph. perspicillatum.

* Ph. (Artibeus) falcatum. Gray, ann. of nat. hist. IV. p. 1.

Von Cuba. Wird von Gray durch den ſichelförmig gekrümmten Zeigefinger von A. jamaicensis, bei dem er gerade ſeyn ſoll, unterſchieden. Da er indeß bei den braſiliſchen Exemplaren von Ph. perspicillatum auch mehr oder minder gekrümmt iſt, ſo ſehe ich keinen triftigen Grund, den A. falcatus hievon zu trennen.

24. Ph. bilabiatum Natt., die gewimperte Blattnaſe; supra albido fuscoque marmoratum, subtus rubello- canescens; macula humerali nivea; labiorum margine verrucis minimis instructa.

Phyllostoma bilabiatum. Wagn. Wiegm. Archiv f. Naturgeſch. 1843.

---

1) Leach hat in den Linn. transact. VIII. p. 75 und 82 zwei Gattungen Artibeus und Madataeus aufgeſtellt, die ſich dadurch unterſcheiden ſollen, daß an jenem der Zeigefinger (mit Einſchluß des Mittelhandfingers) nur 1, an dieſem 2 Phalangen trägt; der Unterſchied iſt jedoch ſo wenig begründet, daß Gray (List of. Brit. mus. p. 18) beide angebliche Gattungen zu Ph. jamaicense zählt.

S. 366; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 174. — Burmeist. Brasil. I. S. 47. — Artibeus leucomus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. III. (1849) p. 306.

Provinz San Paulo in Brasilien. Vom Scheitel zum Steiß 2" 3‴, Ohren 6½‴, Nasenblatt 4½‴, Vorderarm 1" 6‴, Schenkelflughaut in der Mitte 3‴. Ohren mittelmäßig, Klappe am äußern Rand unterhalb etwas gezackt. Nasenblatt breit, nach oben abgerundet mit lang vorgezogener Spitze, längs der Mitte mit erhabenem Kiel. Mundsaum aufgeworfen, granulirt, außerdem die Spitze der Unterlippe mit 5 Wärzchen. Schwingen an der Fußwurzel angesetzt und an den Armen und Rumpfseiten behaart; Sporen sehr kurz, Schenkelflughaut tief ausgeschnitten und behaart. Oben kastanienbraun und etwas weiß marmorirt, indem die braunen Haare in der Mitte weißlich sind. Unterseite licht röthlich grau. An der Ansatzstelle des Halsfittichs an den Rumpf ein kleiner weißer Fleck.

25. Ph. lineatum Geoffr., die rückenstreifige Blattnase; supra castaneo-fuscum, subtus rubello-brunnescens; striis facialibus quatuor unaque dorsali albis. — Tab. 42.

Phyllostoma lineatum. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 180, 186. — Rengg. Paraguay S. 75. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 408; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 170. — Chauve souris II. Azar. ess. II. p. 271. — Arctibius (?) Floresii. CH. L. Bonaparte, ann. of nat. hist. XX. 434.

Paraguay und südwestliches Brasilien (Goyaz, Mato grosso). Körper 3" 3‴, Ohren 7½‴, Nasenblatt 4½‴, Vorderarm 1" 8‴, Schenkelflughaut in der Mitte 1‴. Ohrklappe am Außenrande unten gezackt; Nasenblatt oval lanzett, ganzrandig, mit starker Mittelrippe. Schwingen fast bis zur Basis der Zehen reichend; Schenkelflughaut am Steiß sehr schmal, längs der Hinterbeine breiter, Sporen sehr kurz. Farbe oben kastanienbraun, unten licht bräunlich mit grauröthlichem Anflug. Gesicht mit zwei Paar weißer Längsstreifen: das eine vom Hufeisen gegen den Scheitel, das andere vom Grund der Ohröffnung zum Mundwinkel. Vom Scheitel bis zum Steiß verläuft ein anderer weißer Längsstreif.

26. Ph. personatum Natt., die maskirte Blattnase; supra fuliginoso-fuscum, subtus brunneo-canum; striis facialibus quatuor albis, stria dorsali vix distiguenda.

Phyllostoma personatum. Wagn. Wiegm. Archiv f. Naturgesch. 1843. 1. S. 366; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 172.

Provinz San Paulo. Körper 3" 7‴, Ohren 8‴, Nasenblatt 5‴, Vorderarm 1" 10‴, Schenkelflughaut 3‴. Größer als vorige, Schenkelflughaut etwas breiter. Oberseite rußigbraun, aber nicht sehr dunkel, am Nacken ins schmutzig Bräunlichweiße fallend; Unterseite licht bräunlichgrau. Im Gesicht dieselben 2 Paar weißer Längsstreifen wie bei voriger Art, aber der Rückenstreif ist unbestimmt, schmal, gräulichweiß.

27. Ph. pusillum Natt., die Zwerg-Blattnase; minimum, fuliginosum, subtus pallidius; striis facialibus quatuor albidis. — Tab. 43.

Phyllostoma pusillum. Wagn. Wiegm. Archiv. f. Naturgesch. 1843. 1. S. 366; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 173. — Tschud. faun. peruan. I. S. 63.

Westbrasilien und Peru. Körper 2" 6‴, Ohren 5½‴, Nasenblatt 3‴, Vorderarm 1" 2‴. Sehr ähnlich dem vorigen, aber viel kleiner und ohne Spur eines Rückenstreifs.

c) cauda et patagium interfemorale nulla. — Sturnira et Nyctiplanus Gray [1]).

28. Ph. erythromos Tschud., die rothbuschige Blattnase; supra fuscescens, subtus brunneum; fasciculo pilorum intra humeros et auriculas ferrugineo-rufis.

Phyllostoma erythromos. Tschud. faun. peruan. I. S. 64. tab. 1.

Peru. Körper 2" 8‴, Vorderarm 1" 6½‴. Nasenblatt oval lanzett mit wenig merklicher Mittelrippe; Kinn mit dem gewöhnlichen Warzenbesatz; Ohren mittelmäßig. Schwingen bis zur Fußwurzel reichend; von einer Schenkelflughaut keine Spur. Kopf gelblichbraun. Haare auf der Oberseite schmutzig, mit rußig kastanienbraunen Spitzen, die am Nacken sehr kurz sind, so daß hier die lichte Farbe vorherrscht. Unterseite

1) In Gray's Charakteristik von Sturnira (zool. of Sulphur mamm. p. 21.) liegt ein Widerspruch. In der Definition wird die Schenkelflughaut als fehlend bezeichnet; in der Erläuterung dagegen wird Sturnira von Artibeus unterschieden durch die Schmalheit der Schenkelflughaut, welche vollständig von den Haaren der Beine verdeckt wird. Später (ann. of nat. hist. sec. ser. III. p. 306) errichtete er die Gattung Nyctiplanus und unterschied sie von den andern Phyllostomen durch den Mangel der Schenkelflughaut. In der That fehlt aber letztere dieser ganzen Gruppe, denn ein zuweilen vorkommender, kaum merklicher Hautrand an den Hinterbeinen gehört diesen an. Sturnira und Nyctiplanus fallen daher zusammen.

ſchmutzig licht bräunlich, an den Seiten dunkler mit röthlichem Anfluge; die Haare längs der Mitte am Grunde kaum dunkler, was aber an den Seiten ſtatt hat. Auf den beiden Seiten (wahrſcheinlich nur bei den Männchen) findet ſich ein dicker Büſchel licht roſtrother, ins Kupferige fallender Haare, die einfärbig, nur am Grunde etwas heller ſind; die Flughaut iſt ſchwarzbraun.

29. Ph. chilense Gay, die zimmetbuſchige Blattnaſe; „statura mediocri, capite griseo, dorso pedibusque brunneis saturatioribus, corpore infra dilutiore, amictis humeralibus cinnamomeis; pilis ad basin cinereis; auriculis ovalibus, obtusis, longioribus quam latis; trago parvo obtuso.“ Gay.

Stenoderma chilensis. Gay hist. de Chile, zool. I. p. 30. tab. 1.

Chile, aber ſehr ſelten. Vorderarm 21‴. Backenzähne ⅔. Von dem Rudiment einer Schenkelflughaut wird geſprochen, aber die Abbildung zeigt keine Spur davon. Ohren und Naſenblatt mäßig. Die ♂ an beiden Halsſeiten mit einem Büſchel zahlreicher und roſettenartig geſtellter Haare von heller Zimmtfarbe. Sehr ähnlich dem Ph. erythromus, aber die Behaarung lichter und die Haarbüſchel des Halſes andersfarbig und mehr entwickelt.

30. Ph. chrysocomos Wagn., die goldbuſchige Blattnaſe; supra fuscum, subtus albidum; fasciculo pilorum utrinque intra humeros et auriculas aurato-flavis.

Sturnira Spectrum. Gray, voy. of Sulphur, mamm. 22. tab. 6. fig. 1.

Tropiſches Amerika. Körper 3″ 6‴, Vorderarm 2″. Ohren mäßig, Naſenblatt lanzett oval, ohngefähr ſo breit als lang; Kinn mit dem gewöhnlichen Warzenbeſatz. Rückenhaare grau mit rothbraunen Spitzen. Kopf und Unterſeite viel blaſſer, indem den Haaren die braunen Spitzen fehlen. Eine breitere dunklere Binde zieht von der Achſel über die Bruſt und eine andere über die Baſis der Schenkel. Der Büſchel längerer dickerer Haare an den Halsſeiten iſt goldgelb. Durch anſehnlichere Größe und gelbe Färbung der Halsbüſchel, die wohl auch nur den Männchen zukommen werden, von den beiden vorhergehenden verſchieden.

31. Ph. oporaphilum Tschud., die Bananen-Blattnaſe; supra ex fusco canescens, subtus albido-canum, lateribus obscurioribus.

Phyllostoma oporaphilum. Tſchud. faun. peruan. I. S. 64. tab. 2.

Peru. Körper 3", Vorderarm 1" 10‴. Nasenblatt schnell zugespitzt, länger als breit; Schenkelflughaut fehlend. Oberseite mit schwachem bräunlichen Anflug, zuweilen auf dem Hinterrücken schwach rostbraun. Haare am Grunde dunkel grau, die Mitte weiß, die Spitze wieder dunkler. Bauch, besonders in der Mitte, weißgrau; die Haare am Grunde dunkler als in der Mitte. Bauchseiten und Gliedmassen dunkelbraun. Schwingen schwärzlich, mit weißem Saume, nicht so tief an der Fußwurzel hinabreichend wie bei Ph. erythromos.

32. Ph. fumarium Wagn., die rauchfarbige Blattnase; supra fuliginoso-fuscum, subtus cano-fuscescens, alis nigricantibus.

Phyllostoma fumarium. Wagn. Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 178.

Brasilien. Etwas größer als Ph. excisum. Nasenblatt kurz, zugespitzt; keine Schenkelflughaut. Oberseite trüb rußbraun, ohne Beimischung von Roth; die Haare haben die dunkle Färbung nur an der Spitze, im übrigen Theil sind sie licht graulichbraun, was am Grunde dunkler wird. Unterseite weit lichter, am lichtesten längs der Mitte, dunkler an den Seiten. Schwingen unbehaart und schwärzlich. Durch die trübe Färbung von der vorhergehenden wie von den beiden nachfolgenden Arten verschieden.

33. Ph. excisum Wagn., die gestutzte Blattnase; ferrugineo-brunneum, subtus albido-brunnescens; stria fusca per oculos ducta.

Phyllostoma excisum. Wagn. Wiegm. Archiv f. Naturgesch. 1842. S. 358; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 176. — Burmeist. Brasil. I. S. 49.

Bei Rio Janeiro und durch Burmeister bei Neu-Freiburg (Brasilien) gefunden. Vom Scheitel zum Steiß 2" 2‴, Ohren 6‴, Nasenblatt 2½‴ lang, 1½ breit, Vorderarm 1" 7‴. Nasenblatt zugespitzt, ohne besondere Mittelrippe; Ohren mittellang, schmal; Unterlippe mit dem gewöhnlichen Warzenbesatz. Schwingen fast ganz nackt; Schenkelflughaut völlig fehlend. Rücken dunkel rostbraun, was vorwärts ganz licht wird und an den Halsseiten ins Falbweiße fällt. Unterseite licht weiß-bräunlich, Leibesseiten dunkel rostbraun. Kopf oben rostbräunlich, um das Auge ein schwarzbrauner Kreis, der sich bis zum Ohre ausdehnt. Das Männchen ist ohne besondere Halsbüsche.

34. Ph. albescens Wagn., die blasse Blattnase; supra albido-brunnescens, subtus sordide brunneam; prosthemate elongato lanceolato.

Phyllostoma albescens. Wagn. Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 177.

Südliches Brasilien. Vom Scheitel zum Steiß 1" 10‴, Ohren 6‴, Nasenblatt 3‴ lang, 1½ breit, Vorderarm 1" 5½‴. Sehr ähnlich der vorigen Art, aber etwas kleiner, Nasenblatt länger und zu Anfang des obern Drittels deutlich eingekerbt, die Färbung auf der Oberseite lichter, auf der Unterseite dunkler als bei jener; der Kopf fällt mehr ins trüb Kastanienbraune, ohne Abzeichnung dunklerer Augenringe.

35. Ph. rotundatum Gray, die rundblätterige Blattnase; saturate fuscum, subtus pallidius; prosthemate ovato-lanceolato, fere aeque lato quam longo.

Nyctiplanus rotundatus. Gray, ann. of nat. hist. III. sec. ser. p. 306.

Angeblich aus Brasilien. Vorderarm 1" 7½‴. Ohren etwas zugespitzt, Klappe gezähnelt; Nasenblatt oval lanzett, fast so lang als breit, Spitze zugeschärft; Unterlippe mit dem gewöhnlichen Warzenbesatz; Flügel oben am Leibe und an der Seite der Gliedmassen behaart; keine Schenkelflughaut. Dunkelbraun, unten blasser; Haare gelblichbraun mit dunkeln Spitzen, auf der Unterseite blasser mit blassen Spitzen. Leibesseiten dunkel schwärzlichbraun.

X. CENTURIO. Runzelschwirrer.

Rostrum abbreviatum plicis contortis symmetricis ornatum, prosthema minutissimum, auriculae bilobatae, cauda nulla.

Diese Gattung, welche Südamerika angehört, wurde von Gray aufgestellt und als hauptsächlichste Merkmale folgende angegeben. Der Kopf ist ziemlich groß, das Gesicht nackt, verflacht und mit verschiedenen symmetrisch gestellten Blättchen bedeckt. Die Nasenlöcher sind getrennt und liegen zu beiden Seiten eines dreieckigen Blattes mit vorspringenden Rändern seitwärts und hinterwärts, aber unten ohne Rand. Die Ohren sind groß und von einander geschieden, mit einer großen getrennten schiefen Falte an der Basis des innern Randes, einem conischen, aufrechten Lappen und einer kurzen gezähnelten Klappe. Die Lippen sind innen am

Mundwinkel gewimpert. Schneidezähne sind $\frac{4}{4}$ vorhanden, die obern sind conisch und von einander abgerückt, die untern sind anschließend und abgestutzt; die Backenzähne sind groß mit sehr spitzen kegelförmigen Höckern. Die Flügel sind breit; die Haut zwischen den beiden innern Fingern und dem hintern Finger und Vorderarm ist mit regelmäßigen parallelen Querfasern versehen, welche die Haut in feine reguläre Falten zusammenziehen. Die Schenkelflughaut ist tief eingeschnitten; die Sporen sind kurz und der Schwanz fehlt ganz. Der Mittelfinger hat mit dem der Blattnasen gleiche Anzahl der Phalangen gemein.

Gray reihte diese Gattung bei seinen Noctilionen ein, während Peters neuerdings nach Untersuchung einer zweiten Art sie mit den Blattnasen in Verbindung bringt. Nach seinen Angaben schließt sich die Gattung Centurio durch die Form der Zähne, die gekerbten Lippen, durch die Gliederung der Finger und durch das Vorhandenseyn eines, wenn auch wenig entwickelten, Nasenblattes den ungeschwänzten Phyllostomen (Madataeus Leach) enge an. Es fehlt jedoch der letzte untere kleine Backenzahn, so daß nur 28 Zähne vorhanden sind, nämlich $\frac{4}{4}$ Schneidezähne, $\frac{1}{1}$ Eckzähne und $\frac{5}{5}$ Backenzähne. Dieses so wie die außerordentliche Verkürzung des Gesichtes, die doppellappige Gestalt der Ohren und der eigenthümliche Bau der mit verdünnten, pigmentlosen, in Querbinden geordneten Hautstellen verzierten Flughäute läßt diese Thiere als eigne Gattung unterscheiden. Die Zähne fand Peters an der von ihm untersuchten Art denen von Phyllostoma zum Verwechseln ähnlich, was die Gattung Centurio sogleich von den Noctilionen (mit W förmigen Schmelzfalten der Backenzähne) entfernt, mit denen sie Gray zusammenstellte.

1. C. **senex** Gray, der lichtbraune Runzelschwirrer; **brunneus, pilis apice pallidis, subtus pallidior.**

Centurio senex. Gray ann. of nat. hist. X. (1842) p. 259; voy. of Sulphur. mamm. p. 27. tab. 7.

Als Heimath des einzigen, von dieser Art bisher bekannt gewordenen Exemplares ist zwar Amboina vermuthet; allein diese Angabe ist sicherlich irrig und der eigentliche Wohnort wird das tropische Südamerika seyn. Maaße hat Gray nicht angeführt; nach der Abbildung mißt der Vorderarm 1″ 7‴. Der Pelz ist blaßbraun mit weißlichen Haarspitzen;

unten ist er heller; an jeder Schulter findet sich ein rein weißer Büschel. Die Haut zwischen dem Zeige- und Mittelfinger ist durchscheinend weiß; die Schwingen längs des Leibes, die Vorderarme und Beine sind behaart.

2. C. flavigularis Per., der gelbkehlige Runzelschwirrer; „supra umbrinus, pilis apice et basi fuscis, medio flavido-albis, subtus umbrino-griseus; alis saturate umbrinis, fasciis transversis pellucidis; fasciculo piloso ante humeros fasciaque gulari flavido-albis.“ Peters.

Centurio flavigularis. Peters Monatsbericht der Berlin. Acad. 1854. S. 334.

Einheimisch auf Cuba. Ganze Länge 2″ 9‴, Vorderarm 1″ 6¼‴. Wie Peters bemerklich macht, unterscheidet sich von dieser Art C. senex dadurch, „daß die Haare des Rückens weiße Spitzen haben, daß er keine gelbe Kehlbinde hat, daß die letzten beiden Glieder des dritten bis fünften Fingers viel länger sind, und daß die oberen Schneidezähne von conischer, und nicht, wie bei unserer Art, von doppelkeiliger Gestalt seyn sollen.“

c) Megadermata. Haftschwirrer.

Auriculae magnae conjunctae, trago praeditae.

Gebiß wie bei den Blattnasen. Mit Ausnahme von Macrotus gehören alle der östlichen Halbkugel an.

XI. MACROTUS. Großohr.

Appendix nasalis prosthemate ovato-lanceolato, erecto; patagium interfemorale magnum; cauda longa apice libera.

Eine neue, von Gray aufgestellte Gattung aus Westindien, welche ein Mittelglied zwischen dieser und der vorhergehenden Abtheilung ausmacht. Die Ohren sind groß und durch eine ziemlich hohe Querbinde vereinigt; die Klappe verlängert und zugespitzt, die Schenkelflughaut groß und abgestutzt, die Sporen lang, Füße frei. Der Schwanz ist lang und in die Flughaut eingeschlossen, mit Ausnahme des letzten Glieds, das frei über deren Rand hinausragt. Schließt sich an die Gattung Macrophyl-

lum an, unterſcheidet ſich aber durch die vereinigten und großen Ohren, ſo wie durch die freie Vorragung der Schwanzſpitze.

1. M. Waterhousii Gray, das mausfarbige Großohr; murino-canus, subtus pallidior.

Macrotus Waterhousii. Gray ann. of nat. hist. XIII. p. 69.

Hayti und Jamaika. Körper 2" 6‴, Schwanz 1" 2‴, Ohren eben ſoviel, Naſenblatt 5‴, Vorderarm 2" 2‴. Die Ohren ſind an der Spitze abgerundet und ſchwach behaart, das Naſenblatt lanzettförmig und aufgerichtet, die Unterlippe mit einer ſchmalen, dreieckigen, glattrandigen, vorn ausgehöhlten Warze, die Schenkelflughaut breit und abgeſtutzt.

XII. MEGADERMA. Ziernaſe.

Nasus appendice triplici; prosthema elongatum erectum; patagium interfemorale magnum, cauda nulla.

Stellvertreter der amerikaniſchen Blattnaſen in den tropiſchen Regionen der alten Welt. Die Ohren ſind ungeheuer groß und oberhalb der Stirne durch ein Band miteinander verwachſen; die Klappen ſind ebenfalls von anſehnlicher Länge. Der Naſenbeſatz iſt bedeutend entwickelt und aus 3 Stücken beſtehend, die aber von zwei Blättern gebildet werden. Das horizontale Blatt, in welchem die Naſenlöcher liegen, iſt hinterwärts mit einem zweiten Stück als ein langes ovales Blatt ſenkrecht aufgerichtet; ein anderes, die Naſenlöcher überdeckendes Blatt ſteigt hinterwärts ebenfalls ſenkrecht auf und iſt in dieſem Verlaufe als eine Art Mittelrippe dem hintern aufrechten Blatte angefügt. Schwingen und Schenkelflughaut ſind ſehr groß, aber kein Schwanz; dem Mittelfinger fehlt das überſchüſſige Glied, welches die Phylloſtomen auszeichnet. Bei den Weibchen finden ſich in der Inguinalgegend dieſelben cylindriſchen Anhängſel, wie bei den Weibchen der Kammnaſen. Gebiß: Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1-1}{1-1}$, Backenzähne $\frac{5-5}{5-5}$. In der Oberkinnlade fehlt der Zwiſchenkiefer und damit auch die obern Vorderzähne; ſeine Stelle iſt durch ein ſehniges Band erſetzt. Die obern Eckzähne ſind auf der Innenſeite mit 2 Nebenzacken verſehen, von denen der kleinere vorn, der größere hinten liegt. Der letzte obere Backenzahn iſt ſchmal wie bei Ph. hastatum.

†) labri margo anterior appendice nasali haud tectus.

1. M. Lyra Geoffr., die Leiernase; cano-rufescens, subtus albido-canum; prosthemate verticali rectangulari; trago bilobato.

Megaderma Lyra. Geoffr. ann. du mus. XV. p. 190, 198. tab. 12. — Is. Geoffr. voy. de Bélang. p. 86. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 413. — Blainv. ostéogr. Vespert. p. 101. tab. 7. fig. 6. (Schädel), tab. 14. (Gebiß). — Horsf. catal. of the East. Ind. mus. p. 31. — Blyth, ann. of nat. hist. XV. p. 462. — M. carnatica Elliot. Blyth journ. of the Asiat. soc. XVI. 2. p. 863.

Weit durch Indien verbreitet. Körper 2" 11‴, Ohren 1" 1‴, Nasenblatt 4½‴, Schenkelflughaut 1" 6‴. Das aufrechte Nasenblatt ist am freien Ende viereckig abgeschnitten. Die Ohren sind zur Hälfte ihrer Länge miteinander verwachsen, die Ohrklappe ist in zwei Lappen gespalten: der innere abgerundet, der äußere nochmals so lang und in eine Spitze auslaufend. Sporen sehr kurz. Färbung oben grau mit Roth gewässert, unten hellgrau oder graulichweiß; die obern Haare dunkelgrau mit rothen Spitzen, die untern schwarz mit weißen Spitzen. — Ueberfällt nach Blyth's Angaben andere kleine Fledermäuse und saugt ihnen zuerst das Blut aus; nach Frith sollen Frösche eine Hauptspeise seyn.

2. M. Spectrum Wagn., die nordindische Ziernase; supra schistaceo-cinereum, subtus albidum; prosthemate verticali mediocri ovali; trago bilobato: lobulo interiore basali ovato.

Megaderma Spectrum. Wagn. in v. Hügel's Kaschmir IV. (1844) S. 569 mit Abbild. — M. schistaceum. Hodgson, journ. of the Asiat. soc. XVI. 2. (1847) p. 889. tab. 39.

In Kaschmir vom Baron Hügel entdeckt, später von Hodgson in Nepal aufgefunden. Höhe vom Scheitel bis zum After 2" 7‴, Ohren 1" 3‴, Klappe 6½‴, Nasenblatt 5‴, Schienbein 1" 3‴, Schenkelflughaut ohngefähr 1" 2‴. Der Nasenbesatz läßt die Spitze der Oberlippe frei. Das aufrechte hintere Blatt ist breit oval, oben zugerundet abgestutzt, in der Mitte etwas spitz vorgezogen; das vordere Blatt steigt als schmale keilförmige Mittelrippe am hintern auf. Die Ohren sind fast bis zur Mitte vereinigt; die Klappe am obern Ende zugespitzt, das Anhängsel an der untern Hälfte der Innenseite breit oval. Die Oberseite ist licht schiefergrau, hie und da mit trüb rostigem Anfluge; die Unterse-

te gelblichweiß. Die Haare ſind oben wie unten zweifarbig: die untere Hälfte dunkel ſchiefergrau. Krallen weißlich. Nach Hodgſon's Beobachtungen ſind beide Geſchlechter gleichfarbig; die Weibchen mit cylindriſchen Anhängſeln in der Weichengegend, die er irrig für Saugwarzen hält.

3. M. philippinense Waterh., die philippiniſche Ziernaſe; „supra cinereo-fuscum, subtus cinereum; prosthemate verticali fere ovali, ad apicem subtruncato, horizontali, paulo minori, cordiformi; auribus permagnis; trago elongato, attenuato, acuto, ad basin antice lobo mediocri acuto instructo.“ Waterh.

Megaderma philippinense. Waterh. ann. of. nat. hist. XIII. p. 304.

Von den Philippinen. Körper 2″ 8‴, Ohren 1″ 1½‴, Vorderarm 2″ 1½‴. Ganze Länge des getheilten Naſenblattes 5½‴, wovon die vordere herzförmige Portion merklich weniger als die Hälfte ausmacht. Mit M. Trifolium verwandt, indem das vordere Naſenblatt breiter und das hintere kürzer und breiter als bei M. Lyra iſt, aber es differirt von M. Trifolium durch beträchtlich größere und nicht ganz ſo tief geſpaltene Ohren, ſo wie durch die Form der Klappe, welche ſchmal und ſcharf zugeſpitzt iſt und an der Baſis einen kleinen, faſt dreieckigen Lappen hat.

4. M. Trifolium Geoffr., das Kleeblatt; murino-griseum, prosthemate verticali mediocri, ovato, acuminato; trago trilobato: lobulo medio lateralibus majore.

Megaderma Trifolium. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 193, 197. tab. 12. (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 415. — M. Spasma. Cantor, journ. of the Asiat. soc. XV. p. 179. — S. Müller, verhandel. I. p. 24.

Malayiſche Halbinſel, Singapore, Java und Sumatra. Körper 2″ 11‴, Ohren 1″ 1‴, Naſenblatt 3½‴, Schenkelflughaut 1″ 1‴. Von M. Lyra verſchieden durch kürzeres, ovales und zugeſpitztes Naſenblatt, breiteres Hufeiſen, tiefer geſpaltene Ohren, längere Sporen und insbeſondere durch die Ohrklappe, welche dreilappig iſt und wovon der mittlere Lappen größer als die ſeitlichen iſt.

††) labri margo anterior appendice nasali prosiliente tectus. — Livia Gray.

5. M. Frons Geoffr., die afrikaniſche Ziernaſe; cinereum, prosthemate verticali longissimo ovali; trago bilobato: lobulo interiore basali lanceolato.

Megaderma Frons. Geoffr. ann. d. mus. XV. p. 192, 196, XX. tab. 1. (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 414. — Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 81.

Sennaar und Guinea. Körper 2″ 5‴, Ohren 1″ 4‴, Klappe 9½‴, Naſenblatt 9½‴, Vorderarm 2″ 2‴, Schenkelflughaut 1″ 4‴. Das aufrechte Naſenblatt iſt breit oval und bildet unten eine Art Hufeiſen, das zungenartig über die Oberlippe vorſpringt. Das vordere aufrechte Naſenblatt iſt von ſpitz keilartiger Form, dem aufrechten Theil des vorigen angeheftet, und unten ebenfalls ſich erweiternd und die Naſenlöcher überdeckend. Die Ohren ſind nicht ganz zur Hälfte miteinander verwachſen; die Klappe läuft in eine lange Spitze aus und hat an ihrem Grunde auf der Innenſeite ein lanzettförmiges Anhängſel. Der Pelz iſt lang und weich, oben licht bläulich ſchiefergrau, was an den Spitzen heller wird und bei Einigen am Unterrücken etwas ins Olivenfarbige ſpielt; auf der Unterſeite ſind die Haare am Grunde dunkler ſchieferfarben, die Spitzen meiſt ins Gelbliche fallend. So ſind die Exemplare aus dem Sennaar beſchaffen; bei einem Exemplare angeblich aus Guinea fällt der Unterrücken ins ſchmutzig Roſtröthliche.

XIII. RHINOPOMA. Klappnaſe.

Auriculae mediocres connatae, prosthema parvum erectum, metopium excavatum, cauda patagio interfemorali angusto multum longior.

Indien und Oſtafrika angehörig [1]). Die Ohren ſind mittelmäßig, dicht aneinander ſtoßend und mit einer Klappe verſehen. Der Naſenrücken iſt lang, koniſch, oben concav, am Ende ſchief abgeſchnitten und in eine, von den ſchmalen Naſenlöchern durchbrochene Scheibe ausgebreitet; über dem Naſenende ſteht ein kleines aufrechtes lanzettförmiges Naſenblatt. Die Schenkelflughaut iſt ſchmal und ohne Sporen; der lange Schwanz an ſeiner Baſis von ihr eingehüllt, im übrigen größeren Theile frei. Schneidezähne $\frac{2}{2}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{5}{5}$; die obern Schneidezähne von einander entfernt.

1) Rhinopoma caroliniense Geoffr. aus Carolina gehört nach Blainville nicht hieher, ſondern zu Dysopes.

1. **Rh. microphyllum** Brünn., die graue Klappnaſe; **cinereum, vellere longo copioso.**

Rhinopoma microphyllum. Geoffr. Egypt. II. p. 123. tab. 1. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 444. — Vespertilio microphyllus. Brünnich, Kopenh. Kab. S. 50. tab. 6.

Aegypten. Körper 2″, Schwanz 1″ 10‴, Kopf 7‴, Ohren 5½‴, Flugweite 7″ 4‴. Behaarung lang, reichlich, grau; Schwanz ſehr lang, dünn, ſchwarz. Naſenlöcher in beſtändiger Bewegung, bald ſich öffnend, bald ſich ſchließend.

2. **Rh. Hardwickii** Blyth, die indiſche Klappnaſe; **major, brunneum.**

Rhinopoma Hardwickii. Blyth, ann. of nat. hist. XV. p. 474. — Cantor, journ. of the Asiat. soc. XV. p. 178.

Vorderindien (ſüdliches Mahratten-Land, Calcutta, Allahabad, Agra, Mirzapore) und malayiſche Halbinſel. Folgendes iſt Blyth's Beſchreibung. Ganze Länge bis zu Ende des langen dünnen Schwanzes 5″ 6‴, letzterer um 2″ 3‴ die Schenkelflughaut überragend; Flugweite 12½″, Vorderarm 2″ 3‴, Ohren vorn ⅞″, hinten ½″. Pelz ſehr fein; Farbe ein ſanftes mattes Braun (soft dull brown), am Grunde blaſſer, wo es ins Weißliche fällt. Geſicht, Steiß und Bauchgegend ſind nackt; Geſicht und Häute dunkel mit bleifarbigem Anflug; Haut der Arme unterwärts und des Unterleibes iſt durchſcheinend. Die Naſenlöcher ſind verſchließbar und klappenartig, indem ſie ſchiefe Querſchlitze in der abgeſtumpften Schnautze bilden; die Krallen ſind weiß. — Blyth bemerkt, daß er dieſe Art von einem aus England eingeſandten und als afrikaniſch bezeichneten Exemplare nicht habe unterſcheiden können, daß er auch bei Vergleichung des großen franzöſiſchen Werkes über Aegypten keinen andern Unterſchied gefunden habe, als daß in dieſem die Schwanzwirbel nicht von der gehörigen Größe dargeſtellt ſeyen. Vergleicht man jedoch die vorliegenden Beſchreibungen von beiden Arten miteinander, ſo findet man, daß beide nicht blos in der Färbung, ſondern auch in der Größe erheblich von einander verſchieden ſind, ſo daß es ſich fragt, ob jenes aus England eingeſandte Exemplar nicht etwa gar indiſcher Abſtammung geweſen iſt.

XIV. NYCTERIS. Hohlnase.

Auriculae magnae conjunctae; metopium longitudinaliter excavatum, naribus terminatum, foliolis duobus planiusculis instructum; cauda patagio longo innata, apice bifurca.

Hauptsächlich Afrika zuständig, nur mit einer Art in Südasien vertreten. Der Schnautzenrücken ist bis zur Stirne von einer Längsfurche ausgehöhlt, an deren vorderem Ende die Nasenlöcher sich befinden; über ihnen steht jederseits ein kleines bewegliches, rundliches, flaches Blättchen. Die Ohren sind groß und über der Stirne durch ein kleines Band vereinigt; die Klappe ist kurz und breit. Die Unterlippe ist in der Mitte gespalten und oben mit einer Warze versehen; von N. hispida wird indeß die Unterlippe als einfach bezeichnet. Schenkelflughaut sehr groß und ganz den langen Schwanz einhüllend, dessen letztes Glied sich wie ein T spaltet, was nebst den Sporen zur Unterstützung dieser Flughaut dient. Schädel mit tiefer napfförmiger Grube am Anfange des Schnautzentheiles. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$:$\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{4}{4}$:$\frac{4}{4}$ oder $\frac{5}{5}$:$\frac{5}{5}$. Die Schneidezähne sind sehr klein; die obern zweizackig (nur bei N. villosa dreizackig), die untern dreizackig, bisweilen die hintern blos zweilappig.

1. N. thebaica Geoffr., die ägyptische Hohlnase; **supra dilute brunnea, subtus albida aut cinerascens.**

Nycteris thebaica. Geoffr. descript. de l'Egypt. II. p. 119. tab. 1. fig. 2; ann. d. mus. XX. p. 20. tab. 1. (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 438.

α) **subtus pulchre alba. — Aegyptiacae.**

Nycteris albiventer. Wagn. a. a. O. S. 439.

β) **subtus brunneo-cana. — Senegalenses.**

N. Geoffroyi. Desm. mamm. p. 127. (größtentheils).

Von Aegypten bis zum Senegal. Körper (in gerader Linie) 1″ 10‴, Ohren 1″, Schwanz 1″ 8‴. Alle ägyptische Exemplare, die ich gesehen, sind oben licht röthlichbraun, unten rein weiß; die Haare der Oberseite sind nur an der Spitze braun, in der übrigen Länge graulichweiß, die der Unterseite fast der ganzen Länge nach weiß, blos am Grunde etwas graulich. Ein Exemplar vom Senegal bezeichnet Desmarest als dunkler als die ägyptischen, nämlich: brun en dessus, et gris-brun clair en dessous.

2. N. discolor Wagn., die zweifarbige Hohlnase; fusca, subtus sordide albida; pilis omnibus basi nigro-schistaceis; auriculis amplissimis.

Nycteris discolor. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 440.

Durch Ecklon vom Kap zurückgebracht. Körper (in gerader Linie) 2" 2‴, Ohren 1" 1½‴, Schwanz 1" 10‴. Die Ohren sind sehr groß, der letzte Schwanzwirbel vor der Spaltung ist einer der kleinsten. Die Oberseite ist rußig nelkenbraun, die Unterseite schmutzig weiß; alle Haare sind in ihrer Wurzelhälfte schieferschwarz. Die Ohrwurzel ist hinten und an den Seiten weiß behaart. Die Wangen sind bräunlich, an der Einlenkung der Flügel findet sich unten ein dunkler Fleck; die Flügel sind licht rostbraun.

* N. capensis Smith., „cervice et dorso nigro-fuscis, colli lateribus sordide albis, partibus inferioribus subcinereis, membranis rubro-fuscis; apice tragi semicirculari cum crista villi albescentis.“ Smith.

Nycteris capensis. Smith zool. journ. IV. p. 434. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 440.

Im Innern von Südafrika und an der Ostküste. A. Smith fügt noch bei, daß das Schwanzende nur schwach gabelig und der letzte Wirbel kurz ist. Länge über 2", Ohren ¾". Wegen der dunklern Färbung und weil von der Zweifarbigkeit der Haare nichts gesagt wird, läßt sich diese N. capensis nicht mit N. discolor identificiren.

3. N. affinis Smith., die verwandte Hohlnase; „cervice et dorso rubro-fulvis, colli lateribus rubro-albis, a tergo aurium subrufa, partibus inferioribus fulvo-albis, membranis nigro-fuscis, dentibus primoribus maxillae in paria dispositis.“ Smith.

Nycteris affinis. Smith zool. journ. IV. p. 434. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 434.

Vom Kap. Körper 2", Ohren länger und breiter als bei N. capensis; Schwanz stark gegabelt, letzter Wirbel einer der längsten. — Es ist diese Charakteristik nicht ausreichend zur sicheren Feststellung dieser Art.

4. N. fuliginosa Pet., die rußfarbige Hohlnase; fuliginosa, subtus ex griseo fuscescens, alis nigris, pilis cervicis laterumque colli ad basin nigro-schistaceis; auriculis dimidio capite longioribus.

Nycteris fuliginosa. Peters Mossamb. I. S. 46. tab. 10.

Eine Entdeckung von Peters, die er in einem Hause von Boror in Mossambique machte. Körper 2″ 4‴, Schwanz 2″, Vorderarm 1″ 8‴, Ohren 1″ 2½‴. Die Ohren sind außerordentlich lang, die Klappe ist durch einen hintern Einschnitt in zwei Lappen getheilt, die Unterlippe ist ausgefurcht, die Behaarung reichlich. Schädel und Gebiß zeigen dieselbe Form wie bei N. thebaica. Peters konnte weder bei dieser Art, noch bei N. villosa, thebaica und javanica Backentaschen, wie sie Geoffroy angegeben, auffinden; eben so wenig konnte er sich von der Fähigkeit dieser Thiere, durch Einpumpen von Luft zwischen Haut und Fleisch sich ballonförmig aufzutreiben, überzeugen. Die Farbe des Rückens ist rußbraun, die Bauchseite grau mit einem bräunlichen Scheine. Die Haare des Nackens und der Halsseiten sind am Grunde weiß, die übrigen schwarzgrau schieferfarbig. Flügel und Ohren erscheinen blauschwarz. — Von N. discolor unterscheidet Peters diese neue Art, daß bei jener Ohren und Klappen verhältnißmäßig breiter und die Farbe des Körpers und der Flughäute viel heller braun ist.

5. N. villosa Pet., die zottige Hohlnase; caryophyllino-fusca, subtus ex brunneo albido-cana; auriculis longitudine capitis, disjunctis; dentibus primoribus superioribus trifidis.

Nycteris villosa. Peters Mossamb. I. S. 48. tab. 11.

Ganze Länge nach der Krümmung bis zur Schwanzspitze 3″ 6‴, Schwanz 1″ 7½‴, Vorderarm 1″ 5‴, Ohren 8‴. Ebenfalls von Peters in Mossambique entdeckt und zwar in Inhambane. Die Ohren sind verhältnißmäßig kürzer als bei den andern Arten, und nicht, wie bei diesen, durch eine Hautfalte miteinander verbunden, sondern getrennt. Die obern Schneidezähne sind dreizackig, was von keiner andern Art bekannt ist. Die lange Behaarung des Rückens setzt sich viel weiter als bei andern Species über die Flughäute fort, so daß die Flügel bis zwischen den ersten 2 Fünfteln des Vorderarms und Unterschenkels, und die Schenkelflughaut bis über die Hälfte wollig erscheint. Die Farbe der Oberseite ist rußig nelkenbraun, und die Haare sind hier in der Mitte weißlich, am Grunde schwarzbraun gefärbt. Die Bauchseite ist bräunlich weißgrau, die Basis der Haare ebenfalls schwarzbraun. Die Ohren sind

an ihrer äußern Fläche bis zur Hälfte mit einer weißlichen Wolle bekleidet. Der Haaranflug der Bauchſeite der Flügel iſt weißlich; die Flughäute und Ohren ſind dunkelbraun, die Nägel weiß.

6. Nycteris hispida Schreb., die angelaufene Hohlnaſe; supra e rufescente fusca, subtus albida, flavido-induta; labio inferiori simplici.

Nycteris Daubentonii. Geoffr. Egypt. II. p. 122. — Vespertilio hispidus. Schreb. I. S. 169. tab. 46. — Nycteris hispida. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 441. — Campagnol volant Daubent. Buff. X. p. 88. tab. 20. fig. 42.

Beruht auf einem durch Adanſon vom Senegal mitgebrachten und durch Daubenton beſchriebenen Exemplare. Körper in gerader Linie 1″ 5‴, Schwanz 1″ 2‴, Kopf 5‴, Ohren 9‴, Flugweite 7″ 4‴. Farbe oben röthlichbraun, unten und vorn am Kopfe weißlich mit falbem Anfluge. Unterlippe einfach. Durch letzteres Merkmal würde ſich dieſe Art von den übrigen unterſcheiden [1].

7. N. javanica Geoffr., die rothe Hohlnaſe; supra laete rufa, subtus e rufescente cinerea.

Nycteris javanica. Geoffr. Egypt. II. p. 123; ann. d. mus. XX. p. 20. tab. 1. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 441. — S. Müller verhandel. I. p. 25. — Petalia javanica. Gray list of Brit. mus. p. 24.

Java. Körper 2″ 6‴. Pelz oben lebhaft roth, unten röthlichgrau.

---

1) Zu den afrikaniſchen Arten von Nycteris gehört auch Fraſer's Rhinolophus Martini (ann. of nat. hist. XIII. p. 73.) Daß dieſe Art kein Rhinolophus, ſondern eine Nycteris iſt, beweiſen folgende Angaben: Schnautzenrücken durch eine Längsfurche ausgehöhlt, vorn mit den Naſenlöchern und ihrer Bedeckung durch ein Blättchen; ferner das Vorkommen eines Tragus und die gabelige Spaltung des letzten Schwanzgliedes. Dieſe Merkmale genügen zur Feſtſtellung der Gattung Nycteris. Weiter wird geſagt, daß die Ohren groß und auf der Stirne ſich bis zu einem Abſtand von 2½‴ genähert ſind, und daß die Färbung im Spiritus graubraun iſt, mit einem aſchfarbigen Tone auf der Unterſeite und dunkler als bei Rh. Hipposideros. Heimath: Fernando Po. Ganze Länge 3″ 5‴, Schwanz 1″ 7‴, Ohr 9‴, Vorderarm 1″ 6‴, Flugweite 10‴. — Nach dieſen Angaben wage ich nicht dieſe Art näher beſtimmen zu wollen.

XV. NYCTOPHILUS. Haftflieger.

Auriculae magnae connatae, nasus foliolis duobus erectis praeditus; cauda ad finem patagii producta, simpliciter finita.

Heimath Neuholland. Die Ohren sind sehr groß, am Ende abgerundet und auf der Stirne durch ein breites Band verbunden; die Klappe ist halb so lang als das Ohr, breit an der Basis und in ein abgerundetes Blatt geendigt. Die Schnautze ist zugespitzt. Auf der Nase finden sich 2 kleine Querblätter: das hintere ist am höchsten und in der Mitte eingeschnürt, das andere rudimentäre verläuft in paralleler Linie mit den Oeffnungen der Nasenlöcher. Der Schwanz ist so lang als die lange Schenkelflughaut und einfach geendigt. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{4}{4}$. Die obern Vorderzähne sind lang und conisch, die untern breit und breilappig; die untern Eckzähne haben hinten eine kleine Spitze; an den untern Backenzähnen sind die Höcker mehr conisch als an den obern. Die Haftflieger bilden eine Mittelgattung zwischen Rhinolophus und Nycteris, doch letzterer viel näher stehend.

1. N. Geoffroyi Leach, der großohrige Haftflieger; fuscus, subtus cinereo- albidus.

Nyctophilus Geoffroyi. Leach Linn. transact. XIII. p. 78. — Temm. monogr. II. p. 47. tab. 34. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 442. — Gray list of Brit. mus. p. 25. — Gould mamm. of Austral. part 5.

Körper 1″ 6‴, Vorderarm 1″ 2‴, Schwanz eben so viel. Die Haare sind zweifarbig: oben an der Wurzel schwarz und an der Spitze dunkelbraun, unten an der Wurzel schwärzlich und an der Spitze weißlichgrau. Südaustralien und Vandiemensland.

d) Rhinolophina. Kammnasen.

Auriculae magnae sejunctae, trago privatae.

XVI. RHINOLOPHUS. Kammnase.

Auriculae magnae, acuminatae, plus minus emarginatae; nasus appendice triplici instructus, prosthemate erecto; cauda elongata patagio innata.

Die Ohren sind getrennt und seitlich gestellt, unter der Mitte des Außenrandes mehr oder minder ausgeschnitten; wo der Ausschnitt stark

iſt, dient der untere Lappen, ſtatt der immer fehlenden Klappe, zum Verſchließen des Ohres. Der Naſenbeſatz iſt dreifach: 1) das Hufeiſen, welches die Naſenlöcher enthält, 2) dahinter ein Blatt, das ſich als Querblatt, Längskamm oder Sattel (sella) aufrichtet, 3) das innere aufrecht ſtehende und verſchieden geſtaltete Naſenblatt (prosthema). Der Schwanz iſt bis zum Ende der durch Sporen unterſtützten Schenkelflughaut oder noch etwas über dieſe hinausreichend. Schneidezähne $\frac{2}{2}$ oder $\frac{1}{1}$, Eckzähne $\frac{1}{1}$:$\frac{1}{1}$, Backenzähne jederſeits $\frac{3}{3}$, $\frac{3}{3}$, $\frac{3}{3}$. Die obern Schneidezähne ſind ſehr klein und leicht ausfallend, die untern zwei- oder dreizackig. Der Zwiſchenkiefer bildet eine zungenförmige, nur am hintern Ende angewachſene Lamelle und geht beim Präpariren leicht verloren. Die Kammnaſen bewohnen nur die öſtliche Halbkugel.

1. Subgen. Phyllorrhina Bonap. (Hipposideros Gray).

Prosthema simplex transversale taeniiforme; auriculae vix aut parum emarginatae; digiti podariorum omnes didactyli.

Peters hat darauf aufmerkſam gemacht, daß bei dieſer Untergattung ſämmtliche Zehen der Hinterfüße blos aus zwei Phalangen beſtehen. Ein weiterer Unterſchied von der folgenden Untergattung (Rhinolophus im engeren Sinne) liegt, wie ebenfalls Peters zuerſt zeigte, in dem Umſtande, daß während bei letztgenannter Abtheilung der letzte Backenzahn des Unterkiefers ſo vollkommen wie der vorhergehende und am obern hinterſten Backenzahn nur das letzte Viertel nicht entwickelt iſt, dagegen bei Phyllorrhina dem letzten Backenzahn des Unterkiefers ein Viertel des vorhergehenden Zahnes und dem obern letzten Backenzahn mehr als die Hälfte fehlt. Endlich iſt bei Phyllorrhina das Mittelhandglied des dritten Fingers länger als das des fünften, während bei Rhinolophus das umgekehrte Verhältniß ſtattfindet.

†) species africanae.

1. Rh. Gigas Wagn., die rieſige Kammnaſe; **maximus, supra fuliginosus; capite, gastraeo lateribusque dorsi albidis; regione scapulari subtus fascia fusca ornata.**

Rhinolophus Gigas. Wagn. Wiegm. Archiv 1845. 1. S. 148.; 1848. 1. S. 180. — Phyllorrhina vittata. Temm. esq. sur la côte de Guiné. 1853. p. 72.

Nach einem männlichen Exemplare, das der hiesigen Sammlung durch den Naturalienhändler Brandt zugekommen war, mit der Angabe, daß dasselbe von Dreguela in Nieder-Guinea abstamme, habe ich diese Art, die größte unter allen bis dahin bekannten, aufgestellt.

Die Schnauze ist stumpf. Das Hufeisen ist groß, hinten durch einen aufgesetzten queren Wulst begrenzt, hinter welchem ein eben so breites, halbovales Blatt sich aufrichtet; an jeder Seite des Hufeisens zeigen sich 3 häutige Querfalten. Hinter dem Nasenbesatz findet sich die gewöhnliche Stirngrube. Die Ohren sind hoch, schmal länglichoval, zugespitzt, nackt, im untern Theil an den Seiten mit Wolle beflogen. Die Flügel sind außerordentlich lang und erreichen das Fersengelenk nicht ganz aber doch nur mit einem schwachen Saume, dabei sind sie nackt, oben längs des Körpers und der Schultern nur wenig, unten etwas mehr behaart. Der Schwanz ist kurz und ragt über die schmale Schenkelflughaut hinaus.

Die Farbe der Oberseite ist trüb rußbraun, längs der Seitentheile und auf dem Kopfe schmutzig graugelblichweiß. Die ganze Unterseite ist gelblichweiß, längs der Mitte des Hinterleibs mit trübem Schimmer. Von der dunkelbraunen Schultergegend zieht sich ein ähnlich gefärbter Streif auf deren weiße Unterseite herab. Die rußbraunen Haare der Oberseite sind in ihrer untern Hälfte schmutzig weißlich. Die weißen Haare der Unterseite sind an den Seitentheilen und am Halse fast einfarbig, längs der Mitte des Hinterleibs aber mit dunklem Grundtheil [1]). Am Ende des Vorderhalses findet sich ein Haarwirbel. Der Nasenbesatz, zumal aber die Ohren sind dunkel, der Grund der Innenseite scheint bei letzteren fleischroth gewesen zu seyn; in der untern Hälfte sind sie an den Seitentheilen mit grauweißlicher Wolle beflogen. Flügel und Gliedmassen sind oben rußbraun; unten sind erstere ebenso, aber die Oberarme und hintere Hälfte der Vorderarme zeigen Spuren von rother Färbung, die

1) Nachdem das hier beschriebene Exemplar seit 10 Jahren in der Sammlung steht, ist die Färbung viel lichter geworden, so daß jetzt die sonst rußbraune Farbe größtentheils lichtfalbbraun ist.

auch, jedoch weit trüber, an den Schenkeln und der obern Hälfte der Schienen ſichtlich iſt.

Das Gebiß beſteht aus $\frac{2}{2}$ Schneidezähnen, $\frac{1}{1}$ Eckzähnen und $\frac{4}{4}$ Backenzähnen. Die obern Schneidezähne ſind ſehr klein, die untern etwas größer und dreilappig, das äußere Paar zurückgeſtellt. Die Eckzähne ſind außerordentlich ſtark; die obern auf der Innenſeite platt mit vorſpringendem Längskiele in der Mitte, auf der Vorderſeite mit tiefer Hohlkehle, auf der Außenſeite gewölbt, hinten ſchneidend. An Wirbeln ſind vorhanden: 7 Halswirbel, 11 Rückenwirbel, 7 Lendenwirbel, 3 oder 4 Kreuzwirbel und 2 + . . . Schwanzwirbel.

Zu derſelben Art gehörig halte ich die beiden Exemplare, welche Temminck vom Fort Elmina in Oberguinea bekam, und die er hinſichtlich ihrer vollkommenen Uebereinſtimmung in den äußern Formen mit Phyllorrhina vittata Pet. von Moſſambique dieſer Art zuwies, obwohl er ſelbſt bemerklich machte, daß er bezüglich ihrer Uebereinſtimmung in der Färbung nicht in gleichem Grade ſicher ſey.

Nach Temminck's Beſchreibung iſt der Scheitel und das Geſicht umbragrau (gris-terre-d'ombre); im Nacken ſind die Haare am Grunde braun mit gelblichbraunen Spitzen. Die Schultern nebſt der Mitte des Rückens und des Kreuzes ſind einförmig braun, was vom Oberarm bis zum Oberſchenkel jederſeits von einer breiten gelblichgrauen Binde eingefaßt wird. Auf der Unterſeite iſt der Pelz grau und nimmt längs der Seiten eine weißliche Färbung an. Die Schultern ſind weiß und mit einer breiten, lebhaft braunen Längsbinde bezeichnet. Die Häute ſind ſämmtlich ſchwärzlichbraun. Die äußern Formen kommen, wie ſich aus Temminck's Beſchreibung abnehmen läßt, ganz mit denen des Rh. gigas überein; wenn er jederſeits neben dem Hufeiſen nur 2 Querblättchen angiebt, ſo iſt wahrſcheinlich blos das unterſte, als das kleinſte, überſehen worden. Die Abweichungen in der Färbung dieſes Männchens von dem durch mich beſchriebenen ſind ſo geringfügig, daß ich keinen Zweifel hege, daß beide einer und derſelben Art angehören.

Sehr abweichend iſt dagegen, nach Temminck's Beſchreibung, die Färbung des Weibchens, was aber auch bei vielen andern Arten der Kammnaſen der Fall iſt. Die Oberſeite iſt lebhaft roth, die Binde,

welche sich vom Oberarm zum Oberschenkel erstreckt, ist etwas lichter, Kopf und Wangen sind sehr hell roth, Gurgel und Brust etwas dunkler roth, die Schultergegegend ist licht mit dunkelbrauner Längsbinde, der übrige Theil der Unterseite ist rostroth.

Mit den Längenmaaßen des Rh. gigas stelle ich die von Phyllorrhina vittata Temminck's und Peters zusammen.

	Rh. gigas	Ph. vittata Temm.	Ph. vittata Pet.
Körper	4″ 11‴	5″ 0‴	4″ 6‴
Ohren	1 0	8 0	0 11½
Schwanz	1 1	1 0	1 1
Vorderarm	4 1	3 10	3 11
Flugweite	28 0	23 0	23 0
Knöcherner Schädel	1 5		1 4

Der Rh. gigas ist nach den vorstehenden Angaben in Ober- wie in Niederguinea verbreitet.

2. Rh. vittatus Pet., die gebänderte Kammnase; supra cervino-fuscus, vittis dorsalibus 4 albidis; gastraeo canescente; femina supra castanea.

Phyllorrhina vittata. Peters Mossamb. S. 23. tab. 6. Thier, tab. 13. fig. 7 — 13 (Schädel und Fuß.)

Von dieser Art erhielt Peters auf Ibo, einer der Querimba-Inseln (Mossambique), zwei Exemplare beiderlei Geschlechtes, die in Größe, äußern Formen, Schädel- und Zahnbau so vollkommen mit Rh. gigas übereinkommen, daß ich in diesen Beziehungen nur darin eine leichte Differenz wahrnehmen kann, daß bei Rh. vittatus die Ohren breiter erscheinen und neben dem Hufeisen jederseits 4 Querblättchen sich finden. Die Färbung giebt Peters in folgender Weise an. Der Rücken ist rehbraun, bei dem Weibchen ins Kastenbraune spielend, mit 4 gelblichweißen Längsbinden, von denen 2 längs des Ansatzes der Seitenflügel und 2 etwas verwischte vom Nacken herabsteigend neben der Wirbelsäule verlaufen. Oberkopf und Nacken sind mit Weiß besprengt. Die Bauchseite ist graulichweiß, an den Seiten mit einem gelblichweißen Saume, der sich über den Ansatz der Halsflughaut nach dem Rücken herumschlägt. Das Gesicht

ist schmutzig weiß. Nasenbesatz und Ohren sind braun, die Flügel dunkelbraun, die Nägel braunschwarz. Die braunen Rückenhaare sind zum Theil einfarbig, zum Theil weiß beringt, die des Oberkopfes und Nackens zum Theil mit weißen Spitzen versehen. Die Haare des Bauches sind am Grunde braun, im Enddrittel schmutzig weiß; die weißen Haare zur Seite der Brust sind einfarbig. Die Maaße sind schon bei voriger Art angegeben.

3. Rh. cyclops Temm., die wollige Kammnase; lanuginosus, crispus; pilis fuscis apice flavidis.

Phyllorrhina cyclops. Temm. esq. zool. sur la côte de Guinè p. 75.

Am Flusse Boutry an der Küste von Guinea. Körper 3″, Schwanz 6‴, Vorderarm 1″ 6‴, Ohren 1″, Flugweite 12″ 9‴. Diese Art unterscheidet sich von den verwandten durch ihren wolligen und allenthalben krausen Pelz, der auch den Vorderarm zur Hälfte bedeckt. Die Ohren sind lang und spitz. Beim Männchen ist die Stirngrube groß; beim Weibchen zeigt sich blos ein einfaches Loch, das in keinen Sack übergeht. Die Schenkelflughaut ist halbkreisförmig ausgeschnitten und der kurze Schwanz ist nur an seiner Spitze frei. Das quere Blatt des Nasenbesatzes erhebt sich in zwei Lappen, die durch einen Einschnitt, von welchem ein kleines, sehr schmales Blatt ausgeht, getrennt sind. Die Haare der Oberseite sind schwärzlichbraun mit gelblichen Spitzen, die der Unterseite sind bisterbraun, ebenfalls mit gelblichen Spitzen. Zwischen den Geschlechtern ist in der Färbung kein Unterschied.

4. Rh. fuliginosus Temm., die kurzblätterige Kammnase; ferrugineo-rufus; prosthemate parum evoluto.

Phyllorrhina fuliginosa. Temm. esq. zool. sur la côte de Guinè p. 77.

Temminck erhielt nur ein einziges weibliches Exemplar von der Küste von Guinea. Körper 2″ 1‴, Schwanz 1″ 3‴, Vorderarm 2″, Flugweite 11″ 6‴. Unter allen Arten ist bei dieser der Nasenbesatz am mindesten entwickelt, indem man nur ein wenig ansehnliches Querblatt sieht, von dem sich ein kleines, gegen die Schnauze etwas breiteres Hufeisen ablöst und welches von zwei kleinen, kaum sichtlichen Falten begle-

tet wird. Die Ohren sind lang und breit, an der hintern Basis und am innern Vorderrande mit Haaren besetzt. Die Schenkelflughaut ist groß und der Schwanz von ihr ganz eingeschlossen. Die Oberseite ist lebhaft rostroth, aber an der Basis sind alle Haare goldroth; Kopf, Vorderhals, die ganze Unterseite und die Binde längs der Seiten sind lebhaft goldroth. Die Flughäute sind nackt und schwarz.

5. Rh. gracilis Pet., die schlanke Kammnase; rutilo-brunneus, subtus rutilo-albidus; alis umbrinis supra tarsum terminatis, prosthemate simplici, margine reflexo.

Phyllorrhina gracilis. Peters Mossamb. I. S. 36. tab. 7. (Thier), 13 fig. 14, 15. (Schädel und Gebiß.)

Peters fand von dieser Art im Innern von Mossambique bei Tette ein männliches Exemplar. Körper 2" 2‴, Schwanz 1" 2‴, Vorderarm 1" 8½‴, Ohr 6‴. Körper und Gliedmassen sind schlank und zart. Das Hufeisen ist schmal und zu beiden Seiten von zwei feinen Nebenfalten umgeben; das Nasenblatt ist einfach, am Rande nackt und nach oben umgeschlagen. Die Ohren sind groß und breit, außen bis auf das letzte Viertel behaart und haben einen deutlichen Lappen. Hinter dem Nasenblatt liegt zu beiden Seiten eine drüsige Hervorragung und nach der Mitte zu eine quere Oeffnung. Die kleinen Endglieder des dritten und vierten Fingers theilen sich wie bei Rh. caffer in zwei Aeste. Die Flügel enden etwas oberhalb der Fußwurzel; der Schwanz ragt mit einem kurzen Ende aus der Schenkelflughaut hervor. Die Behaarung ist fein und lang, und läßt den größten Theil des Oberarms und Schenkels frei. Die Oberseite ist hell röthlich nelkenbraun, die Unterseite röthlichweiß, an der Brust mit stärkerem röthlichbraunen Anfluge. Die röthlichbraunen Haare des Rückens sind im größten mittleren Theile weiß; die des Bauches sind am Grunde braun, an der Spitze weißlich. Die Flughäute sind hell umbrabraun; die Nägel schmutzig weiß.

6. Rh. caffer Sund., die kaffersche Kammnase; praecedenti simillimus, at obscurius coloratus, auriculis paululum brevioribus, alis ad tarsum porrectis.

Rhinolophus caffer. Sundev. öfvers. af K. Vetenskaps-Acad. förhandl. 1846. p. 118. — Phyllorrhina caffra. Peters Mossamb. I. S. 39. tab. 8. — Temm. esq. zool. sur la côte de Guinè p. 78.

Wahlenberg entdeckte dieſe Art um Port Natal, wo ſie ſehr häufig iſt. Peters erhielt von Ibo, einer der Querimba-Inſeln an der Südoſtküſte Afrikas, ein Weibchen, das er durch Vergleichung mit Wahlenbergiſchen Exemplaren für identiſch mit dieſen erkannte. Bei Zuſammenhaltung mit letzteren fand auch Temminck ein Exemplar von Congo und zahlreiche von Oberguinea in vollkommener Uebereinſtimmung mit jenen. Die Maaße giebt er folgendermaſſen an: Körper 1″ 8‴, Schwanz 1″, Vorderarm 1″ 7‴. Im Schädelbaue, Gebiß und allgemeinen Habitus kommt dieſe Art mit Rh. gracilis überein, aber die Ohren ſind verhältnißmäßig etwas kürzer, der Naſenbeſatz mehr behaart und der zurückgeſchlagene Rand des Naſenblattes breiter und die Flügel reichen bis zur Fußwurzel herab. Die Farbe des Rückens iſt etwas dunkler und weniger röthlich; die Haare in der Mitte aber ebenfalls weißlich. Die Bauchhaare ſind am Grunde dunkelbraun, an der Spitze grau [1]).

7. Rh. tridens Geoffr., die dreizackige Kammnaſe; flavido-brunneus, subtus albus; prosthemate tridentato; inguine femoribusque nudis.

Rhinolophus tridens. Geoffr. Egypt. II. p. 130. tab. 2. fig. 1. tab. 4. fig. 2.; ann. d. mus. XX. p. 260, 265 tab. 5. — Temm. monogr. II. p. 19. tab. 27. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 423.

Aegypten und Nubien. Körper 2″, Schwanz 9‴, Vorderarm 1″ 8¼‴.

††) species indicae et australienses.

8. Rh. nobilis Horsf., die Edel-Kammnaſe; dorso medio castaneus, lateribus albus, gastraeo medio brunneo-griseus; prosthemate simplici coroniformi; auriculis basi latissimis, lobulo distincto carentibus.

Rhinolophus nobilis. Horsf., zool. research. 6. u. 7. mit Abbild.; catal. p. 34. — Temm. monogr. II. p. 10. tab. 28 (Thier), 29. fig. 1 (Kopf), 32 fig. 1—3. (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 418. — S. Müller verhandel. I. p. 33. — Cantor, Journ. of the Asiat. soc. XV. p. 182. — Waterh. ann. of nat. hist. XIII. p. 303.

---

1) Temminck bezeichnet die Färbung nicht ganz genau, indem er von den Haaren der Oberſeite ſagt, daß ſie an der Baſis weiß und in der andern Hälfte kaſtanienbraun ſind. Die Stirngrube fand er bei Weibchen nicht, dagegen giebt ſie Peters von ſeinem weiblichen Exemplare an.

Java, Sumatra, Amboina, Timor, malayiſche Halbinſel und Philippinen. Länge 5″ 2‴, wovon der Schwanz 1″ 6‴ einnimmt; Vorderarm 3″, Flugweite 19″. Backenzähne $\frac{5}{5}$. Die Ohren ſind anſehnlich, an der Wurzel faſt ſo breit als hoch, und zugeſpitzt. Das Naſenblatt iſt einfach ungezackt; hinter ihm 4 ganz kleine Löcher (Cantor ſagt nur, daß die Stirngrube weniger als bei Rh. Diadema entwickelt iſt). Die Mitte des Rückens iſt ſchön rothbraun; die Seiten deſſelben und die Bruſt rein weiß, die Mitte des Unterleibs graubraun, der Kopf licht roſtgelblich.

* Rh. armiger Hodgs., die gewappnete Kammnaſe; unicolor pallide brunneus, supra pilis apice saturate fuscis; axilla, hypochondriis scapulaque albidis.

Rhinolophus armiger. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. IV. p. 699, X. p. 908. — Blyth ann. of nat. hist. XV. p. 470; journ. XXI. p. 346. — Gray catal. Hodgs. p. 3. — Hipposideros lankadiva. Kelaart, journ. of the Asiat. soc. XX. p. 183.

Mittlere Gegenden von Nepal und auf Ceylon. Vorderarm 3⅝″ engliſch. Gray betrachtet dieſe Kammnaſe als eigene Art; Blyth erklärt ſie entſchieden für identiſch mit Rh. nobilis.

9. Rh. Diadema Geoffr., die Diademnaſe; ruso-brunneus, subtus griseo-brunneus; prosthemate simplici coroniformi; auriculis longioribus quam latioribus, lobulo distincto praeditis.

Rhinolophus Diadema. Geoffr. ann. d. mus. XX. p. 263. tab. 5, 6. — Temm. monogr. II. p. 12. tab. 26. (fig. Geoffr.), tab. 27 (Kopf), 32 fig. 4 bis 6 (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 419. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 181. — Horsf. catal. p. 34.

Timor und malayiſche Halbinſel. Körper 3″, Schwanz 2″, Vorderarm 2″ 10‴, Backenzähne $\frac{5}{5}$. Die Ohren ſind groß, an der Wurzel mit ſtarkem Lappen verſehen; die Stirngrube der Männchen iſt groß. Der Kopf iſt braungrau, die obern Theile goldig rothbraun, die untern gelblichbraun, aber die Haarwurzeln ſämmtlich am Grunde weißlich.

10. Rh. insignis Horsf., die markirte Kammnaſe; castaneus, subtus brunneo-canus, capite et cervice albo fuscoque undulatis; prosthemate simplici latiori quam altiori; auriculis latis, lobulo distincto carentibus.

Rhinolophus insignis. Horsf. zool. research. n. 6; catal. p. 36. — Temm. monogr. II. p. 14. tab. 29. fig. 2 (Kopf), 32 fig. 7, 8 (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 420. — Rh. vulgaris. Horsf. l. c. — Cantor, journ. of the Asiat. soc. XV. p. 183. — Blyth ann. of nat. hist. XV. p. 470. — Rh. deformis. Horsf. l. c.

Java, Pinang, Arracan. Länge 4″, wovon auf den Schwanz 1″ 1‴ kommt, Vorderarm 2″ 1‴. Die Ohren ſind breit, unter der Spitze ausgeſchnitten, jedoch ohne Lappen, das Naſenblatt mit abgerundetem Rande. Das Männchen hat eine große Grube an der Stirne und daneben jederſeits ein kleines Loch. Der Pelz iſt oben zweifarbig. Kopf und Hinterhals ſind weiß mit kurzen kaſtanienbraunen Haarſpitzen, wodurch dieſe Theile weiß und braun gewellt erſcheinen. Der Rücken iſt rein kaſtanienfarben, indem nur die Haarwurzeln weißlich ſind. Die Unterſeite iſt hell braungrau, an den Bruſtſeiten dunkler braun. Das Weibchen hat einen mehr röthlichen Ton. Temminck erklärt Horsfield's Rh. insignis, vulgaris und deformis für einerlei Art.

11. Rh. speoris Schneid., die weißbäuchige Kammnaſe; supra fuscus, pilis basi albis, subtus unicolor albus; prosthemate simplici.

Rhinolophus speoris. Schneider in Schreb. Säugth. I. tab. 59 B. — Temm. monogr. II. p. 17. tab. 27 (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 420. — Rh. cruménifère. Peron voy. aux terr. austral. tab. 35. — Rh. marsupialis. Geoffr. cours publics de 1805.

Amboina, Timor. Kleiner als vorige Art. Körper 2″ 5‴, Schwanz 1″, Vorderarm 1″ 8‴, Flugweite 10 — 12″. Naſenapparat, Zähne und Schädelform ſind ganz wie bei Rh. insignis, das Männchen hat jedoch nur die Stirngrube ohne die ſeitlichen Löcher. Der Pelz iſt oben zweifarbig: halb weiß und halb braun beim Männchen, röthlichbraun beim Weibchen; unten durchgängig rein weiß, nur an der Flügeleinlenkung und den Seiten röthlich.

12. Rh. dukhunensis Sykes., die dekan'ſche Kammnaſe; „supra murinus, infra albido-brunneus, auribus capite longioribus, antibrachio corpus longitudine aequante.“ Sykes.

Rh. dukhunensis. Sykes proceed. I. 1830. p. 99. — Temm. monogr. II p. 23. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 424. — Rh. speoris. Blyth. ann. of

ast. hist. XV. p. 464, 471; XXI. p. 347. — Rh. apiculatus und Rh. penicillatus. Gray. mag. of zool. and bot. n. 12.

Südliches Vorderindien und Ceylon. Flugweite nach Sykes 10″, Vorderarm nach Blyth 2″. Blyth will im Rh. dukhunensis den wahren Vesp. speoris Schneid. erkennen und ihn unterscheiden von Peron's Rh. crumenifère. Seine Färbung bezeichnet er fast so als die des Rh. armiger. Gray's Rh. apiculatus erklärt er für das Männchen, dessen Rh. penicillatus für das Weibchen dieses Rh. dukhunensis. Auch Cantor betrachtet wenigstens den Rh. apiculatus für identisch mit Vesp. speoris Schneid. — Nach einer neueren Mittheilung von Blyth ist zwar die gewöhnliche Färbung braun oder schieferfarbig ohne falben Anflug, aber manche Individuen sind mehr oder minder dunkel falbbraun, andere selbst sehr hell rostroth oder goldigfalb.

13. Rh. galeritus Cant., die gehäubte Kammnase; supra saturate fuscus, subtus pallidior, pilis bicoloribus; auriculis latioribus quam longioribus, pyriformibus, basi postico lobuloque basali villosis; ♂ siphone nullo.

Rhinolophus galeritus. Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 183.

Pinang auf der malayischen Halbinsel. Körper 2″, Schwanz 1″. Backenzähne $\frac{4}{5}$. Wie Cantor diese von ihm aufgestellte Art beschreibt, finden sich neben dem Hufeisen jederseits zwei Blättchen, das Nasenblatt ist concav und reicht bis an die Ohren. Letztere sind breiter als lang, birnförmig und schmäler gegen die Spitze, die kaum über den Pelz vorragt; mehr als $\frac{2}{3}$ des Ohrrückens ist mit Haaren bedeckt, welche eine schmale nackte Linie längs des Außenrandes lassen. Die Haare sind gelblich (buff) oder weißlich am Grunde, in der andern Hälfte ihrer Länge braun. Die Oberseite ist dunkelbraun, mit schwachem röthlichem Anfluge; die Unterseite von lichterem Tone. Wie Cantor zufügt, gleicht diese Art etwas Gray's Rh. apiculatus (Vesp. speoris Schneid.), unterscheidet sich aber durch den Mangel der Stirngrube (?), die Form der Ohren und die Färbung.

14. Rh. griseus Meyen., die graue Kammnase; villosus, cinereus.

Rhinolophus griseus. Meyen nov. act. Bonn. XVI. 2. p. 606. tab. 46. fig. 4. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 421.

Inſel Lucon. Länge vom Hinterhaupt zur Schwanzſpitze 4″ 8‴, Flugweite 16″. Körper ſtark behaart, Ohren ſehr groß, Farbe ganz aſchgrau.

15. Rh. larvatus Horsf., die maskirte Kammnaſe; supra ex fusco fulvescens, postice saturatior, subtus fulvus nitore canescente; auriculis magnis, basi latissimis simplicibus,

Rhinolophus larvatus. Horsf. zool. research. n. 6. mit Abbild.; catal. p. 35. — Temm. monogr. II. p. 22. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 422. — Blyth ann. of nat. hist. XV. p. 470.

Auf Java nach Horsfield, von den holländiſchen Naturforſchern daſelbſt aber nicht gefunden; nach Blyth in Arracan. Nach Horsfield mißt der Körper 3″, in gerader Linie 2½″, Schwanz 1″. Von Rh. insignis und speoris durch die Färbung verſchieden. Die Oberſeite iſt tief braun mit Goldſchimmer, hinten mehr intenſiv; die einzelnen Haare am Grunde mit goldenem Ton, der gegen die Spitzen braun wird. Die Unterſeite fällt ſtark ins Grauliche, indem die lichter goldfarbigen Haare gegen die Spitze grau werden. — Blyth's Rh. larvatus iſt lebhafter gefärbt; Körper 2¾″, Schwanz 1¼″, Vorderarm 2¼″.

16. Rh. bicolor Temm., die zweifarbige Kammnaſe; albus, castaneo-marmoratus; pilis omnibus bicoloribus, maxima ex parte albis, apice castaneis; prosthemate simplici.

Rhinolophus bicolor. Temm. monogr. II. p. 18. tab. 29. fig. 3. (Kopf), 32 fig. 9, 10 (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 422. — Waterh. ann. of nat. hist. XIII. p. 303.

Java, Amboina, Timor und Philippinen. Körper 1″ 5‴, Schwanz 10‴; ſehr große Exemplare haben eine Totallänge von 2″ 8‴, Vorderarm 1″ 8‴. Backenzähne ⅔. Das Naſenblatt iſt klein, die Ohren ſind breiter als hoch, am Ende abgerundet und nicht ausgeſchnitten; die Unterlippe hat neben der mittleren Warze jederſeits eine längliche. Die Haare ſind auf der Oberſeite zu ⅔ ihrer Länge weiß, an der Spitze roth kaſtanienfarbig, daher das Weiß unregelmäßig marmorirt erſcheint; die Unterſeite fällt mehr ins Weiße, weil blos die kurzen Spitzen braun ſind.

17. Rh. marinus Ell., die Maus-Kammnaſe; fuliginosus aut fulvus; patagiis obscuris, apparatu nasali minus evoluto.

Rhinolophus murinus. BLYTH journ. of the Asiat. soc. XXI. p. 347.

var. α) niger.

Hipposideros ater Templeton. BLYTH l. c. XVII. p. 252; XXI. p. 347.

var. β) fuliginosus.

Hipposideros murinus. GRAY mag. of zool. and bot. n. 12. — BLYTH ann. of nat. hist. XV. p. 471; journ. of the Asiat. soc. XXI. p. 347. — Rhinolophus murinus. ELLIOT Madras journ. n. 24. — CANTOR journ. of the Asiat. soc. XV. p. 183.

var. γ) splendidissime fulvus.

Hipposideros fulvus. GRAY mag. of zool. and bot. n. 12. — BLYTH ann. of nat. hist. XV. p. 471; journ. of the Asiat. soc. XXI. p. 347. — Rh. fulgens. ELLIOT, Madras journ. n. 24. p. 99.

Ueber das ſüdliche Indien, Ceylon, Pinang und die nikobariſchen Inſeln verbreitet. Körper faſt 2″, Schwanz beinahe 1″, Vorderarm 1⅝″. Der Naſenbeſatz iſt einfacher als bei den vorhergehenden Arten und hat keine Blättchen außerhalb des Naſenblattes. Die Färbung iſt wie bei manchen andern Arten dieſer Gattung ſehr veränderlich und hat daher Veranlaſſung zur Errichtung mehrerer Nominal-Species gegeben. Die gewöhnliche Färbung iſt dunkelbraun, was unten blaſſer iſt; dieß iſt der Rh. murinus. Auf Ceylon fällt die Farbe noch mehr ins Dunkle, indem die Oberſeite kohlſchwarz iſt, wobei jedoch die einzelnen Haare gegen den Leib dunkel ſilbergrau erſcheinen; der Unterleib iſt graulichſchwarz, die Haut tief ſchwarz. Wie aber Blyth jetzt dargethan hat, iſt der Rh. fulvus oder fulgens, wie er bezeichnet wurde, auch nur eine Abänderung des Rh. murinus. Bei dieſem Rh. fulvus iſt der Pelz prächtig hell roſtfarbig, auf der Oberſeite mit etwas dunklerem Tone; die Flughäute düſter. Blyth bezeichnet letztere Abänderung als eine ſolche, welche ſich vielleicht in der ganzen Klaſſe der Säugthiere am meiſten durch den Glanz und die Lebhaftigkeit ihrer Färbung auszeichne.

18. Rh. cervinus GOULD., die hirſchfarbige Kammnaſe; fulvido-fuscescens, subtus pallidior; patagiis obscuris, prosthemate rectelineato.

Rhinolophus cervinus. GOULD mamm. of Austral. VI.

Sehr häufig am Kap York und in den Sandſteinhöhlen der Albany-Inſel (Neuholland). Körper 2″, Schwanz 1″, Vorderarm 1, 7″, Ob-

ren 0, 5‴. Gould ist zweifelhaft, ob er diese Art zu Rhinolophus oder Hipposideros stellen soll; seine Abbildung giebt aber entschieden letztere Untergattung zu erkennen. Backenzähne $\frac{2}{3}$. Das Nasenblatt ist einfach und geradlinig; die Ohren sind groß und am äußern Rande gegen die Spitze schwach ausgerandet. Die Flügel sind nackt und der Schwanz ragt mit seiner Spitze aus der Flughaut hervor. Die Farbe ist oben falbbraun, an Kopf und Schultern am dunkelsten, unten blasser und am Bauch mit Grau überlaufen.

19. **Rh. pygmaeus** Wat., die Pygmäen-Kammnase; **supra nigricans, pilis basi albidis, subtus cinerascens; prosthemate semicirculari; auriculis acutis emarginatis.**

Rhinolophus pygmaeus. Waterh. ann. of nat. hist. XIII. p. 303.

Von den Philippinen. Körper 1″ 5‴, Schwanz 10½‴, Ohren 4½, Vorderarm 1″ 5¾‴. Hinteres Nasenblatt halbkreisförmig mit verdicktem Rande. Ohren mäßig groß und deutlich ausgerandet. An den Lippen einige undeutliche Warzen; am Kinn zwei größere. Einförmig rostfarben (wie es im Weingeist erscheint), aber auf der Unterseite zum Grauen neigend, die schwärzlichen Haare der Oberseite jedoch am Grunde fast weiß; Lippenhaare und Kinn weiß.

20. **Rh. tricuspidatus** Temm., die dreizipfelige Kammnase; **e rufescente brunneus; prosthemate magno fere quadrangulari, supra tridentato; auriculis parvis.**

Rhinolophus tricuspidatus. Temm. monogr. II. p. 20. tab. 29. fig. 4 (Kopf), 32 fig. 11, 12 (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 434.

Amboina. Körper 1″ 4‴, Schwanz 10‴, wovon 2‴ frei sind, Vorderarm 1″ 4‴. Schenkelflughaut groß, viereckig abgeschnitten. Oben hell röthlichbraun, aber hellbraun an der Wurzel, mit schwärzlichbraunen Haarspitzen auf dem Rücken; an den Seiten und gegen den Steiß rein braun; Flughäute schwärzlich.

2. Subgen. Rhinolophus.

Prosthema compositum, posterius lanceolatum; auriculae lobulo distincto basali praeditae; digiti podariorum (hallice excepto) tridactyli.

21. **Rh. luctus** Temm.; die Trauer-Kammnase; **e nigricante griseus; auriculis maximis fere conniventibus, lobo magno praeditis; apparatu nasali valde evoluto et composito, cauda longitudine tibiae et pedis.**

Rhinolophus luctus. Temm. monogr. II. p. 24, 30 C. tab. 30. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 424. — Aquias luctus. Gray ann. of nat. hist. XIX. p. 408. — Rh. perniger Hodgs. journ. of the Asiat. soc. XII. p. 414. — Blyth ann. of nat. hist. XV. p. 467; XXI. p. 347. — ? Rh. Morio. Gray ann. of nat. hist. X. p. 257.

β) var. rufescens.

Rh. luctus var. Eydoux voy. aut. d. monde par Laplace. zool. p. 9.

Auf Java, und wenn, wie wahrscheinlich, auch Hodgson's Rh. perniger hieher gehört, in Nepal, ja sogar nach Eydoux in einer Varietät auf Manilla. Von der Ohrenspitze bis zum Schwanzende fast 5″, wovon der Schwanz 1″ 8‴ einnimmt; Vorderarm 2″ 4‴. Das Hufeisen ist einfach und vorn ausgeschnitten; der Sattel besteht aus 4 Blättchen in Form eines Maltheserkreuzes mit abgerundeten Enden; dahinter die Lanzette mit 3 Abtheilungen von Blättern: die beiden ersten abgerundet, das hinterste in eine lange stumpfe Spitze endigend. Am Unterkiefer 2 Warzen. Backenzähne $\frac{4}{4}$. Die Schwingen reichen bis zur Zehen-Basis. Die Farbe ist rußigschwarz mit hellgrauen Haarspitzen, was dem Pelz einen grauen Ton giebt, die Häute sind ganz schwarz. Eine röthliche Abänderung von Manilla wird von Eydoux angeführt. — Gray's Rh. Morio von Malakka wird wohl hieher gehören, da er ihn selbst für sehr ähnlich mit Rh. luctus erklärt und es für möglich hält, daß seine röthlichbraune Farbe von der Aufbewahrung in Weingeist herrühren könnte; überdieß sind röthliche Abänderungen von dunkel gefärbten Arten etwas Gewöhnliches.

22. Rh. trifoliatus Temm., die Klee-Kammnase; cinereo-rufescens, subtus cinereo-brunneus; auriculis magnis lobulo magno praeditis, sella trifoliata; cauda longitudine tibiae.

Rhinolophus trifoliatus. Temm. monogr. I. p. 27. tab. 31. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 426. — Aquias trifoliatus. Gray ann. of. nat. hist. XIX. p. 408.

Java, Borneo. Ganze Länge 3″, Vorderarm 1″ 10‴. Wegen ähnlicher Bildung des Nasenbesatzes wie beim vorigen von Gray zu seiner Gattung Aquias gestellt, die ich als überflüssig nicht gesondert habe. Die Blättchen des Sattels sind schmäler und lassen sich mit einem Klee-

blatte vergleichen. Grauröthlich, Kopf und Hals röthlichweiß, Unterleib graubraun. Flughäute nackt, hellbraun, am Leib und Vorderarm ſchwärzlichbraun.

23. Rh. aurantius Gray, die orangenfarbige Kammnaſe; aurantius aut stramineus, pilis dorsi fusco-apiculatis; prosthemate brevi, alis ad talum finitis.

Rhinolophus aurantius. Gray Eyre's Central Australia I. p. 405. tab. 1. fig. 1. — Gould mamm. of Austral. III. — Rhinonycteris aurantia. Gray, ann. of nat. hist. XIX. p. 408.

Port Eſſington in Neuholland. Körper 1. 10″, Vorderarm 1. 11, Schienbein 0. 8. Die Ohren ſind groß. Das Naſenblatt iſt kurz, aufrecht, mit einer Zelle jederſeits und einer dritten vor ſeiner Baſis; der Sattel iſt zuſammengedrückt, und ohne Spitze unten; das Hufeiſen iſt ausgeſchnitten. Die Unterlippe zeigt vorn eine dreieckige Grube kleiner Warzen. Die Flügel laſſen die Füße frei, der Schwanz iſt merklich über die Flughaut verlängert. Der Pelz iſt lang, weich und hell orange (faſt wie bei Rupicola), die Rückenhaare mit kurzen braunen Spitzen; die der Unterſeite ſind viel blaſſer, im Geſichte dunkler. Das Weibchen iſt blaßgelb, auf der Oberſeite mit braunen Haarſpitzen. Die Flughäute ſind braun und faſt nackt.

24. Rh. tragatus Hodgs., die klappige Kammnaſe; fuscus, prosthemate pilis frontis maximam partem tecto.

Rhinolophus tragatus. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. IV. p. 699. — Blyth ann. of nat. hist. XV. p. 467. — Gray catal. Hodgs. p. 2.

Nepal. Vorderarm 2¼″, Schienbein 1 1/16″. Der Ohrlappen iſt weniger entwickelt als bei andern Arten dieſer Abtheilung; das hintere Naſenblatt iſt größentheils durch die Stirnhaare verdeckt. Hodgſon bezeichnet die Färbung als einförmig dunkelbraun, mit hellern und roſtfarbigen Spitzen. Blyth bemerkt hiezu, daß zwei von drei ihm durch Hodgſon zugekommenen Exemplaren lichtbraun ſind und daß nur eines von ihnen auf der Oberſeite die Haarſpitzen trüb roth hat, was dadurch den Hauptton von dieſer Farbe hervorbringt [1]).

1) Im Catal. of the mammal. in the Museum of the East India Company p. 33

* **Rh. mitratus Blyth**, die gekrönte Kammnaſe; **supra clare brunneus, subtus pallidior; auriculis magnis; cauda tibia longiore.**

Rhinolophus mitratus. Blyth ann. of nat. hist. XV. p. 466; XXI. p. 361.

Chyrbaſſe in Centralindien. Körper $2\frac{1}{2}$″, Schwanz $1\frac{1}{2}$″, Vorderarm $2\frac{1}{4}$″, Schienbein 1″, Ohren 1″. Die Ohren ſind groß, der Lappen mäßig entwickelt. Das vordere Naſenblatt iſt oval oder rundlich, über jedem Naſenloch mit einem Hautlappen; das verticale Blatt hinter dem kleinen Naſenblatt iſt wenig entwickelt; der hinterſte Zacken iſt dreieckig und ſpitz, an der Baſis nur wenig überdeckt durch ein kleines Querblatt, das auch bei den meiſten andern Arten vorkommt. Der Pelz iſt ſehr fein und lang, auf der Oberſeite ſchön lichtbraun, die Haare am Grunde blaſſer, auf der Unterſeite lichter. Blyth hält es jetzt für wahrſcheinlich, daß dieſe Art mit Rh. tragatus identiſch iſt.

25. **Rh. euryotis Temm.** die ſchönohrige Kammnaſe; **ruso-brunneus, pectore albido, ventre pallide brunneo; auriculis latissimis; cauda brevissima partem tibiae tertiam aequante.**

Rhinolophus euryotis. Temm. monogr. II. p. 26. tab. 29. fig. 5. (Kopf), 32 fig. 13 bis 15 (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 425.

Amboina. Ganze Länge 2″ 11‴, Vorderarm 2″. Die Ohren ſind ſtark ausgerandet, mit großem Lappen; das lanzettförmige Naſenblatt iſt groß; die Unterlippe iſt mit vier großen Warzen bedeckt. Der Schwanz iſt ſehr kurz, nur $\frac{1}{3}$ von der Länge des Schienbeins, die kurze Spitze iſt frei. Nacken und Rücken ſind welk rothbraun (Haare am Grunde weiß, dann welk rothbraun mit kurzer röthlicher Spitze); Geſicht und Halsſeiten lichtbraun, Bruſt weißlich, bräunlich überflogen, Seiten dunkelbraun, die Mitte des Bauchs hellbraun; Häute ſchwärzlichbraun. Das Weibchen iſt weniger roth, die Töne etwas brauner.

ſtellt Horsfield eine neue Art auf als Rh. Pearsonii. „Farbe oben dunkelbraun mit leichtem kaſtanienfarbigem Tone, unten braun mit rußigem Anflug. Ohren geſchieden, unten mit einem abgerundeten Lappen, vorn faſt $\frac{3}{4}$″ meſſend; Spitze des Geſichtskammes mäßig entwickelt. Von der Naſenſpitze zur Schwanzwurzel 3″, Schwanz $\frac{1}{2}$″, Vorderarm 2″, Flugweite 11″. Obwohl verwandt mit Rh. tragatus beſitzt dieſe Art unterſcheidende Charaktere.“ Von Darjiling.

26. Rh. philippinensis Wat., die philippiniſche Kammnaſe; „supra obscure fuscus, subtus fusco-cinerascens; auribus magnis subacutis, ad latus exterius emarginatis et lobo magno accessorio, ad apicem rotundato, instructis; prosthemate maximo lobo posteriore lanceolato, anteriore valde elevato, ad apicem truncato, ad basin dilatato, hoc ferro-equino membraneo circumdato.“ Waterh.

Rhinolophus philippinensis. Waterh. ann. of nat. hist. XIII. p. 304.

Von den Philippinen. Körper 1″ 11‴, Schwanz 1″, Ohren 11‴, Vorderarm 1″ 10‴. Nahe verwandt mit Rh. euryotis, aber durch die viel größern Ohrlappen und die abgeſtutzte Form des vordern Naſenblattes verſchieden. Auch mit Rh. luctus iſt Rh. philipp. durch die Größe der Ohren und den Typus des Naſenbeſatzes verwandt, aber er iſt kleiner, die Ohren ſind nicht ſo ſcharf zugeſpitzt, der Ohrlappen iſt länger und verhältmäßig ſchmäler, auch differiren die Proportionen des Naſenbeſatzes. Am Kinn finden ſich Warzen.

27. Rh. ferrum equinum Schreb., die große Hufeiſennaſe; auriculis parum excisis; latere sellae anteriore versus medium angustato, prosthemate utrinque ad basin lobulo prosiliente, alis usque ad tarsum porrectis.

Rhinolophus ferrum equinum. Keyſ. und Blaſ. in Wiegm. Arch. V. S. 336; XIX. S. 51. — Bonap. faun. ital. 21 mit Abbild. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 427 tab. 62. (obere fig.). — Rh. unihastatus. Geoffr. ann. d. mus. XX. p. 261, 257 tab. 5. (Kopf). — Temm. monogr. II. p. 28. tab. 27 (Kopf und Schädel.). — Duvernoy mém. de Strasb. III. p. 3.

Vom Harze und dem ſüdlichen England an ſüdwärts verbreitet, z. B. Krimm, Libanon, Algerien. Körper 2″ 2‴, Ohr vom Scheitel an 8½‴, Vorderarm 2″, Schwanz 1″ 4½‴. Die vordere Querfläche des Längskammes vom Naſenbeſatz iſt in der Mitte verſchmälert; die hintere Spitze auf dem Rücken deſſelben erhebt ſich über die vordere Querfläche noch um die Hälfte der Höhe derſelben; der Schwanz iſt ⅘ ſo lang als der Vorderarm. Das Männchen iſt oben aſchgrau mit weißlichen Haarwurzeln; unten hellgrau, an den Seiten etwas dunkler; die Häute ſind ſchwärzlich. Das Weibchen iſt oben licht röthlichbraun mit weißlichen Haarwurzeln; unten röthlichgrau, an den Seiten etwas ſtärker röthlichbraun überlaufen. — Blaſius hat jetzt nachgewieſen, daß der früher von ihm angegebene Unterſchied in der

Zahl der Backenzähne zwischen dieser Art und Rh. clivosus nicht richtig ist, indem bei sämmtlichen europäischen Arten jederseits $\frac{5}{6}$ Backenzähne vorhanden sind.

28. **Rh. clivosus** Rüpp., die hügelige Kammnase; auriculis parum excisis; latere sellae anteriore sursum attenuato; prosthemate sine lobulis prosilientibus; alis ante tibiae finem finitis.

Rhinolophus clivosus. Rüppell's Atlas S. 47. tab. 18. — Temm. monogr. II. p. 32. tab. 29. fig. 7. (Kopf), 32 fig. 18 (Schädel). — Keys. u. Blas. in Wiegm. Archiv V. S. 327. — Bonap. faun. ital. fasc. 21. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 428. — Blasius in Wiegm. Archiv. XIX. S. 52.

Dalmatien, Levante, Aegypten. Nubien. Körper 2″, Ohr $6\frac{1}{2}$‴, Vorderarm 1″ 9‴, Schwanz $11\frac{1}{2}$‴. Die vordere Querfläche des Längskammes vom Nasenbesatz ist hinter den Nasenlöchern nach der Spitze allmählig verschmälert; seine nach hinten gegen die Stirne sich erhebende Spitze lang ausgezogen, etwa doppelt so hoch wie die vordere Querfläche desselben. Der Schwanz ist halb so lang als der Vorderarm. Die Haare der Oberseite sind am Grunde weißlich und an der Spitze bräunlichgrau; die der Unterseite sind einfarbig weißlich mit leichtem röthlichen Anfluge.

29. **Rh. Euryale** Blas., die gleichsattelige Kammnase; praecedenti similis, at latere sellae anteriore per totam longitudinem aequali.

Rhinolophus Euryale. Blas. im Arch. f. Naturgesch. XIX. S. 49.

Diese neue Art ist von Blasius entdeckt und bis jetzt nur in Südeuropa von den Südabhängen der Alpen an gefunden worden (Mailand, Triest, Gardasee, Dalmatien). Aus seiner höchst genauen Beschreibung mit sorgfältiger Vergleichung der drei andern europäischen Arten (Rh. ferrum equinum, clivosus und hippocrepis) hebe ich Folgendes hervor. Körper 1″ 8‴, Schwanz 1″, Vorderarm 1″ $8\frac{1}{2}$‴. In der Größe sowie in der Form des Schädels und Gebisses steht die neue Art am nächsten dem Rh. clivosus. Die vordere Querfläche des Längskammes ist der ganzen Länge nach gleichweit und am Ende breit und flach abgerundet; die hintere Spitze auf dem Rücken desselben erhebt sich über die vordere Querfläche fast um deren ganze Höhe. Hierin weicht sie von den übrigen europäischen Arten entschieden ab, indem diese Querfläche bei Rh. clivosus von der Mitte an, bei Rh. hippocrepis von der Basis bis zur Spi-

ze verſchmälert, bei Rh. ferrum equinum aber von der Mitte bis zur Spitze erweitert iſt. Die Form des Hufeiſens hält das Mittel zwiſchen der von Rh. clivosus und hippocrepis. Das Ohr iſt am Außenrande nur flach ausgeſchnitten. Die Flughaut erreicht die Fußwurzel nicht, ſondern läßt das Schienbein um die Länge der Fußwurzel frei hervorſtehen. Der Schwanz iſt kurz, jedoch verhältnißmäßig länger als bei Rh. clivosus. In der Behaarung und Färbung iſt kein weſentlicher Unterſchied von den verwandten Arten zu beobachten. Die Individuen ſind ohne Unterſchied des Geſchlechtes ſowohl ſehr hellfarbig als dunkler rauchbraun überflogen, beſonders auf der dunkleren Oberſeite.

30. Rh. lobatus Pet., die umbrafarbige Kammnaſe; saturate umbrinus; latere sellae anteriore versus medium attenuato, alis usque ad tarsum porrectis.

Rhinolophus lobatus. Peters Moſſamb. I. S. 41 tab. 9 (Thier), tab. 13 fig. 16, 17 (Schädel).

Von Peters in Moſſambique (Tette und Sena) entdeckt. Körper 2" 2‴, Schwanz 11½‴, Vorderarm 1" 8‴, Ohr 7‴. Backenzähne $\frac{4}{4}$. Die Ohren ſind ſchwach ausgeſchnitten, aber der Ohrlappen iſt hoch. Die vordere Querfläche des Längskammes (Sattels) iſt etwas unter der Mitte zuſammengedrückt; die hintere Spitze deſſelben dreieckig und ſo lang wie die Querfläche; die Lanzette länger als breit. Die Flughaut geht bis zur Fußwurzel herab; das Mittelhandglied des 4ten Fingers iſt das längſte von allen. Der Rücken iſt dunkel umbrafarbig, die Bauchſeite viel blaſſer; die Haare ſind ſämmtlich einfarbig. Ohren und Flughäute ſind ſchwarzbraun. Nach Peters unterſcheiden ſich die verwandten afrikaniſchen Arten von der ſeinigen in folgender Weiſe. Rh. capensis hat nur 4 obere Backenzähne, die Flughaut läßt einen Theil des Schienbeins frei und das Mittelhandglied des 5ten Fingers wird nicht vom 4ten überragt. Rh. clivosus hat dieſelbe Form der Backenzähne, aber die Farbe iſt röthlich, Naſenbeſatz und Verhältniß der Gliedmaſſen ſind verſchieden. Rh. fumigatus weicht in beiden letztern Punkten, ſo wie in der Färbung und der noch größeren Verlängerung des Vorderarmes ab.

30. Rh. capensis Licht., die kapiſche Hufeiſennaſe; auriculis pa-

rum excisis; sella, prosthemate dentibusque ut in Rh. ferro-equino; alis ante tibiae finem terminatis.

Rhinolophus capensis. Lichtenſt. Verz. d. Doubl. S. 4. — Keyſ. u. Blaſ. in Wiegm. Archiv V. S. 328. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 429. — Rh. Geoffroyi. A. Smith zool. journ. IV. p. 433.

Am Kap und in Aegypten. Körper 2″ 1½‴, Ohr 7½‴, Vorderarm 1″ 11½‴, Schwanz 1″. Die Schwingen laſſen einen Theil des Schienbeins frei; der Schwanz iſt halb ſo lang als der Vorderarm. Die Färbung iſt ähnlich der von Rh. clivosus, nur etwas dunkler rauchbraun überflogen, beſonders auf der Oberſeite.

31. Rh. fumigatus Rüpp., die abyſſiniſche Kammnaſe; unicolor fuliginoso-canus, apparatu nasali auriculisque uti in Rh. clivoso.

Rhinolophus fumigatus. Rüppell Mus. Senckenberg. III. S. 132.

Schoa. Körper 2″ 6‴, Schwanz 10‴, Ohr 9‴, Vorderarm 1″ 11‴. Der Naſenbeſatz iſt wie bei Rh. clivosus, aber der Schwanz iſt kürzer, die Flügel länger und der ganze Körper mit ziemlich langem, dunkel rauchgrau gefärbten Pelze bedeckt.

32. Rh. Alcyone Temm., die ziegelfarbige Kammnaſe; rufus, subtus pallidior.

Rhinolophus Alcyone. Temm. esq. zool. sur la côte de Guiné p. 80.

Nur ein einziges weibliches Exemplar vom Boutry-Fluße in Guinea iſt es, worauf Temminck ſeine neue Art in einer kurzen, zur Sicherſtellung nicht ausreichenden Beſchreibung begründete. Körper 2″ 3‴, Schwanz 9‴, Vorderarm 1″ 9‴, Flugweite 11″. Die Lanzette iſt an der Baſis breit, aber nicht ſonderlich hoch und mit zwei Reihen kleiner Rauhigkeiten (caritées) verſehen; ein Sockel ruht auf dem Wulſte und iſt vom großen, mit einer kleinen Hautfalte geſäumten Hufeiſen umgeben. Die Ohren ſind groß und hoch und mit einem beweglichen Lappen geendigt. Die Oberſeite hat eine lebhaft rothe Farbe wie gebrannte Ziegelſteine, die Unterſeite iſt lichter; die Häute ſind ſchwarz.

33. Rh. Nippon Temm., die japaniſche Hufeiſennnaſe; griseo-brunneus (♀ sordide rufa); auriculis magnis; sella antice excavata, in cornu elevata; prosthemate longo acuto.

Rhinolophus Nippon. Temm. monogr. II. p. 30 a. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 431.

Japan. Ganze Länge 4″, wovon der Schwanz 1″ einnimmt, Vorderarm 2″ 1‴. Sehr ähnlich dem Rh. ferrum equinum, aber der Schwanz iſt etwas kürzer, der Naſenbeſatz mehr entwickelt, die Ohren größer und minder behaart, der Pelz länger und weniger glänzend, die Färbung nur leichte Aenderung zeigend. Der Sattel iſt vorn rinnenartig ausgehöhlt und erhebt ſich in eine ſtumpfe Spitze; die Lanzette iſt einfach, aus einem einzigen langen, ſpitzen, behaarten Blatte beſtehend. Die Unterlippe trägt blos eine einzige Warze, oben finden ſich nur 4 Backenzähne. Das Männchen iſt oben graubraun: Haare am Grunde weißlichgrau, an der Spitze braun; unten ſind die Haare am Grunde grau und an der äußerſten Spitze braun; die Häute ſind braun. Das Weibchen iſt trüb braunroth mit weißlichen Haarwurzeln; unten ſind die Haare weißlich, an der äußerſten Spitze etwas röthlich.

34. Rh. affinis Horsf., die verwandte Kammnaſe; fuliginoso aut rufino-fuscus, subtus pallidior, pilis unicoloribus; dentibus molaribus inferioribus 6.

Rhinolophus affinis. Horsf. zool. research. n. 6. — Temm. monogr. II. p. 31. tab. 29. fig. 6. (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 431. — Blyth journ. of the Asiat. soc. XXI. p. 346. — ? Cantor, journ. of the Asiat. soc. XV. p. 181.

Java, Sumatra, ? Pinang. Länge 3″, wovon der Schwanz 11‴, Vorderarm 1″ 10‴. Die Ohren ſind groß, mit großem Lappen; am Unterkiefer finden ſich 4 große Warzen; Backenzähne $\frac{7}{7}$. Der Schwanz iſt länger als das Schienbein. Der Pelz iſt lang, etwas kraus, unten an den Seiten etwas die Flügel bedeckend und durchgängig einfarbig. Das Männchen iſt oben rußbraun, unten graubraun; die Häute ſchwarzbraun. Das Weibchen iſt oben röthlichbraun, unten hellröthlich. — Nach Cantor iſt von zwei Individuen das Männchen oben röthlichbraun, unten lichtgraulichbraun, das Weibchen oben golden falb, was auf der Unterſeite lichter wird; letzteres mit ſtark entwickelten Anhängſeln in der Schamgegend. Es fragt ſich freilich, ob dieſe Exemplare nicht zu Rh. Rouxii ge-

hören, da Cantor nur 2 Backenzähne angiebt und die Färbung damit übereinstimmt [1]).

35. Rh. Rouxii Temm., die krause Kammnase; supra umbra-brunneus, subtus canescens; ♀ rufo-fulva; pilis supra bicoloribus; dentibus molaribus inferioribus 5.

Rhinolophus Rouxii. Temm. monogr. II. p. 306. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 432.

Calcutta, Pondichery. Ganze Länge 3″ 5‴, wovon der Schwanz 10‴, Vorderarm 1″ 10‴. Sehr ähnlich dem Rh. affinis, aber durch Gebiß, Pelz und Farbenabänderung verschieden. Der Schwanz ist gleich lang mit dem Schienbein. Der Pelz ist sehr kurz, sehr kraus und bildet keine Binde längs der Flügel. Das Männchen ist oben umbrabraun, die Haare am Grunde aschgrau; unten hellgrau, an den Seiten und Schultern dunkler. Das Weibchen ist oben brennend roth mit kurzen rothbraunen Haarspitzen, unten schön goldroth; es giebt jedoch auch Weibchen mit schwach röthlicher Färbung, deren untere Theile grauroth sind.

36. Rh. megaphyllus Gray, die neuholländische Kammnase; pallide murinus; patagiis subtus prope corpus albopilosis.

Rhinolophus megaphyllus. Gray proceed. II. (1834) p. 52. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 433.

Neuholland, in Höhlen am Flusse Moorumbidjee. Vorderarm 1″ 10½‴, Schienbein 9‴, Schwanz 1″. Das hintere Nasenblatt ist ovallanzett, an der Wurzel fast so breit als das Gesicht; das Septum der Nase ist grubig; das vordere Blatt mit völlig freiem Rande. Die Ohren sind breit und reichen niedergelegt bis über die Nasenspitze. Der Pelz ist weich und von blasser Mausfarbe; die Häute sind dunkel, unten

1) Auch Blyth bezweifelt es, ob Cantor's Rh. affinis hieher gehört. Dagegen vereinigt er mit obiger Art Rh. rubidus und fulvidus Kelaart von Ceylon und fügt nach Vorlage zahlreicher Exemplare von da die Bemerkung bei, daß die Färbung höchst veränderlich ist, indem in Gemeinschaft miteinander und ohne Unterschied des Geschlechtes Individuen gefangen werden, deren Pelz aus dem lebhaftesten Rostroth bis ins Trübbraune, ohne irgend eine Beimischung von Roth, übergeht, während andere eine Mittelfärbung zeigen.

an den Seiten mit entfernt ſtehenden weißlichen Haaren. — Auf die Selbſtſtändigkeit dieſer Art läßt ſich mehr aus ihrer Heimath, als aus der Beſchreibung ſchließen.

37. Rh. Landeri Mart., die kaſtanienfarbige Kammnaſe; rufo-castaneus, auriculis profunde emarginatis; sella bidentata: dente posteriore altiore.

Rhinolophus Landeri. Martin proceed. V. p. 101. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 433.

Fernando Po im guineiſchen Meerbuſen. Körper 1″ 4‴, Ohren 7½‴, Vorderarm 1″ 7‴, Schwanz 9‴. Der Sattel bildet eine zweiſpaltige, nicht ſehr erhöhte Leiſte, deren hintere Spitze die höhere iſt. Die Ohren ſind groß, mit breitem Lappen. Der Pelz iſt weich, ſchön hell oder roth kaſtanienfarben, auf der Mitte des Rückens etwas dunkler; die Schwingen ſchwärzlich. Iſt einer ſorgfältigen Vergleichung mit Rh. Alcyone bedürftig.

38. Rh. Hippocrepis Herm., die kleine Hufeiſennaſe; auriculis profunde excisis, lobulo distinctissimo praeditis; latere sellae anteriore una cum prosthemate sursum sensim attuenatis.

Rhinolophus Hippocrepis. Bonap. faun. ital. fasc. 21 mit Abbild. —. Keyſ. u. Blaſ. in Wiegm. Archiv V. S. 326. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 434. — Blaſ. in Wiegm. Archiv XIX. S. 53. — Rh. bihastatus. Geoffr. ann. d. mus. XX. p. 265, 258 tab. 5. (Kopf). — Temm. monogr. II. p. 34. tab. 27 (Kopf). — Rh. Hipposideros. Leach zool. misc. III. p. 2. tab. 121. — Vespertilio minutus. Montagu, Linn. transact. IX. p. 163 tab. 18 fig. 6. — V. ferrum equinum β. Schreb. I. S. 174 (zum Theil), tab. 62. (unten).

Von Südengland an durch Frankreich, die Schweiz, Deutſchland bis an den Kaukaſus und nach Kleinaſien verbreitet. Körper 1″ 6‴, Ohr vom Scheitel an 6‴, Vorderarm 1″ 5‴, Schwanz 1″ 2‴. Backenzähne oben 5. Die vordere Querfläche des Sattels iſt allmählig gegen ihre Spitze verſchmälert; die Lanzette (Naſenblatt) ſpitzt ſich allmählig zu, ohne an der Wurzel plötzlich lappenartig ſich auszubreiten. Die Ohren ſind mit einem ſtarken Lappen verſehen, die Flügel bis zur Fußwurzel angewachſen. Der Pelz iſt oben zwei-, unten einfarbig. Auf der Oberſeite ſind die Haare weiß, mit kurzer röthlichgrauer Spitze bei dem Männ-

chen und mehr röthlicher bei den Weibchen; der Unterleib ist weiß mit blaß röthlichem Anflug an den Seiten.

39. Rh. minor Horsf., die zweizackige Kammnase, cinereo-fuscus, subtus brunneo-canus, ♀ rufescens; auriculis profunde emarginatis; sella apice bidentata: dente altero antrorsum verso, altero recto.

Rhinolophus minor. Horsf. zool. research. n. 6. — Temm. monogr. II p. 35. tab. 32. fig. 20, 21 (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 436.

Java, Timor. Länge 2″ 5‴, wovon der Schwanz 8‴, Vorderarm 1″ 9‴. Schwanz so lang als das Schienbein. Das Männchen ist oben schwärzlichbraun, ins Graue ziehend, unten hell braungrau; das Weibchen röthlich, oben dunkler als unten; die jungen Weibchen von der Farbe des Männchens.

40. Rh. pusillus Temm., die Zwerg-Kammnase; supra albido brunneoque marmoratus, pilis bicoloribus, subtus flavescens; sella antice foliolo angusto antrorsum curvato instructa.

Rhinolophus pusillus. Temm. monogr. II. p. 36. tab. 29 fig. 8 (Kopf), 32 fig. 22, 23 (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 426.

Java. Ganze Länge 2″ 3‴, Vorderarm 1″ 4‴. Ohr mit großem Lappen; Schwanz so lang als Schienbein und Zehen. Der Pelz ist oben zwei-, unten einfarbig. Die Haare oben sind auf ½ weiß, an der Spitze graulichbraun; die Unterseite ist gelb wie Milchkaffe, gegen die Seiten etwas brauner.

41. Rh. cornutus Temm., die gehörnte Kammnase; bicolor, supra pilis basi albidis, apice rufino-brunneis; auriculis lobulo magno praeditis; sella in cornu elevata.

Rhinolophus cornutus. Temm. monogr. II. p. 37. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 437.

Japan. Ganze Länge 2″ 2‴, wovon der Schwanz 9‴, Vorderarm 1″ 4‴. Die Ohren sind groß und spitz, der Sattel ist in ein stumpfes Horn erhöht mit flacherem Vordertheil. Der Pelz ist durchgängig zweifarbig. Die Haare sind oben mehr als zur Hälfte weißlich mit röthlichbrauner Spitze; unten lichtgelblich mit röthlichen Spitzen; die Häute hell schwärzlich.

42. Rh. macrotis Hodgs., die großohrige Kammnaſe; brunneus, subtus pallidior; auriculis magnis capite longioribus; prosthemate triangulari.

Rhinolophus macrotis. Blyth. ann. of nat. hist. XV. p. 458; journ. XXI. p. 348. — Gray catal. Hodgs. p. 3.

Nepal. Körper 1⅝", Ohren ⅝", Vorderarm 1⅝‴, Schwanz ⅝". Die Ohren ſind groß, breit mit großem Lappen; der Naſenbeſatz ziemlich complicirt, der Schwanz von der Länge des Schienbeins. Hodgſon nennt die Farbe rußigbraun, unten viel blaſſer und trüb graulich. Blyth bezeichnet ſie als licht erdfarbig olivenbraun, unten blaſſer; in einem ſpäteren Artikel machte er bemerklich, daß er von dieſer Art ſowohl braune als licht röthliche Individuen beſitze [1]).

XVII. COELOPS. Leiſtennaſe.

Auriculae magnae rotundatae integrae; cauda et calcarea nulla; patagium interfemorale profunde excisum.

Unter dieſem Namen ſtellte in der Gruppe der Kammnaſen Blyth eine neue Gattung auf mit folgenden Merkmalen: „Allgemeiner Character von Rhinolophus und Hipposideros, aber Schwanz und Sporen fehlend und die Schenkelflughaut bis zu einer geraden Linie mit den Knieen ſpitz ausgeſchnitten. Ohren fein, groß, breit und gerundet; bis vorn rund fortgeführt ohne Spur von Ausrandung zur Bildung eines Lappens. Schnauzengrube (facial pit) überragt von einem kleinen, durch eine erhöhte Mittellinie getheilten Feld und über dieſem ragt ein kleiner Blattkamm hervor mit einer plötzlich aufſteigenden, ſtumpf zweitheiligen und vorwärts gebo-

1) Noch iſt hier zweier indiſcher Arten zu gedenken, welche Blyth jetzt nur für eine einzige anſieht. Dieß iſt a) Rh. subbadius Hodgs. (journ. of the Asiat. soc. X. p. 908. — Blyth l. c. XXI. p. 347 und ann. of nat. hist. XV. p. 468) von Nepal. — b) Rh. lepidus Blyth (ann. of nat. hist. XV. p. 469; journ. of the Asiat. soc. XXI. p. 347) von Bengalen. Blyth betrachtet beide jetzt nur als Farbenabänderungen von einander, von welchen der Rh. subbadius die röthliche darſtellt. Er ſpricht ſogar die Vermuthung aus, daß beide zu Rh. minor gehören könnten.

Daß Fraſer's Rhinolophus Martini nicht hieher, ſondern zu Nycteris gehört, iſt ſchon bei letztgenannter Gattung erwähnt worden.

genen Spitze; hinter diesem Blatt zeigt ein kleiner Haarpinsel die Lage des bei Hipposideros bemerklichen Siphons an. Jedes Nasenloch ist umgeben mit einem schwachen Hautsaume, und ein breiteres, der Oberlippe anliegendes Blatt säumt die Schnautzenaushöhlung vorne ein, aber die Seiten der letztern sind nur mit Haaren dicht besetzt; der Pelz auf der Stirne ist lang und dicht. Die Verhältnisse der Schwingen und der Vorderarm-Haut sind dieselben wie bei Nycteris. Der Pelz ist lang und sehr fein wie bei den ächten Rhinolophus." Das Gebiß ist nicht untersucht. — Obschon mir aus vorstehender Beschreibung die Beschaffenheit des Nasenbesatzes nicht hinlänglich klar geworden ist, so zweifle ich doch nicht, daß wir hier eine andere Form der Kammnasen vor uns haben, um so mehr, da aus Blyth's Stillschweigen über den Tragus das Fehlen desselben anzunehmen ist und er selbst ausdrücklich diese Fledermaus den Rhinolophinen zuweist [1]).

1. C. Frithii Blyth., die rußige Leistennase.

Coelops Frithii. Blyth., journ. of the Asiat. soc. XVII. 1. 251; XXI. p. 361.

Bewohnt die Sunderbunds von Unter-Bengalen. Körper ohngefähr 1¾", Schenkelflughaut in der Mitte nur ½", Kopf ¾", Ohren hinten ½" oder etwas weniger, Vorderarm 1¾". Farbe düster oder schwärzlich, die Haare oben mit trüb Aschbraun zugespitzt, unten mit lichterer und etwas weißlicher Aschfarbe. Häute braun.

III. Familie.

Gymnorhina. Nacktschwirrer.

Nasus simplex, apparatu foliaceo, nares includente privatus; dentes cuspidati.

---

1) In einem spätern Zusatze fügte Blyth die Bemerkung bei, daß seine Gattung Coelops unverkennbar nahe mit Mormops und Centurio verwandt sei, aber nicht den sonderbar erhöhten Schädel der ersteren Gattung habe, noch auch die Ohrmuschel vorn zweispaltig sei wie bei den beiden andern. Der Mittelfinger zeige nur 3 Glieder, während der von Centurio 4 habe.

Die Beschaffenheit des Gebisses ist ganz so wie bei den Blatt- und Kammnasen; der einzige Unterschied von diesen liegt in dem Mangel eines besonderen häutigen, die Nasenlöcher einschließenden Nasenbesatzes. Die Ohrklappe (tragus) ist immer vorhanden.

a) Brachyura. Stummelschwänze.

Cauda patagio interfemorali multo brevior, apice libera.

Der Schwanz ist viel kürzer als die Schenkelflughaut und ragt auf derselben mit einer kurzen freien Spitze vor. Die Wurzel des Daumens ist von einer eigenen kleinen Daumenhaut umfaßt.

XVIII. MORMOPS. Trutzer.

Cauda brevis, auriculae magnae conniventes; nasus mentumque plicis membranaceis complicatis ornata.

Die falsche Beschreibung, welche Leach nach einem ausgestopften Exemplare gab, hat Gray nach frischen, im Weingeist aufbewahrten berichtigt. Die Nase ist oben abgerundet, unten schief abgestutzt, mit mittlerer Längsrippe und einer gezähnten Querrippe zwischen dem Rand und den Nasenlöchern. Die Oberlippe ist mit rundlichen Warzen besetzt; die Unterlippe ist ausgebreitet, verschieden gefaltet, vorn mit einer großen, von Warzen und zwei kleinen Anhängseln besetzten viereckigen Scheibe. Die Ohren sind sehr groß, über dem Obertheil der Nase vereinigt, am untern Rande vorgezogen und mit den Häuten an der Unterlippe verbunden. Die Klappe ist halbmondförmig mit großem Anhängsel an der Außenseite ihres Obertheils. Die Schenkelflughaut ist sehr groß und am Ende abgestutzt; der Schwanz erreicht nicht ihren Rand und ragt auf ihrer Oberseite mit freier Spitze vor. Nach Leach sind $\frac{4}{4}$ Schneidezähne und $\frac{8}{8}$ Backenzähne vorhanden.

1. **M. Blainvillei** Leach., der lappige Trutzer; **auriculis superne bilobis.**

Mormops Blainvillei. Leach Linn. transact. XIII. p. 77. tab. 7. — Gray, ann. of nat. hist. IV. p. 8. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 447.

Jamaika und Cuba. Weder Leach noch Gray haben die Größe und Färbung angegeben.

XIX. CHILONYCTERIS. Lappenmund.

Nasus oblique truncatus naribus infra positis; labium inferius membranis transversalibus duabus aut una instructum; auriculae sejunctae, angustae, acutae; patagium interfemorale magnum truncatum.

Zu gleicher Zeit haben Gundlach und Gray dieſe Gattung errichtet, erſterer mit dem Namen Lobostoma, letzterer mit dem von Chilonycteris, und zwar nach Exemplaren von der Inſel Cuba. Gray giebt neuerdings von ihr folgende Definition: „Naſe abgeſtutzt, oberer Rand umgeſchlagen, Naſenlöcher unten; Kinn am Vorderrande mit zwei häutigen Querfalten; Ohren ſeitlich, ſchmal, ſpitz, mit einer Auskerbung am Außenrande; Schenkelflughaut groß, abgeſtutzt; Schwanz lang."

Uebereinſtimmend iſt Gundlach's Charakteriſtik. Ich habe den Arten dieſer Zoologen 3 neue, durch Natterer entdeckte, beigefügt, als im Weſentlichen dieſelben Merkmale tragend. Dieſe Gattung iſt ſehr ausgezeichnet, namentlich durch die Form des Schnautzenendes und der Ohren. Die Schnautze iſt vorn nackt und abgeſtumpft; ihr oberer Rand ſcharf hervortretend, und eine abgeſtutzte Fläche bildend, in welcher die vor- und abwärts gerichteten Naſenlöcher liegen. Die Unterlippe iſt mit einem, in der Mitte kleine Wärzchen tragenden häutigen Umſchlage beſetzt, unter und hinter welchem ein zweites Querblättchen liegt. Die Ohren ſind weit auseinander gerückt, mittellang, ſchmal, zugeſpitzt, am äußern Grunde bogenförmig erweitert und bis zum Mundwinkel vorgeführt; die Klappe iſt kurz. Der Schwanz iſt kürzer als die ſehr große, abgeſtutzte Schenkelflughaut und mit ſeinem Ende auf ihr frei vorragend. Die Sporen ſind lang. Der Daumen iſt an ſeiner Wurzel von der Daumenhaut umhüllt. Das Gebiß von Ch. rubiginosa beſteht aus $\frac{1}{4}$ Schneidezähnen, $\frac{1}{1}$ Eckzähnen und $\frac{2}{3}$ Backenzähnen. Die mittleren obern Schneidezähne ſtehen dicht aneinander, ſind zweilappig und ſtärker als die ſeitlichen. Mit Chilonycteris habe ich noch Gray's Gattung Phyllodia verbunden, da ſie ſich von jener nur durch ein einfaches Querblatt an der Unterlippe und durch einen blattartigen Anhang auf der Naſe unterſcheidet. Die Heimath iſt das tropiſche Amerika.

†) **labium inferius membranis duabus ornatum, nasus simplex — Chilonycteris Gray.**

1. Ch. quadridens Gundl., der vierzackige Lappenmund; brunneo-cana, auriculis lobulo basali quadridentato notatis.

Lobostoma quadridens. Gundlach Wiegm. Archiv VI. (1840) S. 357.

Cuba. Körper 1″ 6½‴, Schwanz innerhalb der Haut 6½‴, außer derselben 3‴, Flughaut vom Freiwerden des Schwanzes an noch 7½‴, Sporen 7½‴, Flugweite 8″ 3‴. „Farbe des Pelzes blaß bräunlichgrau, die Haarspitzen der Oberseite dunkler. Kehlgegend hat eine etwas ins Gelbliche spielende Farbe. Ohröffnung weit; oberer Rand sehr verlängert zu einer stumpfen Spitze; oben am Hinterrande ist es etwas ausgeschweift; die untere Hälfte des Vorderrandes ist erweitert, die Erweiterung selbst bildet 4 Zähnchen. Das vordere Lippenblatt dehnt sich bis zum Mundwinkel aus, das hintere ist ungetheilt und nur wenig kürzer als das vordere, an das es sich mit seinem Rande anlehnt. Die Wärzchen des vordern sind nur in der Mitte vorhanden. Die Hautlappen zur Seite der Nase an ihrem oberen Rande in eine Spitze hervortretend. Nase oben nackt. Flughäute, Nase, Lippenblätter und Ohrränder schwarzbraun."

* Ch. Mac Leayii Gray, der mausfarbige Lappenmund; murino-colorata.

Chilonycteris Mac Leayii. Gray, ann. of nat. hist. IV. (1840) p. 5. tab. 1. fig. 2 (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 448.

Cuba. Länge 1¾″, Flugweite 9″, Vorderarm 1¼″, Schwanz ¾″. „Pelz mausfarbig (in Weingeist), mit blassen (greenish) Haarspitzen; unten merklich lichter. Unterlippe mit einer dreieckigen centralen Warze und einer Gruppe kleiner gedrängter Warzen in der Mitte des untern Lippenblattes. Nasenrand mit zwei zahnähnlichen Ausbreitungen jederseits, eine über jedem Nasenloch, und die andere, viel größere an der Außenseite der ersten. Kinn mit 3 Längsfalten und einer conischen Warze jederseits gegen den hintern Rand des untern Kinnblattes. Schwingen kastanienbraun, fast kahl, die Unterseite der Schenkelflughaut mit einigen zerstreuten Haaren." — Diese Art wird wohl mit Ch. quadridens identisch seyn, wenigstens deuten die Heimathsverhältnisse, die Größe, die Färbung, soweit sie an einem Weingeist-Exemplare bestimmt werden kann, die Zacken zur Seite der Nase darauf hin; die Abbildung läßt auch am Ohrlappen noch zwei Zacken erkennen.

2. Ch. fuliginosa Gray, der rußbraune Lappenmund; supra fuliginosa, fusco-tinota; subtus fuscescens, gula femoribusque ad basin rufescentibus; auribus elongatis, attenuatis, acutis." Gray.

Chilonycteris fuliginosa. Gray, ann. of nat. hist. XIII. p. 68.

Auf Hayti. Körper 1" 8‴, Ohren 5½‴, Vorderarm 1" 7‴, Schwanz 10‴, Flugweite 8" 10‴. Faſt in jeder Beziehung mit Ch. Mac Leayi übereinſtimmend, aber von weit dunklerer Farbe und größeren und merklich ſchmäleren Ohren.

3. Ch. cinnamomea Gundl., der zimmtfarbige Lappenmund; cinnamomeo-fusca, pilis basi pallidioribus; auriculis brevibus.

Lobostoma cinnamomeum. Gundlach, Wiegm. Archiv. VI. S. 357.

Cuba. Körper 1" 10‴, Schwanz bis zum Freiwerden 10½‴, das freie Stück 2‴, Sporen 8½‴, Flugweite 10½". „Hat einen oben dunkel-, unten hell zimmtbraunen Pelz; der Grund der Haare iſt überall blaſſer, Geſicht mehr ſchwärzlich behaart. Ohren kurz, weit, gerundet, am untern Rande ſehr mit Haaren gefranzt, die man auch an den Falten im Ohre ſieht. Ohrdeckel kurz, an der innern Seite mit einem Ausſchnitte. Naſenrücken kahl. Oberlippe nach den Mundwinkeln hin mit längeren zimmtbraunen, ſeidenartig glänzenden Haaren beſetzt. Vorderes Lippenblatt etwas länglich viereckig, hinteres zweitheilig, jeder Theil noch mit einer Auskerbung in der Mitte. Die Naſe, die Blätter der Unterlippe, die Ohrränder und Flughäute ſind ſchwarzbraun. Die Haare bilden über der Naſe und unter dem Kinne ein Grübchen."

4. Ch. rubiginosa Natt., der roſtrothe Lappenmund; major, cinnamomeo-rufescens, pilis basi saturatioribus; auriculis elongatis angustatis.

Chilonycteris rubiginosa. Wagn. Wiegm. Archiv 1843 S. 369; Abh. der Münchn. Akadem. V. S. 181. tab. 3. fig. 2—6.

Mato groſſo in Braſilien. Körper 3", Ohren 8‴, Vorderarm 2" 2½‴, Sporen 1" 1½‴, Schwanz 10‴, Flugweite 15". Die mittleren untern Schneidezähne ſind dreilappig, die äußern zweilappig. Die Ohren ſind lang, ſchmal und zugeſpitzt. Der Umſchlag der Unterlippe iſt breit, mit Wärzchen beſetzt und durch eine Querſpalte von dem darunter liegenden Querblatte getrennt; letzteres auf der Unterſeite mit drei Längswul-

sten. Die Färbung ist röthlich-zimmtfarben, was am Bauche lichter wird und hier ins Bräunliche fällt. Die Haare der Oberseite sind ziemlich einfarbig, die des Bauches aber im größern untern Theile weit dunkler als an den lichten Spitzen. Von der vorigen Art schon durch weit beträchtlichere Größe, andern Farbenton und andere Ohrenform verschieden.

5. Ch. gymnonotus Natt., der nacktrückige Lappenmund; fusca, dorso nudo.

Chilonycteris gymnonotus. Wagn. Wiegm. Archiv 1843 S. 367; Abhandl. d. Münchn. Akadem. V. S. 183. tab. 3. fig. 1.

Mato grosso. Körper 2" 4‴, Ohren 7‴, Vorderarm 1" 8½‴, Sporen 10‴, Schwanz 8½‴, Flugweite 11". Die Oberlippe ist stark aufgeworfen und am äußern Rande jederseits zweimal ausgekerbt. Der Umschlag der Unterlippe ist mit Warzen besetzt; das Querblatt unter dem Kinn trägt auf der Unterseite 3 Längsfalten und außerhalb derselben jederseits eine Warze. Die Ohren sind ziemlich lang und die Erweiterung am Grunde des Außenrandes ganzrandig; die Klappe ist oben auf der Innenseite mit einem abgerundeten, quergestellten Fortsatze versehen. Einzig unter allen brasilischen Fledermäusen ist der ganze Rücken völlig nackt. Die Farbe des Pelzes ist dunkelbraun, unten ins Graulichbraune übergehend.

6. Ch. personata Wagn., der maskirte Lappenmund; fusca, subtus dilutior, dorso piloso.

Chilonycteris personata. Wagn. Wiegm. Archiv 1843 S. 367; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 185.

Mato grosso. Körper 2" 1‴, Ohren 6‴, Vorderarm 1" 8‴, Sporen 10‴, Schwanz 7½‴, Flugweite 10½". Ganz wie vorige, aber schon dadurch verschieden, daß der Rücken eben so behaart ist als der übrige Körper.

††) labium inferius membrana una ornatum, nasus supra foliolo erecto ovato-lanceolato. Phyllodia Gray.

7. Ch. Parnellii Gray, der blattnasige Lappenmund; „auribus magnis subacutis, vellere cinerascenti-fusco, pilis ad apicem obscurioribus". Gray.

Phyllodia Parnellii. Gray, ann. of nat. hist. XIII, p. 225.

Jamaika. Die Größe ist nicht angegeben. Kommt in allen Verhältnissen mit der ersten Abtheilung dieser Gattung überein, und unterscheidet sich nur dadurch, daß an der Unterlippe blos ein Querblatt sich findet und auf der Oberseite der Nase ein oval lanzettförmiger fleischiger Anhang vorhanden ist, der aber mit den unterwärts gerichteten Nasenlöchern in keiner Verbindung steht.

XX. NOCTILIO. Hasenschärtler.

Rostrum breve tumidum, labrum late fissum; auriculae sejunctae angustatae; patagium interfemorale magnum truncatum; dentes primores $\frac{4}{4}$.

Der Kopf ist einigermassen dem eines Bullenbeißers ähnlich; die Schnautze ist angeschwollen und abgestutzt; die Nasenlöcher etwas röhrenförmig, vorwärts gewendet und durch eine Längsfurche von einander geschieden. Die Oberlippe ist durch die vorspringende Nasenkuppe weit gespalten und ihre Ränder hängen an beiden Seiten herab. Die Ohren sind weit getrennt, mittellang, schmal, mit zackiger Klappe. Die Schenkelflughaut ist sehr groß und abgestutzt, die Sporen lang, der Schwanz kurz, mit seinem Ende frei vorragend. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Backenzähne $\frac{4}{4}$; die äußeren obern Schneidezähne sind klein und leicht ausfallend. Die Männchen haben einen starken Moschusgeruch. Die Heimath ist Südamerika.

1. N. unicolor Geoffr., der rostfalbe Hasenschärtler; **ferrugineo-fulvus, subtus dilutior.**

Noctilio unicolor. Desmar. mammif. p. 118. — Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 223. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 450. — Tschud faun. peruan. I. S. 76. — N. rufus, Spix vesp. bras. p. 57. tab. 36. fig. 1. 5. — N. leporinus. D'Orbign. voy. dans l'Amér. zool. I. p. 12. tab. 9. (N. ruffipes).

Südliches Brasilien, Bolivien und Peru. Körper 3″ 9‴ bis 4″, Ohren 10‴, Vorderarm 3″ 1‴, Schwanz 11‴, Sporen 1″ 7‴. Die Klappe ist oben gabelförmig, auf dem Außenrande mit 4 kurzen Zacken. Der Pelz ist schön rostroth mit goldgelbem Schimmer, längs der Mitte des Unterleibs blasser. Die Krallen sind röthlichgelb.

2. N. dorsatus Neuw., der gestreifte Hasenschärtler; **obscure castaneo-fuscus, subtus pallide flavidus; stria dorsali albida.**

Noctilio dorsatus. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 218 mit Abbild. — Rengg. Paraguay S. 93. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 451. — N. mastivus. Gray list of Mammal. p. 33. — Gosse, ann. of nat. hist. XX. p. 424. — (Vesp. mastivus) Vahl, Kiob. Selsk. Skriv. IV. tab. 132 fig. 7 (fide Gray). — Vesp. leporinus Linn. Schreb. I. S. 162. tab. 60. — Burmeiſt. Braſil. I. S. 60. — Chauve-souris V. Azar. ess. II, p. 280.

Paraguay, Braſilien, Surinam, nach Goſſe auch Jamaika. Größe der vorigen Art; die Klappe am Außenrande ebenfalls mit 4 kurzen Zacken verſehen. Rengger bezeichnet die Farbe der Oberſeite als graulichbraun, an der Kehle, Hals und Bauch röthlichgelb; längs des Rückgraths ein weißlichgelber Streifen. Ebenſo beſchreibt der Prinz von Wied das von ihm gefundene Exemplar. Ein anders, von Natterer eingeſandtes Individuum iſt auf der Oberſeite trüb kaſtanien-rothbraun, auf der Unterſeite licht bräunlichgelb, an den Seiten ſchwach röthlich überlaufen, der weißliche Rückenſtreif nur ſchwach angezeigt, die Krallen weißlich. Ein zweites von Natterer uns zugekommenes Exemplar, ebenfalls von Caiſſara, hat ungleich mehr Roth, ſo daß die Oberſeite geſättigt, aber trüb roſtroth iſt mit deutlichem gelblichen Rückenſtreif, die Unterſeite reiner, aber blaſſer roſtroth iſt, die Leibesſeiten lebhaft roſtroth. Dieſe Abänderung kömmt mehr mit der Charakteriſtik von Geoffroy überein. Burmeiſter will nach ſurinam'ſchen Exemplaren N. unicolor, dorsatus und albiventer in eine einzige Art vereinigen, was allerdings der Fall ſein könnte.

* N. affinis. D'Orbign., voy. dans l'Amér. mammif. p. 12. tab. 10. fig. 1, 2. — Tſchud. faun. peruan. I. S. 77.

D'Orbigny giebt folgende Notizen: Wohnt in der Provinz Mochos (Bolivien) unter Dächern. Farbe ziemlich licht zimmtbraun, unten blaſſer als oben; längs des Rückgraths ein Anzeichen von einem lichten Streifen, der vielmehr von der eigenthümlichen Anordnung der Haare als von einer Farbenänderung herrührt. Größe etwas geringer als die des N. leporinus oder rufipes. Länge des Vorderarmes 0,058 anſtatt 0,062 des andern. D'Orbigny iſt der Meinung, daß dieſer Haſenſchärtler nicht ſpecifiſch vom N. dorsatus geſchieden werden könne, was ebenfalls meine Anſicht iſt. — Tſchudi charakteriſirt ſeinen N. affinis, von dem er ein Exemplar in Tarma (Peru) 10,000 ü. M. erhielt, als dunkel ka-

stamienbraun, heller am Bauche; die Klappe gabelig, am innern Rande oben mit einem, am äußern mit 2 Zacken; die Nägel mittelmäßig. Körper 3" 4‴, Schwanz 9‴, seine Länge zu der der Schenkelflughaut = 1: 2, 5. Ein lichter Rückenstreif ist nicht erwähnt, vielleicht weil das Exemplar in Weingeist aufbewahrt war; die Angabe der äußern Zacken differirt mit der unsers Exemplares von N. dorsatus.

** N. albiventer Spix., der weißbäuchige Hasenschärtler; supra pallide ferrugineo-brunneus, subtus albicans, stria dorsali albida.

Noctilio albiventer. Spix, vesp. bras. p. 58 tab. 35 fig. 2, 3 (ganz unkenntlich). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 452. Anmerk. — ? Desmar. mammif. p. 118.

Ein einziges Exemplar davon, das Spix am St. Francisci-Flusse fand, existirt in der hiesigen Sammlung. Es ist bedeutend kleiner als die vorhergehenden Arten, indem der Vorderarm nur 2" 3‴ mißt. Der Rücken ist licht rostbraun (im Tone das Mittel zwischen N. unicolor und dorsatus haltend), mit weißlichem Rückenstreif; die Unterseite gelblichweiß, an den Seiten licht rostgelb. Der Schwanz ist kurz, die Schenkelflughaut lang und von den sehr langen Sporen eingesäumt; die Nägel klein und weißlich. Ich hatte früher dieses Exemplar fragweise für ein junges Individuum von N. dorsatus angesehen; da es indeß vollständig mit allen Zähnen versehen ist, und Natterer eben solche Exemplare mitbrachte, könnte doch durch sie eine eigene Art angezeigt seyn.

3. N. ruber Geoffr., der zimmtbraune Hasenschärtler; minor, cinnamomeus, subtus brunneo-flavescens; cauda marginem patagii fere attingente.

Noctilio ruber. Rengg. Paraguay S. 95. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 452. — Vespertilio ruber. Geoffr. ann. d. mus. VIII. p. 204. — Chauve souris XI. Azar. ess. II. p. 292.

Paraguay. Nach Rengger's Beschreibung beträgt die Länge von der Schnautze zur Schwanzwurzel 2" 2‴, Ohr 6‴, Schwanz 1" 2‴, Flugweite 9" 11‴. Die Oberseite ist zimmetbraun, der Bauch licht bräunlichgelb; kein weißer Rückenstreif. Die Flughaut erstreckt sich bis an das Fußgelenk und der Schwanz erreicht beinahe den Rand der Schen-

kelflughaut. Dieſe beiden Merkmale, ſo wie die geringere Größe unterſcheiden den N. ruber auffallend von N. dorsatus und affinis.

XXI. TAPHOZOUS. Grabflatterer.

Rostrum conicum, ad basin fovea excavatum; cauda patagio interfemorali magno brevior; dentes molares $\frac{4}{4}$ aut $\frac{3}{3}$.

Die Schnautze iſt coniſch, die Oberlippe breit, zwiſchen den Augen findet ſich eine einfache Grube, die Ohren ſind mittelmäßig, weit von einander abſtehend und mit einer Klappe verſehen. Die Schenkelflughaut iſt groß, ausgeſchnitten und durch lange Sporen unterſtützt. Der Schwanz iſt nur am Wurzeltheil umhüllt; ſein freies Ende iſt beim Fliegen ganz in die Haut einziehbar, beim Kriechen aber, wo die Schenkelflughaut nach dem Bauch gebogen iſt, frei aus ſelbiger hervorragend. Die Männchen haben meiſt eine Grube am Halſe. Schneidezähne giebt es gewöhnlich $\frac{4}{4}$, bei einigen Arten finden ſich jedoch im jugendlichen Zuſtande oben 2. Die Eckzähne haben einen ſtarken innern Zacken; Backenzähne ſind $\frac{8}{8}$ vorhanden. Heimath: Afrika und Südaſien.

†) species africanae.

1. T. nudiventris Rüpp., der nacktbäuchige Grabflatterer; **cano-brunneus, subtus sordide albidus; inguine, prymna, uropygio artubusque nudis.**

Taphozous nudiventris. Rüppell's Atlas S. 70. tab. 27. fig. b. 1—3. — Temm. v. d. Hoev. tijdschr. V. p. 7. tab. 1. fig. 1 — 3; monogr. II. p. 280 tab. 60. fig. 10—12 (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. II. S. 454.

Aegypten und Nubien. Länge bis zum Schwanzende $4\frac{1}{2}$″, Schwanz 1″, Ohr $9\frac{1}{2}$‴, Vorderarm $2\frac{1}{2}$″. Die Ohrklappe iſt beilförmig; unter dem Kinn findet ſich eine nackte Stelle; Kreuz, Hinterbauch und Gliedmaſſen ſind ganz nackt. Die Farbe iſt oben ſchmutzig lichtbraun, unten trübweißlich; die Haare ſind am Grunde weißlich; die nackte Gegend des Steißes und Hinterbauches iſt fleiſchfarbig.

2. T. perforatus Geoffr., der haarbäuchige Grabflatterer; **e rufescente canus, subtus dilutior, corpore toto piloso.**

Taphozous perforatus. Geoffr. descript. de l'Egypt. II. p. 126. tab. 3. n. 1. — Rüppell Atlas S. 70 tab. 27. fig. 4 bis 6 (Schädel). — Temm. v. d.

Hoev. tijdschr. V. p. 9. tab. 1. fig. 4 bis 6; monogr. II. p. 281. tab. 60. fig. 13 bis 15 (Schädel). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 454.

Aegypten. Länge bis zum Schwanzende 3″ 5‴, Vorderarm 2″ 4‴. Ganzer Körper behaart. Ohrklappe beilförmig. Oben rothgrau, die Haare am Grunde weiß; unten graulichbraun ins Weiße ziehend.

3. T. senegalensis Geoffr., der ſenegalſche Grabflatterer; fuscus, subtus e cinerascente brunneus; trago latissimo rotundato.

Taphozous senegalensis. Geoffr. descript. de l'Egypt. II. p. 127. — Temm. v. d. Hoev. tijdschr. V. p. 11; monogr. II. p. 283. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 455. — Lèrot volant. Daubent. mém. de l'acad. de Paris 1759. p. 386.

Senegal, nach Temminck auch in Sennaar. Körper 2″ 9‴, Vorderarm 1″ 9‴. Kleiner als vorige Art, Ohrklappe breit und gerundet. Farbe oben braun, unten heller mit graulichem Anflug; die Haare am Grunde grau.

* T. mauritianus Geoffr., der mauritziſche Grabflatterer; castaneo-fuscus, subtus rufescens, trago apice sinuato.

Taphozous mauritianus. Geoffr. descript. de l' Egypt. II. p. 127. — Desmar. mamm. p. 130. — Temm. monogr. II. p. 201. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 455. — Gray list of the Brit. mus. p. 32.

Ile de France. Körper 3½″, Schwanz 6½‴, Ohren 6‴. Sehr ähnlich dem T. perforatus, aber die Schnautze ſpitzig, der Schwanz kürzer als der Oberſchenkel, die Klappe unten mit einem Läppchen verſehen und oben mit buchtigem Rande. Der Pelz iſt oben kaſtanienbraun, unten röthlich. Das einzige, in der pariſer Sammlung aufbewahrte Exemplar iſt nicht mehr vorhanden. Nach 2 Exemplaren von Ile de France zählt Gray dieſe Art nebſt T. senegalensis zu T. perforatus.

4. T. leucopterus Temm., der weißflügelige Grabflatterer; griseus, gastraeo alisque magna ex parte albis.

Taphozous leucopterus. Temm. v. d. Hoev. tijdschr. v. p. 12. tab. 1. fig. 7; monogr. II. p. 284. tab. 60. fig. 7. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 456. — Peters Moſſamb. I. S. 55. tab. 13. fig. 20. 21 (Schädel).

Südafrika. Länge bis zum Ende der Schenkelflughaut 3½″, Vorderarm 2″ 1‴, Sporen 8‴. Der Pelz iſt oben dreifarbig, unten ein-

farbig: oben grausprenkelig, indem die Haare an der Wurzel lichtbraun, in der Mitte schwärzlich und an der Spitze hellgrau sind; die Unterseite rein weiß. Die Flügel sind längs der Seiten schwärzlich, weiterhin weiß, zwischen den Fingern lichtgrau; die Schenkelflughaut ist schwärzlich.

5. T. Peli Temm., der große Grabflatterer; maximus, unicolor castaneus; ingluvie excavatione sacciformi notata.

Taphozous Peli. Temm. esq. zool. sur la côte de Guiné p. 82.

Vom Boutry-Fluße an der Küste von Guinea, wo diese Art, die größte unter allen, von Pel entdeckt wurde. Länge von der Schnauze bis zum Ende der Schenkelflughaut 6″, Schwanz 1″ 4‴, wovon 6‴ frei, Vorderarm 3″ 2‴, Flugweite 19—20″. Nähert sich am meisten dem T. saccolaimus, indem sich unter dem Kinn ebenfalls eine Tasche findet, aus der eine stinkende fettige Materie abgesondert wird. Die Ohren sind groß und haben an der Basis einen gegen die Wangen gerichteten Hautfortsatz; die Klappe ist ebenfalls groß. Der Pelz ist wenig reichlich, sehr kurz und glänzend; er bedeckt nur den Körper und Kopf, und läßt alle hintern Theile und das Hautsystem völlig nackt. Auf der Oberseite ist der Pelz lebhaft und glänzend kastanienfarben, auf der Unterseite etwas heller und schmutziger. Das Gesicht ist nur mit einzelnen schwarzen Haaren besetzt. Die Häute sind schwarz.

††) species asiaticae.

6. T. saccolaimus Temm., der kehlsackige Grabflatterer; castaneus, plus minusve albo-maculatus, subtus canescens, ingluvie excavatione sacciformi notata.

Taphozous saccolaimus. Temm. v. d. Hoev. tijdschr. V. p. 14 tab. 1. fig. 8—12; monogr. II. p. 285. tab. 60. fig. 1. bis 6. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 456. — Cantor; journ. of the Asiat. soc. XV. p. 180. — T. pulcher. Elliot ann. of nat. hist. XV. p. 474. — T. crassus. Blyth ann. XV. p. 473.; journ. XXI. p. 348.

Java, Sumatra, Celebes, Buton, nach Cantor um Pinang und im südlichen Indien. Länge bis zum Schwanzende 4″, bis zum Rande der Schenkelflughaut 4″ 9‴, Schwanz 9‴, Vorderarm 2″ 9‴, Flugweite 16 bis 17″. Zwischen den Aesten des Unterkiefers findet sich eine sackförmige Vertiefung; beim Männchen außerdem noch eine Grube am Hal-

se, die eine stark riechende fettige Masse absondert. Die Farbe auf dem Kopfe ist schwarzbraun mit weißen Punkten; die übrige Oberseite kastanienbraun, mit weißen Haarflocken, die je nach der Jahreszeit mehr oder minder häufig sind. Die Unterseite ist selten mit weißen Flecken, gewöhnlich einfarbig matt braun oder graulich mit weißlichen Haarwurzeln. Die einjährigen Jungen sind oben hell rostbraun, unten blaßroth. Bei den südindischen und malakkischen Exemplaren wird die Unterseite rein weiß.

Blyth überzeugte sich neuerdings, daß sein T. crassus identisch ist mit T. saccolaimus.

7. T. philippinensis Wat., der philippinische Grabflatterer; castaneo-fuscus, subtus pallidior; pilis basi albidis; siphone gutturali nullo.

Taphozous philippinensis. Waterh. ann. of nat. hist. XVI. p. 55.

Von den Philippinen. Körper 3″ 1‴, Schwanz 8‴, Ohr 6‴, Vorderarm 2″ 7‴, Schienbein 11‴, Flugweite 13½″. Die Haare sind kurz, am Grunde fast weiß, oben röthlichbraun oder kastanienbraun, bisweilen braun. Die Unterseite ist immer blasser, bisweilen fast weiß, blos mit licht kastanienbraun überlaufen. Die Schwingen sind braun. Ohren an der Basis einander bis auf 2‴ genähert und ziemlich groß; die Klappe oben gerundet, unten eingezogen. Von T. saccolaimus verschieden durch geringere Größe, spitzigere und kürzere Schnautze und andere Färbung; mit T. longimanus übereinkommend durch den Mangel einer Kehlgrube oder eines nackten Fleckes an dieser Stelle, aber verschieden durch die Verhältnisse ꝛc. Noch näher liegt die Verwandtschaft mit T. Cantori oder bicolor, doch ist die Färbung bei diesen dunkler und der Schwanz länger.

8. T. melanopogon Temm., der schwarzbärtige Grabflatterer; rutilo-fuscus, subtus brunneo-albidus, pilis basi albis; gula maris barba nigra ornata.

Taphozous melanopogon. Temm. monogr. II. p. 287. tab. 60 fig. 8. 9 (Kopf und Schädel). — Cantor, journ of the Asiat. soc. XV. p. 180.

Java und malayische Halbinsel. Von der Schnautze bis zur Schwanzspitze 3″ 5‴, bis zum Rand der Flughaut 3″ 9‴, Schwanz 8‴, Vorderarm 2″ 2‴, Flugweite fast 13″. Die Kehlgrube fehlt, die Klappe endigt als gerundetes Blatt. Am Männchen sind die Haare in der untern

Hälfte weiß, auf der Oberseite mit schmutzig röthlichbraunen Spitzen, auf der Unterseite ebenso, aber die oberste Spitze ist weißlich; die des Hinterbauchs und der Binde längs der Seiten sind ganz weiß geendigt. Am Vorderhalse hängt ein langer Bart wie ein Halsband aus langen, durchgängig schwarzen, nur an den Spitzen braungefärbten Haaren herab. Den Weibchen und Jungen fehlt dieser Bart; die Haare der Oberseite sind am Grunde hellbraun und an der Spitze schmutzig dunkelbraun; auf der Unterseite weißlich, an der Spitze schmutzig braun, am Hinterbauch und der Flügelbinde weißlich. — Cantor bemerkt, daß bei den malayischen Individuen der Bart der Männchen mit einer breiten lichtbraunen Binde geendigt ist, das Uebrige der Unterseite ist weiß oder bräunlichweiß; übrigens fand er unter mehr als 40 Stück nur 7 gebärtete. Bei alten Männchen ist die Flügelhaut weißlich, bei Jungen oder Weibchen zwischen den Gliedmassen, längs der Leibesseiten und den Armen schwärzlich oder bräunlich.

9. T. longimanus Hardw., der langarmige Grabflatterer; saturate fuscus, subtus parum pallidior; pilis unicoloribus, apice paululum dilutioribus; siphone gutturali maris magno.

Taphozous longimanus. Hardw. Linn. transact. XIV. p. 525 tab. 17. — Temm. monogr. II. p. 289. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 475. — Blyth, journ. of the Asiat. soc. XI. 2 p. 784; ann. of nat. hist. XV. p. 472. — T. brevicaudus. Blyth journ. of the Asiat. soc. X. p. 976, XXI. p. 348; ann. of nat. hist. XV. p. 472.

Calcutta; zuerst von Hardwicke, aber sehr ungenügend beschrieben, auch Temminck konnte diesen Mängeln wenig abhelfen, da er nur einen verstümmelten Balg vor sich hatte, so daß erst Blyth nach Vorlage vieler Exemplare diese Art sicher begründete. Länge bis zum Schwanzende 4½ bis 4¼″, Schwanz 1″, Vorderarm 2⅝″, Flugweite 15½ bis 16½″. Die Ohren sind nicht flach ausgebreitet, sondern etwas aufgerichtet. Der Schwanz, wenn aus der Flughaut vorgestreckt, bleibt gerade. Der Kehlsack ist auffallend groß und hinter ihm eine kleinere Grube. Der Pelz ist dunkelbraun, nur an den Haarspitzen mit etwas lichterem Tone, am Grunde nicht weiß; die Unterseite ist wenig blasser als die obere, aber die Kehle dunkelroth gefärbt; die Häute bräunlich rußfarben. Zwischen

den Geschlechtern ist in der Färbung kein Unterschied, auch ändert diese wenig, denn nur bei einem Exemplare wurde ein gelblicher oder falber Anflug wahrgenommen. — Seinen T. brevicaudus hat Blyth jetzt selbst wieder eingezogen, da er sich überzeugte, daß er nur auf ein schlecht ausgestopftes Exemplar begründet war.

* T. fulvidus Blyth., der kastanienfarbige Grabflatterer; castaneo-fuscus, pilis basi fulvido-brunneis, apice pallidioribus; siphone gutturali maris distincto.

Taphozous fulvidus. Blyth. journ. of the Asiat. soc. X. 2 p. 975. fig. 1., XXI. p. 348; ann. of nat. hist. XV. p. 472.

Calcutta. Länge bis zum Schwanzende 4″, Schwanz ¾″, Vorderarm 2⅝″, Flugweite 15″. Die Ohren sind aufwärts gerichtet, der Schwanz ist bei der Ausstreckung gerade; am Vorderhalse des Männchens findet sich eine große Grube, die viel kleiner beim Weibchen ist. Die Färbung ist im Allgemeinen ziemlich hell kastanienbraun, der Bauch schwach gebräunt und weniger kastanienfarbig überlaufen. Die Haare sind blaß falbbraun am Grunde, gegen das Ende gesprenkelt mit dunklerem Braun, die äußerste Spitze weißlich; die Unterseite ist schwächer gesprenkelt. Gesicht, Ohren und Häute sind dunkel überlaufen, der Rand der Schwingen zwischen den Hinterbeinen und dem letzten Finger ist weißlich. — Neuerdings überzeugte sich Blyth, daß dieser T. fulvidus blos eine falbliche Abänderung von T. longimanus ist.

** T. Cantori Blyth, der flachohrige Grabflatterer; fuscus, subtus pallidior, pilis basi albis; auriculis plane expansis, cauda recurva, siphone gulari parum distincto.

Taphozous Cantori. Blyth journ. of the Asiat. soc. XI. 2. p. 784; ann. of nat. hist. XV. p. 472; (T. longimanus?) journ. of the Asiat. soc. X. 2. p. 974 fig. 2; XXI. p. 348.

Calcutta, Nellore (Küste von Koromandel). Länge bis zum Schwanzende 4½″, Schwanz 1″, Vorderarm 2½″, Flugweite 16″. Die Ohren sind ziemlich entwickelt, wie gewöhnlich außen nackt, ausgenommen an ihrer hintern Basis und einer Falte an dieser; innen finden sich nur einige kleine Haare. Der Schwanz, wenn er bei eingezogener Schenkelflughaut frei vorragt, ist aufwärts gekrümmt. Die Haare sind oben dunkelbraun, an der Spitze

etwas lichter, am Grunde reinweiß; auf der Unterseite blasser, ausgenommen an der Kehle, indem sie deutlicher bräunlichgrau zugespitzt sind. Die Häute sind dunkler als der Rücken. Diese Art ist, wie Blyth zufügt, leicht erkennbar durch ihre flach ausgebreiteten Ohren, gekrümmten Schwanz, wenig entwickelte Kehlgrube und die weiße Färbung der Haare am Grunde. Indeß neuerdings ist Blyth selbst zweifelhaft geworden, ob dieser T. Cantori in der That specifisch von T. longimanus abweicht.

10. T. bicolor Temm., der zweifarbige Grabflatterer; pilis omnibus basi albis, apice nigro-fuscis; auriculis ovalibus longis glabris.

Taphozous bicolor. Temm. v. d. Hoev. tijdschr. V. p, 18; monogr. II. p. 200. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 458.

Vorderindien, woher Roux aus Calcutta viele Exemplare einsandte. Länge 3″ 6‴, wovon der Schwanz 10‴ einnimmt, Vorderarm 2″ 2‴, Flugweite 13″. Die Ohren sind ganz glatt mit beilförmiger Klappe; der Schwanz ist völlig nackt ohne Spur von Haaren. Alle Haare von der Wurzel an weiß, mit schmutzig schwarzbrauner Spitze; die Häute schwarz. Von einer Kehlgrube sagt Temminck nichts. — Wahrscheinlich ist diese Art, die allerdings noch nicht sicher begründet ist, identisch mit T. Cantori, was um so mehr anzunehmen ist, da Blyth ihrer gar nicht gedenkt, vielmehr für Vorderindien dermalen nur 3 Arten anerkennt: T. saccolaimus, melanopogon und longimanus.

11. T. australis Gould, der neuholländische Grabflatterer; ferrugineo-brunneus, subtus cinereus, pilis basi albis, auriculis elongatis, trago brevi falcato.

Taphozous australis Gould mamm. of Austral. VI, (1854).

Von Mac Gillivray in den Sandsteinhöhlen der Insel Albany, Kap York (Nordküste von Neuholland) in Menge entdeckt. Länge 3″, Schwanz 1″, wovon ½″ frei vorragt, Vorderarm 2½″, Ohren 1″. Schneidezähne $\frac{2}{2}$, Backenzähne jederseits $\frac{2+3}{2+3}$. Die obern Schneidezähne sind sehr klein und einfach, die untern dreilappig. Die Ohren sind ziemlich groß, länglich, innen mit zerstreuten Härchen dünn besetzt, am innern Rande mit einer Reihe kleiner Höcker; die Klappe mißt ½ der Ohrlänge und ist etwas sichelartig gekrümmt mit verschmälerter Basis. Die Flügel

sind unten längs der Arme mit einer Binde zerstreuter weißlicher Haare gesäumt, und die Basis der Schenkelflughaut ist oben ziemlich dick behaart. Der Pelz ist oben entweder rostbraun, in der Mitte des Rückens und über den Bauch lichtbraun, oder ganz bräunlichgrau, wobei die Haare in der Unterhälfte weiß sind. Der Unterleib ist aschgrau, bisweilen mit schwachem röthlichen Anfluge; die Schnautze ist schwarz. — Noch ist bemerklich zu machen, daß die Abbildungen zwischen den Aesten des Unterkiefers einen nackten rhombischen Fleck anzeigen.

XXII. EMBALLONURA. Spitzschwirrer.

Rostrum conicum, fovea nulla, labia simplicia, cauda patagio interfemorali magno brevior; dentes primores $\frac{2}{3}$ aut $\frac{4}{4}$.

Die Spitzschwirer kommen mit den Grabflatterern darin überein, daß sie eine große Schenkelflughaut haben, in welcher der viel kürzere Schwanz beim Fluge verborgen liegt, während er in der Ruhe mit seiner Spitze frei aus ihr hervortritt. Dagegen unterscheiden sie sich von ihnen gleich dadurch, daß sie keine Grube am Anfange der Stirngegend haben und statt 4 unterer Schneidezähne mit 6 versehen sind.

Die Schnautze ist zugespitzt und insbesondere der Oberkiefer mehr oder minder über den untern vorragend. Die Ohren sind mittelmäßig, weit von einander entfernt, mit sehr kurzer Klappe. Gruben am Vorderhalse sind nicht vorhanden, dagegen hat man bei 2 Arten in der Gegend des Ellenbogens Säcke gefunden, die eine ähnliche fette Masse aussondern wie die Kehlgruben der Grabflatterer. Der Schädel ist sehr ausgezeichnet, indem er sich in der Augenhöhlengegend stark zusammenzieht und mit langen, vom Stirnbein kommenden Orbitalstacheln versehen ist. Der Zwischenkiefer ist zangenförmig und die Lücke zwischen den Spitzen nur durch Knorpelmasse ausgefüllt. Schneidezähne $\frac{4}{6}$ oder $\frac{4}{4}$, indem mit dem Alter ein Paar der obern Vorderzähne verloren geht; nach Temminck sind bei E. monticola in der Jugend sogar $\frac{4}{8}$ Schneidezähne vorhanden. Die obern Vorderzähne sind sehr fein und spitz; die untern dreilappig. Jeder obere Eckzahn hat am Grunde einen kleinen Nebenzacken; an den untern Eckzähnen sind diese nur wenig merklich. Backenzähne $\frac{5}{5}$. — Tem-

minck hat von Emballonura eine Gattung Urocryptus getrennt und sie durch den Mangel der obern Schneidezähne von jener unterschieden; da aber Natterer bei seinem Urocryptus 2 obere Schneidezähne vorgefunden hat, so fällt der Grund zur generischen Trennung weg. Gray's Gattungen: Centronycteris, Mosia und Mystacina habe ich ebenfalls mit Emballonura vereinigt, da wenigstens die von ihm angegebenen Merkmale zur Scheidung mir nicht ausreichend schienen [1]).

Gehören hauptsächlich Südamerika an, zwei Arten jedoch finden sich in Südasien, eine in Afrika und zwei auf den polynesischen Inseln.

†) nasus valde productus, nares tubulares. — Emballonura und Centronycteris Gray.

1. E. afra Pet., der afrikanische Spitzschwirrer; ferrugineo-fusca, subtus pallidior; dentibus primoribus superioribus 2.

Emballonura afra. Peters Mossamb. I. S. 51. tab 12. (Thier), tab. 13. fig. 18, 19 (Schädel).

Von Peters in dunklen Kellerräumen in Tette (Mossambique) entdeckt, wo sie massenweise vorkommt. Länge bis zum Schwanzende fast 3″, Schwanz 9‴, Vorderarm 1″ 10‴. Bei mehr als 100 Exemplaren fand Peters stets nur 2 obere Schneidezähne. Die Ohren sind um ¼ kürzer als der Kopf, dreieckig abgerundet und nur an der Basis und am Längskiel behaart. Die Klappe ist doppelt so lang als breit. Die Nase tritt oben doppelröhrig hervor und ist zu jeder Seite schräg abgestutzt. Schwanz und Sporen sind ohngefähr so lang als der Unterschenkel. Die Behaarung ist dicht und weich, von Farbe braun, rauchbraun, schokoladebraun oder, wie in den meisten Fällen, dunkelrostbraun, an der Bauchseite etwas heller. Die einzelnen Haare sind auf der Rückenseite und dem Kopfe einfarbig braun bis auf den ganz kurzen weißlichen Grundtheil; die Bauchhaare haben außer dem hellen Grundtheile auch noch ganz kurze blasse Spitzen. Flügel und Ohren sind von derselben braunen Farbe,

---

1) Noch stellt Gray in die Nähe von Emballonura die Gattung Aello von Leach (mit A. Cuvieri), sie ist indeß von Letzterem so ungenügend geschildert, daß sie nicht wieder erkennbar ist (vgl. Schreb. Supplem. I. S. 465.)

aber etwas dunkler. Die Nägel bräunlichweiß. — Dieſe Art iſt in der Färbung und Geſtalt am nächſten mit E. monticola verwandt, letztere iſt aber kleiner und hat 6 oder 4 obere Schneidezähne.

2. **E. monticola** Temm., der ſundaiſche Spitzſchwirrer; saturate fusca, subtus dilutior; pilis bicoloribus, dentibus primoribus superioribus 6 aut 4.

Emballonura monticola. Temm. v. d. Hoev. tijdschr. v. p. 25 tab. 2. fig. 1, 2; monogr. II. p. 294. tab. 61. fig. 1, 2. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 460.

Java. Länge bis zum Schwanzende 2″ 8‴, Schwanz 5‴, Vorderarm 1″ 7‴, Flugweite 9″. Die Schnautze iſt ſpitz und die Naſenlöcher bilden zwei vorſpringende Röhren. Die Haare ſind zweifarbig: auf der Oberſeite am Grunde gelblichweiß, das Uebrige ſchön dunkel ſchokoladebraun; auf der Unterſeite am Grunde braun, die Spitzen hell ſchokoladebraun; bei Einigen Kopf und Vorderhals ſpaniolfarben.

3. **E. saxatilis** Spix., der gezottelte Spitzſchwirrer; cano-brunnea, subtus albido-cana; naso valde prominente, calcaribus elongatis.

Proboscidea saxatilis, Spix vesp. bras. p. 62. tab. 35. fig. 8. — Emballonura saxatilis. Temm. v. d. Hoev. tijdschr. V. p. 27; monogr. II. p. 296. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 460. — Vespertilio Naso. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 274. mit Abbild.

Am Franciſci- und Mucuri-Fluße in Braſilien. Körper 1″ 9‴, Schwanz 7‴, Vorderarm 1″ 6‴, Sporen 10‴. Die Naſe iſt um eine gute Linie über den Unterkiefer vorgeſtreckt; die Ohren ſind ſchmal und zugeſpitzt. Die Oberſeite iſt graulichbraun, die Unterſeite blaß weißlichgrau, wobei die Haare der Oberſeite dunkel roſtigbraun ſind mit kurzen graulichen oder gelblichen Spitzen, die der Unterſeite aber blos am Grunde braun, im übrigen größern Theile ihrer Länge graulichweiß. Arme, Hinterbeine, Flügel längs der Leibesſeiten und obere Hälfte der Schenkelflughaut ſind mit Büſchelchen weißlicher oder gelblicher Haare beſetzt [1]).

---

1) Spix führt noch eine zweite Art an: Proboscidea rivalis vom Amazonenſtrom an, von der er im Vergleich zu P. saxatilis ſagt: differt corpore minore, supra fusco-brunneo, subtus pallide brunneo., alis supra caput longe prominentibus. Ich habe in hieſiger Sammlung kein Exemplar der Art vorgefunden.

4. E. canina Neuw., der hundsschnautzige Spitzschwirrer; fuliginosa, alis nudis, calcaribus mediocribus.

Vespertilio caninus. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 262 mit Abbild. — Emb. canina. Temm. v. d. Hoev. tijdschr. V. p. 29; monogr. II. p. 298. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 462; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 151. tab. 3. fig. 5 (Kopf), 6, 7 (Drüsensack). — Reinhardt ann. of nat. hist. sec. ser. III. p. 386. — Burmeist. Brasil. I. S. 63.

Südbrasilien. Körper 2″, Schwanz 8‴, Vorderarm 1″ 6‴, Sporen 6¾‴. Die Nase ist stark vorgestreckt, die Stirne durch den starken Pelz hoch erhaben, die Sporen sind nicht so lang als bei E. saxatilis. Die Schenkelflughaut ist behaart, die Flügel nackt. Der Pelz ist lang, weich, einförmig und trüb rostig rußbraun, mit schiefergraulichem Schimmer; die Unterseite ist nur wenig blasser als die obere. Die Haare sind einfarbig mit etwas lichteren Spitzen.

Auf der Oberseite des Armfittigs befindet sich am Rande, dem Ellenbogenwinkel gegenüber, beim Männchen ein mit einer Spalte geöffneter Drüsensack (vergl. die oben angeführte Abbildung, ferner Reinhardt a. a. O.).

5. E. calcarata Neuw., der langgespornte Spitzschwirrer; rutilo-fusca, subtus pallidior, calcaribus longissimis, alis usque ad digitorum pedis basin adnatis.

Vespertilio calcaratus. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 259, mit Abbild. — Emb. calcarata. Temm. v. d. Hoev. tijdschr. V. p. 30; monogr. II. p. 299. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 462.

Südostküste Brasiliens. Körper 1″ 10‴, Schwanz 5 ¾‴, Sporen 1″ 2‴. Die Schnautze ist etwas zugespitzt, der Oberkiefer länger als der untere, die Ohren sind schmal lanzettförmig, die Sporen so lang, daß sich ihre Spitzen fast berühren. Schenkelflughaut und Flügel sind an den Leibesseiten behaart. Die Oberseite ist röthlichbraun, die Unterseite bläßer, röthlichfahl.

††) nasus valde productus, nares tubulares, dorsum striis 2 longitudinalibus albidis signatum. — Urocryptus Temm.

6. E. bilineata Temm.; der zweistreifige Spitzschwirrer; supra fuliginoso-fusca, subtus pallidior.

α) pilis gastraei basi fuscis, apice pallide cinereis.

Urocryptus bilineatus. Temm. v. d. Hoev. tijdschr. V. p. 33 tab. 2. fig. 3, 4; monogr. II. p. 301. tab. 61. fig. 3, 4. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 463.

β) pilis gastraei basi fuscis, apice pallide brunneis.

Var. α. von Surinam, von Temminck folgendermaſſen charakteriſirt. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Backenzähne $\frac{5:5}{5:5}$; Schnautze ſehr ſpitz, Naſenlöcher röhrenförmig; Ohren mittelmäßig, länger als breit, zugeſpitzt, am äußern Rande ausgeſchnitten; Ohrklappe am innern Rande gerade, am äußern gekrümmt und abgerundet. Schenkelflughaut ſehr groß. Oberſeite rauchbraun; auf der Unterſeite die Haare am Grunde braun, an der Spitze licht aſchfarbig. Länge bis zum Schwanzende 2″ 9‴, Schwanz 6‴, Vorderarm 1″ 8‴.

Var. β. in der Umgebung von Rio Janeiro durch Natterer entdeckt. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, alſo in derſelben Anzahl, wie ich ſie bei E. canina, brevirostris und macrotis gezählt habe. Körper 2″ 2‴, Schwanz 6‴, Ohr 5‴, Vorderarm 1″ 7¼‴, Sporen 8‴, Schienbein 8¼‴. Im äußern Habitus wie E. saxatilis. Die Schnautze iſt ſehr ſpitz, die Naſenlöcher röhrenförmig; an der Spitze der Unterkinnlade 2 Warzen. Ohren mittellang, ſtumpf zugeſpitzt, am innern Rande convex, am äußern ſtark bogenförmig ausgerandet und quergeſtreift; die Klappe ſehr kurz, ſtumpf, am innern Rande gerade, am äußern etwas convex. Die Schenkelflughaut iſt groß, faſt gerade abgeſchnitten, und auf ihrer Unterſeite mit Querreihen von kleinen Haarbüſcheln beſetzt; die Flügel ſind an der Fußwurzel angeheftet. Die Oberſeite iſt rußig dunkelbraun, die Haare einförmig. Die Unterſeite iſt lichtbraun, wobei die Haare in ihrer untern Hälfte dunkelbraun. Zwei graugelbliche Längslinien verlaufen über den Rücken. Die Ohren und Flügel ſind ſchwärzlich. — Bei der großen geographiſchen Entfernung dieſer beiden Spitzſchwirrer von einander könnten ſie wohl 2 Arten ausmachen, wie es auch ſchon die Färbung der Unterſeite andeutet; iſt Temmincks Zeichnung richtig, ſo wäre in der Form der Ohren eine noch größere Differenz vorhanden. Die braſiliſche Art könnte man dann als E. insignis bezeichnen.

7. E. lineata Temm., der weißſtreifige Spitzſchwirrer; supra fusca, subtus albida; dorso striis 2 aut 3 albidis minus distinctis.

Emballonura lineata. Temm. monogr. II. p. 297.

Surinam. Körper 1" 7‴, Schwanz 6‴, Schenkelflughaut 1", Vorderarm 1" 4‴. Die Ohren sind mittelmäßig, die Sporen sehr lang, Schneidezähne $\frac{4}{4}$, daher wohl Temminck diese Art von Urocryptus getrennt hat, der sie ihrer Färbung nach angehört. Die Oberseite ist schwarzbraun mit feinen lichtbraunen Haarspitzen, auf der Unterseite sind die Haare nur am Grunde braun, das Uebrige ist weißlich. Längs des Rückens verlaufen 2 oder 3 schwach markirte weißliche Streifen; eine kleine weiße Binde längs der hintern Wurzel der Ohren. Die Flügel sind dunkelbraun, längs der Seiten und auf dem Vorderarm mit einigen weißlichen Haaren besetzt.

†††) nasus valde productus, basi setis brevibus circumcinctus. — Mystacina Gray.

8. E. tuberculata Forst., der neuseeländische Spitzschwirrer; fusca, pilis apice brevi albis; subtus pallidior.

Mystacina tuberculata. Gray in Dieffenb. trav. in New Zealand II. p. 296. — Vespertilio tuberculatus. G. Forster, icon. inedit. in Brit. Mus. tab. 1.

Neuseeland. Größe nicht angegeben. Seine Gattung Mystacina charakterisirt Gray in der Zool. of Sulphur, mamm. p. 23 als: Nase sehr vorgestreckt, an der Basis mit einer Reihe kurzer steifer Borsten umgeben, Schenkelflughaut abgestutzt, Schneidezähne $\frac{4}{4}$, obere groß. In Dieffenbach's Reise sagt er: von Emballonura und Urocryptus verschieden, indem sie nur 2 große Schneidezähne in der Mitte des Oberkiefers hat; Pelz dicht, aufgerichtet, dunkelbraun, mit kurzen weißen Spitzen, die Unterseite blasser. Um die Basis der Schnautze eine Reihe kurzer starker schwarzer Borsten; Schwingen am Leibe und den Gliedmassen verdickt und quer ausgehöhlt; Ohrklappe länglich, pfriemenförmig.

††††) rostrum abbreviatum, labia incrassata.

9. E. brevirostris Wagn., der kurzschnautzige Spitzschwirrer; tota rufo-castanea; auriculis abbreviatis latiusculis; rostro brevi tumido acuminato; alis metatarso affixis.

Emballonura brevirostris. Wagn. Wiegm. Archiv 1843. S. 367; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 187.

In Brasilien durch Natterer entdeckt. Körper 2" 1‴, Schwanz 6‴, Vorderarm 1" 8½‴, Sporen 6½‴. Die Schnautze ist nicht so lang und spitz wie bei E. canina, aber auch nicht so platt wie bei E. macrotis, dabei ziemlich angeschwollen; die Oberlippe weniger als bei dieser über die untere vorragend. Die Ohren sind im Umrisse denen von E. macrotis ähnlich, aber weder so lang, noch so breit, daher auch weiter voneinander abstehend. Der Pelz ist schön roströthlich kastanienfarben, was nur auf dem Bauche etwas trüber ist.

10. E. macrotis Wagn., der großohrige Spitzschwirrer; fusca, auriculis amplissimis approximatis; rostro depresso, alis tarsum vix attigentibus.

Emballonura macrotis. Wagn. Wiegm. Archiv 1843. S. 367; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 189 tab. 3 fig. 8 bis 10 (Kopf).

Von Natterer in der Provinz Mato grosso (Brasilien) entdeckt. Körper 1" 11‴, Ohrlänge 6‴, Ohrbreite 4½‴, Abstand der Ohren 1½‴, Schwanz 5½‴, Vorderarm 1" 8‴, Sporen 6½. Die Schnautze ist scharf, aber kurz zugespitzt und sehr platt gedrückt. Die Ohren sind lang und breit, so daß sie sich sehr genähert sind, was von allen andern Arten unterscheidet. Der Pelz ist dunkelbraun, auf der Unterseite weit lichter.

11. E. nigrescens Gray, der schwärzliche Spitzschwirrer; supra saturate fusca; auriculis mediocribus, alis ad digitorum basin affixis.

Mosia nigrescens. Gray ann. of nat. hist. 1843 p. 117; voy. of the sulph. mamm. p. 25. tab. 6. fig. 2.

Südamerika. Körper 1" 7‴, Schwanz 4‴, Vorderarm 1" 3½‴, Sporen 4½‴. Gray errichtete aus dieser Art seine Gattung Mosia, von der er meint, daß ihr auch E. canina zugehören könnte, was aber durchaus nicht der Fall ist. Von Emballonura unterscheidet er Mosia, daß bei dieser die Nase abgestutzt und nicht verlängert ist und die Nasenlöcher nicht röhrenförmig sind; ferner bezeichnet er die Lippen als ziemlich dick, die Schenkelflughaut als abgestutzt, Schneidezähne ¼. Die Farbe ist dunkelbraun, unten blasser; die Schenkelflughaut unten mit einzelnen Haaren besetzt. Die Ohren sind ziemlich groß und zugespitzt.

12. E. leptura Schreb., der Beutel-Spitzschwirrer; brunneo-cana; sacculo parvo ad antibrachii basin.

Vespertilio lepturus. Schreb. I. S. 173. tab. 57. — Taphozous lepturus. Geoffr. descript. d. l'Egypt. II. p. 126. — Temm. monogr. II. p. 291. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 458. — Saccopteryx lepturus. Illig. prodr. mammal. p. 121. — Gray, ann. of nat. hist. XVI. p. 279. — Krauß Wiegm. Archiv XII. S. 178. tab. 6. (Schädel und Sack).

Surinam. Körper 1″ 8‴, Schwanz 6‴, Ohren 7‴, Schenkelflughaut 11‴, Flugweite 7½″. Der Schädel ist von der typischen Form der Gattung Emballonura mit ⅔ Vorderzähnen; hiedurch, so wie durch den Mangel einer Grube vor der Stirne ist diese Art von Taphozous verschieden. Die Schnautze ist stumpf, die Lippen vorspringend, groß und breit; die Nasenlöcher stehen dicht neben einander; die Ohren sind mittelmäßig und länglich, die Klappe ist klein. In der Nähe des Ellenbogens liegt auf der Unterseite ein 4‴ langer und 2‴ breiter Sack, der auf der Rückenseite sich mit einer Spalte öffnet. Der Pelz ist bräunlichgrau, unten etwas bläßer.

13. E. Alecto Gerv., der manillische Spitzschwirrer; nigricans, auriculis longioribus quam latioribus, trago cultriformi.

Nycticejus Alecto. Gerv. voy. aut. d. monde par Laplace, zool. p. 7.; R. de la Sagra hist. de Cuba, mamm. p. 533. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 551.

Manilla. Länge 1″ 9‴, Schwanz 6‴, Vorderarm 1″ 8‴, Flugweite 10½″. Von Gervais anfangs fälschlich zu Nycticjus, später zu Emballonura gestellt. Der Kopf ist dick, die Schnautze breit und deprimirt; die Klappe länger als breit, am innern Rande gekrümmt, am äußern fast gerade. Der Schwanz ist um die Hälfte kürzer als die Schenkelflughaut, letztes Glied frei. Die Farbe ist schwärzlich, auf der Unterseite der Flügel ins Braune, auf der Schnautze ins Grauliche übergehend.

14. E. semicaudata Peale, der samoanische Spitzschwirrer; fuligi-noso-fusca, subtus pallidior; auriculis angustis, trago brevi apice dilatato, rotundato.

Vespertilio semicaudatus. Peale, Unit. St. explor. exped. VIII. mamm. p. 23. tab. 3 fig. 2.

Auf den Samoan-Inseln und Upolu. Körper 1″ 6‴, Schwanz 0, 6,

Schenkelflughaut über den Schwanz 0, 8, Ohren 0, 4, Klappe 0, 1‴. Gebiß: Schneidezähne $\frac{2\cdot2}{6}$, Eckzähne $\frac{1}{1}:\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{2}{2}:\frac{2}{2}$. Die sonderbare Formel für die Eckzähne rührt daher, daß Peale den obern Lückenzahn wegen seiner eckzahnähnlichen Form für einen Eckzahn angesehen wissen will. Die Schnautze ist breit und stumpf, die Lippen mäßig und hängend wie bei einer Dogge (?), der Schwanz nur die Hälfte der Schenkelflughaut erreichend und auf ihr mit freier Spitze endigend. — Kann kein Vespertilio seyn, sondern gehört nach der Beschreibung (die Abbildung habe ich noch nicht gesehen) zu Emballonura.

XXIII. DICLIDURUS. Klappenschwanz.

Caudae externae loco valvulae duae corneae, patagio interfemorali affixae.

Lange Zeit war das vom Prinzen von Wied beschriebene Exemplar das einzige, das in einer europäischen Sammlung existirte, bis vor Kurzem das brittische Museum ein zweites erlangte, das Gray folgendermassen charakterisirt. Nase einfach, abgerundet, behaart; Ohren groß, rundlich, Klappe mäßig, am Ende abgerundet, an der Basis eingezogen. Schwanz verlängert, ohngefähr bis zur Mitte der Schenkelflughaut reichend, von gewöhnlicher Bildung, mit Ausnahme der beiden letzten Glieder, die ausgebreitet, hornig und hohl sind: das vorletzte Glied quer und halbmondförmig, das letzte dreieckig herzförmig und in das vorige passend. Schenkelflughaut und Sporen sehr groß; unteres Daumengelenk lang und von der Haut eingehüllt, oberes sehr kurz. Nach der Angabe des Prinzen von Wied sind vorhanden $\frac{4}{6}$ Schneidezähne und $\frac{2}{2}:\frac{2}{2}$ Backenzähne.

1. **D. albus** Neuw., der weiße Klappenschwanz; villosus, albus.

Diclidurus albus. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 242 mit Abbild. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 465. — Temm. monogr. II. p. 303. tab. 60. fig. 16. (Schenkelflughaut). — Gray, voy. of the Sulphur, mamm. p. 25 tab. 8 fig. 1.

Mündung des Rio Pardo (Pr. v. Wied), Pueblo Nuevo in Centralamerika (Gray). Ganze Länge 2″ 10‴, Vorderarm 2″ 4‴, Sporen 9½‴. Behaarung lang und weißlich, Schwanzklappen schwärzlichbraun. Gray bezeichnet die Haare des Rückens als rein weiß bis zur

Wurzel; die der Unterseite im untern Drittel ihrer Länge bleifarbig, das Uebrige weiß.

b) Macrura. Langschwänze.

Cauda patagio interfemorali longior, apice longa libera.

Während bei den Stummelschwänzen der Schwanz den Rand der Schenkelflughaut nicht erreicht, springt er bei den Langschwänzen mit einer mehr oder minder langen Spitze über denselben hervor.

XXIV. PTERONOTUS. Schmalhafter.

Patagium interfemorale conicum, basis alarum angustata.

Da nur wenige Notizen über diese von Gray errichtete Gattung vorliegen, so kann sie hier einstweilen blos eine provisorische Stelle einnehmen.

1. Pt. Davyi Gray, der westindische Schmalhafter.

Pteronotus Davyi. Gray, voy. of the Sulphur, mamm. p. 24.

Insel Trinidad. Die Schwingen sind längs des Rückens nur in einer kurzen Linie angeheftet, die Ohren sind seitlich gestellt, das Kinn ist mit zwei queren Hautfalten versehen, und die Füße sind frei.

XXV. CHIROMELES. Handgrämler.

Corpus fere totum nudum, auriculae sejunctae, pollex podariorum liber, oppositus, ungue lamnari instructus.

Ganz vom Habitus der Grämler, aber von ihnen dadurch verschieden, daß fast der ganze Körper nackt, die Ohren voneinander getrennt und völlig seitlich gestellt sind und der Daumen der Hinterfüße von den übrigen Zehen abgerückt, ihnen entgegensetzbar und mit einem großen platten Nagel versehen ist. Die Oberlippe ist nicht gefaltet. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Backenzähne $\frac{4:4}{4:4}$. Auf den sundaischen Inseln und in Hinterindien einheimisch.

1. Ch. caudatus Temm, der sundaische Handgrämler; totus nudus, siphone jugulari distincto.

Chiromeles caudatus. Temm. monogr. II. p. 348 tab. 66. — Ch. torquatus. S. Müller verhandel. I. p. 22.

Java, Sumatra und Borneo. Körper 4″ 6‴, Schwanz 2″, sein freies Ende 1″ 6‴, Vorderarm 2″ 9‴, Ohren 1″ bis 1″ 3‴. Ganz nackt, nur an der Grube, die bei beiden Geschlechtern am Vorderhalse vorhanden ist, am Schwanzende und am Daumen der Hinterfüße finden sich einige Haare. Der Körper ist oben schwarz, unten bräunlich. Nach S. Müller verbreitet das Sekret der Halsgrube einen unerträglichen betäubenden Gestank.

2. Ch. torquatus Horsf., der halsbindige Handgrämler; minor, collo fascia pilosa cincto, siphone nullo.

Chiromeles torquatus. Horsf. zool. research. n. 8. mit Abbild.; catal. East Ind. mus. p. 42. — Dysopes cheiropus. Temm. monogr. I. p. 218 tab. 17. (fig. Horsf.), tab. 23 fig. 1 bis 5 (Schädel). — Dysopes torquatus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 470.

Hinterindien; das einzige bisher bekannte Exemplar kam mit einer Sendung aus Siam. Ganze Länge 5″ 2‴, Vorderarm 3″. Temminck unterscheidet diese Art von der vorhergehenden durch geringere Größe, durch ums Doppelte kürzeren Schwanz und gänzlichen Mangel einer Halsgrube, dazu wird noch gerechnet werden dürfen, daß der Hals von einer Krause brauner Haare umgeben ist.

XXVI. DYSOPES. Grämler.

Auriculae amplae conniventes, rostrum crassum, labrum tumidum laxum.

Der Körper ist untersetzt, der Kopf dick mit angeschwollenen Lippen, von denen die obere mehr oder minder herabhängt. Die Ohren sind breit, vorwärts geneigt, abgerundet, auf der Stirne zusammenstoßend, am Ende des Außenrandes mit einem rundlichen Läppchen, das irrig für die Klappe angesehen worden ist; letztere sitzt ziemlich tief innerlich am Grunde. Die Flügel sind im Verhältniß zum robusten Körper schmal, die Schenkelflughaut ist ebenfalls schmal, der Schwanz mehr oder minder lang und mit seiner Spitze frei über deren Rand hinausragend. Vorderzähne $\frac{4}{4}$, $\frac{2}{2}$, $\frac{2}{2}$, $\frac{1}{1}$, $\frac{2}{2}$, je nach dem Alterstande, so daß darnach, wie es Geoffroy mit seinen beiden Gattungen Nyctinomus (4 Schneidezähne) und (Molossus (2 Schneidezähne) machte, keine generischen Scheidungen vorgenommen werden können. Backenzähne ge-

wöhnlich $\frac{1}{1}$, seltener $\frac{2}{2}$. Am Schädel ist das Stirnbein ohne Orbitalstachel. Ueber die warmen Länder beider Erdhälften verbreitet.

1. Subgen. Nyctinomus Geoffr. Gray.

Labium superius rugosum.

†) europaeo-africani.

1. D. Cestonii Savi, der mittelländische Grämler; murino-cinereus, subtus pallidior, paululum flavicans; auriculis magnis basi conniventibus; alis ad latera pilosis.

Dinops Cestonii. Savi nuov. giorn. di lett. n. 21. p. 230. — Temm. monogr. I. p. 262. — Keys. u. Blas. in Wiegm. Archiv V. S. 304. Wirbelth. S. 44. — Bonap. faun. ital. tab. 7. — Wagn. Schreb. Supplem I. S. 467 tab. LXI. A. — D. Rüppellii. Temm. monogr. I. p. 224. tab. 18 (Thier), tab. 23 fig. 6 — 8 (Schädel). — Wagn. a. a. O. S. 468.

Vom mittleren und südlichen Italien (D. Cestonii) bis nach Aegypten (D. Rüppellii) verbreitet. Körper 3″ 4‴, Schwanz 1″ 10‴, Ohren 1″, Vorderarm 2″ 3‴. Schneidezähne $\frac{2}{2}$ oder $\frac{1}{1}$, Backenzähne $\frac{4}{4}$. Am Vorderhalse des Männchens findet sich eine sehr kleine Grube. Die Ohren sind sehr groß, zusammenstoßend, mit 12 bis 14 Querfalten; die Klappe ist sehr kurz und oben erweitert. Die Oberlippe ist dick, hängend und in Querfalten gelegt; der Schwanz ist zur Hälfte frei. Die Flügel sind oben wie unten längs der Leibesseiten mit einem Haarbesatze versehen. Der Pelz ist graubraun, etwas ins Gelbliche ziehend, auf dem Rücken dunkler; die Häute sind braunschwarz.

2. D. Midas Hedenb., der nacktflügelige Grämler; supra obscure castaneo- aut nigro-fuscus; auriculis magnis basi conniventibus, alis supra nudis.

Dysopes Midas. Sundevall Stockh. Vet. Acad. handl. 1842 p. 207. tab. 2. fig. 7. (Kopf und Schädel).

Sennaar. Körper 3″ 10‴, Vorderarm 2″ 3‴. Sehr genau von Sundevall beschrieben, wie ich dieß aus Vergleichung zweier ausgestopfter Exemplare dieser Art mit einem in Branntwein aufbewahrten Exemplare von D. Cestonii ersehe. Sie stimmt mit letzterem in allen wesentlichen Stücken überein, ist aber durch dunklere Färbung der Oberseite und hauptsächlich durch Mangel der Behaarung auf der Oberseite der

Flügel längs der Körperseiten verschieden. Bei dem einen Exemplare sind die Haare der Oberseite schwarzbraun, bei dem andern dunkel kastanienbraun, bei beiden am Grunde licht und mit einer kurzen hellgrauen Spitze, wodurch der Rücken wie bereift aussieht. Auf der Unterseite sind die Haare licht rostbräunlich mit längeren weißgraulichen Spitzen. Könnte, wie Sundevall meint, doch nur eine Varietät von D. Cestonii sein.

3. D. Geoffroyi Temm., der rothrückige Grämler; rufus, subtus brunneus, auriculis mediocribus disjunctis.

Dysopes Geoffroyi. Temm. monogr. I. p. 226 tab. 19. (Thier), tab. 23. fg. 9. (Gebiß). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 469. — Nyctinomus aegyptiacus Geoffr.

Aegypten. Ganze Länge 3″ 5‴, Vorderarm 1″ 7‴. Die Ohren sind am innern Rande nicht verwachsen; der Pelz ist dicht und die Flügel an den Seiten mit einem weißen Haarbande eingefaßt. Die Oberseite ist roth, der Bauch braun, längs der Mittellinie mit einem schwachen weißen Streif.

4. D. limbatus Pet., der gesäumte Grämler; nigro-fuscus, subtus pallidior, ventre medio lateribusque albis.

Dysopes limbatus. Peters Mossamb. I. S. 56. tab. 14.

Von Peters in dunklen Räumen der Wohnungen auf der Insel Mossambique und in Sena entdeckt. Körper 2″ 3‴, Schwanz 1″ 3‴, Vorderarm 1″ 5‴. Die Ohren sind niedrig, breit und auf der Stirn durch eine Hautwulst vereinigt; die Oberlippe ist dick, faltig, am Rande gekerbt und mit kurzen steifen Haaren besetzt. Die Behaarung ist weich und geht zu beiden Seiten in einem breiten Saume auf die Flughäute über. Das erwachsene Männchen ist auf dem Rücken dunkel schwärzlich rostbraun, am Bauche etwas blasser, die Mitte und die Seiten des Unterleibs so wie die Steißgegend weiß. Die Ohren sind schwarzbraun; die Flughäute durchscheinend bräunlich, neben den Körperseiten braun. Die braune Färbung des Weibchens ist noch dunkler, bei den Jungen dagegen viel heller rostfarbig. Die Rückenhaare sind am Grunde weißlich, die braunen Haare der Bauchseite zeigen außerdem hellere Spitzen. Die Nägel sind braun.

5. D. brachypterus Pet., der kurzflügelige Grämler; ferrugineo-fuscus, gastraeo medio griseo, labris plicatis ad marginem glabris.

Dysopes brachypterus. Peters Mossamb. I. S. 59. tab. 15. fig. 1.

Peters erhielt nur ein einziges Exemplar, ein Männchen, das er in einem Kamine in Mossambique fand. Diese Art ist der vorhergehenden sehr ähnlich, auch in der Größe (Vorderarm ebenfalls 1" 5"'), aber die Lippen sind weniger faltig und am Rande ungekerbt, Kopf und Körper sind grösser und stärker, dagegen die Flügel, Schwanz und Sporen kürzer. Auch die Färbung ist abweichend. Der Rücken und die Seiten des Halses, der Brust und des Bauches sind dunkel rostbraun; die ganze Mitte der Unterseite dagegen ist grau. Sämmtliche Haare sind am Grunde und der Spitze blasser. Die Flughäute und Ohren haben dieselbe Farbe, aber dunkler; die Nägel sind bräunlichweiß [1]).

6. D. pumilus Rüpp.; der Zwerg-Grämler; minimus, nigro-fuscus, subtus pallidior.

Dysopes pumilus. Rüppell, Atlas S. 69 tab. 27 fig. a. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 470. — Temm. monogr. II. p. 354.

Massauah nach Rüppell; Temminck giebt auch noch Aegypten, Nubien und Abyssinien an. Ganze Länge 2" 7"' bis 3", Vorderarm 10"'. Ohren groß, vereinigt, Oberlippe gefaltet; keine Kehlgrube beim Männchen. Oben schwarzbraun, unten blaß graubraun.

††) asiatici.

7. D. plicatus Buch., der Faltengrämler; griseo-fulvidus, subtus pallidior.

Vespertilio plicatus. Buchanan, Linn. transact. V. p. 261 tab. 13. — Dysopes plicatus. Temm. monogr. I. p. 223. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 471. — Blyth ann. of nat. hist. XV. p. 475. — Nyctin. bengalensis. Geoffr. descript. de l'Egypt. II. p. 130. — Nyctin. plicatus. Gray, ann. of nat. hist. IV. p. 6; list of Brit. mus. p. 34.

---

1) Noch stellt Peters a. a. O. S. 60 tab. 15 fig. 2 eine dritte südafrikanische Art als D. dubius auf mit der Diagnose: D. priori similis, sed multo major. Er hatte indeß von dieser Art nur ein einziges, ganz junges Exemplar in Sena erhalten, von welchem er vermuthete, daß es im erwachsenen Zustande viel größer als D. brachypterus oder D. Geoffroyi wäre.

Bengalen. Ganze Länge 4″ 3‴, wovon der Schwanz 1″ 9‴ wegnimmt. Ohren groß, genähert, aber nicht vereinigt, Gray nennt sie in einem gemeinschaftlichen Höcker vereinigt. Lippen gefaltet, Schneidezähne $\frac{4}{4}$. Gray giebt eine große kreisförmige schwielige Scheibe an der Daumenwurzel wie bei Thyroptera an, was ein unrichtiger Vergleich ist. Die Flügel sind längs der Seiten mit einer Haarbinde eingefaßt. Temminck nennt die Färbung: fauve cendré plus ou moins grisâtre, unten etwas heller; Buchanan giebt die Schwingen und nackten Theile als rußfarben an, die Haare mit Aschfarben gemischt, unten blasser; Blyth bezeichnet sie als snuff-brown, unten lichter.

8. D. dilatatus Horsf., der breitschwingige Grämler; fuliginosus, subtus e brunneo rufescens; auriculis connatis.

Dysopes dilatatus. Horsf. zool. research. n. 5. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 473. — Temm. monogr. II. p. 352 tab. 68 fig. 1 bis 3.

Java. Ganze Länge 4″ 3‴ bis 4″ 7‴, wovon der Schwanz 1″ 9 bis 10‴; Vorderarm ebenso lang. Schneidezähne $\frac{1}{1}$, $\frac{2}{2}$, $\frac{3}{3}$; keine Kehlgrube. Der Pelz ist kurz; auf der Innenseite der Flügel längs der Seiten findet sich eine Haarbinde. Das Männchen ist oben rußschwarz oder sehr lebhaft dunkel kastanienbraun, der Bauch aus Roth und licht Braun gemischt, die Häute schwarz. Das Weibchen ist oben, wie Temminck sagt, d'un roux couleur de feuille morte, unten etwas lichter roth, Häute röthlich.

9. D. tenuis Horsf., der schlanke Grämler; nigro-fuscus, subtus cinereus, auriculis connatis.

Nyctinomus tenuis. Horsf. zool. research. n. 5. mit Abbild. — Canton, journ. of the Asiat. soc. XV, p. 179. — Dysopes tenuis. Temm. monogr. I. p. 228 tab. 19bis, tab. 23 fig. 10 bis 16 (Schädel), 24 fig. 1 (Skelet.) — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 471.

Java, Sumatra, Borneo und malayische Halbinsel. Körper 2″ 3‴, Schwanz 1″ 5‴, Vorderarm 1″ 9‴. Die Ohren sind beträchtlich groß und verwachsen; die Oberlippe sehr angeschwollen und stark gefaltet, die Flügel sehr schmal. Die Oberseite ist schwärzlichgrau, die Unterseite aschfarben. Temminck unterscheidet den D. dilatatus davon durch

etwas mehr Größe, breitere Flügel, Kopf, Schnauze und Ohren mehr entwickelt, freies Schwanzende länger (?), und nach den Geschlechtern Verschiedenheit in der Färbung, während eine solche bei D. tenuis nicht statthat.

††††) americani.

10. D. auritus Natt., der haftohrige Grämler; saturate fuscus; auriculis amplis connatis, rostro attenuato.

Dysopes auritus. Wagn. Wiegm. Archiv 1843 S. 366; Abh. d. Münchn. Akad. V. S. 204 tab. 4 fig. 4 (Kopf). — Burmeist. Brasil. I. S. 69.

Matogrosso in Brasilien. Körper 3″ 2‴, Ohren 11‴, Schwanz 1″ 9‴, Vorderarm 2″ 3‴. Untere Schneidezähne 4. Der Kopf ist vorwärts verschmälert; die Ohren sind auffallend groß und mit einander verwachsen; die Oberlippe ist stark gerunzelt, die Nase aufgeworfen. Die Behaarung ist reichlich, auf der Unterseite der Flügel längs der Seiten eine Binde bildend. Die Oberseite ist dunkel kastanienbraun, die Unterseite etwas lichter, die Haare fast einfarbig.

* D. coecus Rengg., der blinde Grämler.

Dysopes coecus. Rengger Paraguay S. 88. — Wagn. Schreb. Supplem. I, S. 479. — Azar. ess. II. p. 218.

Paraguay, scheint identisch mit D. auritus zu sein, doch müssen noch Exemplare damit verglichen werden.

11. D. macrotis Gray, der großohrige Grämler; auriculis amplis connatis, lobulo ad basin exciso; trago crenulato.

Nyctinomus macrotis. Gray, ann. of nat. hist. IV. p. 5. tab. 1 fig. 3 (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 481.

Cuba. Größe und Färbung nicht angegeben, daher die Art nicht sicher festgestellt; nach der Abbildung des Kopfs, dessen Ohren 1″ lang, zu den größern Arten gehörig. Kopf und Nase wie bei N. plicatus, aber Lippen und Ohren viel größer und der Ohrlappen, welcher bei diesem hoch, gerundet und ohne Kerbe vorn an der Basis ist, ist bei N. macrotis gestreckt, oben abgestutzt, mit einer Kerbe vorn am Grunde; die Klappe ist sehr klein, abgestutzt, mit 2 bis 3 Zacken. Am Daumen findet sich eine ähnliche schwielige Scheibe wie bei N. plicatus.

12. D. aurispinosus Peale, der stachelohrige Grämler; fuscus, auricularum plica spinis 6—8 armata.

Dysopes aurispinosus. Peale, Unit. Stat. explor. expedit. VIII. p. 21 tab. 3 fig. 1.

Nur nach einem Exemplare bekannt, das auf dem Schiffe, auf welchem sich Peale befand, gefangen wurde, als letzteres 100 engl. Meilen vom Lande an der Ostküste Brasiliens, südwärts des Cap St. Roque entfernt war. Ganze Länge 4¼", Schwanz 1⅝", Flugweite 14½". Schneidezähne ⅔, Backenzähne ⅓. Ohren sehr groß, verwachsen, vorderer Rand rückwärts gekehrt und an der Falte mit 6 oder 8 Hornstacheln besetzt. Nasenlöcher in einer besondern Scheibe, die vorn mit warzenförmigen hornigen Stacheln gesäumt ist. Oberlippe groß, stark gerunzelt. Pelz dicht, sepiabraun, unten lichter mit blaulichem Schimmer; Häute purpurschwarz.

13. D. Naso Wagn., der gemeine Grämler; cano-fuscus, auriculis magnis disjunctis.

Dysopes Naso. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 475. — Tschud. faun. peruan. I. S. 80. — Dysopes nasutus. Temm. monogr. I. p. 233 tab. 24 fig. 2, 3 (Skelet.) — Molossus nasutus. Gay hist. de Chil. zool. I. p. 35. — M. rugosus. D'Orbign. voy. mamm. p. 13 tab. 10 fig. 2. — Nyctinomus brasiliensis. Is. Geoffr. ann. des sc. nat. I. p. 348 tab. 23. fig. 1—4.

Buenos Ayres, Corrientes, Chile, Peru, Bolivien und Brasilien. Körper 2" 6‴, Schwanz 1" 6‴, Flugweite 10" 8‴. Die Ohren sind groß, abgerundet, einander genähert, aber nicht verwachsen, die Schnauze kurz, die Nasenlöcher vorspringend. Die Oberseite ist trüb schwarz- oder falbbraun, die Unterseite lichter graubraun; die Haare einfarbig. Untere Schneidezähne 6, 4, 2, je nach dem Alter. Ist nicht, wie es von Temminck geschehen, mit D. nasutus Sp. zu verwechseln.

14. D. laticaudatus Geoffr., der saumschwänzige Grämler; obscure fuscus, auriculis conjunctis, cauda usque ad finem limbata.

Molossus laticaudatus. Geoffr. ann. d. mus. VI. p. 156. — Rengg. Paraguay S. 87. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 478. — Chauve-souris VIII. Azar. essai II. p. 286.

Paraguay. Körper 3" 2‴, Schwanz 1" 10‴, Flugweite 15".

Ohren nicht über den Kopf emporragend, halb kreisförmig. Schenkelflughaut die eine Hälfte des Schwanzes einhüllend und die andere bis zur Spitze als ein schmaler Saum einfassend. Schwärzlichbraun, am Bauch in's Bräunlichgraue übergehend.

15. D. gracilis Natt., der zierliche Grämler; minor, sordide brunneus, auriculis amplis connatis, alis versum corpus puncturatis.

Dysopes gracilis. Wagn. Wiegm. Archiv 1843 S. 368; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 206.

Mato grosso. Körper 2" 5‴, Schwanz 1" 2‴, Ohr 6½‴, Vorderarm 1" 6‴. Die Oberlippe ist gerunzelt und gekerbt, die Flügel gegen den Körper zu auf eine zollbreite Strecke dunkel punktirt. Der Pelz ist nicht sonderlich dunkel umbrabraun, auf der Unterseite merklich lichter, die Rückseite mit röthlichgrauem Schimmer; die Haare einfarbig.

2 Subgen. Molossus Geoffr. Gray.

Labium superius haud rugosum.

†) africani.

16. D. natalensis Smith, der natalsche Grämler; e sordide rufescente brunneus, auriculis triquetris.

Dysopes natalensis. A Smith zool. of South Afric. tab. 49.

Port Natal. Körper 2", Schwanz 1" 6‴, Vorderarm 1" 5‴, Backenzähne ¶¶. Die Ohren sind ziemlich groß, dreieckig und (nach der Abbildung) nicht verwachsen; die Oberlippe (nach der Abbildung) ist nicht durch Runzeln gefaltet. Der Pelz ist trüb bräunlichroth, unten lichter; die Haare einfarbig; die Schwingen sind schwach schokoladebraun.

††) americani.

17. D. perotis Neuw., das Taschenohr; maximus, cervino-fuscus, subtus rubello-brunnescens; auriculis amplissimis taenia distincta conjunctis.

Dysopes perotis. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 227 mit Abbild. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 473; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 191. tab. 2 fig. 2 (Kopf). — Molossus rufus. Geoffr. ann d. mus. VI. p. 155. — Gray, ann. of nat. hist. IV. p. 7. — Burmeist. Brasil. I. S. 68. — Dysopes rufus. Temm. monogr. I. p. 220, 261 tab. 23 fig. 17 bis 19 (Schädel).

Brasilien (am Parahyba, in Lagoa santa und bei Barra do Rio negro). Körper 4" 7‴, Schwanz 1" 10‴, Ohren 1" 4‴, Vorderarm 2" 7‴. Die größte Art. Die Ohren sind enorm, die Lippen ungerunzelt und behaart, am Vorderhalse findet sich eine ovale Drüse. Die Oberseite ist kastanienbraun mit Grau überlaufen; die Unterseite lichtbraun, mit Röthlichgrau schwach beflogen. Die Haare sind gegen die Wurzel schmutzig weißlich.

18. D. ursinus Spix, der stumpfohrige Grämler; niger aut nigro-fuscus; auriculis minus elevatis, dilatatis, basi conniventibus.

Molossus ursinus. Spix vespert. bras. p. 59 tab. 35 fig. 4. — Dysopes ursinus. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 472; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 192. — Dysopes Alecto. Temm. monogr. I. p. 231 tab. 20 (Thier), 23 fig. 23—26 (Schädel); II. p. 355.

Para und Barra do Rio negro in Brasilien; französisches und holländisches Guiana. Körper 3" 2‴, Schwanz 1" 10‴, Ohr 6‴, Vorderarm 1" 11‴. Die Ohren sind stumpf zugespitzt, breiter als hoch, an der Basis miteinander zusammenstoßend. Das Männchen zeigt am Halse eine große Grube. Längs des Vorderarms und zwischen den Anfangstheilen der Mittelhand findet sich ein reichlicher wolliger Anflug; außerdem sind die Flügel unten an den Leibesseiten mit breitem Haarsaume besetzt. Der Pelz der Männchen ist ganz schwarz, bei den Weibchen braunschwarz, unten heller.

19. D. longimanus Wagn., der langarmige Grämler; saturate fuscus, auriculis elevatis basi connatis; antibrachio elongato.

Dysopes longimanus. Wagn. Wiegm. Archiv 1843 S. 367; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 194. — Molossus ferox. Pöppig. Froriep's Notiz. XXXII. S. 230. — Tschud. faun. peruan. I. S. 82.

β) ventre utrinque taenia albida limbato.

Dysopes leucopleura Natt. Wagn. Wiegm. Archiv 1843 S. 367; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 196.

Mato grosso und Barra do Rio negro (Brasilien), Peru. Körper 3" 6‴, Schwanz 1" 9‴, Ohr 7‴, Vorderarm 2" 2‴. Nahe verwandt mit D. ursinus, aber die Ohren viel größer und deutlicher verwachsen, die Flügel durch Streckung des Vorderarms und der Mittelhand weit

länger, die wollige Behaarung längs des Vorderarms und zwischen der Wurzel der Mittelhandknochen nicht vorhanden. Das Männchen hat eine sackförmige Grube am Halse. Der Pelz ist reichlich, kastanienbraun, auf dem Rücken ins Schwarzbraune fallend mit Sammetglanz, auf der Unterseite matt, mit oder ohne schwarze Beimischung. — D. leucopleura unterscheidet sich nur dadurch, daß bei ihm der Haarsaum, welcher auf der Unterseite der Flügel den Leib einfaßt, weiß ist, während er bei D. longimanus braun erscheint.

20. D. glaucinus Natt., der lichtbäuchige Grämler; supra castaneo-fuscus, subtus sordide rubello-canus; auriculis elevatis basi connatis.

Dysopes glaucinus. Wagn. Wiegm. Archiv 1843 S. 368; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 197 tab. 4 fig. 1.

Mato grosso. Körper 3″ 5‴, Schwanz 1″ 8‴, Ohren 7½‴, Vorderarm 2″ 1½‴. Wie D. longimanus, aber durch die Färbung der Unterseite auffallend davon verschieden. Der Pelz ist oben raucherig kastanienbraun mit schiefergrauem Schimmer; unten licht bräunlich mit hell röthlichgrauem Anflug. Die Haare sind in der kleinern untern Hälfte weißlich. Ein fahler Fleck am Unterhalse des Männchens zeigt eine kleine Drüse [1]).

21. D. abrasus Temm., der kurzhaarige Grämler; splendide castaneus, subtus dilutior; auriculis disjunctis, siphone nullo, vellere raso.

Dysopes abrasus. Temm. monogr. I. p. 232 tab. 21; II p. 356. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 475.

Surinam und Brasilien. Körper eines jungen Individuums 3″ 2‴, Schwanz 1″ 1‴, Abstand der Ohren 2‴. Die Ohren sind fast so breit als hoch. Der Pelz ist kurzhaarig, aber dicht; der Armflittig, eine Binde längs des Vorderarms und der Anfang der Hand auf der Oberseite ist behaart, auf der untern nicht. Keine Kehlgrube. Der Pelz ist oben glänzend kastanienfarbig, unten heller und matt, die Flughäute schwarz. Von

---

1) Was Pöppig's M. velox? (M. anonymus Tschud. faun. peruan. I. S. 81) seyn soll, weiß ich eben so wenig als Tschudi zu bestimmen.

D. ursinus verſchieden durch entfernt ſtehende Ohren und Mangel der Kehlgrube.

22. D. holosericeus Natt., der ſammetglänzende Grämler; splendide castaneus, subtus dilutior; auriculis basi connivent ibus; pilis adpressis; alis subtus secundum antibrachii longitudinem dense pilosis.

Dysopes albus. Wagn. Wiegm. Archiv 1843 S. 368; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 198.

Um Rio Janeiro. Körper 3″ 6‴, Schwanz 1″ 9‴, Ohren 6‴, Vorderarm 1″ 11‴. Größe und Habitus, namentlich auch Ohrenform, wie bei D. ursinus, aber die Behaarung der Oberſeite iſt glatt anliegend, das Männchen anders gefärbt und anſtatt des Siphons findet ſich, wenigſtens beim ausgeſtopften Exemplare, blos ein länglicher Wulſt. Von D. abrasus verſchieden durch die an der Baſis zuſammenſtoßenden Ohren und die reichliche Flügelbehaarung auf der Unterſeite. Der Pelz iſt oben dunkel kaſtanienbraun mit lebhaftem Sammetglanze, unten nur wenig lichter, aber weit matter.

23. D. albus Natt., der weiße Grämler; albidus, patagiis nigricantibus.

Dysopes albus. Wagn. Wiegm. Archiv 1843 S. 368; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 201.

Mato groſſo. Körper 3″ 4‴, Schwanz 1″ 10‴, Ohren 6‴, Vorderarm 1″ 10‴. Größe und Geſtalt wie D. ursinus. Der Pelz iſt oben wie unten weiß, mit ſchmutzig gelblichem Anflug; die Haare einfarbig. Der Haarbeſatz längs des Vorderarms und der Fingerwurzeln oben wie unten roſtbraun.

24. D. nasutus Spix, der zweifarbige Grämler; supra rufo-castaneus, subtus ferrugineo-albidus; auriculis mediocribus disjunctis; pilis bicoloribus.

Dysopes nasutus. Spix vesp. bras. p. 60 tab. 35 fig. 7. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 474.

Am St Franciſci-Fluß in Braſilien. Körper faſt 3½″, Schwanz 2″ 2‴, Vorderarm 1″ 9‴. Die Oberſeite iſt dunkel kaſtanienrothbraun, wobei die Haare am Grunde weißlich ſind. Die Unterſeite iſt weißlich

und roſtfarbig überlaufen; die Haare an den Seiten und dem Bauch ſind weiß mit licht roſtgelblichen Spitzen, auf der Bruſt und in einem Streif an den beiden Halsſeiten roſtröthlich mit weißlichen Spitzen. Temminck's D. nasutus iſt nicht identiſch mit dem von Spix, ſondern mit D. brasiliensis.

25. D. olivaceo-fuscus Natt., der olivenbraune Grämler; olivaceo-fuscus, subtus multo pallidior, auriculis conniventibus.

Dysopes olivaceo-fuscus. Wagn. Abh. der Münchn. Akadem. V. S. 202.

β) supra cinnamomeo-fuscus, subtus e cano rubello-brunnescens.

D. amplexicaudus Natt. Wagn. a. a. O. S. 203.

Mato groſſo. Körper 2" 8‴, Schwanz 1" 3‴, Ohren 5½‴, Vorderarm 1" 8‴. Die Ohren ſind ziemlich kurz, eben ſo lang als breit, faſt zuſammenſtoßend. Der Unterhals des Männchens hat eine Taſche. Die Farbe iſt oben trüb kaſtanienbraun, unten weit lichter; beide Seiten mit trüb olivengelblichem Anflug. Die Var. β iſt ohne olivenfarbigen Anflug; die Unterſeite bräunlich, mit röthlichgrau überlaufen.

26. D. velox Natt., der ſchnelle Grämler; castaneus, subtus dilutior, auriculis basi conniventibus; pilis unicoloribus; carinis duabus intra nares.

Dysopes velox. Temm. monogr. I. p. 234 tab. 22 fig. 1, tab. 23 fig. 22 (Zähne). — Gray, ann. of nat. hist. IV. p. 7; list of Brit. mus. p. 35. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 476. — Tſchud. faun. peruan. I. S. 81. — Burmeiſt. Braſil. I. S. 71. — Molossus moxensis. D'Orbign. voy. dans l'Amér. mamm. p. 12. tab. 11 fig. 1 bis 4.

Südbraſilien, Bolivien und Peru, nach Gray auch auf St. Lucia (Weſtindien) und nach Burmeiſter ebenfalls in Surinam. Körper 2" 2‴, Schwanz 1" 2‴, Vorderarm 1" 6‴; doch giebt es größere, wo der Körper 2" 8‴, der Schwanz 1" 4‴ mißt. Die Ohren ſind mittelmäßig, breit, mit den innern Rändern ſich vereinigend; am Vorderhalſe findet ſich eine kleine Taſche. Oben iſt der Pelz dunkel kaſtanienbraun oder rothbraun, unten heller, bis ins hell Gelbbraune; alle Haare ſind einfarbig. Jüngere Individuen ſind oben dunkel graubraun, unten mausgrau. Die Häute ſind graulichſchwarz.

27. D. tropidorhynchus Gray, der kielnasige Grämler; praecedenti simillimus, at carina una intra nares diversus.

Molossus tropidorhynchus. Gray ann. of nat. hist. IV. p. 6; list of Brit. mus. p. 35. — M. velox. Horsf. zool. journ. III. p. 236.

Gemein in Havanna. Sehr ähnlich dem D. velox, aber kleiner, der Schwanz dünner und während bei diesem auf der Nasenkuppe zwischen den Nasenlöchern zwei, fast bis zur Basis getrennte Leisten verlaufen, zieht sich bei D. tropidorhynchus nur eine Leiste hin, welche sich oben spaltet und eine Querleiste über jedes Nasenloch abgiebt.

28. D. fumarius Spix, der raucherige Grämler; nigro-fuscus, subtus cinereo-brunneus; pilis basi albidis; auriculis basi conniventibus.

Dysopes fumarius. Spix vesp. bras. p. 60. tab. 35 fig. 5, 6. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 477. — Tschud. faun. peruan. I. S. 81. — Burmeist. Brasil. I. S. 72. — D. obscurus. Temm. monogr. I. p. 236 tab. 22 fig. 2; II. p. 356. — Molossus obscurus. Geoffr. ann. d. mus. VI. p. 155. — ? M. fuliginosus. Cooper ann. of the Lyceum of New York IV. p. 67 tab. 3. fig. 3, 4.

Peru, Nordbrasilien (am Fluß Itapicuru), Surinam und wenn Cooper's M. fuliginosus hieher gehört, auch in Georgien. Körper 2″ 6‴, Schwanz 1″ 9‴, Vorderarm ebenso lang; Temminck giebt die Größe etwas geringer an. Die Ohren sind breiter als lang, durch ein Band vereinigt, das sich als Kiel bis zur Nasenkuppe fortsetzt. Der Unterhals der Männchen zeigt eine Grube. Oben ist der Pelz schwärzlichbraun, unten heller braun; alle Haare sind im Untertheil weißlich. Ohren und Flügel sind schwarzbraun. Nach Temminck ist das Männchen schwarz, das Weibchen braun; die Haare am Grunde weißlich.

29. D. myosuros Tschud., der mausschwänzige Grämler; nigricans, pilis basi dilutioribus; auriculis haud connexis; cauda corpore longiore.

Molossus myosuros. Tschud. faun. peruan. I. p. 83. tab. 4.

Peru. Körper 2″ 2‴, Schwanz 2″ 5‴, Vorderarm 1″ 10‴. Die Lippen sind warzig mit zahlreichen braunen Borsten; die Ohren so breit als hoch und nicht zusammengewachsen. Die Haare der Oberseite sind schwärzlich und am Grunde grau; die der Unterseite sind tief braun, am Grunde hellbraun.

30. D. crassicaudatus Geoffr., der breitschwänzige Grämler; rutilo-fuscus, subtus pallidior; auriculis conjunctis, cauda usque ad finem limbata.

Molossus crassicaudatus. Geoffr. ann. d. mus. VI. p. 156. — Rengg. Paraguay S. 89. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 479. — Chauve-souris X. Azar. essai II. p. 290.

Paraguay. Ganze Länge $3\frac{1}{2}''$, Schwanz $1''$ $4'''$. Ohren nicht besonders groß; Schenkelflughaut den Schwanz zu $\frac{3}{5}$ einhüllend und dann als schmaler Saum bis zur Spitze sich fortsetzend. Oben röthlichbraun, unten bräunlichroth, nackte Theile schwärzlichbraun.

§. Species haud satis definitae.

* Molossus fuliginosus. Gray ann. of nat. hist. IV. p. 7; list. of Brit. Mus. p. 35.

Bermudas, Jamaika, Portobello. Kehldrüse rudimentär. Schwanz verlängert, schmächtig, Nase mit gabelförmiger Leiste von der Mitte zwischen den Nasenlöchern; Ohrläppchen am Grunde eingezogen, Stirne gekielt. Größe nicht angegeben.

* Molossus norfolcensis. Gray l. c. p. 7 und 36.

Norfolk-Insel. Kehldrüse rudimentär. Grauschwarz, unten grau; Schwanz verlängert, schmächtig, Nase ohne Leiste, Ohrläppchen am Grunde nicht eingezogen; Stirne nicht gekielt? Größe nicht angegeben.

* M. cynocephalus. Cooper ann. of the Lyceum of New York IV. p. 65. tab. 3 fig. 1, 2.

Gemein in Georgien und um Charlesston. Körper $2''$, Schwanz 1, 3, Vorderarm 1, 7. Farbe rußbraun, oben dunkler, unten blasser. Ohren in ihrem Hintertheil sonderbar und regelmäßig gekrempelt oder canelirt; Schnauze breit, Lippen dick und hängend. Schneidezähne $\frac{4}{4}$.

* M. anonymus. Tschud. faun. peruan. I. S. 81 = M. velox Poepp. — Peru.

* M. acuticandatus. Desmar. mamm. p. 116. — Brasilien; vielleicht = D. myosuros.

* Ferner M. amplexicaudatus, M. longicaudatus, M. fusciventer, M. ater; sämmtlich von Geoffroy benannt und unzureichend charakterisirt in den ann. d. mus. p. 155 (vgl. Temm. monogr. I. p. 268 und Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 480).

* Dysopes mops. Fr. Cuv. dents des mammif. p. 40. — Indien.

* Nyctinomus acetabulosus Herm.

Madagaraigne Insel bei Port-Louis; nur nach einer Notiz von Commerson bekannt.

* Nyctinomus murinus Gray. — Jamaika (vgl. Fisch. syn. mamm. p. 550.)

* Myopteris Daubentonii. Geoffr. Egypt. II. p. 113 = Rat-volant Daubent.

Heimath unbekannt. Schneidezähne $\frac{2}{2}$, Backenzähne $\frac{5}{5}$, untere Schneidezähne zweilappig. Nase einfach, Schnauze kurz und dick, Ohren groß, getrennt, seitlich. Schwanz lang, in der Wurzelhälfte eingewickelt, am Ende frei. Körper 3″. Oberseite braun, Unterseite schmutzigweiß, mit leichtem falben Anflug (vgl. Desmar. mammif. p. 132; Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 483).

c) Vespertilionina. Fledermäuse.

Cauda longa patagio interfemorali innata, labia simplicia, pollex liber, dentes primores $\frac{4}{6}$, rarius $\frac{2}{6}$.

Von den Stummelschwänzen dadurch verschieden, daß die Schenkelflughaut ihrer ganzen Länge nach den Schwanz umschließt, der demnach mindestens so lang als sie selbst ist oder noch mit einer kurzen freien Spitze über sie hervorragt, daß ferner der Daumen in seiner untern Hälfte von keiner Daumenhaut umgeben ist, wovon nur Furia eine Ausnahme macht, und daß die Lippen von einfacher Bildung sind.

XXVII. PLECOTUS. Löffelschwirrer.

Dentes molares $\frac{6}{6}$, auriculae longissimae, connatae, margine exteriore sub trago terminatae, margine interiore subtus angulatim productae.

Sporadisch in der alten und neuen Welt. Flughäute und Ohren sind dünnhäutig, letztere sehr lang mit ihren innern Rändern an der Basis zusammenstoßend oder durch ein Band vereinigt; mit dem Außenrande etwas hinter dem Mundwinkel und in gleicher Höhe mit diesem geendigt; über dem Grunde des Innenrandes findet sich ein durch eine Einbuchtung abgesonderter, zungenförmig vorspringender, abgerundeter Hautlappen.

1. Pl. auritus Linn., der gemeine Löffelſchwirrer; cano-brunneus; auriculis capite duplo longioribus; trago dimidia auricula breviore, antibrachio caudaque auriculas vix superantibus.

Plecotus auritus. Keyſ. Blaſ. Wirbelth. S. XVI. u. 55. — Bonap. faun. ital. tab. 8. — Vesp. auritus. Schreb. I. S. 163 tab. L; Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 488. — Temm. monogr. II. p. 181 tab. 48 fig. 4. (Kopf). — Bell brit. quadrup. p. 53. — Eversm. bullet. de Moscou XVIII. p. 513. — Nilss. skand. faun. I. p. 53. — S. Longch. faun. belg. p. 22. — Blaſ. Faun. v. Deutſchl. S. 39. — Pl. brevimanus. Jenyns Linn. transact. XVI. p. 55 tab. 1. fig. 2. — Vesp. cornutus. Faber, Iſis 1826 S. 575.

Ganz Europa bis 60° Breite, Georgien, Kaukaſus. Körper 1″ 7‴, Schwanz 1″ 7‴, Ohren 1″ 5‴, Vorderarm 1″ 4½‴. Graubraun, unten etwas blaſſer, ins Weißliche fallend; die Haare in der untern Hälfte ſchwärzlich.

* Pl. brevimanus Bonap., der kurzhändige Löffelſchwirrer; auriculis capite haud duplo longioribus, trago dimidia auricula longiore; antibrachio caudaque auriculas valde superantibus.

Plecotus brevimanus. Bonap. faun. ital. tab. 8. — Keyſ. Blaſ. Wirbelth. S. XVI. u. 55. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 488. — Blaſ. Faun. v. Deutſchl. I. S. 41.

Sicilien. Körper 1″ 8‴, Schwanz 1″ 6½‴, Ohren 1″ 1‴, Vorderarm 1″ 4½‴. Grauröthlich, unten weißlich; die Haare nur am Grunde dunkelbräunlich. — Durch zahlreiche Uebergänge, die Blaſius zur Vergleichung hatte, überzeugte er ſich neuerdings, daß die ſicilianiſchen Formen vollkommen mit unſern nordiſchen übereinſtimmen.

** Pl. Peronii. Is. Geoffr. mag. de zool. 1832 tab. 3 fig. 1. (Wagn. a. a. O. S. 489).

Heimath unbekannt. Farbe heller, auf der Unterſeite faſt ganz weiß, Klappe merklich länger als das halbe Ohr. Könnte mit Pl. brevimanus einerlei ſeyn, was auch der Fall ſeyn dürfte mit Geoffroy's aegyptiſchem V. auritus (descript. de l'Egypt. II p. 118 tab. 2 fig. 3) und mit dem von Rüppell (Mus. Senck. III S. 133) aus Schoa angeführten.

2. Pl. homochrous Hodgs., der nepal'ſche Löffelſchwirrer; obscure brunneus; auriculis capite duplo longioribus, nudis.

Plecotus homochrous. Hodgs. journ. of the Asiat. soc. XVI. 2. p. 894. — Blyth l. c. XXI. p. 360.

Nepal; nur aus Hodgson's Beschreibung nach einem einzigen Exemplare bekannt. Körper 1 $\frac{7}{8}$", Schwanz 1$\frac{1}{4}$", Vorderarm 1 $\frac{7}{16}$", Ohren 1$\frac{1}{4}$", Backenzähne $\frac{4}{4}$ (ob durch Ausfallen?). Ohren 2$\frac{1}{4}$ mal so lang als der Kopf und nackt; aus der Beschreibung geht hervor, daß sie ganz so wie bei unserem Pl. auritus gestaltet sind. Die Farbe ist einförmig dunkelbraun; die Haare sind kurz, am Grunde schwarz, an der Spitze oben ins Braune, unten ins Falbe verlaufend, aber in beiden Fällen düster. Sehr nahe mit Pl. auritus verwandt, aber durch die dunklere Färbung verschieden. Blyth bemerkt, daß er zwischen englischen Exemplaren und der von Hodgson gegebenen Beschreibung keinen andern Unterschied habe auffinden können, als daß nach letzterer der Pelz oben kürzer zu seyn schiene, was zur specifischen Unterscheidung nicht ausreichend wäre.

3. Pl. timoriensis Geoffr., der timorische Löffelschwirrer; nigro-fuscus, subtus cinereo-brunneus; auriculis amplis taenia angusta conjunctis.

Vespertilio timoriensis. Geoffr. ann. d. mus. VIII. p. 200. tab. 47. — Desmar. mamm. p. 146. — Temm. monogr. II. p. 253 tab. 57 fig. 10 (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 520. — Pl. timoriensis. Is. Geoffr. magas. de zool. 1832.

Timor, nur nach einem einzigen Exemplare bekannt. Körper 2" 7"', Schwanz 1" 5"'. Ohren breit, so lang als der Kopf und durch eine kleine Haut vereinigt; Klappe halbherzförmig. Schwärzlichbraun, unten graubraun.

4. Pl. velatus Is. Geoffr., der geschleierte Löffelschwirrer; saturate castaneo-fuscus; subtus pallide brunnescens; auriculis dilatatis taenia angusta conjunctis.

Plecotus velatus. Is. Geoffr. ann. des sc. nat. III. p. 446, mag. de zool. 1832 tab. 2. — Vesp. velatus. Temm. monogr. II. p. 240 tab. 59 fig. 3. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 528. — Gay hist. de Chil. zool. I. p. 40 tab. 1 fig. 2 (Kopf und Gebiß). — D'Orbign. voy. dans l'Amér. mérid. mamm. p. 14.

Chile, Bolivia und Brasilien. Körper 2" 4"', Schwanz 1" 6"', Ohren fast 1", Klappe 6"', Vorderarm 1" 7"'. Der Kopf ist gestreckt,

die Ohren sind sehr breit, am Grunde des innern Randes mit starkem, einwärts gebogenen Umschlag, getrennt, aber durch ein Band über der Stirne verbunden; die Klappe ist schmal blattförmig und halb so lang als das Ohr; der Schwanz ragt mit der Spitze frei über die Flughaut vor. Nach Gay sind $\frac{4}{4}$, nach Temminck $\frac{5}{5}$ Backenzähne vorhanden. Die Farbe ist oben gesättigt kastanienbraun, die schwarzbraunen Haare mit lichtern Spitzen; unten lichtbräunlich, die schwarzbraunen Haare mit bräunlichweißen Spitzen; die Häute sind dunkel braungrau. — Tschudi's Vesp. velatus kann nicht wohl hieher gehören, da er die Ohren als zusammenstoßend, die Klappe fast so lang als das Ohr und den Schwanz als ganz eingehüllt bezeichnet [1]).

XXVIII. SYNOTUS. Haftohr.

Dentes molores $\frac{6}{6}$ aut $\frac{5}{5}$; auriculae connatae, margine exteriore usque ante tragum productae.

Sporadisch in der alten und neuen Welt. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Backenzähne $\frac{6}{6}$ (durch Ausfallen des kleinen obern Lückenzahns $\frac{5}{5}$) oder $\frac{5}{5}$, wenn die amerikanischen Arten, was allerdings noch zweifelhaft ist, wirklich zu Synotus, und nicht zu Plecotus gehören. Die Flughäute und Ohren sind dickhäutig, letztere am Außenrande bis über den Mundwinkel vorgezogen und hier zwischen Auge und Oberlippe endigend; der Innenrand ist ziemlich gleichmäßig gebogen, ohne zungenförmigen Vorsprung. Der nackte Nasenrücken ist beiderseits von einem drüsigen Wulste eingefaßt.

1. S. Barbastellus Schreb., das Kurzmaul, **brunneo-niger, pilorum apicibus flavido-brunnescentibus; auriculis longitudine capitis, rostro brevi obtuso.**

Vespertilio Barbastellus. Schreb. I. S. 168 tab. 55. — Temm. monogr. II. p. 202 tab. 48 fig. 6 (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 486. — Fr. Cuv. mamm. II. — S. Longch. faun. belg. p. 32. — **Barbastellus communis.**

---

1) Nicht wieder aufgefunden ist **Vesp. megalotis** Rafinesque aus Nordamerika, bezeichnet als dunkelgrau, unten lichtgrau, Ohren sehr groß, mit einer ebenso langen Klappe, ganze Länge 4″, Schwanz 2″ (vgl. Wagn. Schreb. Suppl. I. S. 489). Nach diesen Angaben läßt sich nicht einmal die Gattung festsetzen.

Bonap. fenn. ital. tab. 15. — Blyth journ. of the Asiat. soc. XXI. p. 360. — Barb. Daubentonii Bell brit. quadr. p. 63. — Synotus Barbastellus. Keyſ. Blaſ. Wirbelth. S. XVI. u. 56. — Nills. skand. faun. I. p. 57. — Blaſ. Faun. v. Deutſchl. I. S. 43.

Schweden, England, Frankreich, Deutſchland, Italien, Krim und (nach Blyth) bis in den Himalaja. Körper 1″ 7‴, Schwanz 1″ 10‴, Ohren 7½‴, Vorderarm 1″ 5½‴. Backenzähne $\frac{6}{6}$, die ſich im Alter auf $\frac{5}{5}$ reduciren. Die Schnautze iſt ſehr kurz und ſtumpf; die Ohren ſtark ausgerandet, in der Mitte mit breitem Haarband. Der Pelz iſt oben braunſchwarz mit grangelblichen Haarſpitzen; die Unterſeite lichter.

2. S. leucomelas Rüpp., das zweifarbige Haftohr; supra canoniger, subtus ex nigro et albo varigatus; auriculis magnis.

Vespertilio leucomelas. Rüppell, Atlas S. 73 tab. 28 fig. b. — Temm. monogr. II. p. 204. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 522. — ? Plecotus Christii. Gray mag. of zool. and bot. II. p. 13.

Küſten des rothen Meeres. Körper 1″ 7‴, Schwanz faſt ebenſo, Vorderarm 1″ 5‴. Die Ohren ſind groß, mit einander verwachſen, und an der Außenſeite ſtark ausgerandet; die Klappe iſt lang und zugeſpitzt. Oben iſt der Pelz grauſchwarz mit feinen lichtbraunen Haarſpitzen; unten ſind die Haare in der Wurzelhälfte graulichſchwarz, in der Spitzenhälfte rein weiß; der Hinterbauch iſt ganz weiß.

3. S. macrotis Temm., das einfarbige Haftohr; unicolor brunneus, auriculis tragisque magnis.

Vespertilio macrotis. Temm. monogr. II. p. 218 tab. 54 fig. 7, 8. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 510.

Sumatra. Körper 1″ 9‴, Schwanz 1″ 3‴, Vorderarm 1″ 2‴. Die Ohren ſind verhältnißmäßig groß, die Klappe iſt groß und gekrümmt blattförmig. Der Pelz iſt oben wie unten biſterbraun, die Schnautze ſchwarz, die Häute ſehr durchſcheinend, blaß weiß mit vielen braunen Adern.

4. S. Maugei Desm.; das dunkle Haftohr; nigello-fuscus, subtus dilutior, postice albidus; auriculis magnis.

Vespertilio Maugei. Desmar. mamm. 145. — Temm. monogr. II. p. 255. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 513. — Plecotus Maugei. Is. Geoffr. magas. de zool. 1832 n. 7.

Porto Rico. Etwas größer als S. Barbastellus. Die Ohren sind groß, vereinigt, an der Spitze abgerundet und am äußern Rande ausgeschnitten, die Klappe ist zugespitzt und nicht von halber Ohrlänge; die Augen sind an die Basis der Ohren gestellt. Die Farbe ist schwärzlichbraun, unten lichter, zumal in der Nähe der Schenkelflughaut, wo sie fast weiß wird. Die Beschreibung der Ohren deutet eher auf Synotus als Plecotus.

* S. Lecontii Coop.

Plecotus Lecontii. Cooper. ann. of the Lyc. of New York IV. p. 72. tab. 3 fig. 5 (Kopf.) — Plec. macrotis. Le Conte, app. to Mc. Murtrie's Cuv. I. p. 431.

Ziemlich gemein in Georgien, auch um Charlesston. Ganze Länge 3. 4", Schwanz 1. 7, Ohren 1, Vorderarm 1. 6. Backenzähne $\frac{1}{1}$. Die Ohren sind größer als der Kopf und halb so breit als lang; die Klappe ist schmal und kürzer als die halbe Ohrlänge. Jederseits des Nasenrückens zwischen Auge und Nasenlöchern findet sich ein leistenartiger warziger Auswuchs. Die Haare der Oberseite sind dunkel mit lichtbraunen Spitzen, auf der Unterseite mit hellgrauen Spitzen, was zwischen den Hinterbeinen rein weiß wird. Nach der Färbung läßt sich auf Identität mit S. Maugei schließen; die leistenartige Einsäumung des Nasenrückens und die Form des innern Ohrrandes geben nicht einen Plecotus, sondern einen Synotus zu erkennen.

5. S. Townsendii Coop., das columbianische Haftohr; supra ferrugineo-fuscus, subtus flavido-cinerascens; auriculis magnis.

Plecotus Townsendii. Cooper. ann. of the Lyc. of New York IV. p. 73. tab. 3 fig. 6. (Kopf).

Am Columbia-Flusse. Ganze Länge 3. 8", Schwanz 1. 7, Ohren 1. 1, Vorderarm 1. 8". Backenzähne $\frac{1}{1}$. Gestalt wie bei Pl. Lecontii, aber etwas robuster. Die Haare der Oberseite sind am Grunde dunkel, an den Spitzen braun mit rostfarbigem Anflug. Die Unterseite ist röthlich aschfarbig oder ockerfarbig, heller gegen den Schwanz, aber keineswegs weiß. Scheint ebenfalls nicht Plecotus, sondern Synotus angehörig.

XXIX. VESPERTILIO. Fledermaus.

Auriculae disjunctae, nares antice infra rostri apicem apertae; dentes primores $\frac{4}{4}$.

Ueber den ganzen Wohnbezirk der Handflügler und in überaus vielen Arten verbreitet. Von Plecotus und Synotus durch die ganz getrennten seitenständigen Ohren verschieden, so wie dadurch, daß die Naſenlöcher nicht wie bei jenen oben auf der Schnauze, ſondern vorn unter der Schnautzenſpitze etwas ſeitlich geöffnet ſind.

Um die Kenntniß der Arten, namentlich der ausländiſchen, hat ſich Temminck in ſeiner 13ten Monographie die größten Verdienſte erworben; er zählt gegen 80 Arten auf, von denen mehr als die Hälfte neu iſt. Von noch ſtrengerer ſyſtematiſcher Behandlung ſind die klaſſiſchen Arbeiten von Keyſerling und Blaſius[1]; ſie haben nicht blos die Merkmale ausfindig gemacht, durch welche die europäiſchen Arten ſcharf von einander unterſchieden werden können, ſondern auch gezeigt, daß mit wenig Ausnahmen die ausländiſchen Arten ebenfalls in ihren Gruppen unterzubringen ſind. Aus Temminck's Vespertilio haben ſie 5 Gattungen gebildet: Miniopterus, Vesperugo, (mit den Untergattungen Vesperugo und Vesperus), Vespertilio, Plecotus und Synotus.

Ohne Rückſichtsnahme auf die Arbeiten von Keyſerling und Blaſius hat Gray[2] ebenfalls eine Eintheilung der Veſpertillonen aufgeſtellt und daraus als beſondere Gattungen unterſchieden: Barbastellus, Plecotus, Romicia, Vespertilio, Trilatitus, Myotis, Kerivoula, Natalus, Miniopterus, Capaccinus, Scotophilus, Noctulinia, Lasiurus, Murinia und Harpiocephalus.

Mit Gray's Eintheilungs-Princip kann ich mich nicht einverſtanden erklären, da es meiſt auf Merkmale fußt, die mir für generiſche Trennungen nicht bedeutend genug erſcheinen. Ich bin überzeugt, daß man

---

1) Wiegm. Archiv f. Naturgeſch. 1839 u. 1840; ferner in ihrem Werke: die Wirbelthiere Europas. 1840.

2) Ann. of nat. hist. X. (1842) p. 257.

nur auf dem von Keyserling und Blasius betretenen Wege sicher zur scharfen Unterscheidung der Arten gelangen kann; gleichwohl habe ich ihn bezüglich der ausländischen Vespertilionen nicht, wie ich gewünscht hätte, consequent einhalten können, weil bei nicht wenigen der mir nur aus Beschreibungen bekannten Arten die Schilderungen nicht so vollständig sind, daß man daraus die zur Einhaltung einer solchen Methode erforderlichen Charaktere zu entnehmen vermag. Ich habe daher, wie in meinen früheren Supplementen, die Hauptgruppen der Vespertilionen nach den Welttheilen ausgeschieden, und innerhalb dieser Begrenzungen dann wieder Abtheilungen nach zoologischen Merkmalen, so weit es möglich war, angebracht. Ein nicht geringer Theil der hier als Arten hingestellten ausländischen Fledermäuse bedarf zu seiner Sicherstellung einer erneuerten Untersuchung und zwar nach frischen Exemplaren. Da mir hiezu in den meisten Fällen die Gelegenheit fehlte, muß ich mich hier mit ihrer Aufzählung und einer kurzen Charakteristik begnügen, ohne für ihre Artenrechte einstehen zu können. Die deutschen Arten hat so eben Blasius[1]) in ausführlicher Weise meisterhaft geschildert.

a) Europaei.

1. Subgen. Vespertilio Keys. Blas.; dentes molares $\frac{4}{6}$, auriculae margine exteriore sub trago terminatae, trago margine interna convexo aut recto.

Klappe an der Wurzel des Außenrandes mit deutlichem Zahn; Schädel hinten gewölbt, über den niedrigen Nasenrücken deutlich erhöht.

†) auriculis capite longioribus; labio inferiori, oris angulo mentoque albopilosis.

1. V. murinus Schreb., die gemeine Fledermaus; fuliginoso-flavescens, subtus albidus; auriculis capite paululum longioribus, alis digitorum posteriorum basin haud attingentibus.

---

1) Fauna von Deutschland 1855. — Diese ausgezeichnete Arbeit ist dermalen noch nicht im Buchhandel erschienen; der Gefälligkeit des Herrn Verfassers verdanke ich einstweilen die ersten 11 Bogen, die mir gerade zur rechten Zeit kamen, um in meinem, zur Absendung in die Druckerei bereit liegenden Manuskripte noch die nothwendigsten Ergänzungen in der Abtheilung der deutschen Vespertilionen einzutragen.

Vespertilio mutinus. Schreb. S. 165 tab. 51. — Bell brit. quadr. p. 37. — E. Rousseau mag. de zool. 1839 (Zahnwechsel). — Bonap. faun. ital. tab. 10 fig. 2. — Temm. monogr. II. p. 177 tab. 48 fig. 3 (Kopf). — Keys. Blas. Wiegm. Archiv V. S. 308; Wirbelth. XV. u. 52. — S. Longch. faun. belg. p. 21. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 490. — Blas. Faun. v. Deutschl. I. S. 82. — V. myotis. Bechst. Naturgesch. Deutschl. S 1154. — Kuhl, Wetter. An. IV. S. 36. — Myotis murinus. Gray ann. of nat. hist. X. p. 258.

England, Frankreich, Deutschland, Italien, Ungarn, Morea, Südrußland, Syrien, Himalaya und Nordafrika. Körper 2″ 8‴, Schwanz 2″, Ohren 11½‴, Vorderarm 2″ 3‴. Die Ohren sind etwas länger als der Kopf und am Außenrande schwach eingebuchtet; die Klappe ist gerade und erreicht die Mitte des Ohres nicht. Das Gesicht ist von der Stirne bis zur Mitte des Schnauzenrückens dicht wollig behaart. Die Farbe ist oben rauchbraun mit roströthlichen oder fahlgelblichen Haarspitzen, unten weiß; alle Haare an der Wurzel schwärzlich. Linne's V. murinus bezieht sich nicht auf diese Art, die in Schweden fehlt, sondern ist identisch mit V. serotinus.

2. V. Bechsteinii Leisl., die mittelohrige Fledermaus; e rufescente canus, subtus sordide albicans; auriculis capite multo longioribus haud emarginatis; alis usque ad digitorum basin porrectis.

Vespertilio Bechsteinii. Kuhl Wetter. An. S. 30. tab. 22. — Bell brit. quadr. p. 40. — Temm. monogr. II. p. 184 tab. 50 fig. 1, 2. — Keys. Blas. Wiegm. Archiv V. S. 308; Wirbelth. p. XV. u. 53. — S. Longch. faun. belg. p. 22. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 491. — Blas. Faun. v. Deutschl. I. S. 85. — Myotis Bechsteinii. Gray ann. of nat. hist. X. p. 258.

Süd-England, östliches Frankreich, Deutschland, Ungarn, Galizien und die Ukraine. Körper 1″ 11‴, Schwanz 1″ 6‴, Ohren 11½‴, Vorderarm 1″ 6½‴. Die Ohren sind 1½ so lang als der Kopf, am Außenrande ohne Einbuchtung; die Klappe erreicht nicht die Mitte des Ohrs und ist nach außen gebogen. Das Gesicht ist fast ganz nackt. Oben röthlichgrau, ohne roströthliche Haarspitzen; die Unterseite schmutzig weißlich.

3. V. Nattereri Kuhl., die gefranste Fledermaus; fuliginoso-fulvidus, subtus sordide albidus; auriculis extus leviter emarginatis, patagio interfemorali cilliis rigidis subcrispis limbato; alis digitorum basin haud attingentibus.

Vespertilio Nattereri. Kuhl, Wetter. Ann. IV. S. 33. — Boie, Isis 1825 S. 1200. — Bell brit. quadr. p. 42. — Temm. monogr. II. p. 185 tab. 50 fig. 3, 4. — Keyſ. Blaſ. Wiegm. Archiv V. S. 300; Wirbelth. XV. u. 53. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 491. — S. Longch. faun. belg. p. 21. — Nilss skand. faun. I. p. 51. — Mc. Coy, ann. of nat. hist. XV. p. 270. — Eversm. bullet. de Moscou 1845 p. 508 tab. 13 fig. 7 (Kopf). — Blaſ. Faun. v. Deutſchl. I. S. 88. — V. emarginatus. Bonap. faun. ital. tab. 9. fig. 1. — Myotis Nattereri. Gray ann. of nat. hist. X. p. 258.

Von Irland, England und dem mittlern Schweden an bis zum mittelländiſchen und adriatiſchen Meere und den uralſchen Vorbergen verbreitet. Körper 1″ 8½‴, Schwanz 1″ 7½‴, Ohren 7½‴, Vorderarm 1″ 5½‴. Die Ohren ſind am Außenrande ſchwach eingebuchtet; die Klappe reicht über die Mitte des Ohrs und iſt ſichelförmig gebogen; das Geſicht iſt dicht behaart, die Oberlippe iſt mit einem Schnurrbart verſehen. Die Flügel reichen bis zu ⅔ des Mittelfußes; die Schenkelflughaut iſt hinten mit ſtarren Wimpern beſetzt, was bei den vorhergehenden nicht der Fall iſt. Oben iſt die Farbe rauchbraun mit fahlgelblichen Haarſpitzen, unten ſchmutzig weißlich.

4. V. ciliatus Blas., die gewimperte Fledermaus; brunneo-canus, subtus albus; auriculis extus profunde emarginatis; patagio interfemorali ciliis mollibus rectis limbato; alis usque ad digitorum basin porrectis.

Vespertilio ciliatus. Blaſ. im Archiv f. Naturgeſch. 1853 S. 288; Faun. v. Deutſchl. I. S. 91.

Eine neue, von Blaſius entdeckte Art, die er zuerſt im Muſeum zu Turin als ein in Piemont einheimiſches Thier ſah, ſpäter aber auch aus der Gegend von Köln erhielt. Ganze Länge 3″, wovon der Schwanz 1″ 7½‴ ausmacht, Ohren 6½‴, Vorderarm 1″ 4‴. Von dem nahe verwandten V. Nattereri unterſcheidet Blaſius dieſe neue Art durch folgende Merkmale. 1) Bei V. Nattereri iſt das Ohr am Außenrande etwas über der Mitte ſchwach und gleichmäßig eingebuchtet; bei V. ciliatus iſt die Einbuchtung ſehr ſtark und faſt abgerundet rechtwinkelig [1]).

1) Die ſtarke Einbuchtung der Ohren erinnert an V. emarginatus Geoffr., über welchen jedoch Blaſius auch in ſeiner neueſten Beſchreibung ſich noch keine ſichere Mei-

2) Bei jenem ragt die Klappe bis zur Höhe der Einbucht, bei dieſem erreicht ſie letztere nicht. 3) Bei V. Nattereri ſind die Flügel nur bis zu ½ der Länge des Mittelfußes reichend, dagegen bei V. ciliatus bis zur Zehenwurzel. 4) Bei erſterem iſt die Schenkelflughaut hinten mit ſtarren, etwas gekrümmten Härchen gewimpert; bei letzterem ſind dieſe weich und gerade. — Der Pelz iſt oben hell bräunlichgrau, unten weiß; die einzelnen Haare ſind zweifarbig: am Grunde ſchwarzbraun, oben mit fahlbräunlich grauen, unten mit weißen Spitzen. Die Flughäute und Ohren ſind licht graubräunlich [1]).

††) auriculis capite haud longioribus; labio inferiore, oris angulo mentoque fusco-pilosis.

5. V. mystacinus Leisl., die ſchnurrbärtige Fledermaus; fulvido-fuscus, subtus pallidior; auriculis fere longitudine capitis, emarginatis; alis fere usque ad digitorum basin porrectis.

---

nung bilden konnte, nur iſt er jetzt der Anſicht, daß dieſe Art eher in der Gruppe, zu der V. Nattereri gehört, als in der von V. mystacinus zu ſuchen iſt. In letzterer Beziehung ſtimmt er demnach mit Selys Longchamps überein, der den V. emarginatus als ſelbſtſtändige Art beibehält und von ihm bemerklich macht, daß er mehr dem V. Nattereri als dem V. mystacinus gleicht. Von dieſen beiden Arten unterſcheidet er aber ſeinen V. emarginatus durch den wolligen, auf dem Rücken hellrothen und über die Schenkelflughaut merklich ſich erſtreckenden Pelz, durch ſtark ausgerandete Ohren, dicke Schnauze u. ſ. w. Die Färbung des V. emarginatus iſt, wie er zufügt, faſt die des V. serotinus. — Es iſt mir übrigens ſo wenig als Blaſius eine Fledermaus zu Geſicht gekommen, die ich als V. emarginatus auct. hätte deuten können.

1) Im Bullet. de Moscou XVIII. (1845) p. 505. tab. 13 fig. 8 (Kopf) führt Eversmann in der Gruppe mit ⅔ Backenzähnen beiderſeits und mit Ohren, die länger als der Kopf ſind, eine neue Art aus den ural'ſchen Vorbergen auf unter dem Namen:

V. Brandtii; „dentes primores superiores bifidi, interni in tomii directionem positi, externi transversi; auriculae ovatae obtusae capite longiores, trago lanceolato acuminato; notaeum rufofuscum, gastraeum griseum.“

Von den Ohren ſagt Eversmann, daß ſie etwas länger ſind als der Kopf, doppelt ſo lang als breit und am Grunde des äußeren Randes eingebogen. Die Klappe iſt lanzett, zugeſpitzt und reicht bis zur Hälfte des Ohrs. Die Flügel ſind nackt, ſchwarzbraun und reichen bis zu ⅔ des Mittelfußes; die Schenkelflughaut iſt in der Gegend des os calcis etwas gewimpert. Die Haare ſind in ihrem untern Theil ſchwarz. Körper 1″ 7‴, Schwanz 1″ 6‴, Ohren 7‴, Klappe 3½‴.

Vespertilio mystacinus. Kuhl Wetter. Ann. IV. S. 58. — Bell brit. quadr. p. 50. — Temm. monogr. II. p. 191 tab. 51 fig. 3, 4. — Keyf. Blaf. Wiegm. Archiv V. S. 310; VI. S. 6; Wirbelth. S. XV. u. 54. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 492. — S. Longch. faun. belg. p. 20. — Nilss. skand. faun. I. p. 45. — Blaf. Faun. v. Deutfchl. I. S. 96. — V. humeralis. Temm. l. c. p. 192. — V. Schrankii Koch. Wagn. Wiegm. Archiv IX. 2. S. 25.

Mittleres Schweden, England, Frankreich, Deutfchland, Galizien und mittleres Rußland. Körper 1" 7‴, Schwanz 1" 5‴, Ohren 6½‴, Vorderarm 1" 4½‴. Die Ohren erreichen die Schnautzenfpitze und find am Außenrand ſtark eingebuchtet; die Klappe geht etwas über die Ohrmitte, iſt von der Wurzel an ſtark verſchmälert und mit der Spitze ſchwach auswärts gebogen. Der Pelz iſt reichlich, die Oberlippe mit ſchwarzem Schnurrbart. Die Färbung iſt gewöhnlich oben falb roſtbraun, unten blaßgrau, doch varirt ſie bis ins Kohlſchwarze.

6. V. Daubentoni Leisl., die weißbäuchige Fledermaus; ferrugineo-brunneus, subtus cano-albidus; auriculis rhomboidalibus capite brevioribus; alis medium metatarsi haud attingentibus.

Vespertilio Daubentonii. Kuhl Wetter. Ann. IV. S. 51 tab. 25. — Bell brit. quadr. p. 47. — Bonap. faun. ital. tab. 10 fig. 1. — Temm. monogr. II. p. 186 tab. 50 fig. 5, 6. — Keyf. Blaf. Wiegm. Archiv V. S. 311; Wirbelth. XV. u. 53. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 493. — S. Longch. faun. belg. p. 20. — Nilss. skand. faun. I. p. 48. — Eversm. bullet. de Moscou XVIII (1855) p. 510. — Blaf. Faun. v. Deutfchl. I. S. 98. — V. volgensis. Eversm. l. c. 1840 p. 24. — V. emarginatus Jenyns brit. vert. p. 26

β) var. albida.

V. aedilis. Jenyns ann. of nat. hist. III. p. 73 tab. 3; VII. p. 262.

England, ſüdliches Schweden, uralſche Vorberge, Kaſan, Deutſchland, Belgien, Sardinien, Sicilien. Körper 1" 9‴, Schwanz 1" 5½‴, Ohren 6½‴, Vorderarm 1" 5½‴. Die Ohren ſind am Außenrand eingebuchtet; die Klappe reicht faſt bis zur Ohrmitte und iſt blos in der Endhälfte und zwar zuletzt ſtark verſchmälert. Die Farbe iſt oben röthlichgrau oder röthlich graubraun, unten graulichweiß; die Haarwurzeln ſind oben braungrau, unten ſchwarz.

7. V. dasycnemus Bell., die Sumpf-Fledermaus; e rufescente canus, subtus cano-albidus; alis usque ad tarsum porrectis; patagio interfemorali ½ dense piloso.

Vespertilio dasycnemus. Boie, Isis 1825 S. 1200. — Keys. Blas. Wiegm. Archiv V. S. 311; VI. 1. S. 5; Wirbelth. S. XVI. u. 55. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 494. — S. Longch. faun. belg. p. 19. — Blas. Faun. v. Deutschl. I. S. 101. — V. limnophilus. Temm. monogr. II. p. 176 tab. 48 fig. 1, 2.

Dänemark, Oldenburg, Niederlande, Niederrhein, Braunschweig, Schlesien, Ungarn und Altai. Körper 2" 3‴, Schwanz 1" 10‴, Ohren 8‴, Vorderarm 1" 8½‴. Die Ohren reichen nicht bis zur Schnauzenspitze und sind am Außenrand nicht merklich eingebuchtet; die Klappe geht nicht bis zur Endmitte und ist nur im Enddrittel verschmälert. Der Fuß ist ganz frei. Die Schenkelflughaut ist oben und unten zu ⅓ behaart und die Behaarung unten längs des Schienbeins bis zum Rande fortgesetzt. Der Pelz ist oben fahl graubraun, unten trüb weiß. Die einzelnen Haare sind zweifarbig, an der Wurzel schwarz, an der Spitze oben fahl graubraun, unten weiß.

* V. Capaccinii Bonap.

Vespertilio Cappaccini. Bonap. faun. ital. XX. fol. 99. — Temm. monogr. II. p. 187 tab. 49 fig. 3. — Keys. Blas. Wiegm. Archiv. V. S. 312; VI. 1. S. 5; Wirbelth. S. XVI. u. 55. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 495. — V. megapodius. Temm. monogr. II. p. 189.

Wurde anfänglich nur in Sardinien (V. megapodius) und Sicilien (V. Cappaccinii), später aber von Blasius im größten Theile von Italien gefunden. Die sorgfältigen Untersuchungen des Letzteren haben dargethan, daß diese südlichen Formen, auf welchen V. Cappacinii und V. megapodius beruhen, nicht von den nördlichen, auf welchen der V. dasycnemus begründet ist, verschieden sind.

2. Subgen. **Vesperugo Keys. Blas.**; dentes molares $\frac{6}{6}$ aut $\frac{5}{5}$; auriculae margine exteriore sub trago versus angulum oris porrectae; trago margine interiore concavo, introrsum verso. — Klappe an der Wurzel des Außenrandes mit deutlichem Zahn. Schädel hinten flach, mit dem Nasenrücken in derselben Ebene liegend.

†) Dentes molares $\frac{5}{5}$: Vesperugo K. B.

α) trago dilatato, alis ad tarsum finitis.

Flughäute sehr schmal, ihre Unterseite längs des Armes und der Wurzel des fünften Fingers dicht behaart.

8. V. Noctula Schreb., die große Speckmaus; unicolor fulvido-brunneus, pilis unicoloribus; dentibus primoribus inferioribus oblique positis.

Vespertilio Noctula. Schreb. I. S. 166 tab. 52. — Bonap. faun. ital. tab. 13 fig. 1. — Bell brit. quadr. p. 12. — Temm. monogr. II. p. 169; faun. japon. I. p. 15. — Fr. Cuv. mamm. II. — Keyſ. Blaſ. Wiegm. Archiv V. S. 317; VI. S. 7; Wirbelth. XIV. u. 46. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 501. — S. Longch. faun. belg. p. 24. — Eversm. bullet. de Moscou 1845. p. 490 tab. 12. fig. 1. (Ohren und Zähne). — Nilss. skand. faun. I. p. 29. — Blaſ. Faun. v. Deutſchl. I. S. 53. — V. lasiopterus. Schreb. tab. 58 B. — V. proterus. Kuhl, Wetter. Ann. IV. S. 41. — V. ferrugineus. Brehm's Ornis 1827 S. 17.— V. serotinus. Geoffr. ann. d. mus. VIII. p. 194. — V. macuanus. Peters Moſſamb. I. S. 61 tab. 16 fig. 1.

Schweden, England, Frankreich, Deutſchland, Italien, gemäßigtes Rußland, um das kaſpiſche Meer, Japan und nördliches Afrika. Körper 2″ 9‴, Schwanz 1″ 6‴, Ohren 8¼‴, Vorderarm 1″ 11½‴. Die Ohren ſind weit, die Klappe iſt ſehr kurz, der Vorderarm ragt bis zur Schnauzenſpitze vor. Der Pelz iſt gelbröthlichbraun, ohne hellere Spitzen; die Unterſeite iſt etwas lichter, die Haare ſind einfarbig. Blaſius hält ſich für überzeugt, daß auch der V. macuanus Pet. von Moſſambique identiſch mit V. Noctula iſt.

9. V. Leisleri Kuhl, die kleine Speckmaus; rufo-brunneus, subtus pallidior, pilis bicoloribus; dentibus prim. inferioribus secundum mandibulae directionem positis.

Vespertilio Leisleri. Kuhl, Wetter. Ann. IV. S. 38. — Bell brit. quadr. p. 18. — Temm. monogr. II. p. 171. — Keyſ. Blaſ. Wiegm. Archiv V. S. 318; VI. S. 7; Wirbelth. S. XIV. u. 46. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 502. — Eversm. bullet. de Moscou XVIII. p. 495 tab. 12 fig. 4 (Ohr). — Blaſ. Faun. v. Deutſchl. I. S. 56.

Von Frankreich und England an durch das ganze mittlere Europa (insbeſondere auch im ganzen Alpenzug) bis Sibirien verbreitet. Körper 2″ 1‴, Schwanz 1″ 5‴, Ohren 7‴, Vorderarm 1″ 7‴. Die Ohren ſind weit, die Klappe ſehr kurz, und der Vorderarm reicht bis zur Mitte der Mundſpalte. Die Haare ſind zweifarbig: im Wurzeltheil dunkelbraun, im Endtheil fahl rothbraun, auf der Unterſeite mehr graugelblich.

β) **trago angustato, alis usque ad digitorum pedis basin adnatis.**

Flughäute ziemlich breit, ihre Unterſeite längs des Vorderarms und an der Handwurzel nackt.

10. V. Kuhlii Natt., die weißrandige Fledermaus, ferrugineo-fuscus, subtus cano-brunneus; rostro obtuso; patagio interfemorali usque ad medium villosissimo; patagiis albo-marginatis; dentibus primoribus inferioribus oblique positis.

Vespertilio Kuhlii. Kuhl, Wetter. Ann. IV. S. 58. — Temm. monogr. II. p. 196. tab. 51 fig. 5, 6. — Keyſ. Blaſ. Wiegm. Archiv V. S. 319; Wirbelth. S. XIV. u. 47. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 503. — Blaſ. Faun. S. 63. — V. Vipistrellus. Bonap. faun. ital. tab. 11 fig. 1. — Temm. monogr. II. p. 193. — V. marginatus Cretzſchm. Rüpp. Atlas S. 74 tab. 29 a. — Temm. II. p. 201 tab. 52 fig. 3, 4. — Keyſ. Blaſ. Wirbelth. S. XIV. u. 47. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 504. tab. LV. A. — V. albolimbatus. Küſter Iſis 1835 S. 75. — Bonap. faun. ital. tab. 12. fig. 2. — V. Alcythoe. Bonap. l. c. n. 14 fig. 1. — Keyſ. Blaſ. Wirbelth. S. XV. u. 52. — Wagn. a. a. O. I. S. 507.

Kommt von den ſüdlichen Alpenthälern an durch ganz Südeuropa, Nordafrika und Südweſt-Aſien, in allen Ländern rings um das mittelländiſche Meer, vor. Körper 1″ 8‴, Schwanz 1″ 4‴, Ohren 5½‴, Vorderarm 1″ 3½‴. Die Ohren ſind vollkommen dreiſeitig und nicht ausgeſchnitten. Der Leib iſt von einer breiten Haarbinde umgeben. Die Farbe iſt oben dunkel röthlichbraun, unten heller braun mit Grau überflogen; alle Haare ſind an der Wurzel braunſchwarz. Die Flughaut iſt am Hinterrande zwiſchen dem Fuß und dem fünften Finger gelblichweiß gefärbt und gegen den Fuß hin etwas gekörnelt. — Blaſius hat in ſeiner neueſten Arbeit nachgewieſen, daß auch V. marginatus und V. Alcythoe mit V. Kuhlii identiſch ſind.

11. V. Nathusii Keys. Blas., die ſchienenhaarige Fledermaus; fuliginoso-brunneus, subtus sordide luteo-griseus; patagio interfemorali supra usque ad medium et juxta totam tibiam piloso; dentibus primoribus inferioribus secundum mandibulae directionem positis.

Vespertilio Nathusii. Keyſ. Blaſ. Wiegm. Archiv. V. S. 320; VI. S. 11; Wirbelth. S. XIV. u. 48. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 504. — Eversm. bullet. de Moscou 1845 p. 497 tab. 13 fig. 5 (Kopf.) — Blaſ. Faun. v. Deutſchl. I. S. 58.

Durch das ganze mittlere Europa vom Rhein bis zum ſüdlichen Ruß-

land, von Schweden und Norddeutschland bis ans mittelländische Meer verbreitet. Körper 1″ 10‴, Schwanz 1″ 3‴, Ohren 6‴, Vorderarm 1″ 3‴. Die Schnautze ist breit und stumpf, der Außenrand des Ohrs unter der Linie der Mundspalte und hinter derselben geendigt. Die Oberseite düster rauchbraun, die Unterseite düster gelbgrau, nach den Flughäuten mehr rostfarbig, unter den Ohren ein dunkler Fleck; die Wurzeln aller Haare sind schieferschwarz. Die Flughäute sind rauchschwarz, ohne hellern Rand.

12. V. Ursula Wagn., das Bärchen; fulvido-brunneus, subtus dilutior; rostro obtuso tumido, setis hispido; patagio interfemorali basi sola piloso; dentibus primoribus inferioribus secundum mandibulae directionem positis.

Vespertilio Ursula. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 505.

Morea. Körper 1″ 7‴, Schwanz 1″ 4‴, Ohren 5½‴, Vorderarm 1″ 2½‴. Von V. Nathusii durch die starke Anschwellung und den Haarbesatz der Lippen abweichend, sowie daß die Schenkelflughaut nur im obern Drittel behaart und die Färbung lichter ist. Die Oberseite ist rostig gelbbraun, die Unterseite licht gelblichbraun, die Haare sind in ihrem Wurzeltheil schwarzbraun. Kein dunkler Schulterfleck.

13. V. Pipistrellus Schreb., die Zwerg-Fledermaus; fuliginoso aut umbrino-fuscus; rostro attenuato, patagio interfemorali basi sola piloso; dentibus primoribus inferioribus secundum mandibulae directionem positis.

Vespertilio Pipistrellus. Schreb. I. S. 176 tab. 54. — Kuhl, Wetter. Ann. IV. S. 53. — Bell brit. quadr. p. 23. — Temm. monogr. II. p. 194 tab. 48 fig. 5 (Kopf). — Keys. Blas. Wiegm. Archiv V. S. 321; Wirbelth. S. XIV. u. 49. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 506. — S. Longch. faun. belg. p. 23. — Nilss. skand. faun. I. p. 41. — Blyth journ. of the Asiat. soc. XXI. p. 360. — Blas. Faun. v. Deutschl. I. S. 61. — V. pygmaeus. Leach zool. journ. I. p. 560 tab. 22. — Bell brit. quadr. p. 23. — V. brachyotus Baillon. S. Longch. l. c. p. 23 u. 360.

Rußland, Schweden, England, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und Nordasien bis zum Himalaya. Körper 1″ 4½‴, Schwanz 1″ 2½‴, Ohren 5½‴, Vorderarm 1″ 1‴. Der Außenrand der Ohren ist dicht am Mundwinkel geendigt; die Schnautze vorn verschmälert und an

den Naſenlöchern winkelig abgeſchnitten. Die Oberſeite iſt ruſſig rothbraun, mehr oder minder dunkel, die Unterſeite lichter. Die Haare der letztern ſind deutlich zweifarbig: braunſchwarz mit fahl gelbbräunlichen Spitzen; die Haare der Oberſeite bei den dunkel rußbraunen Exemplaren faſt einfarbig, bei den lichteren mit helleren Spitzen. Schinz V. stenotus und V. minutissimus (Syſt. Verz. I. S. 160), ſo wie Crespon's V. nigrans aus Frankreich und Géné's V. nigricans (dict. univ. d'hist. nat. 13 p. 214) ſcheinen nur ganz dunkle Abänderungen des V. Pipistrellus darzuſtellen.

14. V. Maurus Blas, die Alpen-Fledermaus; fuscus, subtus dilutior; trago basi bidenticulato.

Vespertilio Maurus. Blaſ. Münchn. gel. Anzeig. XX. (1853) S. 108; Archiv für Naturgeſch. 1853. 1 S. 35; Faun. v. Deutſchl. I. S. 67.

Eine neue Entdeckung von Blaſius, der dieſe Fledermaus an verſchiedenen Punkten der Centralalpen antraf (Umgebung des Montblanc und St. Gotthard, im obern Oetzthal, an dem Paſterzen-Gletſcher unter dem Großglockner und im Raßfelde bei Gaſtein). Körper 1″ 11‴, Schwanz 1″ 3‴, Vorderarm 1″ 3¼‴, Ohren 6¼‴, Flugweite 8″ 6‴. Ein Mittelglied zwiſchen den Unterabtheilungen Vesperugo und Vesperus, indem ſie in der Zahl der Zähne mit erſterer, in der Fuß- und Schwanzbildung mit letzterer übereinſtimmt. Der Ohrdeckel weicht von dem aller bekannten Arten ab, indem, außer dem gewöhnlichen Zahnvorſprunge an der Baſis des Außenrandes, der bei allen Arten von Vesperugo deutlich ausgebildet iſt, ſich noch über demſelben ein zweiter kleinerer zahnähnlicher Vorſprung befindet. Die Flügel ſind bis zur Zehenwurzel angewachſen und längs des Körpers oben wie unten behaart; die Schwanzſpitze ragt aus der Flughaut frei hervor. Die Schneiden der ſeitlichen untern Vorderzähne ſind quer zur Richtung des Kiefers geſtellt. Die Ohrklappe erreicht ihre größte Breite in der Mitte, und ihre ſtark verſchmälerte Spitze iſt vorwärts nach innen gerichtet. Der Pelz iſt oben dunkelbraun, unten heller. Das Haar iſt überall zweifarbig: am Grunde ſchwarzbraun, oben mit gelb- oder röthlichbraunen, unten mit etwas mehr weißlichbraunen Haarſpitzen. Die hellen Haarſpitzen der Oberſeite nehmen ſich wie ein leichter, lockerer Goldreif auf ſchwarzem Grunde aus

und zeichnen diese Art von allen übrigen aus. Ohren und Flughäute sind dickhäutig und braunschwarz, dunkler als bei einer andern einheimischen Art.

††) Dentes molares $\frac{4}{5}$. — Vesperus K. B.

α) trago angustato.

Flughäute breit, Flügel bis zur Zehenwurzel angeheftet.

15. V. serotinus Schreb., die spätfliegende Fledermaus; castaneo-brunneus, subtus brunneo-canus.

Vespertilio serotinus. Schreb. I. S. 167 tab. 53. — Kuhl Wetterau. Ann. IV. S. 45. — Bell brit. quadr. p. 34. — Temm. monogr. II. p. 175. — Keys. Blas. Wiegm. Archiv. V. S. 313; Wirbelth. S. XIV. u. 49. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 496. — Bonap. faun. ital. n. 13. — S. Longch. faun. belg. p. 23. — Blas. Faun. v. Deutsch. I. S. 76. — V. Noctula. Geoffr. ann. d. mus. VIII. p. 193. — V. murinus. Pall. zoogr. I. p. 221. — V. turcomanus. Eversm. bullet. de Moscou 1840 p. 21; 1845 (XVIII) p. 490 tab. 12 fig. 2 (Ohr und Zähne).

Im mittlern Europa von Frankreich bis nach Sibirien und von Norddeutschland bis Mittelitalien einheimisch. Körper 2″ 6‴, Schwanz 2″, Ohren 9‴, Vorderarm 1″ 11‴. Die Ohren sind ziemlich erweitert; die Klappe ist schmal und unter der Mitte des Außenrandes am breitesten. Die Oberseite ist rauherig kastanienbraun; die Haare am Grunde und der Spitze lichter, die seitlichen einfarbig. Der Unterleib ist bräunlichgrau mit einfarbigen Haaren. — Blasius betrachtet auch den V. turcomanus Eversm. blos als eine sehr hellfarbige und etwas kleinere Lokalvarietät, die bisher nur zwischen dem kaspischen und Aralsee gefunden wurde [1]).

1) Als wesentliche Merkmale seines V. turcomanus giebt Eversmann folgende an. Körper 2″ 9‴, Schwanz 1″ 8‴, Ohren 7½‴, Klappe 3½‴, Vorderarm 1″ 10‴. Backenzähne $\frac{4}{5}$; von den unteren Schneidezähnen sind die beiden äußeren schief gestellt. Die Ohren sind ziemlich groß, obwohl kürzer als der Kopf, breit an der Spitze abgerundet, ihr äußerer Rand gegen den Mundwinkel vorgeführt. Die Klappe ist am innern Rand fast gerade, am äußern conver. Die Flughäute sind nackt, die Flügel bis zur Basis der Zehen vorgestreckt. Die Färbung bezeichnet Eversmann oben als licht fahlbräunlich, unten als weiß, alle Haare einfarbig. Hiemit stimmt unser Exemplar, nur ist bei ihm auch Kopf und Hinterhals weiß, letzterer an den Seiten mit schwachem gelblichen Anhauch.

β) trago dilatato.

Flughäute breit, Flügel bis zur Zehenwurzel angeheftet.

16. V. discolor Natt., die weißſcheckige Fledermaus; supra fuscus, albo-variegatus, subtus albidus; patagiis subtus circum corpus albo-pilosis; dentibus primoribus inferioribus secundum mandibulae directionem positis.

Vespertilio discolor. Kuhl Wetter. Ann. IV. S. 43. tab. 15. fig. 2. — Bell. brit. quadr. p. 21. — Temm. monogr. II. p. 173. — Keyſ. Blaſ. Wiegm. Archiv V. S. 314; Wirbelth. S. XV. u. 50. — Eversm. bullet. de Moscou 1840 p. 25; 1845 p. 502 tab. 12 fig. 3 (Kopf). — Blaſ. Faun. v. Deutſchl. I. S. 73. — V. murinus. Linn. syst. nat. XIII. p. 47. — Nilss. skand. faun. I. p. 17. — V. Noctula. Retz. faun. I. p. 7. — V. Pipistrellus. Retz. faun. p. 7. — V. serotina. Pall. zoogr. I. p. 123.

Südliches Schweden und England, Deutſchland, ſüdliches Rußland, Dauurien. Körper 2″ 1‴, Schwanz 1″ 6½‴, Ohren 7½‴, Vorderarm 1″ 7‴. Der Außenrand des Ohrs geht tief unter die Linie der Mundſpalte hinab und iſt dicht am Mundwinkel geendigt; die Schwanzflughaut oben nur an der Wurzel dicht behaart. Die Haare der Oberſeite ſind dunkelbraun mit glänzender weißlicher Spitze; die der Unterſeite in der Wurzelhälfte braun, in der Spitzenhälfte weiß. Die Unterſeite der Flughäute iſt um den Körper mit einfarbig weißen Haaren beſetzt.

17. V. Nilssonii Keys. Blas., die nordiſche Fledermaus; supra fuscus, brunneo albido-variegatus, subtus clare brunnescens; patagiis subtus circum corpus fusco-pilosis; dentibus primoribus inferioribus oblique positis.

Vespertilio Nilssonii. Keyſ. Blaſ. Wiegm. Archiv V. S. 316; Wirbelth. S. XV. u. 51. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 498. — Blaſ. Reiſe im europ. Rußland I. S. 264; Faun. v. Deutſchl. I. S. 70. — V. Kuhlii. Nilss. illum. fig. v. fol. 2. — V. borealis. Nilss. skand. faun. I. p. 25.

Vom Harze, den Oſtſeeprovinzen, dem mittleren Ural und dem Altai an durch das nördliche Europa bis gegen den Polarkreis verbreitet. Körper 2″ 1‴, Schwanz 1″ 9‴, Ohren 7½‴, Vorderarm 1″ 6‴. Der Außenrand des Ohrs liegt in gleicher Höhe mit der Mundſpalte und iſt 1½‴ hinter ihr geendigt; die Schwanzflughaut oben bis zur Mitte behaart. Die Haare der Oberſeite ſind dunkelbraun mit braunweißlichen Spitzen, die der Unterſeite mit hellbraunen Spitzen; unter dem Ohr ein

hellerer braungelber Fleck. Die Unterseite der Flughäute ist rings um den Körper braun behaart.

18. V. Savii Bonap., die herzohrige Fledermaus; umbrino-fuliginosus, subtus albicans; patagiis nudis.

Vespertilio Savii. Bonap. faun. ital. n. 11. — Keys. Blas. Wiegm. Archiv V. S. 316; Wirbelth. S. XV. u. 51. — Temm. monogr. II. p. 197. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 499.

Dalmatien, Toskana, Rom, Sicilien, Sardinien. Körper 1" 11‴, Schwanz 1" 3‴, Ohren 5‴, Vorderarm 1" 3‴. Schnauze spitz, Ohren um ⅓ kürzer als der Kopf, breit herzförmig; Klappe nierenförmig, kürzer als die Ohrhälfte. Haare der Oberseite an der Basis schwärzlich mit braungelblicher Spitze, die der Unterseite am Grunde mattschwarz mit weißlicher Spitze; Kinn schwärzlich.

19. V. Bonapartii Sav., die stumpfnasige Fledermaus; fusco-subrufescens, subtus vix pallidior; auriculis vix emarginatis.

Vespertilio Bonapartii. Savi, nuov. giorn. lett. Pisa 1839. — Bonap. faun. ital. n. 12.

Rom, Pisa, Ascoli, Sicilien. Körper 1" 6‴, Schwanz 1" 2‴, Ohren 5‴, Vorderarm 1" 2‴. Schnauze stumpf, Ohren oval dreieckig, um ⅓ kürzer als der Kopf, Klappe kürzer als die Ohrhälfte. Haare in ihrem untern Theil dunkelbraun, Spitzen der Oberseite gelblichgrau, der Unterseite weißlich grau, Häute schwärzlich.

20. V. Leucippe Bonap., die Seiden-Fledermaus; cinnamomeus, subtus sericeo-albus; auriculis superne emarginatis.

Vespertilio Leucippe. Bonap. faun. ital. n. 14 fig. 2. — Keys. Blas. Wirbelth. S. XV. u. 52. — Temm. monogr. II. p. 200. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 500.

Sicilien. Körper 1" 9‴, Schwanz 1" 3‴, Ohren 5‴, Vorderarm 1" 3‴. Schnauze flach, gerundet; Ohren um ⅓ kürzer als der Kopf, Klappe halbrund, kaum ⅛ Ohrlänge. Oberseite zimmtfarbig, Unterseite seidenweiß; die Haare am Grunde dunkel.

21. V. Aristippe Bonap., die spitzmäulige Fledermaus; griseo-lutescens, subtus cinereo-albidus; auriculis inferne vix emarginatis.

Vespertilio Aristippe. Bonap. faun. ital. n. 14 fig. 3. — Keyſ. Blaſ. Wirbelth. S. XV. u. 52. — Temm. monogr. II. p. 200. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 500.

Sicilien. Körper 1″ 7‴, Schwanz 1″ 3‴, Ohren 5½, Vorderarm 1″ 3‴. Schnauze zuſammengedrückt ſpitz; Ohren etwas gerundet, Klappe über ⅓ der Ohrlänge. Oberſeite iſabell, Unterſeite ſchmutzig zinnweiß; die Haare am Grunde dunkel.

3. Subgen. Miniopterus Bonap.; dentes molares ⅔; auriculae rhomboidales, trago aequali margine interiore concavo; cranium postice valde tumidum.

22. V. Schreibersii Natt., die Taſchen-Fledermaus; grisco-brunneus, subtus cinereus; cauda corpore longiore; patagio ad pedes sacciforme inflexo.

Vespertilio Schreibersii. Kuhl, Wetter. Ann. IV. S. 41. — Temm. monogr. II. p. 174. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 508. — Miniopterus Schreibersii. Keyſ. Blaſ. Wiegm. Archiv V. S. 323; VI. S. 8; Wirbelth. S. XIII. u. 45. — Blaſ. Faun. v. Deutſchl. I. S. 46. — M. Ursinii. Bonap. faun. ital. tab. 15 fig. 1. — V. Ursinii. Temm. monogr. II. p. 179 tab. 49 fig. 1, 2. — V. dasythrix. Temm. l. c. p. 212. — Wagn. l. c. S. 523. — M. dasythrix. A. Smith zool. of South Afric. I. tab. 52. — V. blepotis. Temm. l. c. p. 212 tab. 53 fig. 1, 2; faun. japon. I. p. 16. — Wagn. l. c. S. 515.

Südeuropa (Bannat, Italien,) Algier, Südafrika (V. dasythrix), Südaſien (Java, Banda, Amboina, Timor, Japan = V. blepotis). Körper 1″ 11‴, Schwanz 2″ 1‴, Ohren 5‴, Vorderarm 1″ 7½‴. Ohren klein, rhombiſch; Klappe ziemlich gleich breit, faſt bis zur Ohrmitte reichend. Füße frei. Oben braungrau, unten hell aſchgrau.

b) Asiatici.

1. Subgen. Vespertilio K. B.; dentes molares ⅔.

23. V. adversus Horsf., die Zangen-Fledermaus; fuscus nitore griseo, subtus albo-canescens; auriculis longitudine capitis; dentibus primoribus scalpris emarginatis denticulis adverse positis.

Vespertilio adversus. Horsf. zool. research. n. 8. — Temm. monogr. II. p. 221. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 516. — ? Cantor, journ. of the Asiat. soc. XV. p. 184.

Java. Körper 2″, Schwanz 1″ 3‴, Flugweite 10″. Nur durch

Horsfield bekannt. Klappe gerade, linear, halb so lang als das Ohr. Oben braungrau mit hellgrauen Spitzen; unten weißlich. — Cantor giebt nur $\frac{4}{5}$ Backenzähne an.

24. V. papillosus Temm., die warzige Fledermaus; auriculis latioribus quam longioribus; patagio interfemorali papillis minutissimis marginato.

Vespertilio papillosus. Temm. monogr. II. p. 220 tab. 55 fig. 1—4. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 515.

Java, Sumatra. Körper 2″, Schwanz 2″, Vorderarm 1″ 7‴. Ohren fast rundlich, mit Längsfalte; Klappe sehr lang, pfriemenförmig. Haare der Oberseite dunkelbraun, an der Spitze röthlich, am Grunde silbergrau; Unterseite röthlich, Bauchmitte roth, Seiten braun; alle Haare an der Wurzel schwärzlich.

25. V. Hardwickii Horsf., die ohrfaltige Fledermaus; auriculis latioribus quam longioribus, plica longitudinali instructis; trago longissimo.

Vespertilio Hardwickii. Horsf. zool. research. n. 8. — Temm. monogr. II. p. 222 tab. 55. fig. 7—9. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 516. — Kerivoula Hardwickii. Gray ann. of nat. hist. X. p. 258.

Java, Sumatra. Körper 1″ 6‴, Schwanz eben so viel, Vorderarm 1″ 1‴. Ohren ausgerandet, gleich V. papillosus mit einer Längsfalte zur Verschließung des Ohres; Klappe sehr lang, linear-lanzett. Oben hell braungrau, unten eben so mit röthlichen Spitzen.

26. V. pictus Pall., die bunte Fledermaus; aurato-rufus; subtus rufescens.

Vespertilio pictus. Schreb. I. S. 170 tab. 49. — Horsf. zool. research. n. 8. — Temm. monogr. II. p. 223 tab. 56 fig. 1—3. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 517. — Kerivoula picta. Gray ann. of nat. hist. 1842. p. 258. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 185. — Blyth l. c. XX. p. 158.

Java, Sumatra, Borneo, Pinang, Vorderindien und Ceylon. Flughäute längs der Seiten, des Vorderarms, der Finger und ganze Schenkelflughaut röthlich oder selbst lebhaft roth, im Uebrigen matt schwarz [1]).

---

1) V. formosus Hodgs. (Kerivoula formosa Gray) aus Nordindien wird von Horsfield im catal. of the mus. East-Ind. comp. p. 40 als der Repräsentant des

27. V. tralatitius Temm., die kurzzehige Fledermaus; fuliginoso-fuscus, subtus canescens; alis usque ad digitorum basin porrectis; patagio interfemorali subtus verrucis minutis, seriatim positis.

Vespertilio tralatitius. Temm. monogr. II. p. 228 tab. 57 fig. 1—4. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 517 (größtentheils). — Kerivoula tralatitoides. Gray list of Brit. mus. p. 27.

Java, Sumatra. Körper 1″ 5‴, Schwanz eben ſo viel, Vorderarm 1″ 3‴. Schnautze ſehr kurz, Ohren ziemlich breit, ſehr ausgerandet. Schwarz, oben mit feinen dunkelbraunen, unten weißlichen Haarſpitzen [1]).

28. V. Horsfieldii Temm., die ſpitzmäulige Fledermaus; fuscus, subtus albescens, alis ad tarsum finitis.

Vespertilio Horsfieldii. Temm. monogr. II. p. 226 tab. 56 fig. 9—11. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 514.

Java. Körper 1″ 8‴, Schwanz 1″ 5‴, Ohren 6‴, Vorderarm 1″ 4‴. Backenzähne $\frac{4}{4}$ (?). Von V. tralatitius verſchieden durch die ſpitzige Schnautze, große Ausdehnung der Geſichtsdrüſen, Länge der Zehen, Flügelanſatz an der Fußwurzel, freies Schwanzende und unregelmäßige Stellung der Wärzchen auf der Unterſeite der Schenkelflughaut. Oben ſchwarz mit braunen Haarſpitzen, Seiten ſchwarz mit grauen Spitzen, Mittellinie des Bauchs weißlich beflogen.

29. V. macrodactylus Temm., die langzehige Fledermaus; niger, subtus canescens; digitis pedum longis; alis ad tarsum finitis.

Vespertilio macrodactylus. Temm. monogr. II. p. 231 tab. 58 fig. 3—5. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 518.

V. pictus auf dem indiſchen Feſtlande von letzterem dadurch unterſchieden, daß dieſer V. formosus etwas größer und gewöhnlich von hellerer Farbe iſt; der Unterleib iſt blaß gelb. Genauer berichtet über dieſe Art Blyth (journ. of the Asiat. soc. XX. p. 158), wonach ſie als ſelbſtſtändig erſcheint.

1) Gray trennt von Temminck's V. tralatitius, den er ſeiner Gattung Kerivoula zutheilt, den V. tralatitius von Horsfield und bezeichnet letztern als Trilatitus Horsfieldii (List of Brit. mus. p. 26). Die Gattung Trilatitus (!) unterſcheidet Gray von Kerivoula dadurch, daß bei jener die Flügel nur bis zur Ferſe, bei dieſer bis zur Zehenwurzel reichen. Horsfield giebt nur $\frac{4}{4}$ Backenzähne an. Ebenfalls von Java. Dieſer Tr. Horsfieldii Gray ſcheint mir mit Temminck's V. Horsfieldii identiſch.

Japan. Körper 1″ 11‴, Schwanz 1″ 1‴, Vorderarm 1″ 3‴. Ohren lang, zugespitzt, etwas ausgeschweift, Klappe lang, gerade, pfriemenförmig. Rußschwarz, unten mit feinen graulichen Spitzen [1]).

2. Subgen. Vesperugo K. B.; dentes molares $\frac{4}{5}$.

α) trago dilatato, alis ad tarsum finitis.

30. V. Molossus Temm., die Doggen-Fledermaus; unicolor ferrugineo-fuscus, subtus brunneo-lutescens; rostro obtuso tumido; auriculis magnis rotundatis, trago brevi.

Vespertilio Molossus. Temm. monogr. II. p. 269; faun. japon. I. p. 15 tab. 3 fig. 5. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 509.

Japan. Körper 3″ 3‴, Schwanz 1″ 9‴, Vorderarm 2″. Backenzähne $\frac{4}{5}$, oberer Lückenzahn fehlend. Mit V. Noctula nahe verwandt, aber größer, Schnauze stumpfer, Ohren entwickelter. Haare einfarbig: Männchen oben dunkel röthlichbraun, unten braungelb; Weibchen oben lebhaft rostroth.

31. V. circumdatus Temm., die saumöhrige Fledermaus; e rufescente fuscus, ventre cinerascente, auriculis latioribus quam longioribus, emarginatis, albido-limbatis.

Vespertilio circumdatus. Temm. monogr. II. p. 214 tab. 53 fig. 3, 4. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 510.

Java. Körper 2″, Schwanz 1″ 4‴, Vorderarm 1″ 7‴. Von den Formen unserer Noctula. Klappe gerundet blattförmig. Pelz glänzend zweifarbig: an der Basis schwarz, auf der Oberseite mit röthlichbraunen, an der Brust mit röthlichen und am Bauch mit grauen Haarspitzen. Ohren schwarz mit gelblicher Wurzel und gelblichweißem Rand.

β) trago angustato, alis usque ad digitorum basin porrectis.

32. V. imbricatus Horsf., die haarschwänzige Fledermaus; auriculis brevibus, rostro obtuso, serie vertebrarum caudalium subtus pilis brevibus vestita.

---

1) Zu dieser Abtheilung gehört V. malayanus Fr. Cuv. ann. d. mus. I. p. 20 tab. 2 fig. 5 (Kopf), er ist aber so unbestimmt charakterisirt, daß er nicht sicher unterschieden werden kann. Fr. Cuvier stellt ihn an die Spitze seiner Murinoides: Ohren trichterförmig, Klappe blattförmig; hell falb, oben dunkler. Körper 1″ 5‴, Schwanz 1″ 7‴, Flugweite 8″.

Vespertilio imbricatus. Horsf. zool. research. n. 8. — Temm. monogr. II. p. 216 tab. 54 fig. 1—3. — ? V. javanais. Fr. Cuv. nouv. ann. d. mus. I. p. 21. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 511.

Java. Ganze Länge 3″, Vorderarm 1″ 4‴. Der sundaische Repräsentant unsers Pipistrellus. Klappe kurz, halbmondförmig. Backenzähne $\frac{2}{3}$ oder $\frac{1}{3}$. Männchen oben schwärzlichbraun, unten schwarz mit röthlichen Haarspitzen; Weibchen oben braunroth, unten röther als das Männchen.

33. V. Abramus Temm., die Abram-Fledermaus; pilis nigris, apice supra flavidis, subtus albidis; auriculis ovalibus brevibus, rostro brevissimo subacuto.

Vespertilio Abramus. Temm. monogr. II. p. 232 tab. 58 fig. 1, 2; faun. japon. I. p. 17. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 513.

Japan. Ganze Länge $2\frac{1}{2}$ bis 3″, Schwanz 1″ 3‴, Vorderarm 1″ 2‴. Gleich der folgenden Art unserem Pipistrellus verwandt. Klappe blattförmig, schwach eingebogen; Schnautze sehr kurz und etwas zugespitzt. Flügel und Schenkelflughaut an der Wurzel behaart. Pelz schwarz, oben mit kurzen falben, unten mit weißlichen Spitzen.

34. V. Akokomuli Temm., der Akokomuli; praecedenti similis at rostro longiore, latiore auriculisque majoribus diversus.

Vespertilio Akokomuli. Temm. monogr. II. p. 223. tab. 57 fig. 8, 9; faun. japon. I. p. 17. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 514.

Japan. Größe der vorigen Art, aber mit längerer und breiterer Schnautze und größeren Ohren. Männchen oben mausgrau mit röthlichfarben Haarspitzen; unten schwarz mit weißgrauen Spitzen; Hinterbauch und Seiten weiß. Weibchen oben röthlichbraun, unten schwarz mit weißlichrothen Spitzen.

35. V. macrotis Temm., die bisterbraune Fledermaus; unicolor brunneus, auriculis majoribus, membranis diaphanis albentibus.

Vespertilio macrotis. Temm. monogr. II. p. 218 tab. 54 fig. 7, 8. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 516.

Sumatra. Körper 1″ 9‴, Schwanz 1″ 3‴, Vorderarm 1″ 2‴. Weicht von den vorhergehenden 3 Pipistrellus-Formen durch größere, insbesonders breitere Ohren ab. Klappe gekrümmt blattförmig. Backen-

zähne $\frac{2}{3}$ oder $\frac{3}{3}$. Haare einfarbig, oben wie unten bisterbraun, Schnautze schwarz. Häute sehr durchscheinend, am Leib etwas bräunlich, im Uebrigen weißlich mit braunen Adern.

36. V. tenuis Temm., die schlanke Fledermaus; **V. tralatitio simillimus, at statura graciliore, auriculis multo brevioribus et acutioribus, rostro breviore numeroque dentium molarium diversus.**

Vespertilio tenuis. Temm. monogr. II. p. 229. tab. 57. fig. 5—7. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 513. — Kerivoula tenuis. Gray ann. of nat. hist. V. p. 558. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 185.

Java, Sumatra, Borneo, Pinang. Durch Ohrenform und haarigen Warzenbesatz der Schenkelflughaut noch mehr als V. macrotis von Pipistrellus abweichend.

γ) trago angustato, alis ad tarsum finitis.

37. V. Hasseltii Temm., die weichhaarige Fledermaus; **vellere brevi lanoso, alis diaphanis ad extremitatem tibiae finitis.**

Vespertilio Hasseltii. Temm. monogr. II. p. 225 tab. 56 fig. 7, 8. — Wagn. Schreb. Supplem I. S. 512. — Trilatitus Hasselti. Gray ann. of nat. hist. X. p. 258.

Java. Körper 1″ 9‴, Schwanz 1″ 3‴, Vorderarm ebenso. Von den vorhergehenden Arten schon dadurch verschieden, daß die Flügel den ganzen Fuß frei lassen. Ohren länger als breit, etwas abgerundet, Klappe lanzett, abgestumpft. Haare an der Basis schwarz, oben mit mausgrauen, unten mit weißen Spitzen; Bauch ganz weiß.

δ) naribus tubuliformibus.

38. V. Harpyia Temm., die Harpyen-Fledermaus; **rostro obtuso, alis ad tarsum finitis, pedibus usque ad ungues pilosis.**

Vespertilio Harpia. Temm. monogr. II. p. 219. tab. 55. fig. 5, 6. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 511. — Harpiocephalus rufus. Gray ann. of nat. hist. X. p. 259.

Java. Körper 2″ 4‴, Schwanz 1″ 10‴, Vorderarm 1″ 8‴. Schnautze stumpf, Nasenlöcher 2 divergirende Röhren bildend; Schenkelflughaut unten mit zahlreichen diagonalen und concentrischen Linien von kleinen behaarten Wärzchen gebildet. Oben röthlichgrau: Haare graulichweiß mit rothen Spitzen; Unterseite einfarbig röthlichgrau, Seiten der Brust mit mehr Roth.

39. V. Suillus Temm., die ferkelnaſige Fledermaus; rostro elongato, alis usque ad ungues porrectis.

Vespertilio Suillus. Temm. monogr. p. 224 tab. 56 fig. 4—6. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 512. — Murina Suillus. Gray ann. of nat. hist. X. p. 258.

Java, Sumatra, Vorderindien (Dargellan). Körper 1″ 8‴, Schwanz 8‴, Vorderarm 1″. Schnautze geſtreckt, Naſe mit vorſpringenden Röhren, Klappe lang, ſchmal, zugeſpitzt. Oben lebhaft roth, mit röthlichweißen Haarwurzeln; unten iſabell oder weißlich.

3. Subgen. Vesperus K. B.; dentes molares $\frac{4}{5}$.

40. V. macellus Temm., die hagere Fledermaus; nigro-fuscus, subtus griseus, alis ad tarsum finitis.

Vespertilio macellus. Temm. monogr. II. p. 230. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 510.

Borneo. Körper 2″, Schwanz 1″ 2‴, Vorderarm 1″ 4‴. Schnautze ſtumpf, Füße ziemlich ſtark, Schwanzſpitze frei. Pelz kurz und glänzend; oben ſchwärzlichbraun, unten eben ſo, aber mit weißlichgrauen Haarſpitzen.

41. V. pachypus Temm., die breitfüßige Fledermaus; castaneo-fuscus, subtus sordide brunneus; auriculis latioribus quam longioribus; plantis latis depressis.

Vespertilio pachypus. Temm. monogr. II. p. 217. tab. 54 fig. 4—6. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 509.

Java, Sumatra. Körper 1″ 9‴, Schwanz 1″ 1‴, Vorderarm ebenſo. Kopf gedrückt, Schnautze ſtumpf, Klappe ſehr kurz und abgerundet, Flügel (nach der Abbildung) an der Ferſe endigend, Schwanzſpitze frei. Oben kaſtanienbraun mit goldrothen Haarwurzeln, Bruſt röthlich mit braunen Haarſpitzen, übrige Unterſeite ſchmutzig braun.

42. V. irretitus Cant., die tſchuſaniſche Fledermaus; supra brunneo-griseus; auriculis capite brevioribus, rotundatis.

Vespertilio irretitus. Cantor ann. of nat. hist. IX. p. 481.

Inſel Tſchuſan. Kopf 6‴, Leib 1¼″, Schwanz 1″ 1‴, Ohren 2¼‴. Schnautze ſtumpf, ſchwarz, behaart, Klappe lanzett, halb ſo

lang als das Ohr, Schwanzspitze frei. Oben bräunlichgrau, unten staubfarbig [1]).

4. Dentes molares haud cogniti.

43. V. oreias Temm., die Schnurr-Fledermaus; auriculis amplis, trago longo filiformi, barba labri magna, alis usque ad digitorum basin porrectis.

Vespertilio oreias. Temm. monogr. II. p. 270. — Wagn. Schreb. Supplem. I S. 519.

Indien. Körper 1" 8‴, Schwanz 1" 2‴, Ohren 8‴, Vorderarm 1" 5‴. Zu Vespertilio K. B. gehörig. Ohren lang und breit, Klappe lang, schmal, gerade. Haare zweifarbig, am Grunde schwarz, oben mit umbrabraunen, unten mit isabellgrauen Spitzen.

44. V. macrotarsus Wat., die großfüßige Fledermaus; supra cinereus, subtus albicans; auriculis longis, angustis, acutis, postice fere rectis; trago elongato, attenuato, acuto; alis ad tarsum finitis.

Vespertilio macrotarsus. Waterh. ann. of nat. hist. XVI. p. 51.

Philippinen. Körper 2" 3‴, Schwanz 1" 10‴, Ohren 6½‴, Vorderarm 1" 9½‴. Wohl zu Vespertilio K. B. gehörig. Schnauze etwas gestreckt, Schwanzspitze frei, Hinterfüße sehr stark; Flügel am Rücken hoch angesetzt, so daß nur ein schmaler behaarter Streif von ¼" Breite frei bleibt. Haare am Grunde dunkler als an den Spitzen.

45. V. pellucidus. Wat., die glasflügelige Fledermaus; rufes-

---

1) Blyth vermuthet (journ. of the Asiat. soc. XX. p. 139), daß mit diesem V. irretitus und dem V. coromandelicus Fr. Cuv. (Schreb. Supplem. I. S. 514), den ich, als nicht genau bestimmbar, in diesem Verzeichnisse nicht aufgenommen habe, eine Fledermaus identisch sein möchte, die unter den kleinen um Calcutta vorkommenden die gemeinste ist; er bezeichnet sie als Scotophilus coromandelicus. Körper 1½", Schwanz 1⅝", Vorderarm 1½, Flugweite 7½, Ohren über ¼". Oben ein sehr kleiner, unten 2 Lückenzähne. Ohren breit, Klappe halb so lang, etwas vorwärts gekrümmt und an der Spitze abgestumpft. Pelz kurz im Vergleich zu V. pipistrellus, oben an der Oberseite trüb falbbraun, unten blasser und graulichfalb; Flughäute düster. — Da die Identität dieser Art sowohl mit V. irretitus als mit V. coromandelicus zweifelhaft ist, könnte man sie als V. Blythi bezeichnen.

cens, subtus cano-albidus; auriculis magnis; acutis, postice emarginatis, trago elongato, attenuato; alis pellucidis ad tarsum finitis.

Vespertilio pellucidus. WATERH. ann. of nat. hist. XVI. p. 52.

Philippinen. Körper 1″ 8‴, Schwanz 1″ 9½‴, Ohren 7‴, Vorderarm 1″ 3‴. Hinterfüße lang und ſchmächtig.

46. V. lasiurus HODGS., die wollſchwänzige Fledermaus; supra ferruginosus; auriculis mediocribus, rotundatis; patagio interfemorali artubusque pilosis.

Noctulinia lasiura. HODGS. journ. of the Asiat. soc. XVI. 2. p. 896.

Nepal. Körper 2¼″, Schwanz 1¾″, Ohren 1⅛″, Vorderarm 1¾″. Mit Noctula verwandt. Habitus von Noctulina labiata[1]), aber verſchieden dadurch, daß die ganzen Beine und Schenkelflughaut in den dicken und wolligen Pelz des Leibes gehüllt iſt. Kopf gedrückt, Klappe ſchneckenförmig. Oben hell roſtfarbig, unten rußig; die Haare grau geſpitzt, Finger roſtig, Häute ſchwärzlich.

47. V. tristis WAT., die trübe Fledermaus; nigro-fuliginosus, subtus cano-indutus; auriculis mediocribus rotundatis, rostro brevi obtuso, alis ad tarsum finitis.

Vespertilio tristis. WATERH. ann. of nat. hist. XVI. p. 50.

Philippinen. Körper 2″ 5‴, Schwanz ebenſo, Ohren 3¾‴, Vorderarm 2″ 1‴. Mit Noctula verwandt. Ohrklappe gekrümmt, abgerundet, Schnautze kurz und ſtumpf. Pelz dicht, aber nicht lang, rußſchwarz, mit einfarbigen Haaren, am Bauche graulich überlaufen.

48. V. Eschscholtzii WAT., die kleinbaumige Fledermaus; fusco-nigricans, subtus pilis apice cinerascentibus; auriculis brevibus, trago brevi apice rotundatis; alis ad tarsum finitis.

Vespertilio Eschscholtzii. WATERH. ann. of nat. hist. XVI. p. 51.

Philippinen. Körper 2″, Schwanz ebenſo, Ohren 3½‴, Vorderarm 1″ 9‴. Von V. tristis durch geringere Größe, kleinern Daumen und minder dunkle Färbung verſchieden.

---

1) Noctulinia labiata Hodgs. (Gray list of Brit. mus. p. 32), ebenfalls von Nepal, iſt mir nicht näher bekannt. Blyth (journ. of the Asiat. soc. XII. p. 360) meint, daß gute Exemplare von dieſer Art einer ſorgfältigen Vergleichung mit V. Noctula zu unterziehen wären.

49. V. Meyeni Wat., die kurzohrige Fledermaus; e rufescente fuscus, pilis basi albentibus, gastraeo cinereo-lavata; auriculis brevibus, subtriangulis, apice rotundatis, postice emarginatis; alis usque ad digitorum basin porrectis.

Vespertilio Meyeni. Waterh. ann. of nat. hist. XVI. p. 53.

Philippinen. Körper 1″ 7‴, Schwanz 11‴, Ohren 2½‴, Vorderarm 1″ 1‴. Ohrklappe schmal, etwas zugespitzt. Nahe verwandt mit V. tralatitius Temm., aber die Schnauze breiter und gerundeter, Ohren minder spitz, Vorderarm kürzer.

50. V. rufo-pictus Wat., die ockergelbe Fledermaus; ochraceus, subtus flavido-albus; patagio interfemorali, brachiis alarumque nigrarum basi rufis.

Vespertilio rufo-pictus. Waterh. ann. of nat. hist. XVI. p. 54.

Philippinen. Körper 2″ 3‴, Schwanz 1″ 11‴, Ohren 5½‴, Vorderarm 1″ 11‴. Flügel bis zur Zehenwurzel reichend, Ohren lang, schmal, zugespitzt, hinten ausgerandet; Ohrklappe 4½‴ lang, schmal, spitz. Oben zart gelb mit grauen Haarwurzeln; unten gelblich weiß, Haare am Grunde kaum grau. Aehnlich V. pictus, aber viel größer und von anderer Ohrenform.

51. V. brachypterus Temm., die kurzflügelige Fledermaus; nigro-fuscus, subtus dilutior; auriculis dilatatis, alis brevibus.

Vespertilio brachypterus. Temm. monogr. II. p. 215 tab. 53 fig. 5, 6. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 519.

Sumatra. Körper 2″ 1‴, Schwanz 1″ 2‴, Vorderarm 1″ 3‴, Flugweite 8″. Schnauze stumpf, Ohren groß, hinten ausgerandet, Flügel an der Fußwurzel angeheftet. Schwarzbraun, unten umberbraun [1]).

c) Africani.

1. Subgen. Vespertilio K. B.; dentes molares $\frac{4}{4}$.

---

1) Weiterer Erläuterung bedürftig ist Scotophilus Kuhlii Leach = Sc. Leachii Gray aus Indien (vgl. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 539 und Mag. of Zool. and Botan. II. p. 15.) — Wegen Vespertilio blepotis vgl. Miniopterus Schreibersii. — Hinsichtlich Myotis parvipes Blyth und Myotis pallidiventris Hodgs. ist nachzusehen Blyth im Journ. of the Asiat. soc. 1853 p. 409, 581, 584.

52. V. tricolor Temm., die dreifarbige Fledermaus; supra tricolor, auriculis longis, obtusis, emarginatis, trago longo extrorsum curvato.

Vespertilio tricolor. Temm. monogr. II., p. 207. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 523.

Kap. Ganze Länge 3" 10‴, Vorderarm 1" 10‴. Kopf länger als breit. Oberseite röthlichgelb: die Haare am Grunde schwärzlichbraun, in der Mitte gelblichweiß, Spitze schön roth. Haare der Unterseite am Grunde braun, im Uebrigen gelblichweiß; Halsseiten und Brust röthlich beflogen.

53. V. epichrysus Temm., die rothdeckige Fledermaus; supra rufus; auriculis mediocribus, rectis, emarginatis; trago recto lanceolato.

Vespertilio epichrysus. Temm. monogr. II. p. 208. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 523.

Kap. Körper 2" 2‴, Schwanz 1" 10‴, Vorderarm ebenso. Backenzähne nicht angegeben, aber nach der Ohrenform hieher gehörig. Haare der Oberseite am Grunde braun, in der Mitte gelblichweiß, Spitze lebhaft roth; auf der Unterseite am Grunde braun, dann licht röthlich.

2. Subgen. Vesperugo K. B.; dentes molares $\frac{4}{5}$.

54. V. Rüppellii Fisch., die dongolanische Fledermaus; fuscato-murinus, subtus niveus, auriculis mediocribus rotundatis.

Vespertilio Rüppellii. Fisch. syn. mamm. p. 108. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 522. — V. Temminckii. Rüpp. Atlas S. 17 tab. 6. — Temm. monogr. II. p. 210.

Dongola (Nubien). Körper 1" 10‴, Schwanz 1" 2‴, Ohren 3½‴, Vorderarm 1" 1‴. Klappe blattförmig, abgerundet und etwas gegen den Kopf gebogen. Oberseite mausgrau mit bräunlichem Anflug; Unterseite glänzend schneeweiß mit einfarbigen Haaren.

55. V. platycephalus Temm., die plattköpfige Fledermaus; e rufescente brunneus, subtus brunneo-albidus; capite valde depresso.

Vespertilio platycephalus. Temm. monogr. II. p. 208. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 524.

Kap. Körper 2", Schwanz 1" 1‴, Vorderarm 1" 1½‴. Backenzähne nicht angegeben. Schnautze platt, Ohren so breit als lang, mit dem äußern Rand bis zur Mundspalte geführt; Klappe blattförmig, einwärts

gekrämmt. Haare der Oberſeite am Grunde ſchwärzlichbraun, an der Spitze röthlichbraun, auf der Unterſeite am Grunde braun, an der Spitze weiß mit Braun gewäſſert [1]).

56. V. subtilis Sund., die feine Fledermaus; „superne griseo-fulvescens, subtus fulvo-albidus, membranis apiceque rostri (cum lateribus faciei) fuscis; auriculis pallescentibus, oblongis, integris, trago brevi, dimidiato-ovali.“ Sund.

Vesperugo subtilis. Sundev. öfvers. af Akadem. förhandl. 1846 p. 119.

Von Wahlenberg in den innern Theilen des Kaffernlandes gefunden. Körper 1″ 5½‴, Schwanz 1″, Vorderarm 1″ 1½‴. Sundevall fügt noch die Bemerkung bei, daß dieſe Art in ihrer Form dem V. minutus verwandt und die Schnautze etwas verſchmälert iſt.

57. V. nanus Pet., die Kobold-Fledermaus; umbrino-fuscus, subtus pallidior; alis nigris; auriculis emarginatis, trago securiformi.

Vespertilio nanus. Pet. Moſſamb. I. S. 63. tab. 16 fig. 2.

In großer Anzahl von Peters in Inhambane (Moſſambique) gefunden. Körper 1″ 5½‴, Schwanz eben ſoviel, Vorderarm 1″ 2‴. Backenzähn ⅔. Die Klappe iſt am Ende breit, beilförmig und mit der Spitze nach innen gerichtet. Die Schnautze iſt breit und ſtumpf. Die Flügel ſind bis zur Zehenwurzel angewachſen und längs des Unterarms unbehaart; die Schenkelflughaut iſt auf der Unterſeite gewimpert. Kopf und Rücken iſt umbrabraun, auf der Bauchſeite blaſſer, Flughäute und Ohren ſchwarz. Sämmtliche Haare ſind an den untern zwei Drittheilen pechſchwarz.

3. Subgen. Vesperus K. B.; dentes molares ⅓.

58. V. isabellinus Temm., die iſabellfarbige Fledermaus; isabellinus, subtus dilutior; auriculis amplis.

Vespertilio isabellinus. Temm. monogr. II. p. 205 tab. 52 fig. 2. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 520.

Tripoli. Körper 2″ 8‴, Schwanz 1″ 7‴, Vorderarm 1″ 8‴. Schnautze ſtumpf, Ohren breit, oval, Klappe kurz, blattförmig. Häute

1) Wegen Vesperugo Dinganii Wbg. iſt Nyeticejus Dinganii Smith zu vergleichen.

nackt, Schwanzende frei. Schön isabell, unten lichter, Schnautzenspitze und Lippen schwarz.

59. V. megalurus Temm., die langschwänzige Fledermaus; olivaceo-fuscus, subtus cano-brunneus, regione inguinali alba; auriculis mediocribus.

Vespertilio megalurus. Temm. monogr. II. p. 206. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 521.

Südafrika. Körper 2″ 3‴, Schwanz 2″, Vorderarm 1″ 10‴. Schnautze spitz, Ohren mittellang, zugespitzt, Klappe sehr lang, Schwanz mit langem freien Ende. Oberseite olivenbraun, Unterseite graubraun, die Haare am Grunde dunkel; in der Schamgegend einfarbig weiß.

60. V. minutus Temm., die kapische Zwerg-Fledermaus; umbrino-fuscus, pilis bicoloribus; auriculis mediocribus.

Vespertilio minutus. Temm. monogr. II. p. 209. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 521.

Kap. Körper 1″ 6½‴, Schwanz 11‴, Ohren 4½‴, Vorderarm 1″ 1‴. Ohren mittellang, höher als breit, ausgerandet; Klappe halb so lang als das Ohr, einwärts gekrümmt. Flügel bis zur Zehenwurzel reichend, Schwanzende frei. Haare am Grunde schwarzbraun, an den Spitzen umberbraun, was unten etwas lichter ist; Hinterkopf und Nacken dunkelbraun[1]).

4. Subgen. Miniopterus Bonap; dentes molares $\frac{6}{6}$.

61. V. scotinus Sund., die dunkle Taschenfledermaus; „nigro-fuscus, pilis, praesertim gastraei, apice subpallescentibus; auriculis parvis, triangularibus, apice rotundatis, trago parvo, augustius oblongo.“ Sund.

---

1) A. Smith's V. minutus (zool. of South Afric. I. tab. 51) = dessen V. capensis kann nicht zum Temminck'schen V. minutus gehören, da die von Smith angegebenen Maaße eher auf V. megalurus passen. Körper 2½″, Schwanz 2″, Vorderarm 1″ 8‴. Ohren so breit als hoch, Klappe halb so lang als das Ohr, Schwanzende nicht vorragend. Backenzähne jederseits $\frac{5}{5}$. Oberseite tief röthlichbraun, die Haare am Grunde leberbraun; Unterseite ebenso, an den Haarspitzen blaß gelblichbraun. Flughäute zwischen bräunlichroth und leberbraun. Man könnte diese Art, die von V. minutus Temm. entschieden abweicht und doch auch nicht recht zu V. megalurus passen will, als V. Smithii bezeichnen.

Vesperugo scotinus. SUNDEV. öfvera. af Akadem. förhandl. 1846. p. 119.

Häufig im Kaffernland. Körper 1" 10‴, Schwanz 1" 8½‴, Vorderarm 1" 7½‴. Nach den Bemerkungen von Sundevall gehört diese Fledermaus zur Abtheilung Miniopterus. Lückenzähne sind jederseits ½ vorhanden. Die ganze Fußsohle nebst der Spitze des Unterschenkels ist frei. Das Verhältniß der Fingerglieder ist wie bei V. Schreibersii, von dem sie sich durch die Färbung unterscheidet. In Temminck's Beschreibung von V. dasythrix will Sundevall auch in der Form der Ohren und der Klappe, so wie in der Behaarung der Schnautze Unterschiede nachweisen; da jedoch Blasius durch Vergleichung von Originalexemplaren dargethan hat, daß zwischen V. Schreibersii und V. dasythrix keine Spur von zoologischen Unterschieden zu bemerken ist, so würde zwischen diesen beiden einerseits und dem V. scotinus anderseits keine andere Differenz, als die dunklere Färbung des letzteren übrig bleiben.

5. Species haud satis definitae.

62. V. lanosus SMITH., die wollige Fledermaus; crispo-lanosus; auriculis amplis profunde excisis, patagio interfemorali postice ciliato.

Vespertilio lanosus. A. SMITH zool. of South Afric. I. tab. 50.

An der Seeküste 200 engl. Meilen ostwärts der Kapstadt. Körper 2" 3‴, Schwanz 1" 6‴, Vorderarm 1" 4½‴. Kopf breit, Ohren ziemlich groß, fast halbkreisförmig, am Außenrande ein großes Stück ausgeschnitten; Klappe lang, schmal, schwach gekrümmt. Füße schlank, (der Abbildung nach) frei. Haare der Oberseite dreifarbig: an der Spitze schmutzig weiß oder blaß siennagelb, in der Mitte zwischen bräunlichroth und gelblichbraun, am Grunde leberbraun; auf der Unterseite am Grunde ebenso, das Uebrige schmutzig röthlichweiß.

63. V. Hesperida TEMM., die Rauten-Fledermaus; rufino-fuscus, subtus rufino-canus; auriculis brevibus, latis; patagiis minus amplis.

Vespertilio Hesperida. TEMM. monogr. II. p. 211. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 524.

An der abyssinischen Küste. Körper 1" 8‴, Schwanz 1", Vorderarm ebenso. Ohren so breit als hoch, Klappe gekrümmt, blattförmig, Schenkelflughaut rautenförmig geadert. Haare am Grunde schwarz, oben mit röthlichbraunen, unten mit röthlichgrauen Spitzen.

64. V. poënsis Gray, die poensische Fledermaus.

Kerivoula poensis. Gray ann. of nat. hist. X. p. 258.

Insel Fernando Po. Flügel bis zur Zehenwurzel reichend, Schenkelflughaut unten mit kleinen Haarbüscheln in Querbinden, Ohren mäßig, Klappe mäßig, halboval, stumpf. Gelblichgrau, an den Seiten gelblichweiß, an Kopf und Nacken weißlichgrau; Haare am Grunde schwarz [1]).

d) Americani.

1. Subgen. Vespertilio K. B.; dentes molares $\frac{4}{4}$.

65. V. Carolii Temm., die rußige Fledermaus; e rufescente fuscus, subtus cinereo-flavidus; auriculis subemarginatis.

Vespertilio Carolii. Temm. monogr. II. p. 237. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 529.

Philadelphia und New-York. Körper 1" 11‴, Schwanz 1" 4‴, Vorderarm ebenso, Ohren 5‴. Schnautze stumpf, Ohren mittellang, oval, Klappe weidenblattförmig. Haare am Grunde dunkel, oben mit röthlichbraunen, unten mit gelblichweißen Spitzen.

66. V. Gryphus Fr. Cuv., die Greif-Fledermaus.

Vespertilio Gryphus. Fr. Cuv. nouv. ann. d. mus. I. p. 15. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 530.

Um New-York. Körper 1" 9‴, Schwanz 1" 2‴, Flugweite 7" 10‴. Fr. Cuvier hat diese nebst den 4 folgenden Arten zu seinen Murinoides mit $\frac{4}{4}$ Backenzähnen gestellt, aber völlig unzureichend charakterisirt. Ohren ausgerandet, Klappe messerförmig. Oben lichtgelb, unten grau, Haare am Grunde schwarz.

67. V. Salarii Fr. Cuv., die graubraune Fledermaus.

Vespertilio Salarii. Fr. Cuv. nouv. ann. d. mus. I. p. 16. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 530.

---

1) Daß der V. macuanus, den Peters (Mossamb. I. S. 61. tab. 16 fig. 1) als neue Art aufstellt, von Blasius mit V. Noctula vereinigt wird, ist schon bei dieser Art angeführt worden. Peters erklärt selbst in dieser Beziehung: „der einzige äußere Unterschied besteht in dem ein wenig kürzeren Tragus, in der etwas dickeren Beschaffenheit der Haare und Flughäute, und in einer glänzenderen dunkleren Farbennüance des Pelzes."

Um New-York. Körper 1" 6‴, Schwanz 7‴, Flugweite 7" 7‴. Ohren ausgerandet, Klappe messerförmig, Oberlippe und Unterkieferspitze mit Barthaaren. Oben graulich kastanienbraun, unten weißlichgrau; alle Haare am Grunde dunkel.

68. V. georginianus Fr. Cuv., die georginische Fledermaus.

Vespertilio georginianus. Fr. Cuv. nouv. ann. d. mus. I. p. 16. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 531.

Georgien. Körper 1" 6‴, Schwanz 1" 2‴, Flugweite 7". Ohren ausgerandet, Klappe pfriemenförmig, Oberlippe und Unterkieferspitze mit Barthaaren. Haare am Grunde schwarz, oben mit lichtgelben, unten mit grauen Spitzen.

69. V. subflavus Fr. Cuv., die blonde Fledermaus.

Vespertilio subflavus. Fr. Cuv. nouv. ann. d. mus. I. p. 17. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 531.

Georgien. Körper 1" 6‴, Schwanz 1" 3‴, Flugweite 7". Ohren ausgerandet, Klappe halbherzförmig, Oberlippe und Unterkieferspitze mit Barthaaren. Oben graugelblich, unten gelblichweiß. Haare der Oberseite am Grunde schwarz, dann weißlich mit bräunlicher Spitze; auf der Unterseite schwarz mit gelblichweißer Spitze.

70. V. crassus Leisler., die dicke Fledermaus.

Vespertilio crassus. Fr. Cuv. nouv. ann. d. mus. I. p. 18. tab. 2 fig. 2 (Ohr). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 531.

New-York. Körper 2", Schwanz 1" 8‴, Flugweite 8" 8‴. Ohren stumpf, klein, nicht über den Scheitel sich erhebend; Klappe außen conver; Oberlippe und Unterkieferspitze mit Barthaaren. Oben graulich kastanienbraun, unten hell gelblich; Haare am Grunde dunkel.

71. V. subulatus Say, die Pfriemen Fledermaus; flavido-brunneus, subtus flavido-griseus; auriculis ovalibus longitudine capitis, trago elongato subulato.

Vespertilio subulatus. Say, Long's expedit. II. p. 65. — Richards. faun. I. p. 2. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 532. — Cooper ann. of the Lyc. of New-York. IV. p. 61. — V. lucifugus. Le Conte, app. to Mc. Murtrie's Cuv. I. p. 481.

Weit durch Nordamerika verbreitet: Labrador, Felsgebirge, Columbia-Fluß, Ohio, New-York, Georgien, Carolina. Körper 1″ 10‴, Schwanz 1″ 6‴, Ohren 8‴. Kopf kurz und breit, Ohren hinten nicht ausgeschnitten, Klappe gleich ⅔ der Ohrlänge. Flügel nackt, Schenkelflughaut an der Wurzel und am Rande behaart. Oben glänzend gelblichbraun, unten gelblichgrau; Haare am Grunde schwärzlich.

72. V. lepidus Gerv., die falbe Fledermaus; fulvidus, auriculis majoribus emarginatis, trago dilatato cupuliformi.

Vespertilio lepidus. Gervais, R. de la Sagra hist. de Cuba, mammif. p. 6. tab. 1. fig. 1—3. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 550.

Cuba. Körper 1″ 4‴, Schwanz 1″ 1½‴, Vorderarm ebenso, Flugweite 7″ 7‴. Ohren ziemlich groß, obgleich wenig erhöht; Klappe an der Basis verschmächtigt, am Ende erweitert, abgestutzt. Farbe gelblichroth; die Haare an der Basis gelblichroth, an den Spitzen etwas braun.

73. V. splendidus Wagn., die splendide Fledermaus; aureo-ferrugineus, auriculis majoribus, trago extus convexo, alis nudis.

Vespertilio splendidus. Wagn. Wiegm. Archiv 1845 S. 148; Abh. d. Münchn. Akadem. V. S. 208.

St. Thomas-Insel. Körper 1″ 10‴, Schwanz 1″ 1‴, Ohren 6‴, Vorderarm 1″ 5‴, Flugweite 8″ 9‴, Backenzähne ⅘. Ohren mittellang, länger als breit, schwach ausgerandet; Klappe ohngefähr von halber Ohrlänge, mit stark convexem Außenrande, daher von fast halbmondförmiger Gestalt. Flügel bis zur Zehenwurzel reichend. Oberseite rostig rothbraun, wobei die Haare nur am Grunde etwas dunkler werden; Unterseite rostig goldfalb, wobei die Haare in ihrer untern Hälfte dunkel rostbraun sind.

74. V. Arsinoë Temm., die weißgurtige Fledermaus; niger, subtus flavido-fuscus, fascia pilorum circum corpus albida; auriculis conicis.

Vespertilio Arsinoë. Temm. monogr. II. p. 247. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 529. —

Surinam. Körper 1″ 6‴, Schwanz 1″, Vorderarm 1″ 2‴. Aehnlich den V mystacinus. Kopf kurz, Schnauze stumpf; Ohren am Ende abgerundet, ohne Ausschnitt; Klappe gerade, lanzett. Oben glänzend schwarz, unten schwärzlichbraun mit fahlen Haarspitzen. Haare der weißlichen Binde um den Leib am Grunde schwärzlichbraun.

75. V. Isidori D'Orb.; die graue Fledermaus; flavido-canus, subtus sordide griseus, capite brunnescente.

Vespertilio Isidori. D'Orb. voy. dans l'Amér. mér. mamm. p. 16.

Um Corrientes. Körper 1" 6‴, Schwanz 1", Vorderarm 1" 2¼‴. Verwandt mit V mystacinus. Klappe messerförmig, etwas zugespitzt. Die Haare am Grundtheil schwarzbraun, auf der Oberseite mit glänzend falbgrauen, auf der Unterseite mit schmutziggrauen Spitzen; Kopf und Hals ins Braune fallend.

76. V. nubilus Wagn., die düstere Fledermaus; supra fuliginoso-fuscus, pilis apice dilutioribus; auriculis elongatis, alis ad digitorum basin porrectis.

Vespertilio albescens. Temm. monogr. II. p. 244. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 534 (theilw.) — ? Kerivoula brasiliensis. Gray ann. of nat. hist. XI. p. 117.

Meine Beschreibung ist nach Natterer's Exemplaren entworfen, auf denen auch Temminck's V. albescens, aber nicht Geoffroy's V. albescens beruht, welch letzterer auf Azara's 12. Fledermaus begründet wurde und allem Anschein nach eine andere Art ausmacht. Natterer's Exemplare stammen aus dem südlichen Brasilien. Körper 2" 2‴, Schwanz 1" 3½‴, Ohren 6½‴, Klappe 3¾‴, Vorderarm 1" 4‴, Flugweite 9". An unserem ausgestopften Exemplare lassen sich ganz deutlich 6 Zähne in der einen Unterkieferhälfte, worunter 3 einspitzige zählen, ist also zur Abtheilung mit 8 Backenzähnen gehörig. Die Ohren sind ziemlich lang, viel länger als breit, und stark ausgerandet. Die Klappe ist schmal, stumpf zugespitzt und mit der Spitze etwas auswärts gebogen. Die Schnautze ist spitz, die Nasenlöcher etwas röhrenförmig, die Flügel nackt und bis zur Zehenwurzel reichend. Die Haare sind am Grunde schwarzbraun, auf der Oberseite allmählig in's rußig Kastanienbraune übergehend, auf dem Bauch mit gelbbräunlichen Spitzen. Ohren und Flügel sind braunschwarz. Von einem alten Männchen gibt Natterer die Färbung folgendermassen an: Oberleib dunkelbraun, mit weißbraunen Haarspitzen; Unterleib stark ins Lichtbräunliche oder Weißbräunliche übergehend. — Gray's K. brasiliensis ist bei der Kürze der Charakteristik nicht näher bestimmbar.

* V. hypothrix D'Orb., die rauchbraune Fledermaus.

Vespertilio hypothrix. D'Orbigny. voy. dans l'Amér. mér. mamm. p. 16.

Provinz Moxos (Bolivia). Körper 1" 10‴, Schwanz 1" 2½‴, Vorderarm 1" 3‴. Vom Habitus des V. mystacinus. Schnauze etwas gestreckt, wenig behaart; Ohren schmal, konisch, etwas ausgerandet; Klappe verlängert, schmal, messerförmig. Rauchbraun, unten lichter und hier mit einigen grauen Haaren gemengt. — Könnte zu V. nubilus gehören.

77. V. parvulus Temm, die winzige Fledermaus; V. nubilo simillimus, at multo minor.

Vespertilio parvulus. Temm. monogr. II. p. 246. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 534.

Mit V. nubilus in den Heimathsverhältnissen, dem Gebiße, den allgemeinen Formen und der Färbung übereinstimmend, aber durch viel geringere Größe und insbesondere auch durch verhältnißmäßig kleinere Ohren verschieden. Körper 1" 9‴, Schwanz 1" 1‴, Ohren 4‴, Vorderarm 1" 1½‴, Flugweite 7" 4‴. Die Farbe ist oben schwarzgrau, unten braungrau; die Flughäute grauschwarz.

78. V. chiloensis Wat., die chilische Fledermaus; fuscus, auriculis mediocribus emarginatis, trago elongato angusto attenuato.

Vespertilio chiloensis. Waterh. zool. of the Beagle I. p. 5 tab. 3. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 537. — Gay hist. de Chile, zool. I. p. 42 tab. 1 fig. 3 (Kopf und Gebiß.)

Eilande ostwärts der Insel Chiloe und Valdivia. Körper 1" 8‴, Schwanz 1" 3½‴, Ohren 5½‴, Klappe 3½‴, Vorderarm 1" 5½‴, Schnauze kurz und stumpf, Ohren schmal, etwas spitz, Pelz schön und einfarbig braun. Nach Gay's Angabe und Zeichnung sind 4 Backenzähne vorhanden.

2. Subgen. Vesperugo K. B.; dentes molares $\frac{4}{6}$.

79. V. carolinensis Geoffr., die karolinische Fledermaus; fuscus, subtus cano-flavescens; auriculis longitudine capitis, oblongis.

Vespertilio carolinensis. Geoffr. ann. d. mus. VIII. p. 193. tab. 47 (Kopf.) — Temm. monogr. II. p. 236 tab. 59. fig. 1. — Cooper ann. of the Lyc. of New-York IV. p. 60.

Gemein in Carolina, Georgien und Long Island. Körper 2″ 3 — 5‴, wovon der Schwanz 1″, Flugweite 9½ — 10″. Nach Temminck ⅛, nach Cooper ⅞ Backenzähne. Klappe weidenblattförmig, von halber Ohrlänge; Flügel bis zur Zehenwurzel reichend. Oben kastanienbraun, unten graugelb; Haare am Grundtheil dunkel.

80. V. erythrodactylus Temm., die rothfingerige Fledermaus; e rufescente brunneus, auriculis brevibus ovalibus.

Vespertilio erythrodactylus. Temm. monogr. II. p. 238. — Wagn. Schreb. Supplem. I S. 527.

Um Philadelphia. Körper 1″ 8‴, Schwanz 1″ 4‴, Vorderarm 1″ 2‴. Klappe weidenblattförmig. Schenkelflughaut oben zur Hälfte behaart, unten mit rautenförmigen behaarten Adern. Oben röthlichbraun, an Kopf und Hals etwas gelblich; Haare am Grunde schwarz, dann gelblich mit röthlichbrauner Spitze. Haare der Unterseite dunkelbraun mit röthlichbrauner Spitze. Vorderarm, Wurzel der Finger und die Zwischenhaut des ersten Fingers röthlich; übrige Häute schwarz.

81. V. noctivagans Le Conte, die silberhaarige Fledermaus; nigro-fuscus, pilis supra argenteo-, subtus flavido-apiculatis.

Vespertilio noctivagans. Le Conte app. to Mc. Murtrie's transl. of Cuv. r. an. I. p. 431. — Cooper, ann. of the Lyc. of New-York. IV. p. 59. — V. Auduboni. Harlan, Americ. monthl. journ. p. 220 tab. 4.

Südliche vereinigte Staaten und Long Island. Ganze Länge 3, 8″, Schwanz 1, 5, Vorderarm 1, 8″. Ohren schwarz, ziemlich groß, etwas oval und ausgerandet; Klappe mäßig, oval und stumpf. Flügel nackt, Schenkelflughaut oben dicht behaart. Pelz schwarzbraun, oben mit silberweißen, unten mit gelblichen Haarspitzen. Ist mit V. pulverulentus näher zu vergleichen.

82. V. leucogaster Neuw., die graubäuchige Fledermaus; nigro-fuscus, pilis flavido-apiculatis, subtus albo-canescens; rostro brevissimo.

Vespertilio leucogaster. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 271 mit Abbild. — Temm. monogr. II. p. 243. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 528.

Ostküste Brasiliens. Körper 1″ 7‴, Schwanz 1″ 3‴, Ohren 4½‴.

Ohren länglich, nicht ausgeschnitten; Klappe mittellang, lanzett. Oben schwärzlichbraun mit gelblichgrauen Haarspitzen; Kehle und Brustseiten schwärzlichbraun, Brustmitte graubräunlich, Bauch weißgraulich.

83. V. cinnamomeus Wagn., die zimmtfarbige Fledermaus; cinnamomeus, auriculis mediocribus.

Vespertilio ruber. D'Orbign. voy. dans l'Amér. mér. mamm. p. 14 tab. XI. fig. 5, 6 (synon. excl.)

Provinz Corrientes. Körper 1" 11‴, Schwanz 1", Vorderarm 1" 4½‴. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, vielleicht oben die mittlern ausgefallen, Backenzähne $\frac{5}{5}$. Ohren mäßig, tutenförmig; Klappe messerförmig, etwas schmäler als die des V. Pipistrellus, Flügel bis zur Zehenwurzel reichend. Zimmtfarben, oben etwas dunkler, unten etwas lichter; die Haare der Oberseite fast einfarbig, die der Unterseite am Grunde bräunlich. — D'Orbigny identificirt fälschlich diese Art mit Azara's Chauve-souris cannelle (V. ruber Geoffr.), denn diese ist, wie Rengger gezeigt hat, ein Noctilio und ihre Flügel reichen nur bis zur Fußwurzel.

84. V. nigricans Neuw., die schwärzliche Fledermaus; fuliginoso-nigricans, subtus dilutior; auriculis emarginatis, tragо angusto, alis usque ad tarsum porrectis.

Vespertilio nigricans. Pr. v. Neuw. Beitr. II. S. 266. — Rengg. Paraguay S. 84. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 533. — Burmeist. Brasil. I. S. 78. — V. albescens. Geoffr. ann. d. mus. VIII. p. 204. — Chauve-souris XII. Azar. ess. II. p. 294.

Paragnay und südöstliches Brasilien. Es ist sehr zweifelhaft, ob die angeführten Autoren sämmtlich eine und dieselbe Art vor Augen hatten. Die Zahl der Backenzähne zu $\frac{5}{5}$ ist blos von Burmeister, die Endigung der Flügel am Fußgelenk blos von Rengger angegeben. Letzterer hält seinen V. nigricans für identisch mit Azara's 12. Fledermaus, der Geoffroy den Namen V. albescens beilegte und die sich demnach von Temminck's V. albescens (unserem V. nubilus) durch geringere Zahl der Backenzähne und kürzere Flügel unterscheiden würde. Größe und Färbung geben übrigens genannte Naturforscher ziemlich gleichförmig an; nach Burmeister mißt der Körper 1" 6‴, Vorderarm 1" 4‴,

Schwanz faſt 1″; nach Rengger iſt das Ohr etwa 6‴ lang, die Klappe 2½‴.

3. Subgen. Vesperus K. B.; dentes molares $\frac{4}{5}$.

85. V. phaiops Rafin., die ſchwarzſichtige Fledermaus; obscure badius, subtus dilutior, pilis unicoloribus; auriculis profunde emarginatis.

Vespertilio phaiops. Rafinesque in Desmar. mammif. p. 135. — Temm. monogr. II. p. 234. — Wagn. Schreb Supplem. I. S. 525.

Vereinigte Staaten. Körper 2″ 5‴, Schwanz 2″, Vorderarm 1″ 8‴. Ohren mittellang, ſtark ausgerandet; Klappe weidenblattförmig, Häute glatt. Pelz einfarbig, oben rothbraun, unten lichter braun, Geſicht und Häute ſchwärzlich.

86. V. ursinus Neuw., die langkrallige Fledermaus; umbrino-fuscus, pilis bicoloribus; auriculis subemarginatis.

Vespertilio ursinus. Temm. monogr. II. p. 235. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 525.

Am Miſſuri. Körper 2″ 4‴, Schwanz 1″ 6½‴, Ohren 4½‴. Schnautze ziemlich lang und breit; Ohren oval, am hintern Rande ſenkrecht, gegen das Ende ſchwach ausgerandet; Klappe lang, lanzett, etwas abgerundet; Nägel lang, ſtark. Oben glänzend umberbraun, unten lichter; alle Haare am Grunde grau.

87. V. Creeks Fr. Cuv., die Creeks-Fledermaus.

Vespertilio Creeks. Fr. Cuv. nouv. ann. d. mus. I. p. 18.

Georgien. Körper 2″, Schwanz 1½″, Flugweite 9″. Backenzähne $\frac{1-1}{4-4}$; Ohren ausgerandet, Klappe meſſerförmig. Oben gelblichbraun, unten ſchmutziggrau, alle Haarwurzeln ſchwarz. Zu unvollſtändig charakteriſirt, als daß ſein Verhältniß zu V. ursinus ermittelt werden könnte.

88. V. pulverulentus Temm., die gepuderte Fledermaus; fuscus, albido-adspersus, auriculis latioribus quam longioribus, patagio interfemorali supra subtusque piloso.

Vespertilio pulverulentus. Temm. monogr. II. p. 235. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 537.

Am Miſſuri. Körper 2″ 3‴, Schwanz 1″ 3‴, Vorderarm 1½″. Dem V. discolor ſehr ähnlich, daher hieher geſtellt, obwohl die Zahl

der Backenzähne nicht angegeben ist. Klappe beilförmig. Dunkel kastanienbraun, oben und unten mit rein weißen Haarspitzen, daher der ganze Körper wie gepudert aussieht.

89. V. ferrugineus Temm., die Laub-Fledermaus; rufescens, subtus albo nigroque variegatus; auriculis angustis, subemarginatis.

Vespertilio ferrugineus. Temm. monogr. II. p. 239 tab. 59 fig. 2. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 526.

Holländisches Guiana. Körper 2″ 3‴, Schwanz 1″ 9‴, Vorderarm 1″ 8‴. Schnautze kurz, Klappe kurz und weidenblattförmig; Schwanz lang, am Ende frei. Oben bräunlich gelbroth oder mehr rein röthlich; Haare am Grunde schwarzbraun; auf der Unterseite die Haare am Grunde röthlichschwarz, an der Spitze rein weiß, wodurch eine schwarz und weiße Scheckung entsteht.

90. V. Hilarii Is. Geoffr., die hilarische Fledermaus; e nigro fusco-castaneus, subtus dilutior; auriculis parvis triangulis.

Vespertilio Hilarii. Is. Geoffr., ann. des sc. nat. III. p. 441. — Blainv. l. c. 2. sér. IX. p. 362. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 526. — ? V. brasiliensis. Desmar. mamm. p. 144. — V. derasus. Burmeist. Brasil. I. S. 77.

Brasilien. Körper 2″ 9‴, Schwanz 1″ 9‴, Vorderarm 1″ 8‴. Ohren fast so breit als hoch, etwas ausgeraubet, Klappe länglich, Schenkelflughaut nackt. Oben aus dem Schwarzbraunen ins Kastanienbraune, unten aus dem Graulichen ins Rothbraune. — Burmeister bemerkt hinsichtlich seines V. derasus: „man könnte diese Art für V. Hilarii halten, wenn nicht der Schwanz sehr viel länger angegeben würde, als wie ich ihn finde; die übrigen Dimensionen und die Farbe passen.“ Nach Burmeister mißt der Körper 2″ 6‴, der Schwanz 1″ 4‴.

91. V. Dutertreus Gerv., die antillische Fledermaus; fusco-rufescens; auriculis mediocribus, attenuatis, emarginatis.

Vespertilio Dutertreus. Gervais, R. de la Sagra, hist. de Cuba, mammif. p. 7. tab. 2. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 527, 550.

Cuba. Ganze Länge 4″ 3‴, Schwanz 1″ 8½‴, Flugweite 12″ 10‴. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Backenzähne $\frac{4}{4}$. Klappe gerade, messerförmig, stumpf, halb so lang als das Ohr; Flughaut nackt, Schwanzende frei. Rothbraun;

Haare am Grunde ſchwarz, an der Spitze löwenroth, auf der Unterſeite ins Kaſtanienrothe übergehend.

92. V. furinalis D'Orb., die argentiniſche Fledermaus; cinnamomeo-brunneus, subtus pallidior.

Vespertilio furinalis. D'Orbign. voy. dans l'Amér. mérid. mamm. p. 13.

Provinz Corrientes. Körper 1″ 8‴, Schwanz 1″, Vorderarm 1″ 5‴. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Backenzähne $\frac{5}{5}$, die untern Schneidezähne ſchief. Klappe wie bei V. Pipistrellus, aber etwas ſchmäler an der Spitze; Schnautze breit, Naſe etwas vorragend. Farbe minder roth als bei V. ruber D'Orb.; oben zimmtbraun, unter der Kehle blaſſer und auf der übrigen Unterſeite mit Grau gewäſſert oder gemiſcht.

93. V. arctoideus Wagn., die feinhaarige Fledermaus; fuliginosus, subtus flavido-brunnescens; vellere copioso molli; auriculis mediocribus, dilatatis.

Meine Beſchreibung begründet ſich auf ein vom Naturalienhändler Brandt aus Braſilien bezogenes Exemplar. Körper 2″ 6‴, Schwanz 1″ 5‴, Vorderarm 1″ 6‴, Ohren 5½‴. Der Pelz iſt ſehr reichlich, namentlich auch auf dem Kopfe; die nackte Schnautzenkuppe und die Oberlippen ſind mit einem Schnurrbart verſehen. Die Flughäute ſind nackt, die Flügel reichen bis gegen die Zehenwurzel. Die Ohren ſind mittellang, ziemlich breit und ausgerandet; die Klappe ſchmal, an der Spitze abgerundet. Oben iſt nur 1, unten 2 einſpitzige Backenzähne jederſeits vorhanden, daher zur Abtheilung mit $\frac{5}{5}$ Backenzähnen gehörig. Wie die Behaarung, ſo iſt auch die Färbung ähnlich der von V. Pipistrellus. Die Haare der Oberſeite ſind glänzend rußig kaſtanienbraun, was gegen den Grund immer dunkler wird. Die Haare der Unterſeite ſind zweifarbig: am Grundtheil ſchwarzbraun, in der Endhälfte gelblichbraun. Die Häute ſind ſchwarz.

* V. polythrix. Is. Geoffr. ann. d. sc. nat. III. p. 443. — Temm. monogr. II. p. 248. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 535.

Braſilien. Körper 2″, Schwanz 1″ 6‴, Vorderarm 1″ 5‴, Flugweite 9″. Backenzähne unbekannt. Ohren ziemlich klein, länger als breit, ausgerandet. Oben dunkel kaſtanienbraun, was unten ſchwach ins Grau-

liche zieht. — Dieſer V. polythrix könnte identiſch mit V. arctoideus ſeyn.

94. V. innoxius Gerv., die amatopiſche Fledermaus; nigro-fuscus; magnitudine V. Pipistrelli.

Vespertilio innoxius. Gervais, voy. de la Bonite, zool. I. p. 35 tab. 11 fig. 7—9 (Schädel).

Amatope in Nordperu. Backenzähne $\frac{1}{1}$. Die Größe übertrifft nicht die von V. Pipistrellus; Farbe ſchwarzbraun.

4. Dentes molares haud cogniti [1]).

95. V. lanceolatus Wied., die Lanzett-Fledermaus; flavido-canobrunneus, subtus flavido-canescens; auriculis majusculis.

Vespertilio lanceolatus. Pr. v. Wied Reiſe in Nordamerik. I. S. 364. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 532.

Pennſylvanien. Körper 1″ 10‴, Schwanz 1″ 3‴, Ohren 6‴. Ohren ziemlich groß, Klappe bis zur Ohrmitte reichend, ſchmal lanzett zugeſpitzt; Flügel nackt, bis zur Zehenwurzel reichend. Oben gelblich graubraun, unten gelblich weißgrau; alle Haare am Grunde ſchwarz. Nackte Theile ſchwarzbraun. — Könnte vielleicht zu V. subulatus gehören.

96. V. lacteus. Temm., die weiße Fledermaus; albus, pilis basi fuscis.

Vespertilio lacteus. Temm. monogr. II. p. 245. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 538.

Als Heimath wird Nordamerika vermuthet. Körper 1″ 8‴, Schwanz 1″, Vorderarm 1″ (Exemplare noch nicht ausgewachſen). Größe und Formen von V. Pipistrellus. Ohren kurz, Klappe ebenfalls lanzett, Schenkelflughaut an der Wurzel behaart. Pelz außen ganz weiß, aber die

1) Wenn ſchon in den vorhergehenden Abtheilungen der amerikaniſchen Fledermäuſe vielen Arten zur Zeit nur eine proviſoriſche Berechtigung zuerkannt werden kann, ſo gilt dieß noch mehr von der vierten Gruppe. In Ermangelung eigner Vergleichungen muß ich mich begnügen, ein Verzeichniß der Arten, wie ſie aufgeſtellt ſind, einfach zu regiſtriren, und Denen, die kritiſche Prüfung überlaſſen, die hiezu Gelegenheit haben.

Haare der Oberseite am Grunde schwärzlich, die der Unterseite röthlichbraun. Flughäute gelb.

97. V. aenobarbus Temm., die rothbärtige Fledermaus; rufofuscus, ventre albido.

Vespertilio aenobarbus. Temm. monogr. II. p. 247 tab. 59 fig. 4. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 539.

Muthmaßlich aus Nordamerika. Körper 1" 6‴, Schwanz 9‴, Vorderarm 11‴, Flugweite 6½". Ohren so breit als lang, Klappe gegen den Kopf gekrümmt. Haare durchgängig zweifarbig, am Grunde schwarz. Oben rothbraun, Stirne, Wangen und Kinn roth, Halsseiten röthlich, Schamgegend rein weiß, Bauch weißlich, Seiten schwach röthlich.

98. V. monticola Bachm., die Berg-Fledermaus; „V. subulato brevior, auriculis brevioribus, tragis non excedentibus dimidiam longitudinem auriculae, colore fulvo.„ Bachm.

Vespertilio monticola. Bachm. journ. of the Acad. of nat. sc. of Philadelph. VIII 2 (1842) p. 280.

Virginien. Körper 1" 8‴, Schwanz 1½".

99. V. virginianus Bachm., die virginische Fledermaus; „V. monticola paululum longior, auriculis paululum longioribus magisque acutis; dentibus prim. max. sup. simplicibus; interfemorali membrana nuda; corpore supra fuligineo-fusco, subtus cinereo-fuscato."

Vespertilio virginianus. Bachm. journ. of the Acad. of Philad. VIII. p. 280.

Virginien.

100. V. Leibii Bachm., die michigansche Fledermaus; „V. supra fusco-ferrugineus, subtus cinereus, alis auribusque nigris."

Vespertilio Leibii. Bach. journ. of the Acad. of Philad. VIII. p. 280.

Michigan. Körper 1" 7‴, Schwanz 1" 4‴.

101. V. californicus Bachm., die kalifornische Fledermaus; „V. fusco-lutescens, vellere longo et molli, trago longitudine dimidium."

Vespertilio californicus. Bachm journ. of the Acad. of Philad. VIII. p. 285. — Peale. Unit. St. explor. expedit. mamm. p. 23.

Kalifornien und Oregon. Körper 1" 7‴, Schwanz 1" 5‴.

102. V. cubensis Gray, die cubaniſche Fledermaus.

Scotophilus cubensis. Gray, ann. of nat. hist. IV. p. 7. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 539.

Cuba. Körper 2¼", Schwanz 1¼", Vorderarm ebenſo. „Pelz ſchwärzlichbraun (im Spiritus), Flügel dunkel, ſchwärzlich; Unterſeite der Schenkelflughaut weißlich mit zerſtreuten Haaren; Füße ſtark, Sporen kurz, ſich verdünnend; Ohren mäßig, ganz, Klappe oval lanzett."

103. V. barbatus Gundl., die ſchnauzbärtige Fledermaus.

Vespertilio barbatus. Gundlach, Wiegm. Archiv 1840 S. 356.

Cuba. Körper 1" 3‴, Schwanz 1". Blaß kaſtanienbraun, Haarſpitzen der Oberſeite dunkler. Schnauzengegend ſehr kurz behaart und durch einen, von einem Mundwinkel zum andern ſich erſtreckenden Bogen längerer, am Mundwinkel wie ein Bart abſtehender, Haare begrenzt; die Ohren etwas in eine ſtumpfe Spitze verlängert; Klappe an der Wurzel ſchmal, dann ſich erweiternd.

104. V. nasutus Shaw, die große Fledermaus.

Vespertilio nasutus. Shaw gen. zool. I. 1. p. 142. — Temm. monogr. II. p. 254. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 532. — V. maximus. Geoffr. ann. d. mus. VIII. p. 202. — Grande sérotine de la Guyane. Buff. suppl. VII. p. 288. tab. 73.

Cayenne. Körper 5" 8‴, Ohrlänge 13‴, Ohrbreite 9‴, Flugweite an 2'. Die größte aller Arten, ſeit Buffon aber nicht wieder beobachtet. Haare auf dem Rücken 4‴ lang. Oben rothbraun, an den Seiten hellgelb, am Bauche ſchmutzigweiß.

105. V. villosissimus Geoffr., die zottige Fledermaus.

Vespertilio villosissimus. Geoffr. ann. d. mus. VIII. p. 204. — Rengg. Paraguay S. 83. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 536. — Chauve-souris VII. Azar. ess. II. p. 284.

Gemein in Paraguay. Körper 2" 6‴, Schwanz 1" 10‴, Ohren 10‴. Ohren doppelt ſo lang als breit, ausgerandet; Klappe halb ſo lang, lanzett. Flügel bis zur Fußwurzel reichend, Schwanz ganz umſchloſſen, Pelz langhaarig, Schenkelflughaut fein behaart. Ueberall mäuſegrau.

106. V. levis Is. Geoffr., die leichte Fledermaus.

Vespertilio levis. Is. Geoffr. ann. des sc. nat. III. p. 444. — Temm. monogr. II. p. 249. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 535.

Brasilien. Ganze Länge 2″ 9‴, wovon der Schwanz die Hälfte, Vorderarm 1″ 4‴, Flugweite 9‴. Ohren fast nochmal so lang als bei V. polythrix, Schwanz so lang als der Körper. Oben dunkel kastanienbraun, unten schwach ins Graulichte ziehend. — Würde nicht die Angabe vorliegen, daß der Körper nicht länger als der Schwanz sey, so könnte dieser V. levis zu V. nigricans oder noch eher zu V. nubilus zu bringen seyn [1]).

e) Australienses.

107. V. Morio Gray, die Mohren-Fledermaus.

Scotophilus Morio. Gray, Grey's journ. of two expedit. in Austral. II. p. 405.

Neuholland und Vandiemensland. Vorderarm 1″ 10‴. Rücken einförmig bräunlichschwarz, unten kaum blasser; Wangen beinahe schwarz; Unterseite der Flügel und Schenkelflughaut mit Haarlinien; Sporen verlängert, schlank, Ohren mäßig, gerundet, Klappe länglich stumpf.

108. V. Gouldii Gray, die halbscheidige Fledermaus.

Scotophilus Gouldii. Gray, Grey's journ. II. p. 405.

Südliches Neuholland. „Schwärzlich, Hinterhälfte des Rückens bräunlich, Seiten und Bauch bräunlich aschfarben; Ohren ziemlich groß, breit, Klappe halboval, Unterseite der Flügel und Schenkelflughaut mit Haarlinien. Var. 1: Hintertheil des Rückens graulich. Bauchseiten grau.

109. V. australis Gray, die haarschnürige Fledermaus.

---

1) Gar nicht einzureihen sind folgende 4 Arten von Rafinesque: V. cyanopterus, melanotus, calcaratus und Monachus, sowie V. arquatus Say (vgl. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 538). Ungewiß bleiben V. brasiliensis Spix (vgl. Wagn. a. a. O. S. 534) und Gray's Kerivoula brasiliensis (ann. of nat. hist. XI. p. 117), von der die ganze Beschreibung in Folgendem besteht: „schwärzlich, Haare mit bräunlichen Spitzen, unten merklich blasser; Ohren groß, spitz, rückwärts gebogen." — Unbekannt ist mir Gray's Natalus stramineus (mag. of zool. and Bot. II. p. 14) aus S. und N. Amerika.

Scotophilus australis. Gray, Grey's journ. II. p. 406.

Südliches Neuholland und Vandiemensland. Vorderarm 1" 5‴, größere Varietät 1" 7‴. „Rücken schwärzlich, Haarspitzen mehr braun, unten an den Bauchseiten merklich blasser. Ohren klein, Klappe oval lanzett, etwas halbmondförmig; Flügel mit 16 oder 18 schiefen Querlinien von Haaren unter jedem Vorderarm und zerstreuten Haaren an den Leibesseiten."

110. V. pumilus Gray, die australische Zwerg-Fledermaus.

Scotophilus pumilus. Gray, Grey's journ. II. p. 406.

Neu Südwales. Körper 1" 2‴, Schwanz 11‴, Vorderarm 1" 2‴. „Graubraun, Basis der Haare schwärzlich, unten blasser, Wangen schwärzlich. Ohren klein, ziemlich dünn, länger als der Pelz; Klappe halb so lang als das Ohr, am Ende abgerundet. Flügel fast kahl, außer an der Achselhöhle, Schenkelflughaut an der Basis behaart; Sporen ⅔ von der Länge der Schenkelflughaut [1])."

111. V. picatus Gould., die weißgurtige Fledermaus; aterrimus, abdomine albo-cingulato.

Scotophilus picatus. Gould proceed. 1852; mamm. of Austral. IV.

Vom Kapitän Sturt in den Centraltheilen Neuhollands entdeckt. Eine sehr kleine Art mit sehr kurzen Ohren. Der Pelz ist oben wie unten glänzend dunkelschwarz, mit Ausnahme eines weißen halbmondförmigen Saumes, der die Seiten und den Hintertheil des Unterleibs umgibt. Die Flughäute sind purpurbraun.

XIX. NYCTICEIUS. Schwirrmaus.

Dentes primores juniorum $\frac{2}{3}^{2}$, adultorum $\frac{1}{3}^{1}$, molares $\frac{6}{6}$; auriculae

1) Noch ist in Gray's List of Brit. mus. p. 30 eine australische Art als Scotophilus Greyii von Port Effington aufgeführt.

Endlich sind noch als von unbekannter Heimath anzuführen: Romicia calcarata Gray (mag. of Zool. and Botan. II. p. 13) und Kerivoula grisea (ann. of nat. hist. X. p. 258), von der es heißt: Ohren mäßig, Pelz grau, Haare am Grunde roth mit weißlichgrauen Spitzen, Flügel braun, Gesicht weißlich, Körper 1" 3‴, Vorderarm 1" 2‴.

disjunctae, breves, rotundatae; cranium inter arcus zygomaticos valde angustatum, versus occiput latum et convexum, crista elevata instructum.

Heimiſch in Afrika, Aſien und Amerika. Von Vespertilio verſchieden, daß bei Erwachſenen regelmäßig die kleinen mittlern Schneidezähne verloren gehen und nur der äußere, eckzahnähnliche jederſeits übrig bleibt, auch ſind die Backenzähne etwas minder complicirt. Bei Jungen wird zuweilen vor den 4 bleibenden Backenzähnen ein ſehr kleiner, fünfter wahrgenommen, der aber zeitig ausfällt. Die Klappe iſt kurz und ſtumpf.

a) Asiatici.

1. N. Heathii Horsf., die flachköpfige Schwirrmaus; e rufescente fuscus, subtus griseo-fulvidus; capite depresso plano.

Nycticejus Heathii. Horsf. proceed. I. (1831) p. 113. — Temm. monogr. II. p. 148. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 541. — Blyth journ. of the Asiat. soc. XX. p. 157; XXI. p. 346.

Häufig in ganz Vorderindien und auf Ceylon; Blyth giebt folgende Maaße an: ganze Länge 6″, wovon der Schwanz 3‴ mißt, Flugweite 16½, Vorderarm 2‴. Schnauze breit und ſtumpf; Ohren kurz, länglich abgerundet und etwas ausgerandet. Dicht behaart, ohne nackte Stellen. Oben dunkelbraun mit röthlichem Anfluge, unten graulichfahl.

2. N. Temminckii Horsf., die veränderliche Schwirrmaus; diversissime coloratus; supra rufo-fuscus aut olivaceo-fuscus, subtus rufus, aut flavido-canus, aut rubello-albidus; trago elongato, attenuato, incurvo.

Nycticejus Temminckii. Horsf. zool. research. n. 8. — Temm. monogr. II. p. 149 tab. 42 fig. 3 — 6. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 541. — Cantor journ. of the Asiat. soc. XV. p. 185. — Blyth ebenda XXI. p. 345. — Scotophilus Temminckii. Gray list. of Brit. mus. p. 31.

Java, Borneo, Sumatra, Banda, Timor, malayiſche Halbinſel, Kalkutta, Pondichery, faſt allenthalben zahlreich. Körper 2″ 7‴, Schwanz etwas über 2″, Vorderarm faſt 2″. Die Behaarung iſt kurz und reichlich. Wie Cantor nachgewieſen hat, iſt die Färbung ungemein veränderlich, entweder oben kaſtanienfarben, unten roth, oder oben rothbraun, unten röthlichweiß, oder oben olivenbraun, unten gelblich braungrau, oder oben ſchmutzig olivenfarbig, unten fahlroth (Junge), oder auch geſcheckt.

* **N. Belangeri Is. Geoffr.**, die nacktbäuchige Schwirrmaus; facie, uropygio, inguine femoribusque nudis.

Vespertilio Belangeri. Is. Geoffr. voy. de Bélang. zool. p. 87. tab. 3. — N. Belangeri. Temm. monogr. II. p. 151. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 542.

Vorder- und Hinterindien nebst Ceylon. Körper 2" 7‴, Schwanz 1" 11‴. Erwachsene oben olivenkastanienbraun, unten falb; Junge oben braun, unten lichtgelb, zugleich Bauch und Hinterkeulen minder nackt. — Wird von Cantor wie von Gray mit N. Temminckii zu einer Art gezählt.

* **N. noctulinus Is. Geoffr.**, die nacktschnauzige Schwirrmaus; fulvus, subtus isabellinus, corpore nec non patagii interfemoralis basi pilosis; rostro apice nudo.

Vespertilio noctulinus. Is. Geoffr. l. c. p. 82. — Temm. monogr. II. p. 211. — N. noctulinus. Temm. p. 266. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 543. — ? Noctule de Sumatra. Fr. Cuv. nouv. ann. de mus. I. p. 20.

Bengalen, Singapore. Körper 2", Schwanz 1" 2‴, Vorderarm 1" 4‴. Nur Jugendzustand, in welchem man diese Fledermaus, nach Cantor, häufig an der Mutter hängen sieht. — Demnach wären unter N. Belangeri erwachsene alte Individuen begriffen, unter N. Temminckii jüngere, und unter N. noctulinus ganz junge Exemplare einer und derselben Art[1]).

* **N. luteus, Blyth**, die falbgelbe Schwirrmaus; magnitudine intermedius inter N. Heathii et N. Temminckii.

Nycticejus luteus. Blyth journ. of the Asiat. soc. XX. p. 157; XXI. p. 345.

---

1) Horsfield führt im Catal. of the mamm. in the Mus. of the East Ind. Comp. p. 37 vier Arten von indischen Schwirrmäusen auf, von denen er angiebt, daß sie eine beträchtliche Familienähnlichkeit miteinander hätten, nämlich 1) Nycticejus Temminckii Horsf. et Temm. von den sundaischen Inseln; 2) N. flaveolus Blyth vom indischen Festland, um ⅛ größer als ersterer und sehr veränderlich in der Färbung; 3) N. isabellinus Blyth von Centralindien, von der Größe des N. Temminckii, aber einförmig isabellfarben; 4) N. castaneus Gray (N. Temminckii Cantor) von der malayischen Halbinsel. — Wahrscheinlich sind die neuen, nach handschriftlichen Mittheilungen von Blyth aufgeführten Arten: N. flaveolus und isabellinus, mit den von ihm später N. Tickelli und luteus benannten identisch, während N. castaneus mit N. Temminckii zu vereinigen ist.

Blyth bezeichnet dieſe Art als den bengaliſchen Repräſentanten des N. Heathii von ähnlicher Färbung, aber geringerer Größe; er hat indeß die Unterſchiede von letzterem und von N. Temminckii nicht ſcharf nachgewieſen, daher die Artberechtigung noch zweifelhaft bleibt. Länge 5⅝", wovon der Schwanz 2¼ mißt, Flugweite 14 ¼, Vorderarm 2¼". Wie Blyth bemerkt, gleichen N. Heathii und N. luteus dem N. Belangeri, indem beide auf der Oberſeite ſehr ſchön falb oder goldbraun ſind, auf der Unterſeite zart gelb, mehr oder minder tief, und nicht ſelten mit falbem Anfluge, deſſen rother Ton gewöhnlich lebhafter iſt als bei N. Temminckii. Bei letzterem mißt, nach Blyth, der Vorderarm 2", bei N. luteus 2⅛" und bei N. Heathii 2¼".

3. N. Tickelli Blyth, die blonde Schwirrmaus; pallide fulvescens, supra vinaceo-lavatus, alis obscuris.

Nycticejus Tickelli. Blyth journ. of the Asiat. soc. XX. p. 157.

Centralindien und Ceylon. Körper 2⅝", Schwanz 2⅛, Vorderarm 2⅝, Flugweite 16, Ohren ⅝". „Pelz mäßig lang, weich und gerade oder etwas gewellt, blaß falblich oder weißlichfalb, auf dem Rücken mehr oder weniger braun (maronne) oder weinfarbig überlaufen. Flughäute dunkel, längs der Finger wie bei Kerivoula picta gezeichnet, die lichte Farbe aber weniger über die Flughaut ausgebreitet, obwohl die Schenkelflughaut hauptſächlich oder ganz von dieſer Farbe iſt. Auf letzterer findet ſich an ihrer Baſis oben ein beträchtlicher Haarwuchs, eben ſo längs der Schienbeine und insbeſondere auf den Zehen; auch das Geſicht und die Augen und die Schnautze iſt behaart. Ohren dreieckig, ſtumpf zugeſpitzt und auswärts an ihrer Wurzelhälfte behaart; die Klappe breit, halbkreisförmig und an der Spitze plötzlich verſchmälert. Noch zeigt das Gebiß eine Eigenthümlichkeit: es findet ſich nämlich ein kurzes, flaches, ſtumpf drei- oder vierlappiges, zweites Paar oberer Schneidezähne hinter dem gewöhnlichen großen Paar, und unmittelbar hinter dem Berührungspunkte des letzteren mit dem jederſeitigen Eckzahne." Letzteres Verhalten hat Blyth bei keiner andern Art wahrgenommen.

4. N. ornatus Blyth, die gezierte Schwirrmaus; isabellino-brunneus, stria dorsali alba; fronte, scapulis axillisque macula alba ornatis; auriculis elongatis.

Nycticejus ornatus. BLYTH journ. of the Asiat. soc. XX. (1851) p. 517.

Cherra Punji in den Khasia-Bergen nördlich von Sylhet. Körper 2⅛", Schwanz 1⅞, Vorderarm 2¼, Ohren ⅝, Klappe ¼". Die Ohren sind länglich oval, die Klappe klein und sichelförmig. Die Farbe ist ein schönes, blaß rostfarbiges Isabellbraun, weniger lebhaft am Unterrücken und etwas blasser auf dem Unterleib. Die Haare sind im ersten Viertel schwarz, dann weißlich mit rostfarbigen Spitzen. Ein weißer Fleck steht auf der Mitte der Stirne, andere an jeder Schulter und ober der Achsel; ein weißer Streif verläuft längs der Mitte des Rückens. Die Schnautze ist dunkelbraun, ein breiter weißer Halbring erstreckt sich um die Kehle von einem Ohr zum andern, hinter ihm ein gleichbreiter dunkelbrauner Halbring, und hinter diesem ein schmälerer, rein seidenweißer. Die Flughäute sind wie bei N. Tickelli bezeichnet oder schwarz, ausgenommen die Schenkelflughaut, welche falbroth ist, wie auch ein Theil der Schwingen gegen den Rumpf hin, nebst den Gliedmassen und Fingern. — In der Färbung ist diese Art mit N. Tickelli verwandt, ist aber kräftiger, mit auffallend stärkeren Füßen und merklich langen Ohren; auch fehlt der kleine Schneidezahn hinter der Stelle, wo sich bei letzterem der große obere Schneidezahn und der Eckzahn berühren.

5. N. Pearsonii HORSF., die graubäuchige Schwirrmaus; rufo-castaneus, subtus canus; capite parvo, brunneo-cano, rutilo-lavato.

Lasiurus Pearsonii. HORSF. catal. of the mammal. in the mus. of the East Ind. Comp. p. 36. — BLYTH journ. of the Asiat. soc. XX. p. 524.

Von Dartschiling in Indien. Körper 3", Schwanz 1" 6‴, Vorderarm 2" 3‴, Flugweite 14". Die Beschreibung Horsfield's gründet sich auf ein einziges Exemplar, bezüglich dessen er sich auf das Zeugniß von Gray beruft, daß es derselben Gattung als die amerikanischen Arten von Lasiurus angehörig ist. „Pelz oben sehr weich, seidenartig und ziemlich lang. Farbe des Kopfes, Nackens und der Schultern bräunlichgrau mit rostfarbigem Anfluge und mit weißlichen Haaren gescheckt. Die übrige Oberseite mit der Basis der Flügel, Schenkel und der Schenkelflughaut sind tief kastanien- oder röthlichbraun; feine Haare von derselben Färbung sind über die Flughaut verstreut und ragen über deren Rand

vor. Der Unterleib ist dicht mit einem grauen Pelze bedeckt, der an der Brust und Gurgel heller ist. Die Schenkelflughaut ist mit regelmäßigen parallelen Querlinien bezeichnet. Die Ohren sind mehr abgerundet als bei den amerikanischen Arten. Die Klappe ist lanzett und erstreckt sich bis zur Mitte des Ohrlappens. Die Flughaut ist braun."

Aus der Beschreibung von Blyth mag noch Folgendes beigefügt werden. Körper 2¼", Schwanz 1¼", Vorderarm 1⅞", Kopf ⅝, Ohren ½". Kopf kurz und breit. Oben 4 Schneidezähne, von welchen die äußern viel kleiner als die andern sind. Pelz oben einfarbig rothbraun, unten schmutzig grau, mit weißgrauen, etwas gekräuselten Spitzen, besonders an Kopf, Schultern und Brust. Aus der geringeren Größe und dem Vorhandenseyn von 4 obern Schneidezähnen läßt sich schließen, daß das Blyth'sche Exemplar noch nicht erwachsen war.

b) Africani.

6. N. Nigrita Schreb., die hundsköpfige Schwirrmaus; fulvo-brunneus, subtus cano-fulvidus; auriculis partem capitis tertiam aequantibus.

Nycticejus Nigrita. Temm. monogr. II. p. 147 tab. 47 fig. 1, 2 (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 540. — V. Nigrita Schreb. I. S. 171 tab. 58 (fig. Buff.)

Senegambien. Körper 4", Schwanz 3", Flugweite 1' 6". Oben falbbraun, unten graufalb, Häute schwärzlich.

7. N. borbonicus Geoffr., die bourbonische Schwirrmaus; rufus, subtus albus; trago elongato lanceolato.

Vespertilio borbonicus. Geoffr. ann. d. mus. I. p. 201. tab. 46 (Kopf) — N. borbonicus. Temm. monogr. II. p. 153. tab. 47 fig. 7 (Kopf). — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 543.

Insel Bourbon. Körper 2" 11‴, Schwanz 1" 7‴, Vorderarm 1" 9‴. Kopf kurz und breit, Ohren kaum höher als der Schädel. Pelz oben lebhaft roth, wobei die Haare am Grunde gelblich sind; Unterseite rein weiß, schwach röthlich überlaufen.

8. N. leucogaster Rüpp., die weißbäuchige Schwirrmaus; flavido-brunneus, subtus albus; facie genisque nudis carneis.

Nycticejus leucogaster. Rüpp. Atlas. S. 71 tab. 28. — Temm. monogr. II. p. 153. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 543.

Kordofan. Körper 2″ 7‴, Schwanz 1″ 6‴, Vorderarm 1″ 10½‴. Schnautze ziemlich lang und breit. Oberseite licht falbbraun, die Haare am Grunde viel heller; Unterseite weiß, häufig mit gelblichem Anfluge, die Haare einfarbig.

9. N. Dinganii Smith., die natalsche Schwirrmaus; olivaceo-brunneus, subtus flavidus; auriculis latiusculis.

Scotophilus Dinganii. A. Smith, South Afr. quart. journ. 1832. I; illustr. of the Zool. of South Afric. tab. 53.

Kaffernland zwischen Port Natal und der Delagoa Bay. Körper 3½″, Schwanz 2″, Vorderarm 2″ 3‴, Flugweite 12″. Oben 2 Schneidezähne dicht an den Eckzähnen (also zu Nycticejus gehörig), die untern 6 zweilappig. Der Kopf ist ziemlich groß, die Nase breit und abgestutzt, die Nasenlöcher vorspringend und vorwärts geöffnet. Die Ohren sind breiter als lang, die Klappe lang, linear, etwas sichelförmig, mit abgerundeter Spitze. Die Farbe der Oberseite ist zwischen honiggelb und trüb orangebraun, die Unterseite licht honiggelb. Die Flughäute sind hell braunröthlich mit bräunlichroth schattirt; die Ohren sind licht bräunlichroth mit fleischröthlichem Anfluge [1]).

10. N. planirostris Pet., die flachschnautzige Schwirrmaus; olivaceo-fuscus, subtus flavido-albus; auriculis longioribus quam latioribus; calcare crure longiore.

Nycticejus planirostris. Peter's Mossamb. I. S. 65 tab. 17 fig. 1.

---

1) Sundevall hat in der Öfversigt af K. Vetenskaps-Akadem. Förhandl. 1846 p. 119 einen Vesperugo Dinganii Wbg. aus den innern Gegenden des Kaffernlandes aufgeführt, der identisch mit Scotophilus Dinganii Smith sein könnte. Sundevall charakterisirt seine neue Art folgendermaßen: olivaceus, subtus virescenti flavus, trago longo tenui. 70 millim. (2″ 7‴) † cauda 50 (1″ 10‴); cubitus 55 (2″). Colore in pure flavum vergente, absque immixto rutilo, inter mammalia fere singularis. Dentes spurii $\frac{2}{2}$; primores inferiores obliqui, transversim positi. Aures oblongae, late distantes, capite breviores, margine inferiore ut in Vesperuginibus Europae formato. Tragus valde angustus, dimidio aure longior, sed apice, paulum antrorsum flexo, rotundatus. Rostrum latum.

Im Innern von Mossambique (Tette). Körper 2" 5‴, Schwanz 2" ½‴, Vorderarm 1" 11½‴, Kopf 10‴, Ohr 6‴. Die untern Schneidezähne sind dreilappig. Die Schnauze ist sehr breit und platt; die Ohren länger als breit, um ⅓ kürzer als der Kopf; die Klappe sichelförmig und halb so lang als das Ohr. Die Flügel reichen bis zur Zehenwurzel. Die Farbe ist oben dunkel olivenbraun, unten weiß mit gelblichem Anfluge; vor dem Schultergelenk befindet sich ein großer bräunlicher Fleck. Flughäute und Ohren sind dunkler braun, die Nägel gelblichweiß.

11. N. viridis Pet., die olivengrüne Schwirrmaus; olivaceo-viridis, subtus viridi-flavus; calcare crure breviore.

Nycticejus viridis. Peter's Mossamb. I. S. 87 tab. 17 fig. 2.

Insel Mossambique. Körper 2" ½‴, Schwanz 1" 6‴, Vorderarm 1" 8½‴, Kopf 9‴, Ohr 5‴. Die untern Schneidezähne sind dreilappig. Die Schnauze ist breit, dick und wulstig; die Ohren länger als breit, und halb so lang als der Kopf; die Klappe sichelförmig und am vordern Rande fast gerade. Die Flügel reichen bis zur Zehenwurzel. Die Oberseite ist schön dunkel olivengrün, die Unterseite grünlichgelb. Flughäute und Ohren sind braunschwarz, die Nägel weiß.

c) Americani.

12. N. pruinosus Say., die bereifte Schwirrmaus; supra flavido-fusca, albo-adspersus; collari flavescente, maxilla inferiore nigra; macula alba ad basin alarum alteraque ad cubitum.

Vespertilio pruinosus. Say; Long's expedit. I. p. 168. — Richards. faun. bor. I. p. 1. — N. pruinosus. Temm. monogr. II. p. 154. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 544. — Pr. v. Wied Reise in Nordamerik. I. S. 403. — Cooper. ann. of the Lyc. of New York IV. p. 55. — Lasiurus pruinosus. Gray list of Brit. mus. p. 32.

Nordamerika, vom 54° an bis herab nach Süd-Carolina beobachtet. Nach Cooper mißt der Körper 3", Schwanz 1. 8, Vorderarm 2": nach Richardson: Körper 4", Schwanz 2". Backenzähne sind nach Letzterem ⅔, nach wiederholten Untersuchungen von Cooper nur ½ und ⅔ Schneidezähne vorhanden. Die Formenverhältnisse und die reichliche Behaarung der Schenkelflughaut und der Flügel längs der Leibesseiten, oben und un-

ten, so wie längs des Vorderarms auf der Unterseite verhalten sich wie bei N. lasiurus. Die Haare der Oberseite sind am Grunde schwarzbraun, dann gelblichbraun, hierauf schwärzlich mit kurzer weißer Spitze, was ein bepudertes oder bereiftes Ansehen hervorbringt; Hintertheile und Behaarung der Schenkelflughaut roth und weiß gemengt. Der Pelz der Unterseite ist dreifarbig; die Haare an der Kehle mit gelblichweißen, an der Brust mit bräunlichen Spitzen, das Uebrige der Unterseite ist heller als oben.

. . . . . .

13. N. lasiurus Schreb., die rothſcheckige Schwirrmaus; supra fulvidus, flavido-variegatus; maxilla inferiore rufa, macula alba ad basin alarum alba nullaque ad cubitum.

Vespertilio lasiurus. Schreb. I. tab. 62 B. — Geoffr. ann. d. mus. VIII. p. 200 tab. 47 (Kopf). — N. lasiurus Temm. monogr. II. p. 156 tab. 47 fig. 8 (Kopf.) — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 545. — Lasiurus rufus. Gray list of Brit. mus. p. 32. — V. noveboracensis. Cooper, ann. of Lyc. of New-York IV. p. 57. — Red bat. Wils. Am. orn. VI. p. 60 tab. 50. — ?? N. tessellatus Rafin. Desmar. mamm. p. 133.

Weit durch die Vereinigten Staaten bis zu den Felsgebirgen verbreitet; nach Temminck auch in Cajenne gemein, hier nur etwas größer. Nach Temminck beträgt die ganze Länge 4″, wovon der Schwanz 2″ ausmacht, Vorderarm 1″ 6‴. Backenzähne $\frac{1}{1}$, vor dem obern ein sehr kleiner Lückenzahn. Der Kopf ist auffallend klein, die Klappe kurz, einwärts gekrümmt; die Schenkelflughaut ist sehr groß, oben ganz behaart, die Flügel längs der Unterseite des Vorderarms behaart. Die Färbung, wie sie Temminck beschreibt, habe ich schon früher angegeben.

Von seinem V. noveboracensis liefert Cooper folgende Charakteristik. Backenzähne $\frac{1}{1}$. Ganze Länge 3. 8″, wovon der Schwanz 1. 5, Vorderarm 1. 5. Der Pelz ist oben röthlich falb, bei Einigen dunkel und mehr rostfarbig, bei Andern heller; die Basis der Haare licht ockerfarbig, gegen das Ende röthlich falb, rost- oder lackfarbig, öfters mit feinen weißen Spitzen; das Röthfalbe herrscht auf der Schenkelflughaut vor. Ein weißer Fleck am Flügelansatz. Unten ist die Farbe ähnlich der des Rückens, aber blasser. Die Flügel sind oben ganz nackt mit Ausnahme eines kleinen Flecks an der Flügelwurzel, längs der Unterseite des Vorderarms be-

haart. Dieſer Theil der Flügel iſt hellgelb oder falb, der Reſt dunkel. Von N. pruinosus verſchieden durch geringere Größe, rothe Färbung der Lippen und des Kinns, Mangel des weißen Flecks am Ellenbogengelenk, dagegen eine rothe Beimiſchung auf der Unterſeite. — Aus dieſer Charakteriſtik geht die Identität von Cooper's N. noveboracensis mit Temmincks N. lasiurus hervor.

14. N. bonariensis Less., die marmorirte Schwirrmaus; supra flavidus, pilis nigro albidoque apiculatis, subtus brunneo-flavescens; pilis patagii interfemoralis nigro-rufis.

Vespertilio bonariensis. Less. voy. de la Coquille, zool. I. p. 137 tab. 2 fig. 1. — N. bonariensis. Temm. monogr. II. p. 159. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 545. — V. Blossevillei. Less. bull. d. sc. nat. VIII. p. 95. — Gervais, R. de la Sagra hist. de Chil. mamm. p. 6 tab. 1 fig. 4— 8 (Kopf, Schädel, Gebiß).

Nach einem bei Buenos-Ayres gefangenen Individuum von Leſſon charakteriſirt. Ganze Länge 3″, wovon der Schwanz 1″ 3‴, Vorderarm 1″ 4‴. Schneidezähne $\frac{4}{4}$, Backenzähne $\frac{6}{6}$. Formen und Behaarung ſind ganz wie bei N. lasiurus. Die Schnauze iſt auroraroth; der Rücken gelb oder hellfalb, jedes Haar ſchwarz geendigt mit kurzer weißer Spitze, was ein bereiftes Anſehen giebt. Die Unterſeite iſt hellfalb, mit Bräunlich gemiſcht; die Behaarung der Oberſeite der Schenkelflughaut iſt ſchwarzroth. Temminck hält es für wahrſcheinlich, daß dieſe Schwirrmaus nicht von N. lasiurus verſchieden iſt. — Aus der ſehr unvollſtändigen Charakteriſtik von Gervais iſt Folgendes hervorzuheben. Vorderarm 1″ 7‴. Farbe des ganzen Körpers, auch der Haare auf der Schenkelflughaut, prächtig kaſtanienroth. Haare an der Baſis ſchwarz, gegen die Mitte blaſſer, an der Spitze kaſtanienroth.

* N. varius Poepp., die bunte Schwirrmaus; ferrugineus, subtus fulvo et fuliginoso-undulatus, torque jugulari pallida.

Nycticejus varius. Poeppig, Reiſe in Chile I. S. 451; Froriep's Notizen XXVII. S. 217. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 547. — Gay hist. de Chil. zool. I. p. 37.

Chile. Körper 2″ 9‴, Schwanz 1″ 7‴. Von Poeppig kurz, von Gay ausführlicher geſchildert, woraus erſichtlich, daß N. varius

im Habitus und in der Behaarung mit N. lasiurus übereinkommt. Die Haare der Oberseite bezeichnet Poeppig als an der Wurzel schwarzbraun, in der Mitte fahlgelblich, an der Spitze rostfarben. Aehnlich nennt sie Gay an der Wurzel schwärzlich, in der Mitte silbergrau, an der Spitze zimmtroth; Bauch mehr ins hell Braune fallend; gegen die Seiten zeigt sich ein gelblichweißer Haarbüschel, dazwischen eine blasse Binde über die Brust. Haare der Schenkelflughaut einfarbig. Worin der Unterschied von N. lasiurus und N. bonariensis liegen soll, wird nicht gesagt und kann auch nicht aus der Beschreibung entnommen werden.

Nun hat aber auch Natterer in Brasilien (San Paulo und Mato grosso) rothscheckige Schwirrmäuse entdeckt, auf welche die Beschreibungen von N. lasiurus, bonariensis und varius in den meisten Stücken zugleich passen. Aeußerer Habitus, Größenverhältnisse und Art der Behaarung verhalten sich bei diesen brasilischen Exemplaren ganz wie bei N. lasiurus. Die Haare der Oberseite sind am Grunde schwarz, dann breit lichtgelb, hierauf schön rostroth, dem sich häufig noch eine ganz kurze, unten schwarze, oben weiße Spitze ansetzt. Der Unterkiefer ist licht rostfalb. Die Haare der Unterseite sind am Grunde schwarz, an der Spitze licht bräunlich fahlgelb. Am Flügelansatz findet sich ein kleiner gelblichweißer Fleck; die Behaarung der Schenkelflughaut ist einfarbig dunkel rostroth. Die Flügel sind schwarz, längs der Flügelknochen röthlichbraun. Das vorstehender Charakteristik zu Grunde liegende Exemplar ist ein Weibchen; es stimmt in der Färbung der Haarspitzen mit den Angaben von N. bonariensis und zum Theil auch mit denen von N. lasiurus, und in der Haarwurzelfärbung mit N. varius überein. Es wird demnach die Zusammengehörigkeit dieser Schwirrmaus mit N. varius und bonariensis wohl nicht beanstandet werden können. In Bezug auf N. lasiurus findet sich nur die Differenz, daß in den Beschreibungen desselben der schwarzen Färbung der Haarwurzeln keine Erwähnung geschieht und die Haare der Schenkelflughaut zweifarbig sind. Darnach habe ich einstweilen diese rothscheckigen Schwirrmäuse in 2 Arten gesondert, über deren Verhalten aber weitere Vergleichungen erst sichern Aufschluß liefern müssen.

15. N. noveboracensis Erxl., die Trauer-Schwirrmaus; unicolor fuscus, macula alba ad basin alarum; patagio interfemorali supra villoso.

Nycticejus noveboracensis. Temm. monogr. II. p. 158. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 546. — Atalapha americana Rafin. Desmar. mamm. p. 156.

Vereinigte Staaten. Körper 1" 6''', Schwanz ebensoviel. Formen wenig verschieden von N. lasiurus und pruinosus, wohl aber die Färbung. Pelz oben wie unten und auf der Schenkelflughaut von einem einförmigen, etwas ins Röthliche ziehenden Braun; nur am Flügelansatz ein kleiner weißer Fleck. Cooper's N. noveboracensis ist nicht dieser Art, sondern Temmincks N. lasiurus angehörig.

16. N. macrotis Gay, die großohrige Schwirrmaus; griseo-brunneus, subtus pallidior; pilis bicoloribus; auriculis grandis.

Nycticejus macrotis. Gay hist. de Chil. zool. I. p. 38. — ? Poeppig's Reise in Chile I. S. 451; Froriep's Notizen XXVII. S. 218. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 548.

In Chile aufgefunden und von Gay folgendermassen geschildert. Körper 2" 10''', Schwanz 2" 3''', Ohren 11 — 12'''. Ohren sehr groß, behaart, an der Spitze abgerundet, etwas breiter als lang; Klappe etwas sichelförmig, abgestumpft und an der Basis schwach gezähnt. Schenkelflughaut oben und Vorderarm unten behaart. Pelz im Allgemeinen graubraun, unten heller; Haare am Grunde braun, dann silbergrau und gegen die Spitze mehr weißlich; Haare der Schenkelflughaut rostfarbig, gegen die Spitze lichter. — Poeppig's N. macrotis kann nach der von ihm vorliegenden Schilderung nicht wohl mit der gleichnamigen Art von Gay identisch seyn [1].

XXXI. THYROPTERA. Scheibenflügler.

Dentes primores $\frac{2.2}{6}$, canini tricuspidati; digiti posteriores omnes didactyli; pollex et metatarsus disco instructa.

Diese auf das tropische Amerika beschränkte Gattung war zu der Zeit, wo ich mein erstes Supplement zum Schreber'schen Werke lieferte, nur aus der unvollkommenen, nach einem höchst schadhaften Exemplare ent-

1) Die zu Nycticejus gehörigen oder verwandten, von Rafinesque aufgestellten Arten: Nycticejus humerulis Kentucky, Hypoxodon mystax von ebenda und Atalapha nicula sind nicht zu deuten (vgl. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 546).

worfenen Beschreibung von Spix bekannt gewesen; ich selbst kannte von gedachter Fledermaus nichts weiter vor als zwei Bruchstücke ohne Kopf, so daß ich außer Stande war, die lückenhafte Schilderung zu vervollständigen und dieser Gattung ihre richtige Stellung im Systeme anzuweisen. Seitdem ist dieß jedoch durch H. Rasch und Cantraine geschehen, von denen jeder ein Exemplar von dieser merkwürdigen Form erhielt, und die bald nach einander, so daß Keiner von der Publikation des Andern etwas wußte, genaue Beschreibungen und Abbildungen von derselben vorlegten. Beide erkannten richtig, daß ihre Exemplare der Gattung Thyroptera Spix angehörig waren, und die Vergleichung, die ich mit ihren Beschreibungen und dem Reste des Spix'schen Exemplares vornahm, ergaben die vollständige Uebereinstimmung in den wesentlichen generischen Merkmalen.

Ich lege hier die von Rasch gegebene Beschreibung, als die detaillirteste, vor und füge ihr Bemerkungen nach den Angaben von Cantraine und nach Vergleichung des Spix'schen Exemplares bei.

Zahnbau. — Die Formel lautet: $\frac{4}{4}$ Schneidezähne, $\frac{1}{1}$ Eckzähne, $\frac{4}{4}$ Backenzähne. Die Schneidezähne haben im Oberkiefer dieselbe Beschaffenheit und Stellung wie bei Vespertilio, nämlich paarweise und durch einen Zwischenraum geschieden; rückwärts mit einem kleinen Flügel, der vordere um $\frac{1}{3}$ länger als der hintere. Die untern Schneidezähne sind im Halbkreis gestellt, dreilappig, der hintere Flügel des vordern Zahns, den ersten des folgenden verdeckend, so daß die Stellung etwas schräg ist; an Größe nehmen sie von hinten nach vorn ab. — Die Eckzähne des Oberkiefers sind fast doppelt so lang als der vordere Schneidezahn, am Grunde vorn mit einem äußerst kleinen Vorsprunge; die untern Eckzähne sind kleiner. — Von den Backenzähnen sind die 3 vordersten als Lückenzähne anzusehen. Im Oberkiefer sind die zwei vorderen einspitzig, der 3te innen am Grunde mit einer Nebenspitze, alle fast gleicher Größe und in Contact. Von den 3 ächten Backenzähnen haben die beiden vordern 6 Spitzen: 3 kleinere auswendig, 2 mittlere, die zugleich die höchsten sind, und die innere, die tiefer steht; der hinterste Backenzahn ist fünfspitzig. Im Unterkiefer sind die 3 Lückenzähne einspitzig, gleich groß:

und im Contact; die 3 ächten sind fünfspitzig mit 2 äußern und 3 innern Spitzen [1]).

Kopf. — Am knöchernen Schädel sind die Kiefer von gleicher Länge; die Breite zwischen den Augenhöhlen etwas geringer als zwischen den obern Eckzähnen; Nasenrücken breit und gewölbt; Orbitalränder ohne Vorsprung; Hirnkasten durchscheinend, stark nach allen Seiten entwickelt, fast kugelig, ohne Leiste, mit einem schwachen Eindruck zwischen Hinterhaupts- und Scheitelbeinen. — Die Zunge zeigt auf der Oberfläche deutliche Spuren von 8 Gaumenfalten. Die Nase etwas zugespitzt, am Ende mit einer kleinen Einsenkung. Augen klein, fast in der Linie sitzend, welche man von den Nasenlöchern zur vordern Ohrwurzel ziehen kann. Ohren dünn, trichterförmig, ihr Innenrand, welcher 2 Linien hinter dem Auge angeheftet ist, bildet vom Grunde an einen vor und einwärts gewendeten Bogen; Ohrenspitze abgerundet; Außenrand im obersten Viertel ebenso, der übrige Theil convex und endet in der Höhe der Mundkrümmung, ungefähr 2 Linien hinter ihr; gegen den obern Theil des Außenrandes 7 kleine Ohrfalten. Klappe (Tragus) klein und dick, mit starker Convexität auswärts, am Grunde mit einem knospenartigen Zahn, Innenseite concav [2]).

Vorderbeine. — Wo das erste und zweite Glied des Daumens zusammenstoßen, ist die Volarfläche verdickt und ausgebreitet bis zu dem eigenthümlichen schildförmigen, kreisrunden, auf der Unterseite vollkommen ebenen Organe; der Daumennagel stark zusammengedrückt. Der 2te Finger

---

1) Cantraine giebt jederseits blos $\frac{2+2}{2+2}$ Backenzähne an; der vorderste obere Lückenzahn war wahrscheinlich nur ausgefallen. Die obern Schneidezähne sind zweilappig, die untern dreilappig.

2) Der Hirnkasten ist, wie Cantraine angiebt, durch den steilen Abfall der Stirne sehr stark von dem Gesichtstheil abgesetzt. Die Ohrmuschel ist ziemlich geräumig und ihre Ränder sind weit vorgestreckt; die Klappe ist versteckt, gekrümmt und in ihrer Mitte ziemlich fleischig. Die Schnauze ist am Ende wie abgestutzt und zeigt zwei endständige Grübchen, die jedoch keine Oeffnung haben und daher nicht die Nasenlöcher sind; letztere finden sich in der Lippe, sind groß, abgerundet und weit abstehend, indem sie fast durch die ganze Zwischenkiefergegend von einander getrennt sind. Die Lippen sind nicht beträchtlich; der ganze Schnauzenrücken ist behaart und nur das Schnauzenende ist nackt.

ist ganz rudimentär; der 3te ist der längste und mit 4 Gliedern versehen; der 4te Finger dreigliederig, das erste Glied von gleicher Länge mit dem ersten des vorhergehenden; der 5te Finger dreigliederig, das erste Glied kürzer als die der zwei vorhergehenden [1]).

Hinterbeine. — Fußsohlen mit einem ähnlichen Organ wie der Daumen versehen, doch nur halb so groß; die 5 Zehen zusammengewachsen. Seitenflughaut am Fuße bis zur Zehenspitze festgeheftet. Sporen ziemlich lang, auf der Mitte mit einem kurzen, bis zum Rande gehenden Ausläufer; der Sporenrand mit einem ziemlich dicken, mit kleinen rundlichen Auswüchsen besetzten Hautrande [2]).

Schwanz 6gliedrig, von der Länge des Körpers, mit etwas mehr als dem letzten Viertel (¼) über die Schenkelflughaut frei vorragend.

Flughäute. Armflughaut bis zum ersten Daumengliede und dem daran sitzenden Schilde festgewachsen. Schwingen nackt, was auch der Fall ist mit der Hälfte des Oberarms und dem ganzen Unterarm. Rand der Schenkelflughaut zwischen der Sporenspitze und der Mitte des 4ten Schwanzgliedes mit Haaren besetzt [3]).

---

1) Der Daumen, sagt Cantraine, hat 2 Phalangen, auf der ersten ist die Scheibe angebracht. Die Abbildungen von Letzterem wie von Rasch geben für den Daumen ganz dasselbe Verhalten zu erkennen wie an unserem Exemplare: derselbe ist nämlich sehr kurz und an der Stelle, wo sich sein Mittelhandknochen mit der ersten Phalanx vereinigt, findet sich auf der Unterfläche die rundlich ovale Hornscheibe. — Vom Zeigefinger bemerkt Cantraine, daß er ganz rudimentär ist, und daß die andern Finger nichts auffallendes darbieten. Er hat also den von Rasch hervorgehobenen merkwürdigen Umstand übersehen, daß während der 4te und 5te Finger (abgesehen von ihrem Mittelhandknochen) nur aus 2 Phalangen bestehen, der 3te Finger 3 Phalangen aufzuweisen hat, was auch das hiesige Exemplar bestätigt. Der Zeigefinger hat am letzteren ebenfalls nur einen kurzen Mittelhandknochen, aber gar keine Phalangen.

2) Der Mittelfuß, macht Cantraine bemerklich, trägt eine ähnliche Scheibe als der Daumen; die große Zehe ist von den andern nicht abgesondert. Die Sporen tragen auf ihrem untern Rande zwei wenig von einander abstehende Fortsätze. — Auch unser Exemplar zeigt am Mittelfuße eine kleine Scheibe. Die Sporen sind längs ihres untern Randes eingesäumt und indem von der Mitte derselben zwei ganz kurze Fortsätze abgehen, bildet der Saum daselbst einen lappenförmigen Vorsprung.

3) Schwanz und Flughäute verhalten sich an unserem Exemplare und an dem von Cantraine ganz so wie es Rasch angegeben.

So weit die Mittheilungen von Rasch. Noch habe ich aber einer Eigenthümlichkeit der Hinterfüße zu gedenken, die sowohl Rasch als Cantraine übersahen, die aber das Spix'sche Exemplar ganz deutlich zu erkennen giebt: die sämmtlichen fünf Zehen der Hinterfüße sind (nämlich abgesehen von ihren Mittelfußknochen) jede nur aus zwei Phalangen zusammengesetzt, eine Beschaffenheit, die bei allen vorher aufgeführten Handflüglern nur lediglich bei Phyllorrhina vorgekommen ist. Die Auffindung dieses eigenthümlichen Verhaltens an unserem Exemplare, wovon ich meinen hochachtbaren Freund Peters in Kenntniß setzte, hatte zur weitern Folge, daß dieser alsbald erkannte, daß seine von ihm und Lichtenstein neu aufgestellte Gattung Hyonycteris vollkommen identisch mit Thyroptera Spix ist. Man braucht auch nur die höchst genaue und ausführliche Beschreibung, die beide genannte Zoologen von Hyonycteris lieferten, mit der vorliegenden von Thyroptera zu vergleichen, um sich von ihrer vollständigen Uebereinstimmung in allen hier behandelten Stücken, ohne irgend eine Ausnahme, zu überzeugen. Peters hat sich aber noch ein wesentliches Verdienst um die Förderung unserer Kenntniße von dieser Gattung erworben, indem er uns auch mit ihrem innern Baue bekannt machte.

Die Gattung Thyroptera ist das interessanteste Glied unter den Vespertilionen. Ihre wesentlichen Merkmale gründen sich auf die Schädelform, den Zahnbau, die rudimentäre Beschaffenheit des Zeigefingers, die Zusammensetzung des Mittelfingers aus 3 knöchernen Phalangen, während die sämmtlichen Zehen des Hinterfußes blos aus 2 Phalangen bestehen, und endlich auf die Haftscheiben am Daumen und der Sohle des Hinterfußes.

Man kennt jetzt 2 Arten von dieser merkwürdigen Gattung, beide aus den nördlichen Theilen des tropischen Amerikas.

1. Th. tricolor Spix, der weißbäuchige Scheibenflügler; supra castaneo-fusca, subtus alba.

Thyroptera tricolor. Spix vesp. bras. p. 61 tab. 36 fig. 9. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 482 u. 551. — Rasch, Nyt Magaz. for Naturvidensk. IV. Heft 1. (1843) mit Abbild.; derselbe in Wiegm. Archiv IX. S. 361. — Th. bicolor. Cantraine bullet. de l'acad. de Bruxell. XII. 1. (1845) p. 489 mit Abbild.



rbe der Oberseite rußig röth-
rnd; die Unterseite rein weiß,
bschneidet; die Flughäute sind
ie Schenkelflughaut ist mit

ie Oberseite dicht besetzt mit
nnen Haaren. Stirn und Na-
Oberlippe von der Mund-
on derselben Farbe. — Kinn,
t graubraunen Haaren besetzt,
en erstreckt; der übrige Theil
bewachsen. Flughäute dun-
elben Farbe. Die Dimensio-
t:

spitze	0,003¼
gliedriger Finger .	0,010
ngers 1stes Glied	0,034¼
„ 2tes „	0,015
„ 3tes u. 4tes Gl.	0,015
„ 1stes Glied.	0,035
„ 2tes „	0,009
„ 3tes „	0,007
„ 1stes „	0,031
s	0,005

ber Oberseite des Leibes und
nt und der Haftscheiben als
als auf den Extremitäten ist.
ch, Seiten, Schamgegend, die

Zur Vergleichung will ich auch einige Ausmessungen vom Spix'schen Exemplare beifügen:

Vorderarm	0,038	3ten Fingers Mittelhand. .	0,034
Schwanz	028	„ „ erste Phalanx .	016
Freie Schwanzspitze . . .	008	Schienbein	018
Sporen	008	Daumenscheibe	004

Als Heimath bezeichnet Spix die Ufer des Amazonenflußes; Cantraine hat sein Exemplar aus Surinam erhalten, Rasch kennt die Herkunft des seinigen nicht. Daß die von beiden Letzteren beschriebenen Exemplare mit der Th. tricolor Spix einer und derselben Art angehören, ergiebt sich aus ihrer vollständigen Uebereinstimmung in den äußern Formen, in den Dimensionsverhältnissen und in der Färbung.

2. Th. discifera Licht. Pet., der einfarbige Scheibenflügler; supra cinnamomea, subtus dilutior, alis umbrinis.

Hyonycteris discifera. Lichtenst. u. Peters über neue merkw. Säugth. 1855 S. 9. tab. 2.

Wie schon vorhin bemerkt ist die Zugehörigkeit dieser Art zu Thyroptera von ihren Begründern jetzt selbst anerkannt worden, indem selbige alle Merkmale dieser Gattung aufzuzeigen hat, wie nachfolgende Angaben ausweisen.

Der Schnautzentheil des Kopfes ist stark von der Stirne abgesetzt und rüsselartig verlängert; das Ende ist gerade abgestutzt, nackt, wie eine Schweinsschnautze und am obern Rande mit einem schmalen Hautsaume eingefaßt; die Nasenlöcher liegen unterwärts. Die Ohren sind groß, ganz von einander getrennt, unregelmäßig viereckig, der hintere Rand doppelt ausgeschnitten und fast bis zum Mundwinkel vorgeführt. Die Klappe ist kurz, zugespitzt und dreizipfelig. Die Flügel sind lang, dünn und bis zu den Nägeln der Hinterzehen vorgestreckt. Der Daumen ist frei und trägt an der Stelle, wo sich seine erste Phalanx mit dem Mittelhandgliede vereinigt, eine ovale 3½ Millimeter lange Haftscheibe. Eine kleinere Scheibe findet sich an den Sohlen der Zehen der Hinterfüße. Der Mittelhandknochen des Zeigefingers ist überaus kurz, indem seine Länge nicht einmal ein Viertel von der des dritten Mittelhandgliedes beträgt; der Finger selbst mit seinen Phalangen fehlt. Der Mittelfinger hat 3 knöcherne

Phalangen aufzuweisen. Die Hinterfüße sind sehr klein und sämmtliche Zehen bestehen, wie bei Phyllorrhina, nur aus zwei Gliedern. Die Sporen sind lang und am äußern Rande gelappt. Der 6gliederige Schwanz ragt mit seinem letzten knöchernen und dem knorpeligen Endgliede aus dem Hinterrande der Schenkelflughaut hervor. Das Gebiß besteht aus $\frac{2\cdot2}{5}$ Schneidezähnen, $\frac{1\cdot1}{1}$ Eckzähnen, $\frac{4\cdot4}{4}$ Backenzähnen. Die obern Schneidezähne sind zweilappig, die untern dreilappig; die Eckzähne, sowohl die obern als untern, haben außer dem großen Zacken noch vorn und hinten einen kleinen Nebenzacken.

Die Farbe des Pelzes erscheint an den in Weingeist erhaltenen und später getrockneten Exemplaren auf der Oberseite zimmtbraun, auf der Unterseite heller. Die Stellen der Flügel, welche die Farbe noch bewahrt haben, sind dunkler umberbraun.

Ganze Länge	0,070	Klappe	0,004
Kopf	015	Sporen	014
Schwanz	032	3ten Fingers Mittelh. . .	031
Vorderarm	033	„ „ erste Phalanx .	015
Ohrhöhe	011	4ten „ Mittelh. . .	030
Ohrbreite	010	Schienbein	015

Die Wirbelsäule besteht aus 35 Wirbeln, nämlich 7 Halsw., 12 Rückenw., 5 Lendenw., 5 Kreuzbeinw., und 6 Schwanzwirbel; an den letzteren heftet sich wie bei Th. tricolor ein knorpeliges Endglied an.

Der Fundort dieses Scheibenflüglers, der sich durch seine einförmige Färbung und die Ohrenform specifisch von Th. tricolor unterscheidet, ist Puerto Cabello in Mittelamerika.

XXXII. FURIA. Furie.

Dentes primores $\frac{4}{4}$, canini antice et postice cuspide aucti, molares utrinque $\frac{8}{8}$.

Jetzt, wo Schädelbau und Zahnsystem der Scheibenflügler genau erörtert worden ist, wird es nothwendig, eine neue Untersuchung von Furia, die dermalen nur aus Fr. Cuvier's Beschreibung bekannt ist, vorzunehmen, um ihr Verhältniß zu den ersteren bestimmt festzusetzen. Es scheint nämlich Furia im Schädel- und Zahnbaue ganz mit Thy-

roptera übereinzuſtimmen, denn obſchon von jener nur 2 obere Lückenzähne jederſeits angegeben werden, ſo hat doch das von Cantraine beſchriebene Exemplar von Thyroptera ebenfalls nicht mehr aufzuweiſen, was wahrſcheinlich vom Ausfallen des erſten obern Lückenzahnes herrührt. Eine erneuerte Unterſuchung hat nun zu zeigen, ob in der Zahl der Finger- und Zehenglieder ebenfalls Uebereinſtimmung mit Thyroptera ſich findet, oder nicht; hiernach wird es ſich dann entſcheiden, ob Furia auch fernerhin als ſelbſtſtändige Gattung beibehalten werden kann oder mit jener zu vereinigen iſt. Von Haftſcheiben iſt übrigens bei Fr. Cuvier keine Rede.

1. F. horrens Fr. Cuv., die ſchwarze Furie; unicolor nigra.

Furia horrens. Fr. Cuv. mém. d. mus. XVI. p. 150 tab. 9. — Temm. monogr. II. p. 264. — Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 549.

Guiana. Ganze Länge 1½", Flugweite 6".

Zusätze und Berichtigungen.

Während des Druckes der vorliegenden fünften Abtheilung des Supplementbandes sind verschiedene neuere Beiträge zur Kenntniß der hier abgehandelten Säugthiere erschienen, die ich für meinen Text nicht mehr benützen konnte, zur Vervollständigung meiner Arbeit aber es für nothwendig erachte, auf die wichtigsten dieser Beiträge in der Kürze aufmerksam zu machen.

Troglodytes (S. 5 u. 8).

Die Frage, ob die afrikanischen Orangaffen in einer oder in zwei Gattungen unterzubringen und wie viel Arten unter denselben anzunehmen sind, ist seit meinem früheren Artikel weiter verhandelt, aber sehr verschieden beantwortet worden.

Am wenigsten Neues bieten Aucapitaine's[1]) Notizen über den Gorilla dar, indem sie hauptsächlich nur das bereits über diesen Affen Bekannte zusammenfassen. Dagegen ist von großer Wichtigkeit Duvernoy's[2]) Abhandlung über die anatomischen Charaktere, welche die Skelete von Troglodytes Tschego Duv. und von Gorilla Gina Is. Geoffr. wahrnehmen lassen.

Franquet hatte nämlich im Jahre 1852 vom Gabon-Fluße ein Skelet eines erwachsenen Schimpanse's mitgebracht, den die Neger N'Tschego nennen und der von ihm als eine neue Art angesehen wurde. Duvernoy

1) Rev. zool. 1853 p. 49 u. 97 tab. 2.

2) Compt. rend. XXXVI. p. 926. — Es ist hiemit zu vergleichen die Beschreibung, welche Kneeland vom Skelet des Gorilla lieferte (ann. of nat. hist. X. p. 23) — Sehr genau ist die Schilderung des Aeußern von Foot (proceed. of Philadelph. VI. p. 30).

theilt diese Meinung und führt zur Unterscheidung der neuen Art von Troglodytes niger, dem eigentlichen Schimpanse, folgende Merkmale an: 1) Der Tschego hat nach Franquet schwarzes Gesicht und kleine Ohren, der Schimpanse (T. niger) hat ein fleischfarbiges Gesicht und große Ohren. 2) Die Form der beim Tschego ausgedehnteren Schläfengruben, die Entwicklung der Pfeil- und Lambdanähte, welche sie begrenzen, und die Erweiterung der Schnautze nach vorn, die sich fast in einer geraden Linie endigt, in welcher sich der Alveolenrand der Schneide- und Eckzähne findet, geben sehr scharfe Merkmale ab, die sich auch noch in der vorn breiteren Gaumenwölbung zeigen, während sie beim Schimpanse eben so breit wie hinten ist und der Alveolenrand der Schneide- und Eckzähne einen ziemlich geschlossenen Bogen bildet. 3) Fersen- und Sprungbein bieten ebenfalls einige bemerkenswerthe Differenzen dar.

Duvernoy ist ferner der Ansicht, daß der Gorilla eine von Troglodytes verschiedene Gattung bilden müsse und beruft sich auf folgende Verhältnisse: 1) Das Gebiß des Gorilla hat mehr Aehnlichkeit mit dem des Orangs als mit dem von Troglodytes. 2) Die Stärke und die beiden Krümmungen der Jochbögen geben dem Gorilla den Anschein eines Fleischfressers. 3) Die außerordentliche Entwicklung seiner Pfeil- und Hinterhauptsleisten, daher auch seiner Schläfengruben. 4) Die Verlängerung seiner Schnautze. 5) Die außerordentliche Länge der Dorn- und Querfortsätze seiner Halswirbel, und ihre Form. 6) Die Kürze seiner Lendenwirbel. 7) Die Länge des letzten Rippenpaares, das den Hüftbeinen angeheftet ist. 8) Die sehr beträchtlichen Dimensionen des letzteren Knochens. 9) Die breite Form des Schulterblatts, dessen Gräthe quer ist, während beim Schimpanse dieser Knochen schmal und länglich ist, mit einer sehr schiefen Gräthe in der Längsrichtung.

Die systematische Stellung anbelangend, räumt Duvernoy dem Gorilla den Rang vor den Orang-Utans und nach den Schimpansés ein, wie dieß schon früher Is. Geoffroy ausgesprochen und es in einigen Bemerkungen, die er an Duvernoy's Vortrag anknüpfte (compt. rend. l. c. p. 933), wiederholt hat. Is. Geoffroy hat auch zuerst die Gattung Gorilla aufgestellt (fünfter unterer Backenzahn mit 5 Höckern, die 3 mittlern Zehen zum Theil vereinigt), und bezeichnet jetzt die einzige Art (Troglodytes

Gorilla Savag.) als Gorilla Gina, nach dem Namen N'Gina, den ihm die Eingebornen des Gabon beilegen [1]).

Anderer Ansicht ist Owen [2]), der durch seine Untersuchungen zu folgenden Resultaten über diese Affen gelangte. 1) Der Gorilla und Schimpanse gehören nicht zur Gattung Orang; 2) ihre unterscheidenden Charaktere nähern sie mehr der Gattung des Menschen an; 3) der Gorilla und Schimpanse sind zwei, der nämlichen Gattung (Troglodytes) angehörende Arten; 4) durch mehrere der specifischen Merkmale, die ihn von seinem Verwandten unterscheiden, und durch die, welche die wichtigsten sind, als der geringere Vorsprung der Prämaxillar-Knochen, die Gegenwart des Processus vaginalis, die Breite der Schulterblätter, der Hüftbeine und der Hand, die vollständigere Entwicklung des Fersenbeines und der großen Zehe, nähert sich der Troglodytes Gorilla mehr dem Menschen an als der Troglodytes niger; 5) die Differenzen, welche an den verschiedenen, von Naturforschern untersuchten Skeleten beobachtet wurden, scheinen Varietäten, aber nicht verschiedne Arten anzuzeigen, und wahrscheinlich gilt dasselbe für die Art des Schimpanses, wenigstens so weit als man nach den verschiedenen, vom Gabon oder andern Lokalitäten der Westküste des tropischen Afrikas kommenden Exemplaren urtheilen kann. — Owen ist demnach, bezüglich der generischen Trennung des Gorillas vom Schimpanse und der Scheidung des letzteren in 2 Arten, mit den genannten französischen Zoologen nicht übereinstimmend, und ich bin in diesem Punkte mit ihm vollkommen einverstanden [3]).

Simia Satyrus S. 11.

Auch bezüglich der asiatischen Orang-Utans ist die Discussion von

---

1) In einer späteren Abhandlung legte Duvernoy (compt. rend. XXXVII. p. 817) einen Auszug aus seinen Untersuchungen der Bänder und Muskeln des von ihm anatomirten Exemplares vom Gorilla vor.

2) Ann. des sc. nat. XX. p. 120.

3) Ueber Troglodytes niger und Tr. Gorilla ist auch noch der Artikel von Temminck in seinen Esquisses zool. sur la côte de Guiné p. 1 u. 15 zu vergleichen.

der Einheit oder Mehrheit derselben durch Fitzinger[1], Blyth[2] und Lucae[3] weiter fortgeführt worden.

Nach eignen und fremden Beobachtungen ist Fitzinger zu dem Resultate gelangt, daß 1) sowohl auf Borneo sowie auf Sumatra Orangs sich finden, bei denen der Nagel und das Nagelglied an den Daumen der Hinterhände entweder vorhanden ist oder fehlt; und 2) daß unter den Orangs von Borneo, außer dieser Verschiedenheit, noch ein weiterer Unterschied in der Bildung des Gesichtsprofils (im Vereine mit anderweitigen osteologischen Schädel-Differenzen) vorkommt, welches sich entweder als ein gerades oder als ein ausgehöhltes darstellt. — Indem nun der Verf. die Schädel-Differenzen mit dem Vorhandensein oder Mangel des Nagels und Nagelgliedes an den Hinterdaumen in Einklang zu bringen versucht, kommt er zum Schlusse, daß es auf Borneo 2 und ebenso auf Sumatra 2 wesentlich von einander verschiedene Orangs gebe, von denen die borneo'schen entweder a) ein gerades Gesichtsprofil und keine Nägel, oder b) ein ausgehöhltes Gesichtsprofil und Nägel an den Hinterdaumen haben; die sumatranischen hingegen entweder a) ein ausgehöhltes Gesichtsprofil und keine Nägel, oder b) ein ausgehöhltes Gesichtsprofil und Nägel an den Hinterdaumen besitzen. Nachdem der Verf. noch einige Merkmale beizieht, glaubt er genug Anhaltspunkte zu haben, welche die Unterscheidung von 4 deutlich von einander abweichenden Formen unter den asiatischen Orangaffen rechtfertigen dürften, obwohl er zur Zeit es noch nicht wagen will, ihre Art-Verschiedenheit mit Bestimmtheit zu behaupten.

Nach der Verschiedenheit der Schädelformen bestrebte sich Blyth die von Brooke für Borneo aufgestellten 3 Arten von Orang-Utans: Midas Pappan, Mias Rambi und Mias Kassar, zu rechtfertigen, wobei er bemerkt, daß die beiden ersten auch auf Sumatra vorkommen. Außerdem errichtete er nach einem kleinen, aber erwachsenen weiblichen Exem-

---

1) Wiener Sitzungsberichte XI. S. 400.

2) Journ. of the Asiat. soc. of Bengal 1853. p. 369 mit 10 Tafeln.

3) Der Pongo- und der Orang-Schädel in Bezug auf Species und Alter (Abhandl. der Senckenberg. naturf. Gesellsch. I. S. 154. tab. 8—13).

plare mit kurzen Vorderarmen eine vierte Art, deren Heimath unbekannt ist. Seinen 4 Arten giebt er folgende Namen: 1) Pithecus Brookei Blyth = P. Wurmbii et P. Abelii Ow. = Mias Rambi; 2) P. Satyrus Linn. = Mias Pappan; 3) P. morio Ow. = Mias Kassar; 4) P. Owenii Blyth, der kleine Orang unbekannter Herkunft. Auf 10 Tafeln sind 5 Schädel, jeder in zwei Ansichten, abgebildet.

Auf die eigne Ansicht von 25 Schädeln gestützt, sprach sich Lucae hinsichtlich der hier angeregten Frage in folgender Weise aus: 1) Owen's Simia Wurmbii und der Schädel von Cross (Simia Crossii), so sehr große Formverschiedenheiten sie auch darbieten, werden durch Uebergänge vermittelt und beide stellen wohl extreme Formen, aber keineswegs verschiedene Arten dar. 2) Der Satz, daß der Orang (Simia Satyrus) das junge, der Pongo aber das alte Thier einer und derselben Art ist, oder daß S. Satyrus im Alter einen Kamm erhält, der um so größer je älter das Thier, ist insofern unrichtig, als es auch Thiere giebt, die, obgleich Männchen, im erwachsenen Zustande sehr entfernte Leisten, aber keinen (aus der Verschmelzung der Leisten entstandenen) Kamm zeigen; andererseits aber Schädel vorkommen, die, wiewohl von jungen Thieren herrührend, die halbbogenförmigen Linien weit mehr genähert, ja Leisten schon an einer Stelle vereinigt und selbst zu einem Kamm ausgebildet, kundgeben, woraus folgt, daß die Pongos von den Orangs zu trennen sind. 3) Es ist sehr wahrscheinlich, daß unter Simia Satyrus Linn. sich junge Thiere befinden, die nach der einen Seite zu Pongos, nach der andern zu Orangs sich entwickeln.

Die vorstehenden und die früheren Untersuchungen werden jetzt in der Hauptsache den ganzen Kreis von Abänderungen, welche der Schädelbau der asiatischen Orang-Utans darbietet, erschöpft, und überdieß in vortrefflichen Abbildungen zur Anschauung gebracht haben. Dieser Theil der Aufgabe scheint nunmehr vollständig absolvirt; keineswegs aber der andere Theil, der die Frage nach der Einheit oder Mehrheit der Arten von Orang-Utans zum Abschlusse zu bringen hat. Zwar stimmen die meisten Zoologen, welche sich speciell mit dieser Aufgabe befaßten, darin überein, daß sie mehr als eine Art zulassen, keineswegs sind sie aber hinsichtlich der Zahl und Begrenzung dieser Arten miteinander einverstanden. Da-

raus geht meiner Meinung nach unverkennbar hervor, daß auf dem bisher betretenen Wege, d. h. durch bloße Vergleichung der osteologischen Verhältnisse, die Discussion über die Einheit oder Mehrheit von Arten unter den asiatischen Orangaffen, so wenig als bezüglich der afrikanischen, zu einem definitiven Bescheide gebracht werden wird; daß im Gegentheile, um zu einem solchen zu gelangen, es unumgänglich nothwendig ist, die Bälge, aus welchen die Schädel oder Skelete genommen sind, gleichzeitig neben diesen letzteren, unter einander vergleichen zu können, um dadurch zu ermitteln, in wie weit die Differenzen im Schädelbaue denen des äußeren Körperbaues und den durch Alter, Geschlecht und Individualität bedingten Einflüssen entsprechend sind. Insbesondere ist es mehr ins Auge zu fassen, daß gewisse Schwankungen in den Schädelformen keineswegs auf Rechnung specifischer Differenzen zu bringen sind, sondern lediglich von individuellen Variationen innerhalb derselben Species ausgehen. Es gilt dieß namentlich auch von der Entwicklung der bogenförmigen Linien, deren Anschwellen zu gegenseitig einander näher gerückten, aber doch noch gesonderten Leisten bis zu ihrer Verschmelzung in einen gemeinschaftlichen Kamm allerdings vom Altersstande abhängig ist, jedoch nicht in ganz gleichem Zeitmaaße erfolgt, indem die Kammbildung je nach den Individuen bald früher, bald später, mitunter erst im höheren Alter vor sich geht. Hinsichtlich sämmtlicher Arten der Orangaffen, der asiatischen, wie der afrikanischen, bin ich überzeugt, daß bei allen ohne Ausnahme im gehörigen Alter ein Scheitelkamm auf dem Schädel sich ausbildet [1]).

---

1) Daß auch Owen keineswegs der Ansicht von Blyth unbedingt beitritt, zeigt ein an Letzteren, (der ihm Abbildungen der weiblichen Schädel von seinen 4 Arten geschickt hatte) gerichteter Brief (Journ. of the Asiat. Soc. of Beng. 1854 p. 211.). „Daß meine S. Wurmbii und S. Abelii“ schreibt Owen, „eine Art ausmachen, verwundert mich nicht; ich habe immer weitere Beweise für ihre Beziehungen verlangt. Daß die weiblichen Schädel des Mias Pappan und M. Rambi zu verschiedenen Arten gehören, dürfte sehr wahrscheinlich seyn, wenn das Merkmal von den Nasenbeinen constant ist. Ich lege nicht so großen Werth auf die Scheitelleiste oder Leisten, indem ich die Differenz in der Beschaffenheit der Eckzähne bei beiden Zeichnungen sehe. Die kurzarmige Species kann schwerlich eine Varietät von S. Morio seyn; und ein anderes Bei-

Brooke und Blyth legen ein großes Gewicht darauf, daß man auch Weibchen, ja sogar Junge findet, die mit Gesichtsschwielen versehen sind, und sie unterscheiden dadurch ihren Mias Pappan von Mias Rambi, daß bei jenem beide Geschlechter solche Auswüchse tragen. Solche Differenzen sind allerdings beachtenswerth; sie können jedoch nur dann mit Evidenz zur Errichtung verschiedener Arten benützt werden, wenn durch Beobachtung der Thiere im Freien nachgewiesen wird, daß innerhalb eines und desselben Familienkreises von Orangaffen alle Weibchen ohne Ausnahme mit solchen Schwielen versehen sind, in einem andern dagegen, der auch sonst noch unterscheidende Merkmale von jenem darbietet, alle Weibchen dieser entbehren. Man hat aber bisher diese Affen in ihrem freien Zustande noch viel zu wenig beobachtet, als daß man bereits auch nur über diesen Punkt eine endgültige Entscheidung fällen könnte.

Wie die Sachen jetzt liegen, so muß die Annahme mehrerer Arten von asiatischen Orangaffen durchaus noch beanstandet werden. Bezüglich der auf Borneo vorkommenden hat Temminck auch noch in der neuesten Zeit dieselbe Meinung ausgesprochen.

Nicht unerwähnt sollen schließlich die Angaben von Fitzinger und Lucae gelassen werden, daß mitunter in einem Kiefer, bald nur auf der einen, bald auf beiden Seiten, ein überschüssiger sechster Backenzahn sich zeigt.

Colobus Guereza S. 36.

Während des Druckes meiner Bearbeitung der Affen erschienen Temminck's Esquisses zoologiques sur la côte de Guiné (Leid. 1853), so daß es mir nicht mehr möglich war, sie für meinen Text zu benützen, weshalb ich es für diese Ordnung nur noch in Nachträgen zu thun vermag.

Temminck (a. a. O. S. 23) machte uns zuerst mit der Bekleidung, welche das Junge des Guereza im ersten Lebensjahre trägt, bekannt.

---

spiel von der verkürzten Ausbildung des Radius würde mich, wenn andere Merkmale sie begleiteten, hinsichtlich dieser außerordentlich interessanten Zugabe zum Verzeichnisse der menschenähnlichen Affen vollkommen befriedigen."

In diesem Alter ist der ganze Pelz schmutzig weiß; erst mit dem zweiten Haarkleide, oder im Alter von ein bis zwei Jahren, nimmt er die Färbung der Erwachsenen an, ohne jedoch in diesem Alter mit der weißen Mähne und der dicken Schwanzquaste versehen zu seyn.

Auch zur genaueren Kenntniß des Colobus polycomus (C. ursinus), C. ferrugineus (C. fuliginosus) und C. verus lieferte Temminck a. a. O. mehrere Beiträge.

Cercopithecus albigularis S. 45.

Nach Exemplaren, die Temminck (a. a. O. S. 32) von der afrikanischen Westküste durch Pel erhielt, weist er gleich mir die Identität des Cercopithecus albigularis mit C. monoides nach. Als Unterschied von dem mehr verwandten C. Samango hebt er hervor, daß bei diesem der Rücken grau und schwarz gescheckt, bei C. albigularis aber roth und schwarz geringelt ist.

Cercopithecus Campbelli S. 47.

Temminck (S. 33) führt als Heimath seiner Exemplare die Ufer des Boutry-Flußes an, und setzt zugleich die Unterschiede von C. Mona genau auseinander.

Cercopithecus Diana S. 48.

Nach Temminck's Beschreibung der einjährigen Jungen (S. 29), deren Länge nicht 20″, wovon der Schwanz 12″ einnimmt, überschreitet, sind die weißen Haare des Bartes bereits etwas verlängert, während die Stirnbinde angezeigt ist. Der ganze Pelz ist wollig und schmutzig; der des Rückens schwarz, einfarbig und matt, ohne Spur des lebhaften und glänzenden Kastanienbrauns auf dem Rückgrath, selbst ohne Ringelung der andern Rückenhaare; die Gliedmassen sind graulichschwarz; der Schwanz falb, an der Wurzel und Spitze schwärzlich; die Unterseite schmutzig gelblichweiß. Buffon's Roloway erklärt Temminck für einen C. Diana im Alter von ein oder zwei Jahren; demnach ist unser C. palatinus wieder mit jener Art zu vereinigen.

Cercopithecus leucampyx S. 48.

An zwei alten Exemplaren, die Temminck von der Küste von An-

gola erhielt (S. 35), überzeugte er sich, daß der C. Pluto von Gray mit C. leucampyx identisch ist. Nach seiner Beschreibung sind Kopf, Hals, Schultergegend, Schenkel, äußere und innere Seite der Gliedmassen, Hände, Bauch und Schwanz vollkommen schwarz. Rücken und Seiten sind mit langen, aschgrau und schwarz geringelten Haaren mähnenartig bedeckt. Der Backenbart ist buschig und weiß und schwarz geringelt; das Kinn ist rein weiß; die Stirnbinde ist beim Männchen weiß, beim Weibchen aschgrau. Das Gesicht ist schwarz, aber die Augenlieder licht. Die Größe ist die von C. Diana. Ogilby's C. dilophos (Monkeys p. 343) ist auf die gedachten Exemplare begründet.

Cercopithecus lunulatus Temm. n. sp.

C. fulvido-canus, subtus albidus; palpebris livido-rosaceis, capillo nigrescente, postice fulvo.

Cercopithecus lunulatus. Temm. esq. sur la côte de Guiné p. 37.

Die falbnackige Meerkatze (C. lunulatus) ist eine neue Art, welche zu den Mangabeys (Cercocebus) gehört und die Temminck sowohl von der fast einfarbigen Species aus dem östlichen Aethiopien, als von der mit weißem Halsband und rothem Scheitel aus dem westlichen unterscheidet; sie bewohnt die Wälder des Boutry-Flußes an der Küste von Guinea.

Scheitel und hintere Theile des Kopfes sind schwärzlichgrau, am Hinterhaupt ein großer Fleck von langen röthlichfalben Haaren; die ganze übrige Oberseite ist mausgrau oder graulichfalb, ohne andere Abzeichnungen als eine schwarze Binde längs des ganzen Rückgraths. Die Unterseite des Körpers und die Innenseite der Gliedmassen ist mit schmutzig weißen Haaren spärlich besetzt. Der Schwanz ist oben schwarz, unten weiß. Die Finger sind fleischfarbig, das Gesicht ist fahl bläulich (livide) mit orangefarbigem Tone, die Lippen und die Nasenfirste braun, die Augenlieder bläulich rosenfarbig. Körper 21″, Schwanz 19″. — Die Jungen zeigen schon vom ersten Alter an den Nackenfleck, der licht röthlich ist; die Rückenbinde ist nicht oder nur schwach angedeutet, die Oberseite licht röthlich.

Dieser C. lunulatus hat nach C. Aethiops S. 52 seinen Platz im Systeme einzunehmen.

Cynocephalus rubescens Temm. n. sp.

C. supra ferrugineo-rufescens, pilis late annulatis, subtus albido-canescens.

Papio rubescens. Temm. esq. zool. sur la côte de Guiné p. 39.

Ein halbwüchsiges, wahrscheinlich von der afrikanischen Westküste herstammendes weibliches Exemplar, dessen Eckzähne erst bis zum Niveau der Schneidezähne vorgerückt waren, gab Temminck Veranlassung zur Errichtung einer neuen Art von Pavianen.

Der Rüssel ist nicht so vorspringend als bei andern Pavianen, der Pelz ist lang, der Schwanz mit einer kleinen Quaste geendigt. Scheitel und Gegend zwischen Aug und Ohr sind röthlichbraun, die Wangengegend weißlich, das Gesicht matt grau und der Augenkreis von einem bläulichen Tone. Die ganze Oberseite, die Seiten, Arme und Schenkel sind roströthlich, indem die 4 bis 5″ langen Haare mit breiten hellrothen und braunen Binden geringelt sind. Die Haare der Vorderarme, des Untertheils der Schienbeine, der Hände und des Schwanzes haben einen entschiedneren rothen Ton; die Finger sind mit einzelnen langen weißlichgrauen Haaren besetzt. Die Unterseite des Körpers und die Innenseite der Gliedmassen ist mit spärlichen weißlichgrauen Haaren versehen. Körper 17″ 6‴, Schwanz 14″ 6‴.

Dieser C. rubescens kommt in der Färbung ziemlich mit C. Choras Ogilb. (S. 64) überein, der auf ein halbwüchsiges Männchen begründet ist, doch ist bei letzterem die Unterseite des Körpers gleichfarbig mit der Oberseite. Ueber beide müssen weitere Aufschlüsse erwartet werden.

Perodicticus Potto. S. 153.

Sehr ausführlich hat Temminck in seinen Esq. zool. die Verschiedenheit der Färbung nach Alter und Geschlecht auseinandergesetzt. An seinem größten Exemplare mißt der Körper 12″, der Schwanz 3″ 6‴.

Otolicnus crasicaudatus. S. 156.

Bianconi hat (in den Memorie della Accademia delle scienze dell Istituto di Bologna. V. 1854 p. 225) über diese, aus Mossambik stammende Art ebenfalls einige Notizen beigebracht und sie übereinstim-

mend mit Geoffroy's Beschreibung gefunden. Nach seinen Angaben mißt der Körper 12″, Schwanz 14″, Unterschenkel 3″ 9‴, Kopf 2″ 10‴, Ohr 1″ 10‴.

Otolicnus Alleni. S. 159.

Temminck erkennt gleichfalls die Selbstständigkeit dieser Art an, und stützt sich hiebei auf ein altes weibliches Exemplar, auf dessen Etikette Cape-Coast als Fundort bezeichnet ist. Seiner Meinung zufolge ist O. Garnetti Ogilb. mit O. Alleni identisch[1]).

Otolicnus Peli Temm. n. sp.

O. e rufescente brunneus, subtus pallide rutilus; naso stria alba signato; cauda villosissima fusca, argenteo-lavata.

Otolicnus Peli. Temm. esq. zool. sur la côte de Guiné p. 42. — ? O. Demidoffii Fisch. Wagn. Schreb. Supplem. I. S. 292; V. S. 160.

Durch Pel wurden aus den Waldungen von Dabocrom in Guinea mehrere Exemplare, alte und junge von beiden Geschlechtern, eines Galagos eingeschickt, in denen Temminck eine neue Art erkannte.

Der Pelz der erwachsenen Thiere ist wollig, gekräuselt und sehr reichlich; die Ohren sind groß, nackt und schwarz, der Schwanz ist länger als der Körper und sehr buschig. Scheitel, Nacken, Rücken und Außenseite der Gliedmassen sind schmutzig röthlichbraun, wobei die Haare am Grunde matt schwärzlichgrau sind. Die ganze Unterseite des Köpers und die Innenseite der Gliedmassen sind hellroth, auf der Brust mit einem leichten orangenfarbigen Ton überlaufen, der als Längsbinde auch unterhalb der Ohren vorherrscht. Eine schmale weiße Binde erstreckt sich über den ganzen Nasenrücken und zwar in allen Altersständen. Die Schwanzhaare sind dunkelbraun mit silberfarbigen Spitzen. Die ganze Länge beträgt 13″ 3‴, wovon der Schwanz 7″ einnimmt.

An einem halbwüchsigen weiblichen Exemplare von 7½″ Länge fällt

1) Flower theilte in den Ann. of nat. hist. sec. ser. XIV. p. 307 die Anatomie eines Galagos mit, den er für eine unbeschriebene, aber von ihm nicht weiter definirte Art ansieht. Der Körper hatte eine Länge von 9½″, der Schwanz 13½″, Fuß 3″. Backenzähne giebt er beiderseits nur $\frac{5}{5}$ an.

die Oberseite mehr ins Rothe als bei vorigen, und die Schwanzwurzel hat denselben Ton; die Schwanzhaare sind kürzer und an den Spitzen nicht glänzend. Bei den einjährigen Jungen, von der Größe einer Spitzmaus (ganze Länge etwas über 6″), ist die ganze Ober- und Außenseite nebst dem Schwanze feurigroth; der Unterleib und die Innenseite der Beine röthlichweiß. Die weiße Binde längs der Nase ist nur sehr schwach gezogen, aber deutlich; die Haare des Schwanzes sind von gleicher Länge mit denen des Rückens.

Temminck hielt anfänglich die Jungen dieser Art für identisch mit Fischer's Galago Demidoffii, da er jedoch an seinen Exemplaren die sehr langen, in Form eines Bartes die Mundwinkel, Wangen und Augenwinkel bedeckenden Haare, welche die Beschreibung von Fischer angiebt, nicht wahrnehmen konnte, während zugleich Letzterer einer weißen Nasenbinde nicht gedenkt, so hielt sich Temminck mit gutem Grunde für berechtigt, aus den ihm vorliegenden Exemplaren eine neue Art zu errichten. Nun hat aber gleichzeitig Is. Geoffroy vom Gabonfluße ein Exemplar erhalten, in welchem er den Galago Demidoffii erkennen wollte; es erübrigen daher weitere Vergleichungen zwischen diesen verschiednen Individuen.

Zahnlücker S. 162.

Eine neue Anordnung der Edentaten wurde von H. N. Turner[1]) vorgelegt. Sie erstreckt sich nicht blos auf die Gattungen, sondern auch auf die Arten, so weit letztere dem Verf. bekannt geworden sind. Seine Arbeit ist nämlich vom Juli 1851 datirt, und daher mag es zum Theil kommen, daß ihm die neueren auswärtigen Arbeiten von Sundevall, Focillon und mir entgangen sind. Immerhin aber ist diese Arbeit nicht ohne Werth, da ihr Verf. bei der Charakteristik der Gattungen und Arten hauptsächlich den Schädelbau berücksichtigt und über denselben gute Bemerkungen mitgetheilt hat. Dieß betrifft besonders die Gattung Bradypus, da er hier die Schädel, auf welche Gray seine neuen Arten begründete, vergleichen und dadurch zu denselben Resultaten, wie ich schon früher nach andern Materialien, gelangen konnte. So trennt Turner den

1) Ann. of nat. hist. sec. ser. XII. p. 348.

Bradypus affinis nicht von Br. gularis; eben so weiß er den B. Blainvillei, flaccidus und problematicus nicht von Br. marmoratus zu scheiden. — Von Myrmecophaga Tamandua trennte er eine eigene Art mit dem Namen Myrmecophaga longicaudata ab; es ist dieß dieselbe Form, welche ich schon unter gleichem Namen als Var. δ von M. Tamandua unterschieden und dabei bemerkt hatte, daß weitere Untersuchungen höchst wahrscheinlich dieselbe als eigene Art erweisen werden.

Von Hyrtl ist nunmehr die ausführliche, vortreffliche Schilderung des arteriellen Gefäßsystems der Edentaten begleitet von prächtigen Tafeln in den Denkschriften der Wien. Akadem. d. Wissensch. V. S. 1 und VI. S. 21 erschienen; ebendaselbst (IX. S. 1.) die Anatomie von Chlamydophorus.

Die Memorie della Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Tom. III. (1851) enthalten zwei anatomische Arbeiten über Thiere dieser Ordnung von A. Alessandrini. Die erste (S. 363. Tab. 26, 27) befaßt sich mit einem Exemplare des Bradypus tridactylus und liefert eine Beschreibung des Skelets und der Eingeweide mit Abbildungen des Schädels, der Athmungsorgane, Zunge und des Herzens. Dem Verfasser scheint es unbekannt geblieben zu sein, daß es mehrere Arten dreizehiger Faulthiere giebt. — Die andere Abhandlung (S. 433. Tab. 29 — 31) hat zum Gegenstande die Myrmecophaga didactyla. Beschrieben wird das Skelet, der Verdauungsapparat, das Herz, die Harn- und Geschlechtswerkzeuge. Abgebildet sind das Skelet, der Schädel und einzelne Weichtheile.

Orycteropus.

Mit der Lösung der Frage, ob es eine oder mehrere Arten von Orycteropus gebe, befaßte sich Duvernoy (l'Instit. 1853 p. 91). Nach Vergleichung eines Skelets von einem bei Gondar in Abyssinien erlegten Orycteropus und des Schädels eines anderen Exemplars vom weißen Nil mit 2 Skeleten vom Kap, hält sich Duvernoy mit einem gewissen Grade von Sicherheit für berechtigt zur Erklärung, daß die Erdferkel von Abyssinien und dem Sennaar (Orycteropus aethiopicus Sund.) eine von denen des Kaps (O. capensis) verschiedene Art bilden. Bezüglich des Erdferkels vom Senegal kommt er zum Schluß, daß obwohl dasselbe vom

abyssinischen verschieden sei, es demselben doch mehr als dem kapischen gleiche, welches eine von den beiden andern sehr verschiedene Art ausmache. — Später lieferte Duvernoy noch Bemerkungen über den feineren Bau der Zähne von dieser Gattung (Instit. 1854 p. 15).

Manis tricuspis. S. 180.

Temminck sieht in seinen Esquiss. zool. p. 177 die Manis multiscutata Gray ebenfalls für identisch mit Manis tricuspis an.

Außerdem finden sich in den Küstengegenden von Guinea noch zwei andere Arten: Manis longicaudata und M. Temminckii; letztere hat daher eine sehr große Verbreitung, da sie von der nördlichen Grenze der Kapkolonie an ostwärts bis nach Sennaar, westwärts bis unter dem Aequator gefunden wird.

Phascologale unicolor et ferrugineifrons Gould n. sp.

Gould hat in den Mammals of Australia, part. VI. Abbildungen von Antechinus Swainsoni, flavipes, leucogaster, ferruginifrons und unicolor mitgetheilt, unter welchen die beiden letztern neu aufgestellte Arten sind.

1. **Phascologale unicolor** Gould, der einfarbige Beutelbilch; **fulvido-fusca, subtus pallidior; pedibus brunneis.**

Antechinus unicolor. Gould mamm. of Austral. Part VI.

Durch ihre robuste Form, die breiten Füße und kurze Schnautze gehört diese Art zu der Abtheilung der breitfüßigen Beutelbilche, von denen A. flavipes den Typus abgiebt. Die Oberseite ist rostfarbig braun, mit zahlreichen schwarzen Haaren untermengt, die Unterseite ist blasser falbbraun, die Füße hellbraun.

Körper . . .	5″ 5‴	Ohren	0″ 6‴
Schwanz . . .	3 7	Hinterfuß . . .	0 9

In Neu-Südwallis entdeckt und nach Ph. apicalis S. 199 einzuschalten.

2. **Phascologale ferrugineifrons** Gould, der rothstirnige Beutelbilch; **cano-brunnea, subtus albida; capite supra fulvo, pedibus albis.**

Antechinus ferrugineifrons. GOULD mamm. of Austral. VI.

Durch die schlankere Leibesform, die gestreckten schmalen Füße und die längere Schnautze gehört diese Art zur zweiten Abtheilung von Antechinus. Die Oberseite des Kopfs und das Hinterhaupt ist rostfalb, mit feinen schwarzen Haaren untermengt; der Rücken ist blaß bräunlichgrau mit zahlreichen schwärzlichen Haaren. Die Unterseite ist blaß graulichweiß, die Füße weiß, der Schwanz hellbraun.

Körper	4″ 6‴	Ohren	0″ 6‴
Schwanz . . .	3 3	Hinterfuß . . .	0 9

Hat gleiche Heimath mit der vorigen Art und ist nach Ph. albipes S. 203 einzureihen.

Dendrolagus inustus. S. 287.

Der bisher unbekannte innere Bau der Schlappbeutler ist durch Owen[1]) an einem erwachsenen Weibchen des Dendrolagus inustus von 25″ Länge (den Schwanz mit eingerechnet) erläutert worden.

Der Magen zeigt in seiner Form und Struktur große Aehnlichkeit mit dem der Känguruhs. Er ist auf $\frac{5}{6}$ seiner Länge von zelliger Beschaffenheit, mißt längs der großen Krümmung 3′ 8″ und hat in der Mitte der zelligen Abtheilung einen Umfang von 11″. Die Zellen werden hauptsächlich durch zwei Längsbinden gebildet, die eine längs des Vordertheils, die andere längs des Hintertheils des Magens, und durch eine dritte von geringerer Ausdehnung längs der großen Krümmung. Hauptzellen giebt es ohngefähr 15; der einfache Endtheil des Magens mißt gegen 6″. Der Dickdarm ist 3′, der Dünndarm 9′ lang. Der Blinddarm ist 5″ lang und mißt im Umfang ebensoviel; er ist einfach und endigt stumpf, ohne im Durchmesser abzunehmen.

Die Leber ist verhältnißmäßig klein und besteht aus einem rechten und linken Lappen, wovon der erstere etwas getheilt ist und der letztere den Spiegel'schen Lappen abgiebt. Die Gallblase ist groß. Das Herz zeigt die bei den Beutelthieren gewöhnliche Beschaffenheit durch das Vorkommen zweier getrennter oberer Hohlvenen und die Abwesenheit der Fossa und

1) Ann. of nat. hist. sec. ser. XIV. p. 448.

des annulus ovalis. Der Kehlkopf kommt in seiner Beschaffenheit mit dem des großen Känguruhs überein.

Die Eierstöcke zeigen eine gerunzelte hirnförmige Oberfläche; jeder Eileiter, ohngefähr 1¼" lang, endigt in einem etwas zusammengedrückten Fruchthälter von 1" Länge und 3‴ Weite. Jeder Fruchthälter mündet mit einem deutlichen os tincae in den Grund einer Scheide mit einem mittleren Blindsack, der sich 1" 3‴ über den Anfang der seitwärts gebogenen Scheidenkanäle erstreckt. Diese Kanäle sind 3" lang, auf der Innenseite fein längsgefaltet, mit einer halbmondförmigen klappenartigen Falte vor ihrer Endigung in den Urogenital-Kanal, und öffnen sich mit dem Mastdarme in einen kurzen und weiten gemeinschaftlichen Kloaken-Vorhof, der durch einen starken Schließmuskel geschlossen wird.

Die Gehirnlappen sind glatt und zeigen nur einen kurzen Einschnitt auf ihrem obern Theile. Es findet sich keine Spur von einem Hirnbalken, und das Gehirn correspondirt in allen Einzelheiten, mit Ausnahme seiner einfacheren Oberfläche, mit dem des großen Känguruhs.

Die Zahnformel bestimmt sich an dem untersuchten Individuum zu ¼·¼ Schneidezähnen, ½·½ Eckzähnen, ¼·¼ Lückenzähnen und ¼·¼ ächten Backenzähnen = 30 Zähnen.

Halmaturus Leichhardti Gould n. sp.

H. crispus, e rufo, nigro albidoque variegatus; gastraeo caudaque cano-albidis, regione oculari laete fulva.

Lagorchestes Leichhardti. Gould mamm. of Austral. V. (1853).

Zwei Exemplare, alt und jung, wurden auf der Reise von Leichardt, wahrscheinlich zwischen dem Golf von Carpentaria und Port Essington, aufgefunden. Das Gesicht ist grau und braun gesprenkelt, was an den Ohren ins Rostfalbe übergeht, letztere sind weiß gesäumt; die Augen liegen in einem großen ovalen, lebhaft rostrothen Fleck. Die Oberseite ist rostroth, schwarz und weiß gescheckt, indem die Haare am Grunde kastanienfarbig sind, was gegen die Mitte ins Schwarze übergeht, dann weiß mit dunkelrother Spitze; am Hinterrücken und der Schwanzwurzel werden diese Farben durch Graulichweiß, mit Schwarz untermengt, ersetzt. Die ganze Unterseite und der Schwanz ist graulichweiß; Hände und Zehen sind falblich überlaufen.

Körper	1′ 3″	Ohren	1″ 1‴
Schwanz . . .	1 1	Hinterfuß mit Kralle	5 9

Diese neue Art könnte nur mit H. conspicillatus verwechselt werden, unterscheidet sich aber von letzterem durch die angenehm contrastirende Färbung ihres krausen Pelzes, durch den weißlichen Ton des Hinterrückens und Schwanzes, die lebhaftere Rostfarbe der Augengegend, die kleineren Ohren und die kastanienbraune Färbung der Haare der Oberseite an ihrem untern Theile; (bei H. conspicillatus sind die Haare schwarz, an den gekrümmten Enden rostigweiß, mit rostbraunen oder schwarzen Spitzen). Ist nach H. conspicillatus S. 306 einzuschalten.

Halmaturus xanthopus Gray n. sp.

H. laterali simillimus, at vellere multo pallidiore nec non caudae parte basali clare lutea diversus.

Petrogale xanthopus. Gray ann. of nat. hist. sec. ser. XIV. p. 465.

Nach zwei Exemplaren beiderlei Geschlechts charakterisirte J. E. Gray diese neue Art in folgender Weise. „Blaßbraun, fein gesprenkelt; Kinn und Unterseite weiß; ein Streif vom Hintertheil der Schulter und längs der Seite des Gesichts unter dem Auge weißlich; Rückenstreif schmal und braun; Gliedmassen, Füße und Schwanz hellgelb; Schwanzende mehr buschig und braun, gescheckt; Ohren roth. Neuholland; Richmond Fluß? Diese Art hat alle Zeichen wie Petrogale lateralis, ist aber davon verschieden durch viel blassere und gelbere Färbung und durch die hellgelbe Farbe der Beine und des Anfangstheiles des Schwanzes. Sie hat ohngefähr die Größe von P. penicillata oder hält vielmehr das Mittel zwischen ihr und P. lateralis.“ — Die erwähnten Exemplare wurden zugleich mit solchen von Südaustralien und dem Richmond Flusse geschickt.

Cervus porcinus S. 366.

Im Journ. of the Asiat. soc. of Beng. 1854 p. 217 erklärte Blyth, daß nach Ansicht einer Reihe von Geweihen, die Kelaart von seinem Axis oryzeus aus Ceylon einschickte, er nicht im Stande sei, dieselben von denen des A. porcinus zu unterscheiden. In einer Note fügte er jedoch folgende Bemerkung bei: „Dr. Kelaart hat seitdem ein lebendes erwachsenes Männchen gesendet und die Art hält genau die Mitte zwischen

Axis maculatus und A. porcinus von Bengalen in Form (einschließlich der Hörner), Größe und Färbung."

Antilope leucotis. S. 406.

Peters hat jetzt (in den Abh. der Berlin. Akademie 1855 S. 96 tab. 3) von seiner Antilope leucotis eine Abbildung mit ausführlicher Beschreibung mitgetheilt, und schließt sie nunmehr denjenigen Formen an, welche Gray in seiner Untergattung Adenota zusammenstellte und worin er A. Kob Erxl. und A. Leché aufführte. Demnach ist diese A. leucotis nach A. Kob Gray auf S. 434 einzureihen.

Antilope picta S. 450.

Da auch Giebel (allgem. Zoolog. I. S. 323) vom Skelete der Meckel'schen Sammlung bemerklich macht, daß die Backenzähne mit stark entwickeltem Cylinder zwischen den Prismen versehen sind, er hiemit also die Angaben von Gray und Turner bestätigt, während dem hiesigen Exemplare solche Säulchen abgehen, so folgt hieraus, daß dieses Merkmal ein schwankendes, sein Vorkommen jedoch der häufigere Fall ist.

Bos Banteng S. 473.

Giebel hat in seiner allgem. Zoolog. I S. 261 es ebenfalls versucht, die Annahme von der Selbstständigkeit des Bos Banteng als eigener Art zu rechtfertigen. Ich habe jedoch auf das Ungenügende dieses Versuches bereits aufmerksam gemacht[1]) und mein demnächst erscheinender Jahresbericht [im Archiv für Naturgesch. 1855] wird Weiteres hierüber enthalten.

Sus penicillatus Schinz = Choeropotamus pictus Gray. S. 502.

Indem Gray neuerlich erkannte, daß sein, für Sus larvatus und Sus pictus angenommener Gattungsname Choeropotamus schon längst von Cuvier an ganz andere Thiere vergeben wurde, änderte er denselben jetzt in Potamochoerus um; zugleich machte er darauf aufmerksam, daß sein

1) Naturwissensch. u. Bibel im Gegensatze zu dem Köhlerglauben des Herrn C. Vogt S. 29.

Choeropotamus pictus ſchon früher von Schinz als Sus penicillatus aufgeſtellt worden war. Die Synonymik letzterer Art ordnet ſich nun in folgender Weiſe an.

Sus penicillatus. Schinz Monograph. d. Säugth. Heft 18 (1847). S. 12. tab. 10; rev. zool. 1848. p. 152; Archiv f. Naturgeſch. 1848. 2. S. 141. — Choeropotamus pictus. Gray ann. of nat. hist. soc. ser. X. 1852. p. 281; illustrated news 1852 mit fig. — Potamochoerus penicillatus. Gray ann. XV. (1855) p. 66.

Schinz war der erſte, der, wie angeführt, dieſe Art von Sus larvatus unterſchied und zwar nach einem erwachſenen Exemplare, welches das Muſeum in Baſel von der Goldküſte erhalten hatte, und zu dem ſpäter ein Friſchling kam, der noch ſeine Livree trug. Gray, der dieſes Exemplar zu beſichtigen Gelegenheit hatte, verſichert ſelbſt, daß es identiſch mit ſeinem P. pictus iſt. Der Körper mißt 4′, der Schwanz 1′. Backenzähne finden ſich jederſeits $\frac{6}{6}$.

Rhinoceros indicus. S. 515.

Eine ausführliche Anatomie des indiſchen Nashorns hat Owen in den Transact. of the zoolog. Soc. of London. IV. 2 p. 31, tab. 9—22 mitgetheilt. Das unterſuchte Exemplar war ein vollſtändig erwachſenes Männchen, das 15 Jahre in der Menagerie gelebt hatte. Seine Länge betrug 13¼′, ſein größter Umfang 13′ und ſein Gewicht ohngefähr 5000 Pfund [avoirdupois].

Spitzzähner oder Inſektenfreſſer. S. 521.

Da der Druck meiner Bearbeitung der Ordnung der Inſektenfreſſer ſchon beendigt war, als mir Blaſius Fauna von Deutſchland zukam, ſo will ich es wenigſtens nicht unterlaſſen, hier auf ſie aufmerkſam zu machen, weil ſie wichtige Beiträge zur genaueren Kenntniß der deutſchen und ſüdeuropäiſchen Arten aus dieſer Abtheilung enthält und daher zur Ergänzung meiner Arbeit dient [1]).

1) Ueber den feineren Bau der Seitendrüſen der Spitzmäuſe ſtellte Th. v. Heßling ſehr genaue Unterſuchungen an Sorex fodiens, tetragonurus und leucodon an (Zeitſchr. für wiſſenſch. Zool. V. S. 29).

Gattung Spitzmaus. S. 539.

Aus der angeführten Fauna von Blasius will ich nur bemerklich machen, daß er den Sorex Antinorii für ein junges ausgebleichtes Exemplar von S. alpinus ansieht. Hinsichtlich des S. Güldenstaedtii hält er (S. 150) es für wahrscheinlich, daß Pallas unter diesem Namen den S. araneus begriffen hat. Die Maaße würden auch besser zu diesem als zu S. leucodon [1]) passen. Bei S. araneus mißt im Durchschnitt der Körper 2" 8‴ und der Schwanz ohne Haare 1" 6‴; bei S. leucodon 2" 10‴ und 1" 4‴. Die Unterschiede beider letztgenannten Arten hat Blasius scharf und durchgreifend auseinander gesetzt.

Eben ist mir vom Journ. of the Asiat. soc. of Bengal das erste Heft des Jahrgangs 1855 zugekommen, worin (S. 24 bis 38) eine Abhandlung von Blyth über die indischen Spitzmäuse enthalten ist. Obwohl es zu bedauern ist, daß dem Verfasser, der dermalen in Calcutta lebt, die nothwendige Literatur gebricht und er eben deshalb auch die allein zu sichern Resultaten führende Untersuchungs-Methode von Blasius nicht kennt, so ist er doch ein zu genauer Beobachter, als daß er nicht wichtige Beiträge zur Kenntniß der artenreichen Gattung Sorex sollte geliefert haben. Für Indien zählt Blyth nicht weniger als 19 Arten auf, unter denen freilich einige zweifelhaft geblieben sind. Ich werde nach meiner Anordnung die von Blyth hier benannten Arten aufführen.

1. Subgen. Crocidura Wagl.

Wie Blyth diese Gruppe charakterisirt, so sind die Zähne (mit Ausnahme von S. melanodon) ganz weiß; die obern Schneidezähne stark und viel länger als ihr hinterer Ansatz, die untern selten mit einer Spur eines gezackten obern Randes; oben finden sich 4 Lückenzähne, von denen gewöhnlich der erste groß, der zweite und dritte viel kleiner, der vierte winzig ist und der dritte den zweiten übertrifft. Der Schwanz ist dick, verschmächtigt sich hinterwärts und ist mit langen zerstreuten Haaren versehen. Ganz richtig erkennt Blyth, daß diese Gruppe identisch mit Pachyura Selys ist.

1) Durch einen Druckfehler ist S. 561 bei S. leucodon die Körperlänge zu 5", statt 3", angegeben.

a) dentes omnino albi. — Crocidura Wagl.

†) species maximae aut mediocres.

1. Sorex coerulescens Shaw, richtig bestimmt. Gemein in Bengalen, Nepal, wohl auch im Thale von Assam, selten in Sylhet und ganz verschwindend in Arakan; auf der malayischen Halbinsel kommt diese Art wohl nicht vor.

2. S. murinus Linn., S. myosuros Pall., ist identisch mit meiner, unter letzterem Namen aufgeführten Art. Blyth kennt sie nicht aus Vorderindien, wohl aber aus Arakan, Khasya und der malayischen Halbinsel. Horsfield's Angabe von Nepal beanstandet er. Vom S. Griffithi Horsf., den er mit mir zu S. myosuros gehörig ansieht, macht er es höchst wahrscheinlich, daß er nicht aus Afghanistan, sondern aus Arakan abstammt. Nach dem S. indicus (S. Sonneratii) hat sich Blyth vergeblich umgesehen; sehr begreiflich, weil letzterer einerlei mit S. myosuros ist.

3. S. serpentarius Is. Geoffr., (S. candianus Kelaart; journ. of the Asiat. soc. XX. p. 164, 185; XXI. p. 350, XXII. p. 412), nach Exemplaren von Kandia auf Ceylon und Mergui; scheint richtig bestimmt.

4. S. soccatus Hodgs. (ann. of nat. hist. XV. p. 270) von Nepal und Sikim. Blyth rechnet hieher ein Exemplar aus Sikim, doch ist es um ein gut Theil dunkler, mit wohl besetzten Füßen und Schwanze, und Kopf und Beine sind verhältnißmäßig stärker. Nach Hodgson's Angabe ist dieser S. soccatus in Größe und Verhältnissen dem S. nemorivagus ähnlich, unterscheidet sich aber durch seine bis zu den Nägeln behaarten Füße, den deprimirten Kopf und die angeschwollene Wangengegend. Ohren groß und vorragend. Farbe einförmig schmutzig oder bräunlich schieferblau, was sich bis zu den behaarten Extremitäten ausdehnt. Körper 3¼", Schwanz 2⅛".

5. S. nemorivagus Hodgs. (S. 553.) ist von Blyth nicht beobachtet worden. Er stimmt nicht der Meinung von Gray bei, daß diese Spitzmaus blos ein halbwüchsiger S. murinus (S. coeruleseens) sei und beruft sich auf Hodgson's Charakteristik, die allerdings mit einer solchen Ansicht nicht zusammenstimmt. Eher dürfte, wie Blyth zufügt, Horsfield in seinem Katalog diesen S. nemorivagus für S. murinus (S. myosuros) genommen haben.

6. S. heterodon Blyth, neue Art aus den Khasya-Bergen. Sehr ähnlich dem S. soccatus, aber nicht so dunkelfarbig, und blaß, anstatt schwärzlich, an den Füßen und der Unterseite des Schwanzes; die Füße mit einem behaarten Fleck unter der Ferse. Der Schädel ist so lang als der von S. soccatus, aber viel schmäler und die obern Schneidezähne nicht so stark gekrümmt.

7. S. niger Ell. (S. 566) ist von Blyth nicht gefunden worden.

8. S. ferrugineus Kelaart (journ. of the Asiat. soc. XX. p. 185 = S. montanus Blyth l. c. p. 163; XXI. p. 350) von Ceylon. Wie Kelaart angiebt, ist diese Art etwas kleiner als S. montanus (nach Blyth fast von derselben Größe), Füße und Beine nackt, Pelz weich rostbraun mit Blau überlaufen; der Geruch sehr unangenehm, während S. montanus keinen solchen hat. Das Gebiß kommt mit dem von S. murinus Linn. überein.

9. S. montanus Kelaart (journ. XX. p. 163) aus den Gebirgen von Ceylon. Körper $3\frac{3}{4}''$, Schwanz $2\frac{1}{4}''$, Hinterfuß $\frac{2}{3}''$. Pelz oben rußschwarz ohne rostigen Anflug, unten lichter; Schnurren lang, silbergrau, Untertheil der Beine und Füße graulich, mit anliegenden Haaren besetzt, Krallen kurz und weißlich. Ohren groß, rund, nackt, ihr äußerer Rand in gleicher Höhe mit dem Pelz des Kopfs und Nackens, daher hinterwärts verdeckt.

††) species minimae.

10. S. pygmaeus Hodgs. (S. 545) kennt Blyth aus Autopsie nicht, doch weist er nach, daß diese Spitzmaus von S. pygmaeus Pall. ganz verschieden ist, wiewohl Gray beide zusammenstellt.

11. S. micronyx Blyth, als neue Art nach 2 Exemplaren von Kemaon und Landour aufgestellt. Zähne weiß. Krallen mit feinen Härchen überdeckt und überaus klein. Pelz von blasserer und mehr kastanienbrauner Färbung als bei irgend einer von den kleinen Arten und auch unten mehr silberig. Füße und Schwanz nur dünn behaart und die Haut nicht verdeckend; oben brauner, unten weißlich oder vielleicht fleischfarbig. Körper $1\frac{5}{8}''$, Schwanz $1\frac{1}{8}''$.

12. S. Perrotteti Duvern. (S. 555); nach einem weiblichen Exemplare aus Dartschiling von Blyth also bestimmt. Körper $1\frac{1}{4}''$, Schwanz $1''$. Zähne weiß, Schwanz mit langen einzelnen Haaren. Pelz einför-

mig braun mit leichtem kastanienfarbigen Anflug, unten kaum blasser. Füße und Schwanz behaart, Krallen weißlich und deutlich; Schwanz oben braun, unten blaß. Wenn diese Spitzmaus als neu sich ausweisen sollte, will ihr Blyth den Namen S. Hodgsonii vorbehalten; indeß, so weit als man ohne genauere Kenntniß des Gebißes urtheilen kann, scheint sie mir mit S. Perrotteti übereinzustimmen.

13. S. nudipes Blyth; eine neue Art von Tenasserim, auffallend durch ihre nackten Füße, großen Ohren und die großen Seitendrüsen, welche den andern kleinen Arten abgehen. Körper $1\frac{1}{2}$", Schwanz $1\frac{1}{16}$". Ohren merklich größer als bei den andern, Schwanz, mit Ausnahme der langen zerstreuten Haare, fast nackt; Vorderfüße und Zehen der Hinterfüße nackt und fleischfarbig. Pelz oben einförmig braun wie bei S. vulgaris, etwas gesprenkelt und schimmernd, die Unterseite mit silberigem Schimmer. Schwanz etwas dick, gleichmäßig sich verdünnend, oben braun, unten blaß.

14. S. atratus Blyth; als neue Art nach einem Exemplare ohne Kopf aus den Khasya-Bergen aufgestellt. Ausgezeichnet durch die sehr dunkle Färbung, welche sich über die Füße und den Schwanz erstreckt, der ebenfalls unten schwärzlich ist; letzterer ist 1" lang. Pelz oben schwärzlichbraun, etwas röthlich überlaufen, unten dunkelgrau. Füße und Schwanz behaart, letzterer außerdem mit langen einzelnen Haaren.

b) dentes picei, apice albi. — Paradoxodon.

In allen Stücken mit Crocidura übereinstimmend, aber dadurch verschieden, daß die Zähne blos an der Spitze weiß, im Uebrigen pechfarbig sind.

15. S. melanodon Blyth; eine neue, in einem Hause in Calcutta aufgefundene Art, die sich als solche schon durch die höchst eigenthümliche, im Gegensatze zu Sorex Wagl. stehende Färbung der Zähne ausweist. Körper $1\frac{7}{8}$", Schwanz $1\frac{1}{16}$", Hinterfuß mit Kralle $\frac{5}{16}$". Pelz einfarbig braun, ohne irgend einen röthlichen Anflug, unten kaum blasser. Füße und Schwanz fast nackt, außer den einzelnen langen Haaren des letzteren; beide nebst Ohren und Schnautze von einer schwarzgelblichen Färbung, unten dunkler; Krallen weiß und deutlich sichtlich.

2. Subgen. Feroculus Kel. n. subgen.

Dentes toti albi 30, intermedii superiores utrinque 4, primores inferiores serrati; cauda brevipilosa pilis longioribus patentibus instructa.

Es ist dieß eine Untergattung, die man anerkennen und zwischen Sorex Wagl. und Crocidura Wagl. einschalten muß. Zähne klein, und weiß; die obern Schneidezähne minder stark gekrümmt und mit großem hinteren Ansatz, die untern gezähnt, mit zwei Aushöhlungen und daher mit einer Reihe von drei Spitzen; von den 4 obern Lückenzähnen sind die beiden mittlern gleich groß, der erste ziemlich groß und der letzte klein. Ohren kaum sichtlich über dem Pelz, Füße auffallend stark, Schwanz dick, allmählig sich verdünnend, mit zerstreuten langen Haaren.

16. S. macropus Blyth = S. feroculus Kel. (journ. of the Asiat. soc. XX. p. 163), von Ceylon. Körper $4\frac{1}{4}$", Schwanz $2\frac{1}{4}$", Hinterfuß $\frac{7}{8}$"; Vorderfüße $\frac{1}{4}$" breit mit langen und nur schwach gekrümmten Krallen, von denen der des Mittelfingers $\frac{1}{4}$" lang ist. Pelz ziemlich lang und sehr weich, einförmig schwärzlich, sehr schwach röthlich überlaufen, Schwanzspitze nackt und fleischfarbig.

3. Subgen. Soriculus Blyth n. subgen.

Dentes 30 apice piceo-colorati, intermedii superiores utrinque 4, primores inferiores haud serrati angulo aucti; pedes haud ciliati, cauda brevipilosa pilis longioribus destituta.

Diese Untergattung kommt im Gebiße mit Crossopus überein, unterscheidet sich aber davon durch die gewöhnliche, nicht für den Aufenthalt im Wasser eingerichteten Füße. Der Schwanz ist wie bei der Untergattung Sorex Wagl. beschaffen, nämlich mausähnlich, ohne die langen flatternden Haare von Crocidura: die Ohren sind unter dem Pelze versteckt.

17. S. nigrescens Gray, (S. 546.), wozu auch Blyth den S. sikimensis Hodgs. (S. 566) zieht und folgende Bemerkungen beifügt. Körper $3\frac{1}{4}$", Schwanz $1\frac{1}{2}$", Hinterfuß mit Krallen $\frac{5}{8}$". Schwanzwirbel 15, ohne die äußerste Spitze. Pelz durchgängig schwärzlich, etwas röthlich überlaufen; Füße und Krallen blaß. Sehr gemein in Sikim. — Nach Gray's Vorgang hatte ich S. nigrescens mit S. soccatus vereinigt; aus den Untersuchungen von Blyth ergiebt es sich aber, daß beide sogar zu verschiedenen Untergattungen gehören.

Noch führt Blyth 2 Arten an: S. himalayicus Gray und S. caudatus Hodgs., die er jedoch in Ermangelung von Exemplaren eben so wenig in den Untergattungen einzureihen weiß als ich.

Sorex flavescens S. 557.

Gelegentlich dieser Art macht Sundevall (öfvers. af K. Vetensk. Akadem. förhandl. 1846 p. 119) folgende Bemerkung: „Sorex rutilus nob., S. flavescens Smith Ill. descriptio ad tab. 45 (sed non S. flavescens Is. Geoffr., cui cauda multo brevior etc.), maxime affinis S. fulvastro, dilute fulvescens, subtus flavescenti griseus; cauda quadrangula, crassa, paullo breviore quam dimidio corpore. 110 m. m. (4" 1‴) † cauda 50 (1" 10‴), planta c. u. 16½. Rhinarium bifidum et valvulae auris interioris villoso-fimbriatae ut in S. fulvastro. E Port Natal allatus."

Sorex (Myosorex) caffer S. 565.

S. supra e nigrofusco griseoque varius, subtus cinerascens, pedibus fuscis.

Sorex caffer. Sundev. öfvers. af K. V. Akad. förhandl. 1846 p. 119.

Ich habe schon a. a. O. bemerklich gemacht, daß S. caffer von S. varius specifisch abzuweichen scheine und die Vergleichung von Sundevall's Charakteristik des ersteren mit einem Exemplare des letzteren hat mich in dieser Ansicht noch mehr bestärkt. Sundevall giebt von seinem S. caffer folgende Merkmale an. E. sectione S. varii (dentibus totis albis, cauda tota tenui, unguibus anticis majoribus); nigro-fuscus, obsoletius griseo-varius, subtus cinerascens, pedibus fuscis. Minor et nigrior quam S. varius: 75 m. m. (2" 9½‴) † cauda 35 (1" 4‴), planta c. u. 15. Rostrum non cristatum. Forma omnino S. varii, sed cauda tetragona, paullo crassa ut in S. russulo (S. araneo). E. Caffraria interiore et Port-Natal). — Zur Unterscheidung bemerke ich noch, daß bei S. varius die Füße schmutzig gelblichweiß sind.

Scalops und Talpa. S. 571 u. 576.

In den Proceed. of the Academ. of Philadelph. VI. p. 320 suchte Le Conte nachzuweisen, daß die Gattung Scalops zu unterdrücken und ihre Arten bei Talpa einzureihen wären. Als Hauptargument führt

er an, daß mehrere Arten von Scalops die gleiche Anzahl von Zähnen mit Talpa gemein hätten und nur in der Größe des ersten und vierten oberen Zahnes Verschiedenheiten darböten. Diese erweiterte Gattung will er dann weiter in folgende 3 Gruppen abtheilen.

a) Dentes 44, 4to superiore et 5to inferiore majore; rostrum latum depressum naribus terminalibus; pedes postici non palmati.

Zu dieser Gruppe gehören Talpa europaea und coeca, nebst einer neuen Art, die Le Conte als Talpa reposta bezeichnet. In der größeren Breite der mittlern Schneidezähne nähert sie sich der T. coeca, dagegen folgen im Unterkiefer nach dem fünften eckzahnähnlichen Zahn vier kleine einfache und gleiche Zähne, alsdann die gewöhnlichen mehrzackigen. In der Färbung gleicht dieses Exemplar vollkommen der Talpa europaea, doch sind die Schwanzhaare ganz schwarz. Der Körper mißt 4. 8″, der Schwanz 0. 8″. Der Wohnort ist unbekannt. — Daß dieses Exemplar zu Talpa gehört, kann ich nicht bezweifeln, dagegen liegt in der Angabe der Zahl der Zähne ein Widerspruch. Le Conte läßt nach dem untern falschen Eckzahn 4 Lückenzähne (statt 3 wie bei den andern Arten von Talpa) folgen, wodurch also die neue Art 2 Zähne mehr als die übrigen, d. h. im Ganzen 46, zählen würde, während er selbst in der Charakteristik der ersten Gruppe 44 angiebt. Dieser Widerspruch ist erst zu lösen, bevor man sich über die Artberechtigung dieser Talpa reposta aussprechen kann, von der überdieß die Unbekanntschaft mit ihrer Heimath ein großer Uebelstand ist.

b) Dentes 44, incisivis mediis superioribus magnis, dente 4to superiore vix elongato; rostrum elongatum, gracile, naribus vel lateralibus, vel supernis; pedes postici non palmati.

Von den 7 Zähnen, die im Oberkiefer nach dem großen Schneidezahne folgen, sind die 3 ersten spitz, conisch und nehmen allmählig an Größe zu; die 3 folgenden sind klein, schwach zusammengedrückt und wachsen ebenfalls etwas an Größe, der 7te ist dreieckig, mäßig groß, mit einer kleinen vorn-innern Spitze. Die hieher gehörigen Arten ordnet Le Conte folgendermassen an:

†) nares laterales.

cinereo-nigra, cauda longa valde pilosa . . . . . T. Breweri.

††) nares superni, cauda brevis parce pilosa.

aeneo-brunnea, ungues antici nigri . . . . . T. aenea.
concolor (fusco-nigra), pedibus solis pallidioribus . . . . T. Townsendii.
cinereo-nigra, pedibus pallidis, fronte vittaque inferna albis . T. taeniata.

Letztere Art (T. taeniata) will Le Conte auf das von mir (S. 574) ebenfalls erwähnte Exemplar, das Bachman und Audubon als Farbenspiel von Sc. Townsendii betrachteten, begründen; vor der Hand kommt mir letztere Ansicht immer noch als die wahrscheinlichere vor.

c) Dentes 36, primo superiore, 2do inferiore magnis; rostrum subdepressum naribus supernis; pedes postici palmati.

Hieher stellt Le Conte Scalops aquaticus, latimanus und eine neue Art, die er Talpa Pennantii benennt und in ihr den yellow mole von Pennant sieht. Da sie im Gebiß mit Sc. aquaticus übereinstimmt und nur in der lichtern Färbung sich unterscheidet (Haare an der Spitze gelblichbraun, am Grunde dunkelgrau, Füße und Schwanz blaß, letzterer kurz und nackt), überdieß nur auf einem einzigen Exemplare beruht, so wird diese T. Pennantii doch wohl nur zu den Farbenabänderungen von Scalops aquaticus zählen.

Was endlich die Vereinigung von Scalops mit Talpa anbelangt, so ist diese durchaus zu mißbilligen, da das Zahnsystem beider nach einem ganz verschiednen Typus gebildet ist, und dieses Merkmal in erster Linie bei Feststellung und Unterscheidung von Gattungen in Berücksichtigung kommt. Die erste Abtheilung von Le Conte bleibt also allein auf Talpa beschränkt; die beiden andern bleiben nach wie vor davon getrennt und bilden die Gattung Scalops in der Ausdehnung, wie ich sie mit meinen Vorgängern genommen habe. Als äußeres Merkmal zur Unterscheidung der beiden Gattungen Talpa und Scalops kann dienen, daß bei erstierer die Nasenlöcher endständig, bei letzterer ober- oder seitenständig sind.

Phyllostoma perspicillatum. S. 626.

Phyllostoma obscurum, von dem der Kopf auf Tab. 42 fig. 5 abgebildet ist, halte ich nur für eine kleinere Varietät von Ph. perspicillatum.

Centurio flavigularis S. 639.

Von dieser Art haben nunmehr Lichtenstein und Peters (in

den Abh. der Berlin. Akadem. 1855 S. 81 tab. 1) die ausführliche Beschreibung nach der äußern und innern Beschaffenheit, zugleich mit der Abbildung des Thieres geliefert.

Vespertilio nitens Natt. tab. 51 fig. 4.

Nach Natterer's Zeichnungen abgebildet, ohne daß ich dermalen ein ausgestopftes Original-Exemplar damit vergleichen kann, wahrscheinlich aber mit meinem V. arctoideus identisch.

Nycticejus Dinganii Smith S. 769.

Herr Prof. Peters hat die Gefälligkeit gehabt, mir brieflich mitzutheilen, daß er bei seiner Anwesenheit in Stockholm fand, daß Nycticejus Dinganii = Scotophilus Dinganii A. Smith = Vesperugo Dinganii Sundev. ist. Somit ist meine Vermuthung zur Gewißheit gebracht.

BIBLIOTHECA BODLEIANA

BIBLIOTHECA BODLEIANA



BIBLIOTHECA BODLEIANA





BIBLIOTHECA BODLEIANA

BIBLIOTHECA BODLEIANA



BIBLIOTHECA BODLEIANA

BIBLIOTHECA BODLEIANA

BIBLIOTHECA BODLEIANA

BIBLIOTHECA BODLEIANA

BIBLIOTHECA REGIA HOLMIENSIS



lich.



fec.



BIBLIOTHECA BODLEIANA



lith.



BIBLIOTHECA · REGIA · MONACENSIS

BIBLIOTHECA BODLEIANA

BIBLIOTHECA BODLEIANA

4.

2.



Weber lith.

Weber lith.